



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>






**BRANNER  
GEOLOGICAL LIBRARY**



Rare  
Book







**BRANNER  
GEOLOGICAL LIBRARY**



Rare  
Book







## DU MÊME AUTEUR.

---

**Cours élémentaire de Paléontologie et de Géologie stratigraphiques.** 2 volumes in-12 avec 600 vignettes gravées en relief et sur cuivre par M. E. Salle, et 18 tableaux réunis en un atlas in-4..... 10 fr.  
Le premier volume est en vente.

**Paléontologie française (TERRAINS CRÉTACÉS).** Les 160 livraisons publiées contiennent les Mollusques céphalopodes, gastéropodes, acéphales, brachiopodes et bryozoaires, formant 4 volumes de texte et 4 volumes de planches.

**Paléontologie française (TERRAINS JURASSIQUES).** Il a déjà paru 62 livraisons comprenant les Céphalopodes et le commencement des Mollusques gastéropodes. — Les prix sont par livraison, comprenant 4 planches in-8 tirées sur papier vélin, et du texte correspondant, 1 fr. 25 c. pour Paris, 1 fr. 35 c. pour les départements.

**Foraminifères fossiles du bassin tertiaire de Vienne (Autriche).** 1 vol. in-4 avec 21 planches du même format ..... 25 fr.

**Voyage dans l'Amérique méridionale,** pendant les années 1826 à 1834. 10 vol. in-4°, y compris 500 planches.



**PRODROME**  
DE  
**PALÉONTOLOGIE**

**STRATIGRAPHIQUE UNIVERSELLE**

DES

**ANIMAUX MOLLUSQUES & RAYONNÉS**

FAISANT SUITE

**AU COURS ÉLÉMENTAIRE DE PALÉONTOLOGIE**

**ET DE GÉOLOGIE STRATIGRAPHIQUES,**

PAR

**M. ALCIDE D'ORBIGNY**

Docteur ès sciences, Professeur suppléant de Géologie à la Faculté des Sciences de Paris,

Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, de l'ordre de saint Vladimir de Russie, de l'ordre de la Couronne de fer d'Autriche, officier de la Légion d'honneur Belivienne; membre des Sociétés philomatique, de géologie, de géographie et d'ethnologie de Paris, membre honoraire de la Société géologique de Londres; membre des Académies et Sociétés savantes de Turin, de Madrid, de Moscou, de Philadelphie, de Ratisbonne, de Montevideo, de Bordeaux, de Normandie, de la Rochelle, de Saintes, de Blois, de l'Yonne, etc.

---

**DEUXIÈME VOLUME.**

---

STATIONER, 100 N. 3RD ST. N. Y.

**VICTOR MASSON,**

**Place de l'École de Médecine, 17. — Paris.**



1850

546672

YSA

19 MAY

## TERRAINS JURASSIQUES.

### QUATORZIÈME ÉTAGE : — CORALLIEN.

#### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITES**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 212.

\*1. **excentralis**, Young, d'Orb., Paléont. univ., p. 57, Terr. jurass., 1, p. 120, pl. 17. France, Villerville (Calvados), Wagnon (Ardennes).

\*2. **Boyerianus**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 64, Terr. jurass., 1, p. 132, pl. 22. France, Roocourt-la-Côte (H.-Marne), Esnandes, près de la Rochelle (Charente-Inférieure); Suisse, Laufon, Aarau.

**NAUTILUS**, Breynius, 1752. Voy. t. 1, p. 54.

\*3. **giganteus**, d'Orb., 1825, id., Paléont. franç., Terr. jurass., 1, p. 163, pl. 36. France, Pointe-du-Ché, près de la Rochelle (Charente-Inférieure), Maranville, Nantua (Ain); Suisse, Chaux-de-Fonds; Verdun (Meuse).

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. p. 181.

\*4. **Cymodoce**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 202, 203, fig. 1. Dompierre, la Belle-Croix, près de la Rochelle.

\*5. **Radisensis**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 203, fig. 2, 3. France, Loix, Ile-de-Ré (Charente-Inférieure).

\*6. **Altenensis**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 204. *A. inflatus macrocephalus*, Quenstedt, 1847 (non *inflatus*, Sow., non *macrocephalus*, Schloth.). France, la Belle-Croix, Dompierre, près de La Rochelle, Beauvoir (Deux-Sèvres), Tonnerre (Yonne).

\*7. **Bupellensis**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 105. *A. Bakeriæ*, Quenstedt, 1847, p. 192, pl. 16, fig. 7 (non Sowerby). *A. perarmatus-mamillatus*, Quenstedt, pl. 16, fig. 11 (non *A. perarmatus*, Sow., non *mamillatus*, Schl.). France, Marsilly, la Belle-Croix, près de La Rochelle (Charente-Inférieure), Beauvoir.

\*8. **Achilles**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 106, 107, fig. 1, 2. France, La Rochelle, Belle-Croix, Pointe-des-Minimes, Marsilly (Charente-Inférieure), Beauvoir (Deux-Sèvres).

#### MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**RISSOINA**, d'Orb., 1840. Voy. t. 1, p. 297.

\*9. **bisulca**, d'Orb., 1841. *Rissoa bisulca*, Buvignier, 1843, Mém.

Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 16, pl. 5, fig. 13 et 14. St-Mihiel.  
**RISOA**, Fremenville, 1814. Voy. 1, p. 183.

\***10. unisulca**, Buvignier, 1843, Verdun, t. 2, p. 16, pl. 5, fig. 15. St-Mihiel.

\***11. unicarina**, Buvignier, 1843, Verdun, t. 2, p. 16, pl. 5, fig. 12. St-Mihiel.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801. D'Orb., Paléont., Terr. crét., 2, p. 49.

**12. Münsteri**? Römer, 1836, p. 147, pl. 11, fig. 10. Hoheneggelsen.

**CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.

\***13. athleta**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est de 15°, longue de 250 mill., lisse, à tours légèrement convexes, quoique plats au milieu. France, St-Mihiel (Meuse), Châtel-Censoir, Rues.

\***14. Dormoisii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Heddingtonensis*, mais à tours non renflés, néanmoins distincts sur la suture; angle spiral, 16°. France, Tonnerre (Yonne).

\***15. Cæcilia**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est de 16°, lisse, à tours sans aucune saillie les uns sur les autres. Wagnon.

\***16. Clio**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est de 13° 1/2, lisse, effilée, à tours plans seulement à peine saillants en gradins à leur partie inférieure. Oyonnax (Ain), Wagnon, Saulce-aux-Bois (Ardenne), Estré (Charente-Inférieure).

\***17. Clytia**, d'Orb., 1847. Coquille dont l'angle spiral est de 17° avec les tours légèrement renflés comme chez le *C. gigantea*, mais bien plus allongés. Trouville, Saulce-aux-Bois.

\***18. Cepha**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est de 26°, lisse, sans saillie aux tours de spire. Saulce-aux-Bois (Ardenne).

\***19. Calliope**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est de 16°, mais de forme pupoïde, les tours renflés à la partie inférieure. Saint-Mihiel.

\***20. Calypso**, d'Orb., 1847. Espèce grande, courte et renflée, dont l'angle spiral est de 52°, mais dont les tours, sans aucune saillie, sont très-étroits. France, Oyonnax.

\***21. Cornelia**, d'Orb., 1847. Petite espèce oblongue, pupoïde, dont l'angle spiral est de 48°, les tours lisses, sans saillie, assez longs. Tonnerre (Yonne), Oyonnax (Ain).

\***22. Callirhoë**, d'Orb., 1847. Petite espèce courte, presque paludiforme, lisse, à tours non saillants. France, La Rochelle.

\***22'. Pollax**, d'Orb., 1849. Grande espèce lisse à angle spiral bien plus ouvert que chez les espèces précédentes. Saintpuits (Yonne).

**NERINEA**, Defrance, 1825. Voy. t. 1, p. 262.

\***23. elongata**, Voltz, Bronn, 1837, Jahrb., p. 550, pl. 6, fig. 15. Trécourt (Haute-Saône), Oyonnax, près de Nantua (Ain), St-Mihiel.

\***24. Mandelslohi**, Bronn, 1837, Jahrb., pl. 6, fig. 26, p. 553. Goldf., pl. 175, fig. 4. *N. triplicata*, Pusch, 1837, Polens., Paléont., pl. 10, fig. 16. Wagnon, Saulce (Ardenne), Tonnerre, Châtel-Censoir (Yonne), St-Mihiel (Meuse), Pointe-du-Ché, près de La Rochelle (Charente-Inférieure), Oyonnax, Landeyron, près de Nantua (Ain); Allem., Wurtemberg, Nattheim.

- \***25. fasciata**, Voltz, 1835. Bronn, 1837, Jahrb., pl. 6, fig. 21, p. 554. Environs de Lisieux (Calvados), Coulange-sur-Yonne (Yonne).
- \***26. Visurgis**, Römer, 1836, Oolith., p. 148, pl. 11, fig. 26-28. Goldf., pl. 176, fig. 6. Bronn, 1837, Jahrb., p. 559, pl. 6, fig. 8. Oyonnax; Allem., Hildesheim, Goslar, Hannover, Hoheneggelsen.
- \***27. speciosa**, Voltz, 1835. Bronn, 1837, Jahrb., p. 550. France, St-Mihiel, Commercy; Suisse, Jura Bernois.
- \***28. Sequana**, Thirr, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 44, pl. 176, fig. 7. France, Lisieux (Calvados); Seesen, Ingolstadt.
- \***29. Mosse**, Desh., Dict. class. d'hist. nat., vol. 2, 1831, pl. 4, fig. 1, 2. Bronn, 1837, Jahrb., pl. 6, p. 564. Oyonnax (Ain), Saint-Mihiel, Châtel-Censoir (Yonne).
- \***30. Moreauiana**, d'Orb., 1841, Revue zoologique, p. 319. Saint-Mihiel, Nantua (Ain), Tonnerre (Yonne).
- \***31. subscalaris**, Münt., Goldf., 1843, 3, p. 41, pl. 175, fig. 12. St-Mihiel; Nattheim.
- \***32. turritella**, Goldf., 1843, 3, p. 43, pl. 176, fig. 5 (non Voltz). Nous possédons son type tout à fait distinct. All., Nattheim.
- \***33. elatior**, d'Orb., 1847. Espèce si allongée et si grêle qu'au diamètre de 9 mill., elle mesure jusqu'à 200 mill.; angle spiral, 3° 1/2, tours cylindriques évidés avec 5 rangées inégales de tubercules. La Rochelle, Beaume (Doubs).
- \***34. subcylindrica**, d'Orb., 1847. Espèce cylindrique, dont l'angle spiral est de 3°, tours de spire très-longs, lisses, légèrement saillants en gradins en arrière. St-Mihiel (Meuse).
- \***35. sexcostata**, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, angle spiral de 4°, à tours de spire fortement évidés, ornés de six côtes longitudinales, égales, point de plis à la columelle. La Rochelle.
- \***36. Jollyana**, d'Orb., 1847. Charmante espèce dont l'angle spiral est de 5° 1/2, à tours pourvus d'un bourrelet antérieur, saillants en gradins en arrière, ornés en travers de 5 petites côtes, deux plis sur la columelle. Roche-de-Bonneville, près de Clamecy, St-Mihiel.
- \***37. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, angle spiral de 5°, à tours très-évidés pourvus de 3 côtes au milieu. La Rochelle.
- \***38. Altenensis**, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, à tours évidés pourvus au milieu d'une rangée de tubercules. La Rochelle.
- \***39. inornata**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, à tours plans avec des indices de stries longitudinales. La Rochelle.
- \***40. Bernardiana**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, dont l'angle spiral est de 7°, les tours de spire pourvus d'un bourrelet en haut et en bas, et de stries intermédiaires alternes. Oyonnax.
- \***41. Nantuacensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce allongée; angle spiral 5°, dont les tours sont lisses, plans, et sans saillie, point de plis à la bouche. Oyonnax; Allem., Nattheim.
- \***42. teres**, Münt., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 43, pl. 176, fig. 3. France, Beaume (Doubs); Allem., Nattheim.
- \***43. Cottaldina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. Jollyana*, mais avec les tours de spire évidés, finement striés en long, angle spiral 4°. Châtel-Censoir, Oyonnax.
- \***44. canaliculata**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, dont l'angle

spiral est de 6°; les tours saillants en rampe en arrière, sont fortement canaliculés sur cette rampe. France, Châtel-Censoir.

- \***45. turriculata**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. Cottaldina*, et du *Jollyana*, mais avec des tours bien plus longs et plus obliques; angle spiral 5°. France, St-Mihiel.
- \***46. subtrilineata**, d'Orb., 1847. Coquille dont l'angle spiral est de 5°, à tours plans ou légèrement évidés, ornés de 3 séries de petits tubercules. Châtel-Censoir.
- \***47. Cæcilia**, d'Orb., 1847. Coquille dont l'angle spiral est de 10°, à tours étroits, carénés et saillants en avant, ornée de trois à quatre séries de tubercules indistincts. Châtel-Censoir, St-Mihiel.
- \***48. Calliope**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est de 6°, à tours de spire légèrement évidés, munis de légers bourrelets en haut et en bas, l'intervalle muni de 7 petites séries inégales de tubercules peu saillants. Châtel-Censoir.
- \***49. Callirhoë**, d'Orb., 1847. Coquille pourvue d'un angle spiral de 8°, à tours plans, saillants légèrement en gradins en arrière et inégalement striés. Châtel-Censoir.
- \***50. ornata**, d'Orb., 1847. Coquille ayant un angle spiral de 4°, à tours évidés, pourvus d'un bourrelet supérieur, d'une petite côte et de deux séries de tubercules au-dessous. Châtel-Censoir.
- \***51. Calypso**, d'Orb., 1847. Coquille pourvue d'un angle spiral de 15°; tours de spire excavés, pourvus d'un bourrelet en haut et en bas et d'une rangée de tubercules oblongs au milieu. St-Mihiel, Châtel-Censoir, Verdun (Meuse).
- \***52. Cassiope**, d'Orb., 1847. Coquille dont l'angle spiral est de 6° 1/2; tours de spire évidés, lisses, pourvus en haut d'un fort bourrelet arrondi, en bas d'un néplat saillant. France, Yonnax.
- \***53. Defranci**, Desh., 1836, Moll. de Morée, p. 186, pl. 26, fig. 1, 2. *N. nodulosa*, Deslongch., 1842, Mém. de la Soc. linn. de Norm., 7, p. 181, pl. 8, fig. 23, 24 (non *N. nodulosa*, Deshayes, 1836). *N. turrita*, Voltz. St-Mihiel, Trouville (Calvados), Commercy, Saulce-aux-Bois (Ardennes), Yonnax (Ain), Tuzennecourt (H.-Marne), Roche de Bonneville, près de Clamecy (Nièvre), Châtel-Censoir, Veriel (Doubs), Saintpuits (Yonne); Morée. Cette espèce a son angle spiral de 15°, elle a des tubercules à la partie supérieure des tours, et quelquefois des ondulations transverses.
- \***54. Castor**, d'Orb., 1847. Espèce voisine par ses plis et ses ornements du *N. Defranci*, mais ayant des nodosités plus marquées et un angle spiral de 21 à 25° d'ouverture. Saulce-aux-Bois (Ardennes), St-Mihiel, Ferté-Bernard (Sarthe). C'est le *N. suprajurensis*, de Voltz, lorsqu'il cite cette espèce dans l'étage corallien de Commercy.
- \***55. Desvoidyi**, d'Orb., 1847. Espèce longue de 27 centimètres, dont l'angle spiral est de 10 à 12°, les tours lisses, renflés à la partie antérieure, point de plis sur la columelle. St-Mihiel, Saulce-aux-Bois, Wagnon, Yonnax, Roche-de-Bonneville (Nièvre), Châtel-Censoir, Saintpuits (Yonne).
- \***56. umbilicata**, d'Orb. Très-grande espèce dont l'angle spiral est de 16°, les tours lisses, un peu renflés, l'ombilic largement ouvert.



- Oyonnax, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, St-Mihiel ; Allem., Nattheim.
- \*57. *striata*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *N. Castor*, mais sans tubercules, et avec les tours striés en travers; angle spiral, 18°. France, St-Mihiel.
- \*58. *Clio*, d'Orb., 1847. Espèce voisine par les dents et la forme du *N. Mandelslohi*, mais s'en distinguant par le manque d'ombilic ouvert; angle spiral, 17° 1/2. St-Mihiel, Châtel-Censoir, Tuzennecourt (H.-Marne), Oyonnax.
- \*59. *Clymene*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. Moreauiana*, mais entièrement lisse, à tours non saillants, à deux plis sur le labre. France, Châtel-Censoir.
- \*60. *Clytia*, d'Orb., 1847. Espèce ayant la forme extérieure des *Chemnitzia*, mais ayant un canal sur la suture et un léger pli supérieur à la columelle. Saint-Mihiel, Châtel-Censoir, Coulange-sur-Yonne.
- \*61. *Cynthia*, d'Orb., 1847. Espèce à tours anguleux en avant, presque plans extérieurement, striés partout en long. France, Châtel-Censoir.
- \*62. *Crithæa*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, à tours plans, évidés seulement en avant, le reste forme un méplat en rampe en arrière. C'est le *N. elegans*, Voltz, non *elegans*, Thurman. France, Lisieux.
- \*63. *scalata*, Voltz, 1837, Jahrb., p. 317. France, Commercy.
- \*64. *subturritella*, d'Orb., 1837. Espèce allongée, dont les tours sont saillants en gradins en avant, et striés en long. *N. turritella*, Voltz, non Goldf., c'est le type. France, Commercy.
- \*65. *subteres*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 40, pl. 175, fig. 6. Lindner-Berge.
- \*66. *subcochlearis*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 41, pl. 175, fig. 14. Nattheim.
- \*67. *terebra*, Schübler, Zieten, 1830, Pétrific., p. 48, pl. 36, fig. 3. Goldfuss, pl. 175, fig. 13. Wurtemberg, Nattheim.
- \*68. *sulcata*, Schübler, Zieten, 1830, p. 48, pl. 36, fig. 4. Nattheim.
- \*69. *tricincta*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 42, pl. 176, fig. 1. Nattheim.
- \*70. *quinque-cincta*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 43, pl. 176, fig. 2. Nattheim.
- \*71. *quadricincta*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 43, pl. 176, fig. 4. Delsemben.
- \*72. *Rœmeri*, Philippi, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 43, pl. 176, fig. 5 bis (exclus. synonym.). Allem. Hoheneggelsen.
- \*73. *tuberculosa*, Rœmer, 1836, Nordd. Oolith., p. 144, pl. 11, fig. 29. Bronn, Jahrb., 1837, pl. 6, fig. 7. Allem., Berge, près de Hanovre.
- \*74. *imbricata*, Desh., Voltz, 1835, Jahrb., pl. 6, p. 563. Desh., 1836, Expéd. de Morée, 3, p. 185, pl. 26, fig. 4, 5.
- \*75. *nodulosa*, Desh., 1836, Moll. de Morée, p. 185, pl. 24, fig. 6, 7. Voltz, Jahrb., pl. 6. Morée.
- \*76. *simplex*, Desh., 1836, p. 186, pl. 26, fig. 8, 9. Morée.
- \*79. *pupoides*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, courte et large, conique,

dont l'angle spiral est de 45°, les tours convexes, sur le labre un pli, sur la columelle deux. France, Oyonnax.

- \***80. fusiformis**, d'Orb., 1847. Coquille fusiforme, dont l'angle spiral est de 20°, le dernier tour presque aussi long que le reste, légèrement renflé, acuminé en avant; bouche pourvue sur la columelle de deux et sur le labre d'un pli. France, Châtel-Censoir.

- \***81. Cabanetiana**, d'Orb., 1847. *Asteon Cabanetiana*, d'Orb., 1841, Revue zoologique, p. 318. France, Oyonnax, envir. de Nantua (Ain).

**ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.

- \***82. Corallina**, d'Orb., 1847. Petite espèce longue de quelques millimètres, ventrue, dont la moitié antérieure du dernier tour est seule sillonnée en travers. France, St-Mihiel.

**ACTEONINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 118.

- \***83. Dormoisiana**, d'Orb., 1847. *Acteon Dormoisiana*, d'Orb., 1841, Revue zoologique, p. 318. France, Nantua (Ain), Tonnerre, Saintpuits (Yonne), St-Mihiel.

- \***84. acuta**, d'Orb., 1847. *Acteon acuta*, d'Orb., 1841, Revue zoologique, p. 318. France, Oyonnax, envir. de Nantua.

- \***85. pupoides**, d'Orb., 1847. Très-petite espèce ovale, lisse, à tours très-rapprochés, pourvue d'une rampe sur la suture. France, La Rochelle.

- \***86. miliola**, d'Orb., 1847. Petite espèce allongée, entièrement lisse, à tours très-allongés. France, La Rochelle.

- \***86'. hordeum**, d'Orb., 1849. Petite espèce dont les tours sont plus longs que chez la précédente. Saintpuits (Yonne).

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

- \***87. grandis**, Müust., Goldf., 1844, 3, p. 118, pl. 199, fig. 8. France, Saulce-aux-Bois, La Rochelle, La Chapelle, près de Salins (Jura), Tonnerre (Yonne), Verdun, St-Mihiel (Meuse); Allem., Eichstadt; Suisse, Le Raimaux, près de Délémont (Berne).

- \***88. Danae**, d'Orb., 1847. Coquille ovale, dont l'angle spiral convexe est de 80°; tours lisses, bouche très-grande, ovale. France, La Rochelle, Ferté-Bernard (Sarthe).

- \***89. Daphne**, d'Orb., 1847. Espèce oblongue dont l'angle spiral est de 55°, les tours à peine renflés, peu larges. France, La Rochelle, Saulce-aux-Bois, Tonnerre.

- \***90. Dejanira**, d'Orb., 1847. Espèce oblongue, dont l'angle spiral est de 65°, les tours renflés, le dernier très-grand, point de rampe sur la suture. Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Dijon.

- \***91. Delia**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, dont l'angle spiral est de 72°, les tours renflés, courts, le dernier très-grand. France, Oyonnax, Châtel-Censoir, La Chapelle, près de Salins (Jura), Verdun, St-Mihiel, Saulce-aux-Bois, Grand-Combe-des-Bois, près de Morteau (Doubs).

- \***92. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce ovoïde, dont l'angle spiral est de 100 à 107°, les tours courts, excepté le dernier qui est très-ample, légèrement strié en long. France, La Rochelle, Saint-Mihiel, Verdun (Meuse).

- \***93. hemisphaerica**, d'Orb., 1847. *Nerita hemisphaerica*, Römer, 1836, *Oolith.*, p. 156, pl. 10, fig. 7. France, La Rochelle, Tonnerre, Saulce-aux-Bois, Nantua, Châtel-Censoir.

Oyonnax, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, St-Mihiel; Allem., Nattheim.

- \*57. *striata*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *N. Castor*, mais sans tubercules, et avec les tours striés en travers; angle spiral, 18°. France, St-Mihiel.
- \*58. *Clio*, d'Orb., 1847. Espèce voisine par les dents et la forme du *N. Mandelslohi*, mais s'en distinguant par le manque d'ombilic ouvert; angle spiral, 17° 1/2. St-Mihiel, Châtel-Censoir, Tuzennecourt (H.-Marne), Oyonnax.
- \*59. *Clymene*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. Moreauiana*, mais entièrement lisse, à tours non saillants, à deux plis sur le labre. France, Châtel-Censoir.
- \*60. *Clytia*, d'Orb., 1847. Espèce ayant la forme extérieure des *Chemnitzia*, mais ayant un canal sur la suture et un léger pli supérieur à la columelle. Saint-Mihiel, Châtel-Censoir, Coulange-sur-Yonne.
- 61. *Cynthia*, d'Orb., 1847. Espèce à tours anguleux en avant, presque plans extérieurement, striés partout en long. France, Châtel-Censoir.
- \*62. *Crithæa*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, à tours plans, évidés seulement en avant, le reste forme un méplat en rampe en arrière. C'est le *N. elegans*, Voltz, non *elegans*, Thurman. France, Lisieux.
- \*63. *scalata*, Voltz, 1837, Jahrb., p. 317. France, Commercy.
- \*64. *subturritella*, d'Orb., 1837. Espèce allongée, dont les tours sont saillants en gradins en avant, et striés en long. *N. turritella*, Voltz, non Goldf., c'est le type. France, Commercy.
- 65. *subteres*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 40, pl. 175, fig. 6. Lindner-Berge.
- 66. *subcochlearis*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 41, pl. 175, fig. 14. Nattheim.
- 67. *terebra*, Schübler, Zieten, 1830, Pétrific., p. 48, pl. 36, fig. 3. Goldfuss, pl. 175, fig. 13. Wurtemberg, Nattheim.
- 68. *sulcata*, Schübler, Zieten, 1830, p. 48, pl. 36, fig. 4. Nattheim.
- 69. *tricineta*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 42, pl. 176, fig. 1. Nattheim.
- 70. *quinque-cincta*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 42, pl. 176, fig. 2. Nattheim.
- 71. *quadricineta*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 43, pl. 176, fig. 4. Delsemben.
- 72. *Rœmeri*, Philippi, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 43, pl. 176, fig. 5 bis (exclus. synonym.). Allem. Hoheneggelsen.
- 73. *tuberculosa*, Rœmer, 1836, Nordd. Oolith., p. 144, pl. 11, fig. 29. Bronn, Jahrb., 1837, pl. 6, fig. 7. Allem., Berge, près de Hanovre.
- 74. *imbricata*, Desh., Voltz, 1835, Jahrb., pl. 6, p. 563. Desh., 1836, Expéd. de Morée, 3, p. 185, pl. 26, fig. 4, 5.
- 75. *nodulosa*, Desh., 1836, Moll. de Morée, p. 185, pl. 24, fig. 6, 7. Voltz, Jahrb., pl. 6. Morée.
- 76. *simplex*, Desh., 1836, p. 186, pl. 26, fig. 8, 9. Morée.
- \*79. *pupoides*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, courte et large, conique,

est de 72°, les tours arrondis, striés en long sur leur moitié inférieure. France, Saint-Mihiel.

**113. æquilineatus**, Münster, Goldf., 1844, 3, p. 57, pl. 181, fig. 2. Nattheim.

**114. angulato-plicatus**, Münster, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 57, pl. 181, fig. 3. Allem., Nattheim.

**115. Helenus**, d'Orb., 1847. *T. binodosus*, Münster, Goldf., 1844, Petr., 3, p. 58, pl. 181, fig. 4 (non Münster, 1839). Allem., Nattheim.

**116. cancellatus**, Münster, Goldf., 1844, 3, p. 58, pl. 181, fig. 5. Nattheim.

**\*117. minutissimus**, d'Orb., 1847. *T. minutus*, Römer, 1836, Oolith., p. 151, pl. 11, fig. 4 (non Deshayes, 1824). Hoheneggelsen.

**\*118. Moreanus**, d'Orb., 1847. Espèce très-déprimée, à tours déprimés, unis, avec un bourrelet autour d'un large ombilic. France, Saint-Mihiel.

**\*119. Delia**, d'Orb., 1847. Petite espèce conique, à tours ornés au pourtour de deux rangées de grosses nodosités, le reste costulé en long. France, Saint-Mihiel.

**\*120. Dirce**, d'Orb., 1847. Petite coquille plus large que haute, ornée au pourtour subcaréné de onze pointes obtuses, le côté de la bouche fortement ridé en travers. France, Saint-Mihiel.

**HELICOCRYPTUS**, d'Orb., 1847. C'est un *Solarium* dont les tours embrassants en dessus cachent une partie de la spire.

**\*121. pusillus**, d'Orb., 1847. *Helix pusilla*, Römer, 1836, Oolith., p. 161, pl. 9, fig. 31. France, Saint-Mihiel; Allem., Hoheneggelsen.

**TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.

**\*122. princeps**, Römer, 1836, Oolith., p. 153, pl. 11, fig. 1. Goldf., pl. 195, fig. 2. France, Saulce-aux-Bois (Ardennes), Châtel-Censoir, La Rochelle; Allem., Hildesheim.

**\*123. globatus**, d'Orb., 1847. *Delphinula globata*, Buvignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 20, pl. 5, fig. 33, 34. France, Saint-Mihiel, Loix, île de Ré (Charente-Inférieure).

**\*124. substellatus**, d'Orb., 1847. *Delphinula stellata*, Buvignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 20, pl. 5, fig. 35 et 36 (non *stellatus*, Gmelin, 1789). France, Saint-Mihiel.

**\*125. bicinctus**, d'Orb., 1847. *Littorina bicincta*, Buvignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 20, pl. 6, fig. 1. Saint-Mihiel.

**\*126. granicostatus**, d'Orb., 1847. *Littorina granicosta*, Buvignier, 1843, Mém. Soc., t. 2, p. 21, pl. 6, fig. 2. France, Saint-Mihiel.

**127. Cotteausius**, d'Orb., 1847. Grande espèce, aussi haute que large, tours subanguleux munis de larges tubercules transverses, le reste avec de larges côtes. France, Châtel-Censoir (M. Cotteau).

**\*128. subfunatus**, d'Orb., 1847. *Delphinula funatus*, Goldf., 1844, 8, p. 89, pl. 191, fig. 11 (non *funatus*, Sow., 1824). France, Saint-Mihiel; Würtemb., Nattheim.

**\*129. tegulatus**, Münster, Goldf., 1844, 3, p. 100, pl. 195, fig. 1. Saint-Mihiel; Nattheim.

**\*130. Emylius**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. substellatus*, mais pourvue de côtes granuleuses, nombreuses du côté de l'ombilic. Fr., Saint-Mihiel.

- \***131. Ephynes**, d'Orb., 1847. Espèce allongée pourvue sur la convexité de la spire de gros tubercules espacés. France, La Rochelle.
- \***132. Epulus**, d'Orb., 1847. Espèce assez courte, dont les tours ont deux côtes saillantes, tuberculeuses, séparées par deux autres plus petites. France, Saint-Mihiel.
- \***133. Rathierianus**, d'Orb., 1847. Jolie espèce conique plus longue que large, ornée de deux côtes longitudinales près de la suture, et de deux autres sur la convexité du dernier tour. France, Tonnerre.
- \***134. Erinus**, d'Orb., 1847. Espèce plus large que haute, entièrement lisse, à tours peu renflés, bouche ronde. France, Saint-Mihiel, Châtel-Censoir.
- \***135. Erippus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. globatus*, mais avec une côte granuleuse plus forte que les autres à la partie inférieure des tours. France, Saint-Mihiel.
- \***136. Eryx**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. funatus*, mais pourvue d'une rampe aplatie près de la suture. France, Saint-Mihiel.
- \***137. Eudoxus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais munie de trois grosses côtes granuleuses inférieures, et d'une autre rangée de tubercules au pourtour de l'ombilic. Saint-Mihiel.
- 138. punctato-sulcatus**, Rœm., 1836, p. 153, pl. 11, fig. 7. Hoheneggelsen.

**139. Auchurus**, Münst., Goldf., 1844, 3, p. 100, pl. 194, fig. 18. Nattheim.

\***140. Moreausius**, d'Orb., 1847. Assez grande espèce, plus longue que large, avec de fortes nodosités transverses, doubles, le dernier tour évasé. France, Saint-Mihiel.

**STOMATIA**, Lamarck, 1801. Voy. 1, p. 7.

**141. carinata**, d'Orb., 1847. *Stomatella carinata*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 19, pl. 5, fig. 27, 28. France, Saint-Mihiel.

**142. funata**, d'Orb., 1847. *Stomatella funata*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 19, pl. 5, fig. 29 et 30. France, Saint-Mihiel.

**PHASIANELLA**, Lamarck, 1802. Voy. t. 1, p. 67.

\***143. Buvignieri**, d'Orb., 1847. *P. paludiformis*, Buvignier, 1843, Mém., t. 2, p. 21, pl. 6, fig. 3, 4 (non Zieten, 1830). St-Mihiel.

**DITREMARIA**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 229.

\***144. ornata**, d'Orb., 1847. *Pleurotomaria ornata*, Münst., Goldf., 1844, 3, p. 100, pl. 195, fig. 6. France, Saint-Mihiel, Châtel-Censoir; Allem., Nattheim.

\***145. Rathieriana**, d'Orb., 1847. Grande espèce large de 70 millimètres, dont l'angle spiral est de 85°, les tours en gradins striés en long. France, Tonnerre (Yonne), Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Châtel-Censoir, Saulce-aux-Bois.

\***146. scalaris**, d'Orb., 1847. Grande espèce large de 80 millimètres, dont l'angle spiral est de 69°, les tours en gradins élevés, carénés supérieurement. France, Saulce-aux-Bois.

\***147. amata**, d'Orb., 1847. Belle espèce, plus petite que les deux précédentes, dont l'angle spiral est de 115°, les tours déprimés, bicarénés extérieurement, striés en long partout, ondulés en travers sur la suture. France, Saulce-aux-Bois, Saint-Mihiel.

**PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.

- \***148. monilifer**, d'Orb., 1847. *Trochus monilifer*, Ziet., 1830, p. 46, pl. 34, fig. 4 (non Sowerby). France, Saint-Mihiel; Nattheim.
- \***149. Euterpe**, d'Orb., 1847, Étage Oxfordien, n° 133. La Rochelle.
- \***150. Galatea**, d'Orb., 1847. Espèce plus large que haute, à tours plans, carénés et tuberculeux au pourtour, striés partout en long. France, Nantua (Ain).
- \***151. Glycerie**, d'Orb., 1847. Espèce très-déprimée, lisse, avec quelques indices de stries dans le sens de l'enroulement; bande du sinus linéaire. France, Châtel-Censoir.
- 152. Agassizii**, Münster., Goldf., 1844, 3, p. 74, pl. 186, fig. 9. Nattheim.
- 153. Jurensis**, d'Orb., 1847. *Trochus Jurensis*, Hartmann, Zieten, 1830, Pétrific., p. 46, pl. 34, fig. 2. Goldf., pl. 180, fig. 12. Wurtemb., Nattheim, Muggendorf.
- 154. quinquecinctus**, d'Orb., 1847. *Trochus quinquecinctus*, Zieten, 1830, Pétrific. du Wurtemb., p. 46, pl. 35, fig. 2. Nattheim.
- PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.
- \***155. Rupellensis**, d'Orb., 1847. *Pterocera Ponti*, d'Orbigny, 1825, Ann. des Sc. nat., p. 2, pl. 5, fig. 1. *Strombus Ponti*, Brongn., pl. 7, fig. 3 A (exclus., fig. B). Cette espèce bien distincte du *P. Ponti*, Brongniart, pl. 7, fig. B, auquel nous conservons ce nom, a une pointe en dedans du canal. France, env. de La Rochelle.
- \***156. tetracera**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 5, pl. 5, fig. 2. France, env. de La Rochelle, Oyonnax, Tonnerre, Saint-Mihiel.
- 157. aranea**, d'Orb., 1847. Voy. Étage oxfordien, n° 149. France, Rochelle, Tonnerre, Saulce-aux-Bois, Saint-Mihiel, citadelle de Besançon, Oyonnax.
- \***158. Eudora**, d'Orb., 1847. Petite espèce dont les tours sont costulés en travers, striés en long; l'aile très-dilatée, a trois pointes courtes, l'intervalle costulé en long. France, La Rochelle.
- 159. Eola**, d'Orb., 1847. Espèce de moyenne taille, à tours en gradins lisses; le dernier a deux légères saillies longitudinales. France, Verdun, Saint-Mihiel (Meuse).
- FUSUS**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 303.
- 160. longiscatus**, d'Orb., 1847. *Pleurotoma longiscata*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 22, pl. 6, fig. 8. France, Saint-Mihiel.
- 161. Rissoides**, d'Orb., 1847. *Pleurotoma Rissoides*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 23, pl. 6, fig. 9. Saint-Mihiel, Commercy.
- 162. recticaudatus**, d'Orb., 1847. *Triton recticaudatum*, Buvign., 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 24, pl. 6, fig. 12. Saint-Mihiel.
- 163. Munsterianus**, d'Orb. *Murex fusiformis*, Münster, Goldfuss, 1843, 3, p. 28, pl. 172, fig. 14 (non Römer, 1836). Allem., Nattheim.
- PURPURINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 270.
- \***164. Moreausia**, d'Orb., 1847. *Purpura Moreausia*, Buvignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 26, pl. 6, fig. 19. France, Saint-Mihiel (Meuse), Saulce-aux-Bois.
- \***165. turbinoides**, d'Orb., 1847. *Purpura turbinoides*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 26, pl. 6, fig. 20. France, Saint-Mihiel.
- \***166. Lapiérrea**, d'Orb., 1847. Voy. Étage oxfordien, n° 158. France, Saulce-aux-Bois, Châtel-Censoir.



**CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

- \***167. limaeformis**, Römer, 1836, Oolith., p. 142, pl. 11, fig. 19. Goldf., pl. 173, fig. 17. Saint-Mihiel; Hannover, Hoheneggelsen.
- \***168. septemplicatum**, Römer, 1836, Nordd. Oolith., p. 142, pl. 11, fig. 16. Goldf., pl. 173, fig. 18. France, Saint-Mihiel; Allem., Hannover.
- \***169. Römeri**, d'Orb., 1847. *Fusus Römeri*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 22, pl. 174, fig. 13. France, St-Mihiel; Allem., Hoheneggelsen.
- \***170. millepunctatum**, Deslongchamps, 1842, Mém. Soc. lin. de Norm., t. 7, p. 204, pl. 11, fig. 26, 27, 28. France, Berneville, près la chapelle Saint-Christophe (Calvados), La Rochelle.
- \***171. Corallense**, Buvignier, 1843, t. 2, p. 22, pl. 6, fig. 7. Saint-Mihiel.
- \***172. flosum**, d'Orb., 1847. *Purpura flosa*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 27, pl. 6, fig. 22 et 23. France, Saint-Mihiel.
- \***173. Buvignieri**, d'Orb., 1847. *Fusus corallensis*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 23, pl. 6, fig. 10 (non n° 171). Saint-Mihiel.
- \***174. versicostatum**, d'Orb., 1847. *Murex versicostatus*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 23, pl. 6, fig. 11. France, Saint-Mihiel.
- \***175. buccinoideum**, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 24, pl. 6, fig. 13, 14 et 15. Saint-Mihiel (Meuse), et Ardennes.
- \***176. Achilles**, d'Orb., 1847. Magnifique espèce, longue de 140 millimètres, dont l'angle spiral est de 20°, les tours convexes, ornés de gros tubercules comprimés, transverses, se correspondant, et de stries longitudinales. France, environs de Saintpuits (Yonne).
- \***177. crassilabrum**, d'Orb., 1847. Belle espèce dont la bouche, pourvue d'un gros péristome, est réléchie et s'étend en arrière, les tours ornés de nodosités transverses. France, Saint-Mihiel.
- \***178. Ganymedes**, d'Orb., 1847. Espèce assez grande, dont l'angle spiral est de 25°, les tours en gradins, lisses. France, Saint-Mihiel.
- \***179. Gerontes**, d'Orb., 1847. Espèce grande, dont l'angle spiral est de 270°, les tours excavés légèrement au milieu, saillants et en bourrelet en haut et en bas. France, Saint-Mihiel.
- \***180. Glaucippe**, d'Orb., 1847. Petite espèce, un peu pupoïde, dont les tours, légèrement saillants en gradins, sont ornés de six rangées alternes de gros et de petits tubercules. France, Saint-Mihiel, environs de Besançon, Châtel-Censoir, La Rochelle.
- \***181. Glycerie**, d'Orb., 1847. Petite espèce dont les tours saillants ont quatre côtes longitudinales simples. France, Saint-Mihiel.
- 182. Halle**, d'Orb., 1847. Espèce de moyenne taille, courte, ornée de cinq côtes longitudinales se correspondant, les tours fortement costulés en long. France, Saint-Mihiel (M. Moreau).
- 183. Hecabe**, d'Orb., 1847. Espèce moyenne, allongée, dont les tours ont une forte série de nodosités en arrière, le reste costulé en long. France, Saint-Mihiel (M. Moreau).
- 184. Hecale**, d'Orb., 1847. Petite espèce très-courte, pupoïde, ornée par tour de trois rangées de côtes tuberculeuses. Saint-Mihiel.
- \***185. Heliodore**, d'Orb., 1847. Petite espèce allongée, ornée de cinq grosses côtes se correspondant d'un tour à l'autre, ceux-ci ornés de quatre côtes longitudinales simples. France, Saint-Mihiel.

\***186. Palæmon**, d'Orb., 1847. Très-petite espèce, ornée en long de grosses varices qui ne se correspondent pas d'un tour à l'autre, et de stries longitudinales à l'enroulement. France, Saint-Mihiel.

\***187. Hemou**, d'Orb., 1847. Très-petite espèce à sept côtes longitudinales très-obliques, se correspondant d'un tour à l'autre. France, Saint-Mihiel.

**188. Heranice**, d'Orb., 1847. Petite espèce allongée, ornée en long de nombreuses petites côtes se correspondant, et de stries fines, transverses. France, Saint-Mihiel (M. Moreau).

\***189. Fleurianusum**, d'Orb., 1847. Belle espèce de moyenne taille, ornée de quelques varices irrégulièrement placées, et par tour de quatre côtes échinulées, transverses. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

\***190. Rupellense**, d'Orb., 1847. Petite espèce allongée, à tours convexes et même subcarénés au milieu, pourvus de cinq côtes longitudinales inégales, granuleuses. France, La Rochelle.

\***191. Hesione**, d'Orb., 1847. Petite espèce très-allongée, à tours non convexes, à peine striés en long. France, La Rochelle.

**192. subsuturale**, d'Orb., 1847. *C. suturale*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 22, pl. 6, fig. 6 (non Risso, 1826). France, Sampigny (Meuse).

**FISSURELLA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 126.

**193. Moreausia**, d'Orb., 1847. Espèce très-déprimée, ovale, ornée de côtes rayonnantes égales, simples et comme granuleuses. France, Saint-Mihiel (M. Moreau).

**194. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce conique, ornée de neuf angles peu prononcés et de côtes rayonnantes larges et inégales. France, Saint-Mihiel (M. Moreau).

**IMULA**, DeFrance, 1827.

\***195. cornucopiæ**, d'Orb., 1847. Charmante espèce avec des côtes alternes inégales, dont les intervalles sont striés en travers, le sommet très-recourbé. France, Saint-Mihiel, Loix, île de Ré.

**EMARGINULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 197.

**196. Eolia**, d'Orb., 1847. Petite espèce clypéiforme, peu élevée, à sommet latéral, finement treillissée partout. St-Mihiel (M. Moreau).

**HELICION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.

\***198. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce presque ronde, ornée de petites côtes rayonnantes inégales, avec lesquelles se croisent des plis concentriques. Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

\***199. Corallina**, d'Orb., 1847. Belle espèce ovale, conique, assez élevée, lisse ou avec des lignes concentriques d'accroissement. Fr., Saint-Mihiel, Châtel-Censoir.

**200. submucronata**, d'Orb., 1847. Grande espèce entièrement lisse, à sommet sur l'extrémité, et prolongé en pointe recourbée. France, Trouville (Calvados).

**DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 73.

**201. Corallinum**, d'Orb., 1847. Petite espèce lisse, comprimée, très-arquée. France, La Rochelle.

**BULLA**, Linné, 1758.

- \*202. *vetusta*, d'Orb., 1847. Grosse espèce ovale, lisse, sans spire apparente. France, La Rochelle.  
 203. *Hildesiensis*, Röem., 1836, p. 137, pl. 9, fig. 26. Hildesheim.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**PANOPEA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.

- \*204. *sinuosa*, d'Orb., 1847. *Lutraria sinuosa*, Röem., 1839, Oolith., p. 42, pl. 19, fig. 24. *Pholadomya donacina*, Voltz. *Pleuromya donacina*, Agassiz, 1845, Études crit., p. 248, pl. 23, 29, fig. 16-18 (non *donacina*, Goldf.). France, La Rochelle, Nantua; Allem., Heersum.  
 \*205. *Hellica*, d'Orb., 1847. Très-grande espèce oblongue, élargie et obtuse sur la région buccale, rétrécie et obtuse sur la région anale. France, Wagnon (Ardennes), La Rochelle.  
 \*206. *Hallie*, d'Orb., 1847. Très-grande espèce oblongue, élargie et tronquée sur la région anale, courte et rétrécie sur la région buccale. France, Écommoy (Sarthe).  
 \*207. *Hylla*, d'Orb., 1847. Assez grande espèce, lisse, renflée, oblongue, presque sinuuse, égale en largeur à ses deux extrémités très-obtuses. France, Ecommoy.  
 \*208. *Hippia*, d'Orb., 1847. Grande espèce très-comprimée, ovale, oblongue, lisse, assez prolongée et rétrécie sur la région buccale. France, Saulce-aux-Bois (Ardennes).  
 \*209. *Hylax*, d'Orb., 1847. Moyenne espèce allongée, comprimée, presque sinuuse, égale en largeur à ses extrémités. Saint-Mihiel.  
 210. *Hersilia*, d'Orb., 1847. Moyenne espèce, voisine du *P. Tellina*, mais plus longue sur la région anale et plus allongée dans son ensemble. Fr., Trouville (dans le Grès), La Ferté-Bernard (Sarthe).  
 \*211. *Hesione*, d'Orb., 1847. Moyenne espèce, ovale, très-courte sur la région buccale, prolongée et large sur la région anale, fortement ridée partout. France, Pointe-du-Ché.  
 212. *striata*, d'Orb., 1847. *Unio striatus*, Münster, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 182, pl. 132, fig. 3. Allem., Nattheim.  
 213. *ovalina*, d'Orb., 1847. *Mya ovalis*, Römer, 1839, Nordd. Oolith., p. 42, pl. 19, fig. 28 (non Sow., 1836). Allem., Heersum.  
**PHOLADOMYA**, Sowerby, 1826. Voy. t. 1, p. 73.  
 \*214. *canaliculata*, Römer, 1836, Oolith., p. 129, pl. 15, fig. 3. *P. pelagica*? Agassiz, pl. 2, fig. 5, 7. *P. obliqua*, Agassiz, 1842, pl. 3, fig. 10-12; pl. 3-6, fig. 7-9 (déformation). *P. Hugii*, Agassiz, p. 128, pl. 2 c, fig. 4-9 (déformation). *P. parvula*, Leym., Aube, pl. 10, fig. 19 (non Römer). France, La Rochelle, Riceys, Clairvaux (Aube), La Ferté-Bernard (Sarthe); Allem., Heersum; Suisse, Gunsberg, Gösigen (Soleure).  
 \*215. *paucicosta*, Römer, 1836, Ool., pl. 16, fig. 1. *P. ventricosa*, Goldf., 1839, 2, p. 266, pl. 155, fig. 5 a (exclus. fig. a, b, c). *P. ambigua*, Goldf., 1839, pl. 156, fig. 1 (non Sowerby). *P. paucicosta*, Agassiz, pl. 6, fig. 7-8; pl. 6, fig. 6 c. *P. Michelinii*, Agassiz, 1842, p. 100, pl. 6, fig. 4-6 (exemplaire déformé par la pression verticale). *P. pliocosa*? Agass., p. 92, pl. 4 b, fig. 1, 2. *P. bicostata*, Agass., p. 94, pl. 4 b,

fig. 3-6. France, La Rochelle, Rœdersdorf (Haut-Rhin), Riceys, Clairvaux (Aube), Saulce-aux-Bois, Tonnerre; Suisse, Dorneck (Soleure); Allem., Essingen (Bavière), Hildesheim.

\***216. anaglyptica**, d'Orb., 1847. *Lysianassa anaglyptica*, Münster, Goldf., 1839, 2, p. 263, pl. 154, fig. 7. France, La Rochelle; Lübke.

\***217. intermedia**, d'Orb., 1847. Espèce qui fait le passage des espèces placées parmi les *Gonomya* d'Agassiz et les *Pholadomya*. Elle est oblongue, lisse, et n'a que les indices de stries obliques, seulement sur la région buccale. France, La Rochelle.

**GEROMYA**, Agassiz, 1844. Voy. t. 1, p. 275.

\***218. excentrica**, d'Orb., 1847. *Isocardia excentrica*, Voltz, Rœmer, pl. 7, fig. 4. France, Pointe-du-Ché.

\***219. obliquata**, d'Orb., 1847. Charmante espèce ronde, ornée de stries obliques parallèles qui vont du sommet au bord, un peu inclinées vers la région anale. France, Châtillon-sur-Aube.

**THRACIA**, Leach, 1825. Voy. t. 1, p. 216.

\***220. suprajurensis**, Deshayes. Voy. Étage kimmeridgien. Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, La Ferté-Bernard (Sarthe).

\***221. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce plus courte et plus large que le *T. pinguis*, surtout plus courte sur la région buccale. Pointe-du-Ché.

**ANATINA**, Lamarck, 1809. Voy. t. 1, p. 74.

\***222. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Belle espèce voisine de l'*A. inflata*, mais bien plus large et plus tronquée à son extrémité anale, fortement ridée partout. France, La Rochelle.

\***223. bipartita**, d'Orb., 1847. Espèce plus allongée que toutes les espèces connues, striée comme l'*A. antica*, mais séparée en deux parties par un sillon oblique qui se rend du crochet à la région paléale. France, La Rochelle.

\***224. nasuta**, d'Orb., 1847. Espèce aussi longue que la précédente, sans sillon, lisse sur toute la moitié anale qui est très-étroite, arquée et très-longue. France, La Rochelle.

**PERIPLOMA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.

\***225. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, bien plus étroite que le *P. jurensis*, plus longue sur la région anale. France, La Rochelle.

**GASTROCHLENA**, Spengler, 1788. Voy. t. 1, p. 275.

**226'. unicosta**, d'Orb., 1847. *Fistulana unicosta*, Deslongch., 1838, loc. cit., pl. 9, fig. 23, 24-31, 32. France, Trouville.

\***226. Oceania**, d'Orb., 1847. Grande espèce oblongue, élargie et obtuse sur la région anale, très-ouverte et acuminée du côté opposé, pourvue d'un sillon oblique du crochet à la région paléale. France, Châtel-Censoir, Trouville.

**227'. pseudotrigona**, d'Orb., 1847. *Fistulana subtrigona*, Desl., 1838, loc. cit., pl. 9, fig. 11-16 (non Bronn, 1836). Trouville.

**227. Corallensis**, Buvignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 3, pl. 3, fig. 4. Verdun, Haudainville, Lion devant-Dieu.

\***228. lacryma**, d'Orb., 1847. *Fistulana lacryma*, Deslongch., 1838, id. de Normandie, p. 8, pl. 9, fig. 9, 10, 17, 18. Trouville.

**LAVIGNON**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 306.

\***229. subrugosa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *Lavignon rugosa*,

mais avec des stries fines au lieu de fortes rides. France, Pointe-du-Ché, Castellanne (B.-Alpes), Nantua (Ain).

**LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.

\***230. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, oblongue, lisse, arrondie à ses extrémités. France, Trouville (Calvados).

**VENUS**, Linné, 1758. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 428.

**231. Jurensis** Münst., Goldf., 1839, 2, p. 245, pl. 150, fig. 17. Nattheim.

\***232. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, oblongue, lisse, les deux extrémités arrondies, le côté buccal le plus court, sinus très-visible. France, La Rochelle.

**CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.

\***233. Neptuni**, d'Orb., 1847. Espèce grande, ovale, comprimée, ronde du côté buccal, allongée et subrostrée sans être carénée du côté anal. France, Ferté-Bernard (Sarthe).

**OPIS**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.

\***234. cardissoides**, d'Orb., 1847. *Cardita cardissoides*, Goldfuss, 1839, 2, p. 186, pl. 133, fig. 10. Châtel-Censoir ; Allem., Nattheim.

\***235. Goldfussiana**, d'Orb. *Cardita lunulata*, Goldf., 1839, 2, p. 186, pl. 133, fig. 9 (non Sowerby; espèce de l'Étage bajocien). Allem., Nattheim ; France, Châtel-Censoir.

\***236. paradoxa**, d'Orb., 1847. *Cardium paradoxum*, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 6, pl. 4, fig. 3, 4. France, St-Mihiel.

\***237. Moreausia**, Buvignier, 1843, p. 8, pl. 4, fig. 8, 9. St-Mihiel, Sampigny.

\***238. Cotteausia**, d'Orb., 1847. Belle espèce carrée, ornée partout de côtes concentriques, d'un sillon rayonnant sur la région anale, la lunule peu excavée. France, Châtel-Censoir.

\***239. Thais**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine de l'*O. Arduennensis*, mais plus renflée et à côtes plus fines. Châtel-Censoir.

\***240. radisensis**, d'Orb., 1847. Très-grande espèce déprimée, à lunule excavée, fortement costulée partout, avec un angle obtus sur la région anale. France, Loix, Ile de Ré.

\***240<sup>b</sup>. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce remarquable par sa grande obliquité, ses crochets écartés et sa carène antérieure. La Rochelle.

**240<sup>c</sup>. excavata**, Römer, 1839, Oolith., p. 36, pl. 19, fig. 5. Allem., Fritzw.

**ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 1, p. 216.

\***241. supracorallina**, d'Orb., 1847. *A. minima*, Goldfuss, p. 19, pl. 134, fig. 15 (non *minima*, Phillips). France, La Pérouse et La Chapelle, près de Salins (Jura), Verdun (Meuse), Trécourt (Haute-Saône). Riceys, Clairvaux (Aube) ; Derneburg, Pappenheim.

\***242. Cotteausia**, d'Orb., 1847. Grande espèce très-comprimée, ovale, oblongue, un peu carrée, lisse, avec des côtes concentriques seulement aux crochets. France, Châtel-Censoir, Oyonnax.

\***243. Nysa**, d'Orb., 1847. Grande espèce presque ronde, épaisse, avec des ondulations concentriques peu marquées. France, St-Côme, près de La Ferté-Bernard, Écommoy (Sarthe).

\***244. Eudora**, d'Orb., 1847. Espèce plus petite, mais voisine de

forme de l'*A. Poppea*, s'en distinguant par sa région anale bien plus large et plus carrée. France, St-Mihiel.

\***245. bicostata**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. supracoralina*, mais plus ovale, avec des côtes plus éloignées, terminée chacune par deux petites côtes. France, La Rochelle.

\***246. papyracea**, d'Orb., 1847. Espèce tellement comprimée, qu'il reste à peine de la place pour l'animal ; forme un peu trigone, ornée de côtes concentriques. France, La Rochelle.

\***247. Niclas**, d'Orb., 1847. Coquille voisine de forme de l'*A. supracoralina*, mais bien plus grande, avec des côtes plus aiguës. France, La Rochelle.

**248. extensa**, d'Orb., 1847. *Cardita extensa*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 186, pl. 133, fig. 11, 12. Allem., Nattheim.

**249. submultistriata**, d'Orb., 1847. *A. multistriata*, Leymerie, 1846, Statistique de l'Aube, pl. 10, fig. 7 bis (non Sow., 1836). France, Ricceys, Clairvaux (Aube).

**HIPPOPODIUM**, Sowerby, 1819.

\***250. Corallinum**, d'Orb., 1847. Grosse espèce oblongue, égale en largeur, tronquée sur la région anale. France, Châtel-Censoir, Écommoy (Sarthe), Loix, île de Ré (Charente-Inférieure).

**251. Cottaldinum**, d'Orb., 1847. Grosse espèce remarquable en ce qu'elle est allongée transversalement du crochet au labre et chargée de grosses côtes d'accroissement. France, Châtel-Censoir.

**CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.

\***252. Elea**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. quadrata*, mais bien plus grande et plus carrée, plus large que longue. Oyonnax (Ain).

\***253. Corallina**, d'Orb., 1847. Grande espèce un peu oblique, lisse, à crochets saillants, une partie anguleuse, obtuse sur la région anale. France, Angoulins, près de La Rochelle.

\***254. Hersilia**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine de la précédente, mais infiniment plus oblique. France, Pointe-du-Ché.

\***255. Erato**, d'Orb., 1847. Grande espèce longue, renflée, subcylindrique, à crochets terminaux sur la région buccale. Loix, île de Ré.

\***256. Eucharis**, d'Orb., 1847. Moyenne espèce cordiforme, presque ronde, lisse, à crochets saillants, la région buccale assez courte. France, Châtel-Censoir, Angoulins, Estré, près de La Rochelle.

\***257. Bernardina**, d'Orb., 1847. Moyenne espèce voisine du *C. Eucharis*, mais avec les crochets plus contournés et terminaux. France, Oyonnax.

**TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.

\***258. aculeata**, d'Orb., 1847. Espèce voisine pour la direction et la disposition des épines des côtes avec le *T. spinifera*, mais avec des stries fines au lieu de côtes transverses sur l'area anale. France, La Rochelle et ses environs.

\***259. Bronnii**, Agass., 1840. Etud. crit., p. 18, pl. 5, fig. 19 (exclus. syn.). Cette espèce diffère du *T. clavellata*, par ses côtes presque droites, non arquées. France, Hennequeville, Trouville, Besançon.

\***260. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine pour les petits tubercules rapprochés des côtes, du *T. concentrica*, mais avec les côtes



bien plus serrées, moins arquées, l'area anale striée en travers. France, Tonnerre (Yonne).

- \***261. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. clavellata*, mais dont les tubercules forment des lignes irrégulières, et des lignes parallèles à l'area anale qui est simplement ridée en travers. France, La Rochelle, Nantua.

- \***262. Meriani**, Agass., 1840, Étud. crit., p. 41, pl. 11, fig. 9. *T. costata*, Leymerie, Aube, pl. 10, fig. 12 (non Sowerby). *T. subcostata*, Leym., pl. 10, fig. 3, 4. Suisse, Zwingen, dans la vallée de Laufon (Soleure); France, La Rochelle, Ecommoy, Loix, île de Ré, Châtel-Censoir, Riceys, Loches, Clairvaux (Aube). Elle a toujours les côtes bien plus rapprochées que chez le *T. costata*.

- \***263. bicostata**, d'Orb., 1847. Petite espèce ovale dont l'area anale est ornée des mêmes côtes concentriques que le reste de la coquille. France, La Rochelle.

- 264. hybrida**, Rømer, 1836, p. 97, pl. 6, fig. 2. Hoheneggelsen.

- 265. concinna**, Rømer, 1836, Oolith., p. 35, pl. 19, fig. 21. Hoheneggelsen.

- 267. geographica**, Agass., 1840, Étud. crit., p. 25, pl. 6, fig. 2, 3; pl. 10, fig. 7. Suisse, Hoggerwald (Soleure), près Muttens (Bâle), Zwingen (vallée de Laufon); Wurtemberg.

- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.

- \***268. athleta**, d'Orb., 1847. Espèce longue de 160 millim., ovale, légèrement striée concentriquement. France, Wagnon (Ardennes), St-Mihiel (Meuse).

- \***269. Delia**, d'Orb., 1847. Espèce comprimée, circulaire, presque équilatérale. France, Saulce-aux-Bois (Ardennes), Châtel-Censoir.

- \***270. Mosse**, d'Orb., 1847. Petite espèce ronde, bien plus renflée que la précédente. France, Verdun (Meuse), Trouville (Calvados).

- \***271. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce de moyenne taille, très-comprimée, ovale, bien plus longue sur la région buccale. France, La Rochelle.

- \***272. Neptuni**, d'Orb., 1847. Petite espèce presque ronde, inéquilatérale, très-régulièrement striée dans le sens de l'accroissement. France, La Rochelle.

- CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.

- \***273. elegans**, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 4, pl. 3, fig. 11, 12. France, St-Mihiel, Châtel-Censoir, Oyonnax.

- \***274. decussata**, Buvignier, 1843, Mém. de Verdun, t. 2, p. 4, pl. 3, fig. 13, 14, 15, 16, 17. France, St-Mihiel, Verdun, Saulce-aux-Bois (Ardennes), Oyonnax.

- 275. Cottaldina**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, inéquilatérale, plus courte sur la région anale, très-renflée, ornée de petites côtes concentriques. France, Châtel-Censoir (M. Cotteau).

- UNICARDIUM**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 218.

- \***276. Aceste**, d'Orb., 1847. Voy. Etage oxfordien, n° 307. France, Châtel-Censoir.

- \***277. Callirhoë**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, oblongue, lisse, renflée, la région buccale la plus courte. France, La Rochelle.

- \***278. subregulare**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. Alcyon*.

seulement moins inéquilatérale et plus renflée. France, La Rochelle, Loix, île de Ré, Écommoy.

**ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. t. 1, p. 132:

\***279. brevis**, d'Orb., 1847. Espèce très-courte, très-renflée, à crochets très-contournés sur eux-mêmes. France, Loix, île de Ré.

\***280. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce très-oblique; région anale courte, acuminée, région buccale tronquée obliquement, les crochets très-contournés. France, La Rochelle.

**281. cordiformis**, Schübler, Zieten, 1830, pl. 62, fig. 3. Allem., Nattheim.

**282. semipunctata**, d'Orb., 1847. *Cardium semipunctatum*, Münster, Goldf., 1839, 2, p. 219, pl. 143, fig. 14. Nattheim.

\***283. parvula**, Römer, 1836, Oolith., p. 107, pl. 7, fig. 9. France, Écommoy (Sarthe), La Rochelle; Allem., Hoheneggelsen.

**CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.

\***284. Corallinum**, Leymerie, 1846, Statistiq. de l'Aube, pl. 10, fig. 11. *C. striatum*, Buvignier, 1843. Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 5, pl. 3, fig. 20, 21 (non *striatum*, Sow., 1839). France, St-Mihiel, Tonnerre, Wagnon, La Rochelle, Oyonnax, Saulce-aux-Bois, Châtel-Censoir.

\***285. septiferum**, Buvignier, 1843, id., p. 6, pl. 4, fig. 1, 2. St-Mihiel, Saulce-aux-Bois.

**286. sublamellosum**, d'Orb., 1847. Espèce pourvue d'une cloison lamelleuse comme le *C. septiferum*, mais de forme triangulaire, tronquée sur la région anale. France, Châtel-Censoir (M. Cotteau).

\***287. semiseptiferum**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme extérieure du *C. intextum*, mais plus ovale et pourvue dans l'intérieur, du côté anal, d'une très-courte lame. France, La Rochelle, La Ferté-Bernard, Trouville, Châtel-Censoir.

**288. aculeiferum**, Schübler, Zieten, 1830, Wurtemberg, p. 83, pl. 62, fig. 8. Wurtemberg, Nattheim, près de Heidenheim.

**ISOARCA**, Münster, 1843.

**289. textata**, Münster. *Pectunculus textatus*, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 159, pl. 126, fig. 1. Allem., Nattheim.

**NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 13.

\***290. Feronia**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, oblongue, très-comprimée, lisse, obtuse sur la région buccale. France, La Rochelle.

**LIMOPSIS**, Sassy. Voy. t. 1, p. 280.

\***291. Moreausiana**, d'Orb., 1847. Petite espèce ovale, lisse, très-comprimée, égale aux deux extrémités. France, St-Mihiel.

**ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.

\***292. sublata**, d'Orb., 1847. *A. lata*, Koch, 1837, Beitr., p. 49, pl. 7, fig. 10 (non Gmelin, 1789). France, Angoulins, près de La Rochelle; Allem., Holtensen.

\***293. trisulcata**, Münster, Goldf., 1838, 2, p. 142, pl. 121, fig. 11. France, St-Mihiel; Allem., Nattheim.

\***294. Janira**, d'Orb., 1847. *A. pectinata*, Münster, Goldf., 1838, 2, p. 149, pl. 123, fig. 11 (non Phillips, 1829). France, Saulce-aux-Bois; Allem., Nattheim.

\***295. Jason**, d'Orb., 1847. *A. amula*, Zieten, 1830, p. 75, pl. 56,

- fig. 6 (non Phill., 1829). France, Châtel-Censoir; Wurtemb., Nattheim, près de Heidenheim.
- \*296. *Janthe*, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine de l'*A. Halie*, mais plus large, plus carrée, ornée de petites stries rayonnantes aux deux extrémités, le reste strié concentriquement. France, La Rochelle, Châtel-Censoir, St-Mihiel, Trouville.
- \*297. *Harpya*, d'Orb., 1847. Voy. Etage oxfordien, n° 337. France, La Rochelle, Châtel-Censoir.
- \*298. *Idalia*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme de l'*A. Harpya*, mais plus allongée et avec l'extrémité anale tronquée. France, La Rochelle.
- \*299. *Janias*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. parvula*, mais avec trois ou quatre côtes rayonnantes sur la région buccale, le reste orné de stries concentriques. France, La Rochelle, Châtel-Censoir.
- \*300. *Idmone*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme de l'*A. pectinata*, mais avec des stries plus fortes et plus espacées sur la région anale. La Rochelle, Wagnon, Saulce-aux-Bois, Châtel-Censoir.
- \*301. *Janassa*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. Janira*, mais plus large et subanguleuse sur la région anale. France, La Rochelle.
302. *fracta*, Goldf., 1838, 2, p. 141, pl. 121, fig. 10. Nattheim.
303. *texata*, Münster., Goldf., 1838, 2, p. 142, pl. 121, fig. 12. Nattheim.
304. *funiculosa*, Münster., Goldf., 1838, 2, p. 142, pl. 121, fig. 13. Nattheim.
305. *obliquata*, Zieten, 1830, p. 93, pl. 70, fig. 2. Nattheim.
306. *subgranulata*, d'Orb., 1847. *A. granulata*, Münster., Goldf., 1838, 2, p. 149, pl. 123, fig. 10 (non Brocchi, 1814). Nattheim.
307. *subrotundata*, d'Orb., 1847. *Cucullæa rotundata*, Römer, 1836, p. 104, pl. 6, fig. 26 (non *rotunda*, Sow., 1836). Hanovre.
- PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.
308. *obliquata*, Deshayes, 1839, Traité élém., pl. 38, fig. 3 (non Leymerie, 1846). France, La Rochelle.
- MYOCONCHA**, Sowerby, 1824. Voy. t. 1, p. 165.
- \*309. *compressa*, d'Orb., 1847. Espèce oblongue, rétrécie sur la région buccale, élargie et tronquée obliquement sur la région anale. France, Écommoy (Sarthe), Ile de Ré, Châtel-Censoir.
- \*310. *aurecula*, d'Orb., 1847. Espèce très-courte, très-large, pourvue d'une espèce d'oreille à la région buccale. La Rochelle.
- MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.
- \*311. *subpectinatus*, d'Orb. Voy. Etage 12, n° 197; Etage 13, n° 372. France, La Rochelle, Nantua.
- \*312. *fureatus*, Münster., Goldf., pl. 129, fig. 6. Römer, 1839, p. 33, pl. 18, fig. 38. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Landeyron, près de Nantua; Allem., Hoheneggelsen, Nattheim.
- \*313. *acinaces*, d'Orb., 1847. *Modiola acinaces*, Leymerie, 1846, Statistiq. de l'Aube, pl. 10, fig. 2. Riceys (Aube), La Rochelle.
- \*314. *petasus*, d'Orb., 1847. Espèce très-curieuse, courte, triangulaire, très-large au milieu, ressemblant aux chapeaux des carabiniers savoisiens. La coquille est très-épaisse, évidée sur la région palléale. France, Châtel-Censoir, St-Mihiel.

- \***315. Leda**, d'Orb., 1847. Grande espèce très-arquée en faux, carénée, très-épaisse, à charnière bidentée, très-excavée sur la région palléale. France, Tonnerre, Châtel-Censoir.
- \***316. Lagus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais renflée sur la région palléale. France, Tonnerre, Châtel-Censoir.
- \***317. Lynceus**, d'Orb., 1847. Très-grande espèce arquée, évidée sur la région palléale, presque carénée, peu large sur la région anale. France, St-Mihiel, Châtel-Censoir.
- \***318. Leilus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. consobrinus*, mais un peu plus allongée, oblique à la région anale et munie d'un léger sillon de séparation à la région palléale. France, environs de La Rochelle, Ferté-Bernard (Sarthe).
- \***319. Lassus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. gibbosus*, mais plus large sur la région buccale, très-oblique sur la région anale, la région palléale séparée du reste par une forte dépression. France, La Rochelle.
- \***320. Lysippus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. imbricatus*, mais bien plus courte, plus large et plus oblique sur la région anale, moins excavée sur la région palléale. *M. cuneatus*, Goldf., p. 177, pl. 131, fig. 6 (non Sowerby). France, La Rochelle St-Mihiel.
- \***321. lombricalis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. plicatus*, mais plus arquée et sans aucun pli ni rides. France, La Rochelle.
- LITHODOMUS**, Cuvier, 1817.
- \***322. Corallinus**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, très-renflée, lisse, obtuse à ses deux extrémités. France, Tonnerre (Yonne), Wagnon, Saulce-aux-Bois (Ardennes).
- \***323. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, comprimée, lisse, acuminée à ses extrémités. France, La Rochelle, Tonnerre, Trouville.
- LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.
- \***324. Münsteriana**, d'Orb., 1847. *Lima elongata*, Münt., Goldf., 1836, 2, p. 89, pl. 102, fig. 13 (non Sowerby, Mantell, 1821). France, Châtel-Censoir; Allem., Muggendorf.
- \***325. tegulata**, Münt., Goldf., 1836, 2, p. 89, pl. 102, fig. 15. France, Loix, Ile de Ré, St-Mihiel, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Châtel-Censoir, Nantua; All., Muggendorf, Amberg.
- \***326. rudis**, Sow., 1818, Min. Conch., 3, p. 25, pl. 214. France, Angoulins, Loix, Ile de Ré, Nantua; Russie, Saragula, près d'Orembourg; Angl., Malton, Calne.
- \***327. glabra**, Münt., Goldf., 1836, 2, p. 88, pl. 102, fig. 9. France, Angoulins, près de La Rochelle; Allem., Amberg, Streitberg.
- \***328. subsemilunaris**, d'Orb., 1847. *L. semilunaris*, Goldf., 1836, 2, p. 84, pl. 102, fig. 2 (non Zieten, 1830). France, Angoulins, Tonnerre, Châtel-Censoir; Allem., Hildesheim.
- \***329. laeviuscula**, Deshayes. *Plagiostoma laeviusculum*, Sow., 1822, M. C., 4, p. 112, pl. 383. France, La Rochelle, Châtel-Censoir; Angl., Malton, Castle-Howard.
- \***330. Hirata**, Münt., Goldf., 1836, 2, p. 85, pl. 102, fig. 5. France, Oyonnax; Allem., Neumark, Regensberg.

- \***331. costulata**, Römer, 1839, Oolith., p. 30, pl. 18, fig. 28. Fr., Châtel-Censoir; Allem., Hoheneggelsen.
- \***332. Corallina**, d'Orb., 1847. Grosse espèce ovale, tronquée sur la région buccale, ornée de côtes rayonnantes simples, séparées par des sillons assez peu profonds. France, Châtel-Censoir, Saint-Mihiel.
- \***333. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Grosse espèce comprimée, semi-lunaire, tronquée sur la région buccale, bien plus étroite que le *Lima læviuscula*. France, La Rochelle, Tonnerre, Châtel-Censoir.
- 334. minutissima**, d'Orb., 1847. *L. minuta*, Römer, 1839, Ool., p. 30, pl. 18, fig. 29 (non Goldf.). Allem., Hoheneggelsen.
- 335. subantiquata**, Römer, p. 78, pl. 13, fig. 15. Heersum.
- 335'. exarata**, Goldfuss, 1838, 2, pl. 121, fig. 4. Nattheim.
- \***336. aciculata**, Münster, Goldf., 1836, 2, p. 82, pl. 101, fig. 5. Fr., Angoulins (Charente-Inférieure); Allem., Streithberg, Nattheim.
- 337. substriata**, Münster, Goldfuss, 1836, 2, p. 88, pl. 103, fig. 1. Amberg, Bamberg.
- POSIDONOMYA**, Bronn, 1837. Voy. t. 1, p. 13.
- 338. gigantea**, Münster, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 120, pl. 114, fig. 4. Allemagne, Streithberg.
- 339. canaliculata**, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 120, pl. 114, fig. 5. Allemagne, Streithberg.
- AVICULA**, Klein, 1758. Voy. vol. 1, p. 13.
- \***340. Mimas**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme de l'*A. polyodon*, mais un peu plus large et sans dents. France, La Ferté-Bernard.
- \***341. Mysis**, d'Orb., 1847. Petite espèce ovale, oblique, pourvue de côtes rayonnantes simples, peu régulières et de stries d'accroissement. France, La Rochelle.
- 342. Corallina**, d'Orb., 1847. Grande espèce oblique, comprimée, très-remarquable par les plis obliques qui couvrent l'aile anale. Fr., Châtel-Censoir (M. Cotteau).
- \***343. subplana**, d'Orb., 1847. *Perna plana*, Thurmann (collection). C'est une Avicule et non une Perne, comme nous nous en sommes assuré par la charnière. France, Châtel-Censoir, Angoulins, Nantua.
- 344. Pygmæa**, Koch, 1837, Beitr., p. 37, pl. 3, fig. 6. Hanovre.
- 345. Goldfussii**, Koch, 1837, Beitr., p. 42, pl. 5, fig. 1. Allem.
- \***346. polyodon**, Buvignier. Voy. Étage oxf., n° 406. La Rochelle.
- PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 176.
- \***347. Corallina**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine du *P. mityloides*, mais plus courte, à fossettes plus larges. France, Ferté-Bernard (Sarthe), Saint-Mihiel, Pointe-du-Ché.
- PINNIGENA**, Deluc, 1779. Voy. vol. 1, p. 314.
- \***348. Saussurii**, d'Orb., 1847. *Pinna Saussurii*, Desh., 1838, Traité élém. de conchyol., p. 24, pl. 38, fig. 4. France, Pointe-du-Ché (Charente-Inférieure), Saint-Mihiel (Meuse).
- \***349. rugosa**, d'Orb., 1847. Espèce plus allongée que la précédente, comme ondulée et costulée en long, ridée en travers. France, Pointe-du-Ché.
- PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.
- \***350. inæquicostatus**, Phillips, 1829. Voy. Étage oxfordien, n° 426. Fr., Châtel-Censoir.

- \***351. clathratus**, Rœmer, 1836, Ool., p. 212, pl. 13, fig. 9. France, Angoulins, près de La Rochelle; Allem., Spitzhuts, Heersum.
- \***352. varians**, Rœmer, 1836, p. 68, pl. 3, fig. 19. France, Saint-Mihiel, Pointe-du-Ché; Allem., Hoheneggelsen, Hildesheim.
- \***353. strictus**, Münster, Goldf., 91, fig. 4. Rœmer, 1836, Oolith., p. 69. France, Pointe-du-Ché; Allem., Delligden, Hoheneggelsen.
- \***354. subarticulatus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. articulatus*, mais plus allongée, à côtes plus espacées. France, Loix, Ile de Ré (Charente-Inférieure), Saint-Mihiel, Châtel-Censoir.
- \***355. lens**, Sowerby, 1821. Voy. Étage oxfordien, n° 425. *Pecten Decheni*, Rœmer, 1839, Ool. Nach., p. 28, pl. 18, fig. 25. France, Pointe-du-Ché, Loix, Ile de Ré, La Rochelle, La Ferté-Bernard (Sarthe), Châtel-Censoir (Yonne); Allem., Heersum.
- \***356. Orontes**, d'Orb., 1847. Voy. Étage oxfordien, n° 433. Châtel-Censoir.
- \***357. Corallinus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. inaquicostatus*, mais avec sept ou huit côtes garnies de tubercules transverses, irréguliers, qui descendent souvent dans les sillons. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle Châtel-Censoir.
- \***358. Nisus**, d'Orb., 1847. Charmante espèce voisine du *P. articulatus*, mais plus étroite et ornée de côtes alternes, l'une plus grosse que l'autre, toutes avec des tubercules espacés. France, Loix, Ile de Ré, Pointe-du-Ché.
- \***359. Nothus**, d'Orb., 1847. Espèce allongée comme la précédente, mais avec des côtes alternes, simples, espacées, sans tubercules. France, Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
- \***360. Niso**, d'Orb., 1847. Espèce moyenne, étroite, ornée de petites côtes inégales, alternes, rapprochées. France, env. de La Rochelle.
- \***361. solidus**, Rœmer, 1836, Oolith., p. 212, pl. 13, fig. 5. France, La Rochelle, Châtel-Censoir; Allem., Heersum, Hannover.
- \***362. Nireus**, d'Orb., 1847. Espèce renflée, courte, voisine du *P. Palinurus*, mais à côtes simples, régulières, très-élevées. France, Châtel-Censoir, Oyonnax, Commercy, Saint-Mihiel, L'Échaillon, près de Grenoble (Isère).
- \***363. Nicæus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente; mais plus allongée et à côtes moins rapprochées, séparées par un plus long sillon. La Rochelle.
- 364. subimbricatus**, Rœmer, 1836, p. 212, pl. 13, fig. 6. Allem., Heersum.
- 365. Buchii**, Rœmer, 1839, p. 27, pl. 18, fig. 8. Hildesheim, Hoheneggelsen.
- 366. concinnus**, Koch, 1837, Beitr., p. 42, pl. 5, fig. 4. Allem.
- \***367. subconcentricus**, d'Orb., 1847. *P. concentricus*, Koch, 1837, Beitr., p. 43, pl. 5, fig. 8 (non Blainville, 1825). Allem., Lerbeck.
- HINNITES**, DeFrance, 1821.
- \***368. coralliphagus**, d'Orb., 1847. *Spondylus coralliphagus*, Goldf., 1838, 2, p. 95, pl. 121, fig. 5. France, Pointe-du-Ché; Nattheim.
- \***369. inæquistriatus**, d'Orb., 1847. *Spondylus inæquistriatus*, Voltz. Echantillons donnés en 1835. C'est une véritable Hinnites, re-

marquable par les pointes tubuleuses dont elle est ornée. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Châtel-Censoir.

**\*370. ostreiformis**, d'Orb., 1847. Grande espèce très-variable, régulière dans le jeune âge, mais ostréiforme surtout à la valve inférieure. Oyonnax, Landeyron, près de Nantua (Ain), Châtel-Censoir.

**PLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 202.

**\*371. rustica**, d'Orb., 1847. Espèce épaisse, irrégulière, ornée de huit à dix grosses côtes subépineuses. France, Wagnon (Ardenne).

**DICERAS**, Lamarck, 1819.

**\*372. arietina**, Lamarck, 1819. *Chama arietina*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 206, pl. 139, fig. 2. *Isocardia dicerata*, orthocera et brevis, d'Orb. (père), 1822, Mém. du Mus., t. 8, p. 103, pl. 1, fig. 1-8; pl. 2, fig. 1-6. *Diceras sinistra*, Desh., 1838, Traité élém., pl. 28, fig. 1-3. *Diceras minor*, Desh., 1838, id., pl. 28, fig. 7-8. *Chama speciosa*, Goldf., 2, p. 205, pl. 139, fig. 1. *Diceras Lucii*, Defrance, Favre, Observat. 1 à 5. France, Saint-Mihiel (Meuse), Wagnon, Saulce-aux-Bois (Ardenne), Châtel-Censoir, Tonnerre (Yonne), Pointe-du-Ché, Angoulins, près de La Rochelle (Charente-Inférieure), Montpellier (Hérault); Allem., Regensburg (Bavière); mont Salève (Suisse).

**\*373. Münsteri**, d'Orb., 1847. *Chama Münsteri*, Goldf., 1839, 2, p. 204, pl. 138, fig. 7. France, Oyonnax, Landeyron, près de Nantua (Ain), Tonnerre (Yonne); Bav., Regensburg.

**\*374. Bernardina**, d'Orb., 1839. Espèce caractérisée par sa valve inférieure large, trigone, aplatie sur la région anale, et son autre valve operculaire. France, Oyonnax, La Voute, Landeyron, Plagne, près de Nantua (Ain).

**OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.

**\*375. solitaria**, Sow., 1824, 5, p. 105, pl. 468, fig. 1. *O. pulligera*? Goldf., pl. 72, fig. 11. Angl., Weymouth, Malton; France, Pointe-du-Ché, Trouville, Saulce-aux-Bois, Saint-Mihiel, Tonnerre, citadelle de Besançon (Doubs), Oyonnax, Châtel-Censoir; Allem., Dorschelf, Hohenbüchen.

**\*376. Amor**, d'Orb., 1847. Voy. Étage callovien, n° 226. Châtel-Censoir, Loix, Ile de Ré.

**\*377. gregaria**, Sow., 1815. Voy. Étage oxfordien, n° 448. France, Pointe-du-Ché.

**\*378. Clytia**, d'Orb., 1847. Espèce qui approche un peu de la forme de l'*O. edulis*, mais qui varie excessivement suivant les corps sur lesquels elle s'est fixée, sa surface fixe étant toujours très-large. Fr., Pointe-du-Ché, près de La Rochelle (les rochers de coraux en sont couverts), Châtel-Censoir, Saulce-aux-Bois, Loix, Ile de Ré.

**\*379. Cypræa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*O. dilatata*, mais toujours bien plus mince, plus irrégulière, avec un sillon latéral plus marqué. C'est certainement une espèce distincte. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

**380. spiralis**, d'Orb., 1847. *Exogyra spiralis*, Goldf., 1835, 2, p. 33, pl. 86, fig. 4. *E. nana*, Sow. in Fitton. Fr., Pointe-du-Ché; Allem., Westph., Osterkappeln; Angl., Weymouth.

**FULVINITES**, Defrance, 1827. Maintenant que nous connaissons

parfaitement ce genre, nous pouvons dire que c'est une *Anomya* avec une charnière comme les *Perna*.

- \***381. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce remarquable, ovale ou oblongue, fixée sur les polypiers. France, La Rochelle.

**ANOMYA**, Linné, 1758.

- \***282. Jurensis**, d'Orb., 1847. *Placunea Jurensis*, Rœmer, 1836, Ool., p. 66, pl. 16, fig. 4. France, Saint-Mihiel, Pointe-du-Ché, Châtel-Censoir; Allem., Hoheneggelsen.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**RHYNCHONELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 92.

- \***383. inconstans**, d'Orb., 1847. Voy. Étage oxfordien, n° 460. *Terebratula corallina*, Leymerie, 1846, Stat. de l'Aube, pl. 10, fig. 16, 17. France, Tonnerre (Yonne), Pointe-du-Ché (Charente-Inférieure), Saulce-aux-Bois (Ardennes), route de Grasse à La Malle (Var), Oyonnax, près de Nantua (Ain), Escagnolles (Var).

- \***384. Royeriana**, d'Orb., 1847. Voy. Étage callovien, n° 462. Fr., Loix, île de Ré.

- \***385. pectunculata**, d'Orb., 1847. Voy. Étage oxfordien, n° 465. France, Pointe-du-Ché, Écomoy (Sarthe), Oyonnax, près de Nantua.

- \***386. Astieriana**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 492, fig. 1-4. *Terebratula inconstans speciosa*, Münster, 1839, Beitr., 1, p. 113, pl. 8, fig. 5 et 5 (non *inconstans*, Sow). *T. deformis*, Zieten, 1830, pl. 42, fig. 2 (non Lamarck). France, Escagnolles (Var); Allem., Süddeutschland, Regensburg, Heidenheim.

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

- \***387. insignis**, Schübler, 1830. Voy. Étage oxfordien, n° 471. Fr., Loix, île de Ré, Châtel-Censoir, Tonnerre (Yonne), La Rochelle, Saint-Mihiel, Oyonnax (Ain).

- \***388. substriata**, Schloth., de Buch, 1834, Mém. de la Soc. géol., 3, p. 163, pl. 16, fig. 6. *T. striatula*, Zieten, 1830, p. 59, pl. 44, fig. 2 (non Sow). Wurtemberg, Gruibengen, Nattheim, Amberg.

- \***389. nucleata**, Schl., Zieten, 1830, Pétrific., p. 53, pl. 39, fig. 10. Wurtemberg, Gruibengen, près de Stufenberg, Amberg, au-dessous Streitberg, Fustenberg; France, Ardèche.

- \***390. subsella**, Leymerie, 1846, Statistiq. de l'Aube, pl. 10; fig. 5. Espèce confondue par M. de Buch avec le *T. perovalis* de l'étage bajocien; elle s'en distingue par ses plis plus profonds et sa forme plus large. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Aube, environs d'Avallon (Yonne), Oyonnax (Ain).

- \***391. Bucculenta**, Sow., 1823. Voy. Étage oxfordien, n° 472. *T. carinata*, Leymerie, 1846, pl. 10, fig. 6. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, Aube.

- \***392. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine des *T. resupinata* et *Bernardina*, mais toujours sans sillons sur la petite valve entièrement plane. France, Dompierre, Angoulins, près de La Rochelle.

- \***393. equestris**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. subsella*, mais dont la grande valve se recourbe à la région palléale et se prolonge



en une forte saillie obtuse qui force la petite valve à se relever fortement. France, Pointe-du-Ché.

- \***394. Repeliniana**, d'Orb., 1847. Magnifique espèce oblongue, dont le crochet de la grande valve se prolonge en un long rostre. Fr., carrière de L'Echaillon, près de Vurey (Isère), Châtel-Censoir (Yonne), Oyonnax (Ain).

**TEREBRATELLA**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 222.

- \***395. pectunculoides**, d'Orb., 1847. *Terebr. pectunculoides*, Schl., 1821. *Terebr. tegulata*, Zieten, 1830, pl. 43, fig. 4. Allem., Grumbach, près d'Amberg, Streitberg, Nattheim, près de Giezen.

- \***396. loricata**, d'Orb., 1847. *Terebr. loricata*, Schl., 1821. *Terebr. truncata*, Zieten, p. 43, fig. 6 (non *truncata*, Sow.). Allem., Grumbach, près d'Amberg, Nattheim, près de Geisen, Streitberg, Lachenberg, près de Bahligen.

- \***397. pectunculus**, d'Orb., 1847. *Ter. pectunculus*, Schloth., Buch, 1834, Mém. de la Soc. géol., 3, pl. 17, fig. 1. France, Écommoy (Sarthe); Allem., Amberg.

- \***398. Fleuriausa**, d'Orb., 1847. Espèce du Coralrag confondue avec la *Ter. trigonella*, qui est le *Spirigera trigonella*. Elle en diffère par ses côtes plus saillantes, par sa forme plus raccourcie, plus épaisse et ses caractères de genre. France, Loix, île de Ré; Allem., Heidenheim.

**THECIDEA**, Defrance, 1828.

- \***399. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. antiqua*, mais toujours triangulaire et bien plus étroite sur la région cardinale. Fr., Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

## MOLLUSQUES BRYOZOAIRES.

**ALECTO**, Lamouroux, 1821.

- 400. intermedia**, d'Orb., 1847. *Aulopora intermedia*, Münster, Goldf., 1833, Petref., 1, p. 118, pl. 65, fig. 1. Allem., Streitberg.

- 401. Corallina**, d'Orb., 1847. *Aulopora dichotoma*, Goldf., 1833, Petref., 1, p. 118, pl. 65, fig. 2 (non Lamouroux, 1821). France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle; Allem., Streitberg.

- \***402. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais dont les cellules ne sont pas distinctes et l'ouverture très-relevée. France, Pointe-du-Ché.

**DIASTOPORA**, Lamouroux, 1821.

- \***403. orbiculata**, d'Orb., 1847. *Cellepora orbiculata*, Goldf., pl. 12, fig. 2. Römer, 1836, Oolith., p. 18. France, Pointe-du-Ché; Allem., Hoheneggelsen, Bayreuth, Streitberg, Herrn, Münster.

## ÉCHINODERMES.

**DYSASTER**, Agassiz.

- 404. Buchii**, Desor, Monog. des Dysasters, p. 21, pl. 3, fig. 9-11. Agassiz, 1847, Cat., p. 139. Stockach (grand-duché de Baden), Struchingen.

\*405. *Michelfini*, Agass., 1847, Cat., p. 139. France, Drayes, Châtel-Censoir (Yonne).

**FIGURUS**, Agassiz.

\*406. *Blumenbachi*, Agass., 1847, Cat., p. 104. *Echinolampas Blumenbachi*, Koch et Dunk., Ool., p. 37, pl. 4, fig. 1. France, Tonnerre; Hanovre, Waltersberg.

\*407. *Hausmanni*, Agass., 1847, Cat., p. 104. *Clypeaster Hausmanni*, Koch et Dunk., Ool., p. 88, pl. 4, fig. 3. Allem., Kleinbremen près Bückeberg.

\*408. *nasutus*, d'Orb., 1847. Espèce fortement prolongée en avant en une saillie obtuse. France, Tonnerre (Yonne).

**NUCLEOLITES**, Lamarck.

\*409. *transversus*, d'Orb., 1847. Espèce transversalement ovale, tronquée du côté opposé à l'anus. France, Saint-Mihiel (Meuse).

**HYBOCLYPUS**, Agassiz.

\*410. *stellatus*, Desor, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 94. Wiltshire.

**HOLECTYPUS**, Agassiz.

\*411. *Mandelslohi*, Desor, Monogr. des Galér., p. 68, pl. 9, fig. 14-16. Agassiz, 1847, Cat., p. 87. *Discoidea Mandelslohi*, Desor. Vrach (Wurtemberg), Liesberg (Soleure).

\*412. *Corallinus*, d'Orb., 1847. Espèce confondue, par sa forme, avec le *H. depressus*, mais s'en distinguant par la disposition de ses petits tubercules, placés par lignes concentriques espacées. France, Pointe-du-Ché.

**FIGASTER**, Agassiz.

\*413. *pileus*, Agassiz, 1847, Cat., p. 86. Davy, Crassé (Yonne).

\*414. *patelliformis*, Agassiz, 1847, Cat., p. 86, et Echin. Suisse, 1, p. 82, pl. 13, fig. 1-3. Saulce-aux-Bois; Laufflon, vallée de Birze (Berne).

\*415. *tenuis*, Agassiz, 1847, Cat., p. 86; Echin. Suisse, 1, p. 83; Mon. des Galérites, p. 80, pl. 12, fig. 1-3. France, Saint-Mihiel (Meuse); Fringeli (Soleure).

\*416. *inflatus*, d'Orb., 1847. Espèce petite, renflée, bombée en dessous, un peu anguleuse. France, Saulce-aux-Bois (Ardennes).

**HELIODIDARIS**, Agassiz.

\*417. *mirabilis*, Agassiz, 1847, Cat., p. 68. *Echinus mirabilis*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 11. France, Clamecy (Nièvre), Saulce-aux-Bois, Wagnon (Ardennes).

**ROBINUS**, Linné.

\*418. *perlatus*, Desmar., Agass., 1847, Cat., p. 61; Echin. Suisse, 2, p. 82, pl. 22, fig. 13-15. France, Besançon, Salins (Jura), Ile de Ré, val de Moutier, Pointe-du-Ché, Châtel-Censoir (Yonne).

\*419. *distinctus*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 62. Angoulins.

**GLYPTICUS**, Agassiz.

\*420. *hieroglyphicus*, Agassiz, Cat. syst., p. 57; Echin. Suisse, 2, p. 96, pl. 13, fig. 37-39. *Echinus hieroglyphicus*, Münster. Gœdfuss, pl. 40, fig. 17. France, Besançon, Salins (Jura), Saulce (Ardennes), Champlitte (Haute-Saône), Tonnerre, Châtel-Censoir (Yonne), Danvillers (Meuse); Suisse, Soleure.

**HYCOSMUS**, Agassiz.

\*421. *decoratus*, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 52. Suisse, Lägeren.

**DIADEMA**, Gray.

\*422. **subangulare**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 44; Échin. Suisse, 2, p. 19, pl. 17, fig. 21-25. *Diadema sulcatum*, Agassiz. *Cidaris subangularis*, Goldf., pl. 40, fig. 8. Suisse, vallée de Birse, Blochmont, Weissenstein, Muggendorf (Alpes Wurtembergeoises), Sirchingen; Fr., Salins (Jura), Ile de Ré, Saulce-aux-Bois.

\*423. **pseudodiadema**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 45; Echin. Suisse, 2, p. 11, pl. 17, fig. 49, 50, 52. *Echinus pseudodiadema*, Lam. *Echinus germinans*, Phill., York., 3, fig. 15. *Diadema ambiguum*, Desm. Fr., Besançon, Saint-Mihiel, La Rochelle; Suisse, env. de Soleure.

\*424. **mamillatum**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 43. *Cidaris mamillata*, Röem. France, La Rochelle, Verdun; Hildesheim.

\*425. **Orbignyanum**, Cotteau, 1848. Cette espèce est circulaire et médiocrement renflée; les tubercules principaux un peu plus gros que les tubercules secondaires formant deux rangées sur les aires ambulacraires. — Les tubercules secondaires sont nombreux, égaux entre eux et disposés en lignes régulières. — On en compte plus de douze rangées sur chacune des aires interambulacraires. France, Châtel-Censoir (Yonne), M. Cotteau.

**ACROSALENIA**, Agassiz.

\*426. **tuberculosa**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 39. Saint-Mihiel.

**ACROPELTIS**, Agassiz.

\*427. **aequituberculata**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 36. Angoulins (Charente-Inférieure).

**ACROCIDARIS**, Agassiz.

\*428. **Censoriensis**, Cotteau, 1848. Cette espèce est remarquable par sa petite taille et sa forme très-déprimée. Les tubercules diminuent rapidement de grosseur à la face supérieure; ceux des aires ambulacraires sont presque aussi gros que ceux des aires interambulacraires. France, Châtel-Censoir (Yonne), M. Cotteau.

\*429. **nobilis**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 36; Echin. Suisse, 2, p. 32, pl. 14, fig. 16, 17. Fr., Angoulins; Suisse, Hoggerwald (Soleure).

\*430. **tuberosa**, Agassiz, 1847, Cat., p. 36; Cat. syst., p. 9; Echin. Suisse, 2, p. 31, pl. 14, fig. 13-15. France, Châtel-Censoir; Suisse, canton de Neuchâtel.

**HEMICIDARIS**, Agassiz.

\*431. **mammosa**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 34. La Rochelle.

\*432. **ovifera**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 34. France, La Rochelle.

\*433. **crenularis**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 33. Voy. Ét. 13, n° 520. France, La Rochelle, Spitzhuts (Hanovre); Saulce-aux-Bois (Ardennes), Saint-Mihiel (Meuse), Vittaux (Côte-d'Or).

\*434. **Thurmanni**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 34; Echin. Suisse, 2, p. 50, pl. 19, fig. 1-3. France, Salins (Jura), Pointe-du-Ché, près de La Rochelle; Suisse, Porrentruy, Simmenthal.

\*435. **undulata**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 35; Echin. Suisse, 2, p. 52, pl. 18, fig. 25. Suisse, Fringeli, Jura soleurois.

**CIDARIS**, Lamarck.

\*436. **miranda**, Desor, Agassiz, Cat. syst., p. 28. Angoulins.

\*437. **Orbignyana**, Agass., Cat. syst., p. 28. *C. tripterygia*, Leymerie, pl. 9, fig. 3. France, La Rochelle.

\***438. *maginata***, Goldfuss, Petref., p. 118, pl. 39, fig. 7; Agass., 1847, Cat. syst., p. 27. France, Angoulins, Heidenheim.

\***439. *coronata***, Goldf., Petref., p. 119, pl. 39, fig. 8. Agass., 1847, Cat. syst., p. 27. France, La Rochelle; Puiseux (Ardennes); Calne; Suisse, Fringeli (Soleure).

\***440. *Blumenbachii***, Münster in Goldf., Petr., p. 117, pl. 39, fig. 4, Agass., 1847, Cat. syst., p. 27. France, Verdun, Saint-Mihiel (Meuse), Franville, Wagnon, Angoulins; Suisse, Fringeli (Jura soleurois).

\***441. *nobilis***, Münster, Goldf., p. 117, pl. 39, fig. 4. Agass., Echin. Suisse, 2, p. 65, pl. 21 a, fig. 21. Angoulins; Randen (Schaffhouse).

\***442. *megalacantha***, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 29. Ile de Ré.

\***443. *consobrina***, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *C. propinquus*, mais ayant toujours les pointes bien plus étroites et plus acuminées à leur extrémité. France, Angoulins.

**444. *maxima*?** Münster, Goldf., Petr., p. 116, pl. 39, fig. 1. Agass., 1847, Cat., p. 28. France, Saint-Mihiel; Baireuth.

\***445. *elegans***, Münster, Goldf., Petref., p. 118, pl. 39, fig. 5. Agass., Cat. syst., p. 28. Baireuth; env. Bâle, Randen.

**446. *constricta***, Agassiz, Echin. Suisse, 2, p. 72, pl. 21, fig. 3, et 1847, Cat. syst., p. 30. France, env. de Besançon et de La Rochelle.

**CRENASTER**, Lwyd, 1799. Voy vol. 1, p. 240.

\***447. *Rupellensis***, d'Orb., 1847. Charmante espèce presque aussi grande que le *C. violaceus*, mais ayant les branches plus longues et plus déprimées. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

**OPHIURELLA**, Agassiz.

\***448. *bispinosa***, d'Orb., 1847. Grande espèce remarquable par les pièces latérales des bras larges et chargées alternativement d'une ou de deux longues épines. France, Pointe-du-Ché.

**ACROURA**, Agassiz. Voy. vol. 1, p. 177.

\***449. *subnuda***, d'Orb., 1847. Espèce dont les bras grêles ont à peine de très-petites épines entre les plaques. France, Pointe-du-Ché.

**COMATULA**, Lamarck.

**450. *depressa***, d'Orb., 1847. Magnifique espèce que nous possédons avec tous ses bras, qui se distingue de toutes les autres par ses bras déprimés, à pièces saillantes latéralement en dents de scie. Fr., Angoulins.

**GUETTARDICRINUS**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 15.

\***451. *dilatatus***, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 15, pl. 1, fig. 2. France, Angoulins.

**APIOCRINUS**, Miller, d'Orb., Crinoïdes, p. 18.

\***452. *Roissyanus***, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 20, pl. 3, 4. *Apiocrinus Meriani* et *similis*, Desor. France, Pointe-du-Ché, Angoulins, La Chapelle (Jura), Tonnerre, Vauligny (Yonne), Chaleseuil (Doubs), Largue (H.-Rhén.). Elle n'est point du portlandien, comme l'a cru M. Desor, mais de l'étage corallien le mieux caractérisé. Je la possède complète, racine, tige, calice et bras.

\***453. *Murchisonianus***, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 32, pl. 6. Pointe-du-Ché.

\***454. *magnificus***, d'Orb., 1847. Magnifique espèce que nous possédons complète : calice globuleux, presque sphérique, pièces ha-

sales aussi larges que hautes; bras bifurqués deux fois; tige lisse. Fr., La Jarne, près de La Rochelle.

**455. insignis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine des *A. Murchisonianus* et *magnificus*, mais dont le calice est déprimé dans son ensemble, et dont les pièces basales sont denticulées sur leurs bords, ce qui n'existe pas dans les autres espèces; tige lisse, les racines par groupes. France, Estré, près de La Rochelle.

**455'. Rathieri**, d'Orb., 1849. Espèce voisine de l'*A. Murchisonianus*, mais dont le calice est plus étroit, plus pyriforme, à plusieurs pièces intermédiaires. France, Tonnerre (M. Rathier).

**MILLERICINUS**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 36.

**456. simplex**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 39, pl. 12. Nous la possédons complète. France, Pointe-du-Ché.

**457. polydactylus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 41, pl. 9, fig. 1-8. Nous l'avons complète. France, Pointe-du-Ché, Angoulins.

**458. gracilis**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 44, pl. 10. Nous l'avons complète. France, Pointe-du-Ché.

**459. Fleuriausianus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 46, pl. 8, fig. 1-4. Pointe-du-Ché.

**460. crassus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 48, pl. 8, fig. 5-7. Fr., Pointe-des-Minimes, près de La Rochelle.

**461. elegans**, d'Orb., 1839, p. 49, pl. 8, fig. 8-11. Angoulins.

**462. cupuliformis**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 51, pl. 8, fig. 12-15. Angoulins.

**463. obtusus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 75, pl. 14, fig. 9-11. Pointe-du-Ché.

**464. inflatus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 76, pl. 14, fig. 12-14. France, Pointe-du-Ché.

**465. brevis**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 77, pl. 14, fig. 15-17. France, Pointe-du-Ché.

**466. angulatus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 79, pl. 14, fig. 18-21. France, Pointe-du-Ché.

**467. Goupilianus**, d'Orb., 1839, Crinoïdes, p. 83, pl. 15, fig. 11-15. France, Ecommoy (Sarthe).

**468. Radisensis**, d'Orb., 1847. Tiges dont les articulations sont lisses, plus épaisses que dans les autres espèces, et légèrement convexes en dehors. France, Loix, île de Ré, Ecommoy (Sarthe).

**469. inaequalis**, d'Orb., 1847. Tiges voisines du *M. Dudressierianus*, mais dont les articles sont plus étroits, plus bombés et souvent épineux, les rayons infiniment plus petits. France, Pointe-du-Ché, Angoulins.

**PENTACHINUS**, Miller, 1821.

**470. alternans**, Roemer, 1839, p. 18, pl. 17, fig. 38. France, Angoulins, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, La Chapelle, près de Salins (Jura), avec les Astartés; Allem., Hildesheim.

**471. Goldfussii**, Roemer, 1839, p. 18, pl. 17, fig. 37. Hoheneggelsen.

## ZOOPIHYTES.

**LASMOPHYLLIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 208.

**472. subexcavata**, d'Orb., 1847. *Anthophyllidium excavatum*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 85, pl. 17, fig. 10 (not. Roemer, 1836). France, Saint-Mihiel (Meuse).

**\*473. truncata**, d'Orb., 1847. *Caryophyllia truncata*, DeFrance, 1817, Dict., 7, p. 193, n° 3. *Caryophyllia Calvimonti*, Lamouroux, 1830, Encycl. Michelin, Icon., pl. 27, fig. 1, p. 116 (exclus. syn.). *Montlivaltia Calvimonti*, Edw. et Haime. France, Saint-Mihiel, Tonnerre (Yonne), Chaumont, près de Verdun.

**\*474. Moreausiaca**, d'Orb., 1847. *Caryophyllia Moreausiaca*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 85, pl. 17, fig. 1. *Caryophyllia clavus*, Mich., pl. 17, fig. 6. Saint-Mihiel, Chaumont, Châtel-Censoir.

**475. dilatata**, d'Orb., 1847. *Caryophyllia dilatata*, Michelin, 1843, Iconog., p. 86, pl. 17, fig. 4. Peut-être une variété de la précédente. France, Saint-Mihiel, Maxey-sur-Vaize, Damvillers.

**476. subcylindrica**, d'Orb., 1847. *Caryophyllia subcylindrica*, Michelin, 1843, Icon., pl. 17, fig. 2-3. Peut-être individu usé du *L. Moreausiaca*. France, Saint-Mihiel.

**\*478. Radisensis**, d'Orb., 1847. Très-grande espèce conique, large, peu excavée à la partie supérieure. France, île de Ré.

**ELLIPSOSMILIA**, d'Orb., 1849. Note sur les polypes, p. 5.

**\*479. plicata**, d'Orb., 1847. Espèce cylindrique isolée, très-allongée, ornée en dehors de plis transverses presque également espacés, qui vont jusqu'au bord. France, Châtel-Censoir, Saintpuits (Yonne).

**MONTLIVALTIA**, Lamouroux, 1821.

**\*480. cornuta**, d'Orb., 1847. *Caryophyllia cornuta*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 87, pl. 17, fig. 5. France, Saint-Mihiel.

**\*481. subrugosa**, d'Orb., 1847. Espèce isolée, plus ou moins conique, arquée ou droite, couverte extérieurement de très-petites rides transverses. France, Loix, île de Ré, Pointe-du-Ché, Châtel-Censoir, Oyonnax (Ain).

**\*482. contorta**, d'Orb., 1847. Espèce isolée dont l'ensemble est diversement contourné et marqué en dehors de stries transverses entre de gros plis qui se continuent jusqu'au bord supérieur. France, La Rochelle, Pointe-du-Ché.

**AMBLOPHYLLIA**, d'Orb., 1849. Note sur des polypes, p. 8.

**\*484. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine du *M. contorta*, mais dont les rides extérieures ne se continuent pas jusqu'au bord. Calices souvent confluent. France, La Rochelle.

**ACROSMILIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 241.

**\*485. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce longue, arquée, acuminée à son extrémité, profondément creusée en dessus par des lames granuleuses. France, La Rochelle, Pointe-du-Ché.

**486. vasiformis**, d'Orb., 1847. *Caryophyllia vasiformis*, Michelin, 1843, Icon. zooph., pl. 19, fig. 5. France, Damvillers (Meuse).

**\*487. elongata**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, droite, comme silonnée en long à son sommet. France, Wagnon (Ardennes).

**THECOSMILIA**, Edwards et Haime. Voy. t. 1, p. 208.

**488. glomerata**, d'Orb., 1849. *Dendrophyllia id.*, Michelin, 1843, Icon. zooph., p. 88, pl. 18, fig. 3. France, Saint-Mihiel, Châtel-Censoir, Tonnerre.

**489. crassa**, d'Orb., 1849. *Dendrophyllia dichotoma*, Michelin, 1843, Icon., p. 88, pl. 18, fig. 4 (non *Lithodendron dichotomum*, Goldf., 1831). France, Saint-Mihiel, Verdun, Maxey-sur-Vaise. Cette espèce pourrait n'être qu'une variété de la précédente.

**490. subcylindrica**, d'Orb., 1847. *Lobophyllia cylindrica*, Michelin, 1843, p. 90, pl. 20, fig. 2 (non Phillips, 1829). France, Verdun.

**491. turbina**, d'Orb., 1847. *Loboph. id.*, Michelin, 1843, Icon., p. 90, pl. 19, fig. 1. Peut-être la même espèce que le *Crassum*. France, Sampigny.

**491'. Buvignieri**, d'Orb., 1847. *Lobophyllia id.*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 90, pl. 17, fig. 9. Espèce rameuse. France, Saint-Mihiel, Verdun (Meuse), Echaillon (Isère), Poisat, près de Nantua.

**491". confluens**, d'Orb., 1847. Jolie espèce dont les calices sont confluent, souvent deux par deux; extérieur strié par endroits. France, Vauligny, près de Tonnerre (Yonne), La Rochelle, Echaillon.

**STILOSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

**491'''. Michelini**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., X, p. 275, pl. 6, fig. 2. Chaude-Fontaine (Doubs).

**CALAMOPHYLLIA**, Blainville, 1834. Voy. t. 1, p. 292.

**492. Pseudostylina**, d'Orb., 1847. *Lithodendron pseudostylinum*, Michelin, 1843, p. 96, pl. 19, fig. 9, pl. 20, fig. 4. France, Dun.

**492'. striata**, Blainville, 1830, Dict., 50, pl. 312. Guettard, t. 2, p. 406, pl. 34. Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 11, p. 262, France, Verdun.

**493. Moreausiaca**, d'Orb., 1847. *Lithodendron Moreausiacum*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 95, pl. 21, fig. 3. Leym., pl. 10, fig. 15. France, Verdun, Angoulins, près de La Rochelle.

**494. Edwardsii**, d'Orb., 1847. *Lithodendron Edwardsii*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 96, pl. 21, fig. 2. France, Verdun.

**495. undata**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'ensemble a des rameaux ronds, droits, gros de 15 mill., peu divisés, ornés de rétrécissements annulaires ondulés. France, Wagnon (Ardennes).

**496. funiculus**, d'Orb., 1847. *Lithodendron funiculus*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 93, pl. 19, fig. 7. France, Saint-Mihiel, Wagnon, Oyonnax, Landeyron, Poisat, près de Nantua (Ain).

**497. lombricalis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*E. pseudostylina*, mais dont les tiges sont bien plus minces et plus chargées de cloisons transverses. France, Oyonnax (Ain).

**497'. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce à tiges grosses comme un tuyau de plume, peu dichotomes, espacées. France, Wagnon, Poisat, près de Nantua (Ain).

**498. strangulata**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*E. undulata*, mais à tige plus irrégulière, marquée de rétrécissements transverses très-rapprochés et irréguliers. Oyonnax, Landeyron, Saintpuits.

**499. inaequalis**, d'Orb., 1847. Tiges inégales, les unes grosses, les autres petites, avec de légères rides transverses. France, Wagnon.

- \***500. simplex**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*E. compressa*, mais d'un tiers plus mince et sans étranglement ni rides. France, Oyonnax, Landeyron. Poizat, Châtel-Censoir, Wagnon, Echaillon (Isère).
- \***501. Bernardina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*E. simplex*, mais à tiges rondes, du tiers plus étroites. France, Landeyron.
- \***502. subgracilis**, d'Orb., 1847. Espèce à tige encore plus petite que chez la précédente, avec des cloisons peu marquées entre les tiges. France, Angoulins, près de La Rochelle.
- EUNOMIA**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 292.
- \***503. lævis**, d'Orb., 1847. *Lithodendron læve*, Michelin, 1842, Icon. zooph., p. 93, pl. 19, fig. 8. France, Wagnon, Verdun, Maxey-sur-Vaise, Châtel-Censoir, Oyonnax.
- \***504. flabella**, d'Orb., 1847. *Lithodendron id.*, Michelin, 1842, Icon. zooph., p. 94, pl. 21, fig. 4. France, Maxey-sur-Vaise, Verdun, Oyonnax, route de Grasse à La Malle (Var).
- \***505. Cottaldina**, d'Orb., 1847. Belle espèce voisine pour l'ensemble de forme du *C. pseudostylina*, mais sans stries longitudinales.
- \***506. nodosa**, d'Orb., 1847. Belle espèce à tiges comprimées, comme noueuse par des étranglements très-marqués qui laissent des tubercules, surtout aux côtés. France, Oyonnax, Landeyron (Ain).
- \***507. grandis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les tiges ont 18 mill. de diamètre, et sont fortement ridées en travers. France, Oyonnax.
- \***508. articulata**, d'Orb., 1847. *Lithodendron id.*, Michelin, 1842, Icon. zooph., p. 94, pl. 21, fig. 1. Saint-Mihiel, Wagnon.
- \***510. rugosa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. dichotoma*, mais avec des rides transverses très-marquées. Wagnon, Saulce-aux-Bois.
- 511. contorta**, d'Orb., 1847. Espèce dont les tiges, très-étroites, sont contournées de toutes les manières et irrégulières. Loix, île de Ré.
- APLOPHYLLIA**, d'Orb., 1849. Note sur les polypes, page 8.
- \***512'. dichotoma**, d'Orb., 1849. *Lithodendron id.*, Michelin, 1843, pl. 19, fig. 6. *Calamophyllia dichotoma*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 11, p. 263. France, Verdun, Wagnon, Dun.
- ENALLHELIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 322.
- \***513. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*E. compressa*, mais avec des tiges ramuleuses très-étroites, rondes, avec les calices seulement sur les côtés. Ceux-ci saillants également striés en dehors. France, Angoulins.
- CONOCENIA**, d'Orb., 1849. Cellules bien plus saillantes que dans les *Stylina*, coniques, lisses.
- 514. tumularis**, d'Orb., 1847. *Astrea tumularis*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 117, pl. 27, fig. 3. France, Saint-Mihiel.
- ADELOCENIA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Stylina* sans columelle styloforme.
- \***515. castellum**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1844, id., p. 118, pl. 27, fig. 4. Sampigny, Goussaincourt, Bay-Bel, Tonnerre.
- \***516. tubulosa**, d'Orb., 1847. *Astrea tubulosa*, Michelin, pl. 27, fig. 2 (non Goldfuss). France, Saint-Mihiel, Châtel-Censoir.
- \***517. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. vertebralis*, mais dont les cellules sont un peu plus grandes et surtout bien plus lamelleuses. France, Angoulins.



\*518. *Moreana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. tubulosa*, mais dont les cellules sont plus petites, plus élevées, coniques, et plus rapprochées. France, Sampigny (Meuse).

\*519. *Lancelotii*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules très-petites, serrées, s'élèvent en tube. France, Wagnon.

**DECACŒNIA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Phyllocœnia* à cinq ou dix systèmes, amorphes.

\*520. *magnifica*, d'Orb., 1847. Espèce dont les calices sont d'un diamètre plus grand que chez toutes les autres espèces, et ont dix chambres doubles. France, Châtel-Censoir, Wagnon.

\*521. *Michelini*, d'Orb., 1847. *Stylina tubulosa*, Michelin, pl. 21, fig. 6 (non *tubulosa*, Goldfuss, 1830; non Michelin, pl. 27, fig. 2). France, Saint-Mihiel, Torcy, Châtel-Censoir (Yonne), Wagnon (Ardenne), Oyonnax, Landeyron, près de Nantua (Ain), Saintpuits.

**PARASTREA**, Edwards et Haime, 1848.

\*522. *lifoliana*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 105, pl. 24, fig. 1. France, Lifol.

\*523. *meandrites*, d'Orb., 1847. *Astrœa meandrites*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., pl. 24, fig. 2. France, Saint-Mihiel, Oyonnax, Landeyron, Dun, Sampigny.

**TREMOCŒNIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 386.

\*524. *subornata*, d'Orb., 1847. Magnifique espèce à calices profonds, divisés en six quadruples chambres; leur intervalle orné de petites lamelles crénelées. France, La Rochelle.

\*525. *pulchella*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, par ses calices et les chambres de ceux-ci, mais avec des côtes plus grosses dans les intervalles. France, Tonnerre, Wagnon.

**CRYPTOCŒNIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 322.

\*526. *sublimbata*, d'Orb., 1847. *Astrœa limbata*, Michelin, 1843, pl. 24, fig. 10 (non Goldf., 1831). France, Sampigny, Saint-Mihiel, Wagnon, Tonnerre.

\*527. *hexaphyllia*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules ont quatre millim. de diamètre avec six doubles chambres; intervalles étroits avec de grosses côtes. France, La Rochelle.

\*528. *Baugieri*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules ont 1 1/2 millim. avec six chambres simples; intervalle presque lisse. France, Beauvoir, près de Niort (Deux-Sèvres).

\*529. *subregularis*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de deux millim., ont six chambres doubles prolongées en dehors, l'intervalle profondément costulé. France, Saulce-aux-Bois (Ardenne), montagne de Bel-Air, près de Dijon (Côte-d'Or), Oyonnax près de Nantua; Tonnerre (Yonne).

\*530. *decupia*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 2 millim., paraissent avoir dix chambres doubles; intervalles fortement costulés. France, Loix, île de Ré.

\*531. *Radisensis*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 2 1/2 millim., ont six chambres doubles, non prolongées en dehors; l'intervalle avec de grosses côtes. France, Loix, île de Ré.

**PŒUDOCŒNIA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Cryptocœnia* à huit systèmes, au lieu de six.

- \***532. suboctonis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont du même diamètre, mais avec huit doubles chambres, au lieu de dix. France, Tonnerre (Yonne), Rapt (Haute-Saône).
- \***533. Bernardina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*octonis* par ses huit chambres aux cellules, mais dont celles-ci sont d'un tiers plus petites. France, Landeyron.
- \***534. ramosa**, d'Orb., 1849. Espèce à petits calices saillants, espacés sur des rameaux dendroïdes. France, Tonnerre.
- \***535. digitata**, d'Orb., 1849. Espèce formant des expansions digitées, déprimées. France, Tonnerre.
- \***538. octonis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 2 1/2 mill., ont huit chambres presque simples; intervalles fortement costulés. France, La Rochelle, Vauligny, près de Tonnerre, Loix, île de Ré, Oyonnax (Ain), Châtel-Censoir.
- \***540. elegans**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 1 1/2 mill., ont huit chambres simples; l'intervalle couvert de côtes granuleuses. France, Wagnon, Saint-Mihiel.
- \***541. ramosa**, d'Orb., 1847. Espèces dont les cellules, larges d'un millim., ont huit chambres simples; l'intervalle finement radié, l'ensemble presque rameux. France, Vauligny, près de Tonnerre.
- DENDROCENIA**, d'Orb., 1849. Voy. v. 1, p. 322.
- 541'. Corallina**, d'Orb., 1847. *Astrea limbata*, Leymerie, 1846, Statistiq. de l'Aube, pl. 10, fig. 14 (non Goldf., 1831; non Michelin, 1843). France, Aube.
- STYLINA**, Lamarck, 1816.
- \***542'. Delucii**, Edwards et Haime, 1849. Ann. des Sc. nat., p. 292, n° 6. *Astrea Delucii*, DeFrance, 1826, Dict., 42, p. 386. *Astrea versatilis*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 108, pl. 24, fig. 9. *Astrea rotularia*, Michelin, 1844, Iconog., p. 108, pl. 24, fig. 11. Saint-Mihiel, Saulceaux-Bois, Wagnon, Tonnerre, Lifol, Tuzennecourt (Haute-Marne).
- \***544. Arduennensis**, d'Orb., 1847. *Astrea pentagonalis*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 107, pl. 24, fig. 6 (non *A. pentagonalis*, Goldf., 1831). France, Dun.
- \***545. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges d'un mill., ont douze chambres distinctes; l'intervalle strié. France, Estré, près de La Rochelle.
- \***546. Nantnacensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges d'un millim., ont six chambres; l'intervalle très-lisse. France, Landeyron (Ain).
- \***547. microcoma**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de moins d'un millimètre, sont très-serrées et ont six chambres; l'intervalle étroit. France, Loix, île de Ré, Tonnerre, Châtel-Censoir.
- 548. echinulata**, Blainville, 1830, Dict. des Sc. nat., t. 6, p. 317, pl. 40, fig. 5. Edw., 1849. *S. Gaulardi*? Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 97, pl. 21, fig. 5. Dun.
- 548'. Bourgueti**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. natur., p. 290, n° 3. *Astrea Bourgueti*, DeFrance, 1826, Dict. des Sc. nat., 42, p. 380. France, Oyonnax (Ain).
- 549. depravata**, d'Orb., 1847. *Astræa depravata*, Michelin, 1844, Iconog. zoophyt., p. 106, pl. 24, fig. 5. France, Sampigny.

**STEPHANOCœNIA**, Edwards et Haime.

\*551. *intermedia*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont très-petites. France, La Rochelle, Tonnerre.

\*552. *florida*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 7 millim., sont profondes, bien circonscrites. France, Wagnon.

\*553. *plana*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de quatre millim., sont très-superficielles, quoique distinctes. France, Châtel-Censoir (Yonne).

\*554. *trochiformis*, d'Orb., 1847. *Astrœa trochiformis*, Michelin, 1843, Icon. zooph., p. 118, pl. 27, fig. 6. France, Sampigny.

**ASTROCCœNIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*555. *Sancti-Mihieli*, d'Orb., 1849. *Astrea id.*, Michelin, 1844, p. 109, pl. 25, fig. 1. France, Saint-Mihiel, Mécrin, Sampigny.

**EWALLOCCœNIA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Astroccœnia* dendroïdes rameuses.

\*556. *crasso-ramosa*, d'Orb., 1849. *Astrea id.*, Michelin, 1844, p. 109, pl. 25, fig. 2. France, Saint-Mihiel, Maxey-sur-Vaize.

**PRIONASTREA**, Edwards et Haime. Voy. t. 1, p. 178.

\*557. *grandis*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules sont larges de 20 millim., multiradiées, indistinctes, les cloisons crénelées. France, La Rochelle, environs de Nantua, Loix, île de Ré.

\*558. *Blandina*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 10 millim., sont multiradiées et circonscrites d'un encadrement. Poizat, Oyonnax, Echailon, près de Grenoble, Saint-Mihiel.

\*559. *striata*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 12 millim., sont non bordées, peu distinctes, inégales; cloisons fines, granuleuses. France, Ecommoy (Sarthe).

\*560. *Corallina*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 10 millim., sont non bordées, mais très-distinctes par une saillie; les cloisons inégales. France, Saint-Mihiel, Saint-Claude (Jura), environs de Nantua, Saulce-aux-Bois (Ardenne).

\*561. *Rathieri*, d'Orb., 1849. *Astrœa helianthoides*, Michelin, pl. 24, fig. 3 (non Goldfuss, 1831). France, Dun, Ecommoy, Tonnerre, environs de Nantua (Ain).

\*562. *Noe*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 7 mill., sont peu profondes, multiradiées, bien circonscrites, à cloisons serrées. France, Trouville (Calvados), Oyonnax, Landeyron (Ain), Tonnerre.

\*563. *Cabanetiana*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 5 millim., sont presque superficielles, à cloisons espacées et granuleuses. France, Oyonnax, Angoulins, Tonnerre.

\*564. *angustata*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 3 1/2 millim., sont d'un aspect analogue à celles du *P. Cabanetiana*. France, Saulce-aux-Bois, Tonnerre.

\*565. *punctata*, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules, larges de 1 1/2 millim., sont très-distinctes et profondes. France, Wagnon, Châtel-Censoir.

\*566. *dubia*, d'Orb., 1849. Grande espèce dont les cellules, larges de 12 millim., sont bordées d'un espace lisse. Wagnon.

**CONFUSASTREA**, d'Orb., 1847. Voy. v. 1, p. 322.

\*567. *sub-Burgundia*, d'Orb., 1847. *Astrœa Burgundia*, Leymerie,

1846, Statist. de l'Aube, pl. 10, fig. 13 (non Michelin, 1843). France, Saintpuits (Yonne), Aube.

\***566. Burgundiae**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 106, pl. 24, fig. 4. France, Saint-Mihiel.

**567. Mosensis**, d'Orb., 1847. *Agaricia rotata*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 102, pl. 22, fig. 6 (non *A. rotata*, Goldf., 1831). Eix.

\***568. excavata**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 13 millim., sont excavées, séparées par une colline arrondie; cloisons inégales. France, Wagnon.

\***569. inaequalis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 9 millim., sont peu profondes, quoique assez distinctes, mais très-inégales. France, Châtel-Censoir.

**SYNASTREA**, Edwards et Haime. Voy. t. 1, p. 208.

\***570. hemisphaerica**, d'Orb., 1849. *Astrea id.*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 101, pl. 22, fig. 4. France, St-Mihiel, Maxey-sur-Vaise, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

\***571. cristata**, d'Orb., 1849. *Astrea cristata*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., pl. 24, fig. 7. Goldf., 1831, pl. 22, fig. 8. France, Saint-Mihiel, Châtel-Censoir, Oyonnax.

\***572. collinaria**, d'Orb., 1849. Belle espèce à calices petits, formant des collines nombreuses, arrondies, sur une masse amorphe. Saintpuits (Yonne).

\***573. excavata**, d'Orb., 1849. Espèce en plaques, dont les cellules, larges de 5 millim., sont profondes, à cloisons étroites. France, Estré, près de La Rochelle.

\***574. Oceani**, d'Orb., 1849. Espèce en mamelons, dont les cellules, larges de un millim. et demi, sont très-régulières, superficielles et seulement excavées au centre. France, Oyonnax, Poisat (Ain), Écomoy (Sarthe), Saulce-aux-Bois.

\***575. pulchella**, d'Orb., 1849. Espèce en mamelon, dont les cellules larges d'un millim., sont superficielles et ornées de cloisons très-régulières. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

\***576. confusa**, d'Orb., 1849. Espèce en grandes masses, dont les cellules larges de 2 millim. sont superficielles et tellement confuses, qu'on peut à peine reconnaître le centre. Poisat, près de Nantua.

**577. complanata**, d'Orb., 1849. Espèce en grandes masses aplaties, dont les cellules larges de 4 millim., sont superficielles et à peine impressionnées au centre. France, St-Mihiel.

**578. Moreana**, d'Orb., 1849. *Pavonia tuberosa*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 101, pl. 22, fig. 5 (non *P. tuberosa*, Goldf., 1831). Verdun.

**DACTYLASTREA**, d'Orb., 1849. C'est une *Synastrea* dendroïde, rameuse.

\***579. incrustata**, d'Orb., 1849. *Alveopora incrustata*, Michelin, 1844, id., p. 111, pl. 25, fig. 8. Espèce rameuse. France, Mécrin, St-Mihiel (Meuse), Landeyron, près de Nantua (Ain).

\***580. subramosa**, d'Orb., 1849. Espèce rameuse comme la précédente, dont les cellules, à peu près de même diamètre, ont des cloisons alternes bien plus minces. France, Châtel-Censoir, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

**CENTRASTREA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 209.

\*580'. *interrupta*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules larges d'un millim. et demi, sont contiguës ou séparées, les intervalles par lames étroites séparées par des sillons interrompus. France, Poizat, près de Nantua.

\*581. *Moreana*, d'Orb., 1847. *Agaricia lobata*, Michelin, 1844. p. 116, pl. 27, fig. 5 (non Goldfuss, 1830). France, Sampigny, Verdun, Ecommoy (Sarthe), Trouville.

\*582. *araneola*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1844, *Jeshog. zoophyt.*, p. 107, pl. 24, fig. 8. France, St-Mihiel.

\*584. *granulata*, d'Orb., 1847. *Agaricia granulata*, Michelin, pl. 28, fig. 1 (non Münster, 1830). France, St-Mihiel, Verdun,

\*585. *microconos*, d'Orb. Voy. Étage oxfordien, n° 634. France, Trouville.

**THAMNASTREA**, Le Sauvage, 1822. C'est un *Centrastrea* dendroïde.

\*585. *dendroïdea*, d'Orb., 1847. *Astrea dendroïdea*, Lamouroux, 1821. *Thamnasteria Lamourouxii*, Le Sauvage, Michelin, 1844, pl. 25, fig. 3. France, Trouville, St-Mihiel.

**MICROSOLENA**, Lamouroux, 1821.

\*586. *tuberosa*, d'Orb., 1847. *Alveopora tuberosa*, Michelin, 1844, id., p. 110, pl. 25, fig. 7. France, St-Mihiel.

\*587. *irregularis*, d'Orb., 1847. Espèce en grandes plaques, dont les cellules peu distinctes ont 5 millim. de diamètre. France, Oyonnax, près de Nantua.

**POLYPHYLLASTREA**, d'Orb., 1849. C'est un *Synastrea*, à cloisons fines, serrées, inégales, comme divisées en segments et sans intervalles entre elles.

\*587'. *plana*, d'Orb., 1849. Espèce en plaques, dont les cellules larges de 8 à 9 millim. sont entièrement planes, les cloisons très-fines, le centre excavé. France, Poizat, près de Nantua.

**DENDRARGEA**, d'Orb., 1849. C'est un *Microsolena*, dont l'ensemble est dendroïde, rameux.

\*588. *racemosa*, d'Orb., 1847. *Alveopora racemosa*, Michelin, 1844, Icon zoophyt., p. 110, pl. 25, fig. 6 (les cellules sont trop distinctes dans la figure). France, Sampigny.

**DACTYLARGEA**, d'Orb., 1847. Ce sont des polypiérites cylindriques, simples ou doubles, par fissiparités, pourvus d'une épithèque formant un ensemble en buisson, cloisons irrégulières.

\*589. *truncata*, d'Orb., 1847. Espèce en mamelon, dont les rameaux sont courts et tronqués, à une ou plusieurs cellules. France, Loix, Ile de Ré.

**APLOSMILIA**, d'Orb., 1847. Cellule comprimée, isolée, avec une columelle lamelleuse au centre, portée à l'extrémité d'une tige.

\*590. *aspera*, d'Orb., 1847. *Lobophyllia id.*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 89, pl. 20, fig. 3. *Eusmilium aspera*, Edw. et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., p. 266, n° 4. France, St-Mihiel, Oyonnax, Poizat.

\*591. *semisulcata*, d'Orb., 1847. *Lobophyllia id.*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 89, pl. 17, fig. 8. *Eusmilium semisulcata*, Edw. et Haime, 1849, Ann. des sc. nat., p. 266, n° 5. France, St-Mihiel, Verdun, Marey, Wagnon (Ardennes), Pointe-du-Ché.

- \***592. nuda**, d'Orb., 1847. Espèce rameuse, dont les tiges sont lisses, marquées seulement de quelques côtes au pourtour des cellules terminales. France, St-Mihiel, Sampigny.
- 592'. Buignieri**, d'Orb., 1849. *Lobophyllia Buignieri*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 90, pl. 17, fig. 9. *Eusmilie Buignieri*, Edw. et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., p. 266, n° 6. Maxey-sur-Vaise (Meuse.)
- STYLOGYRA**, d'Orb., 1847. Ensemble flabelliforme, columelle très-marquée en lame.
- \***593. flabellum**, d'Orb., 1847. *Lobophyllia flabellum*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 92, pl. 18, fig. 1 (figure fautive en ce qu'elle n'indique pas la lame médiane). *Rhipidogyra flabellum*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., p. 282, n° 3. France, Saint-Mihiel, Châtel-Censoir.
- STYLOSMILIA**, Edwards et Haime, 1849.
- 593'. Michelinii**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., p. 275, pl. 6, fig. 2. France, Chaude-Fontaine (Doubs).
- PHYTOGYRA**, d'Orb., 1849. C'est un *Stylogyra*, formant des rameaux horizontaux, libres, dichotomes, pourvus en dessus de cellules non interrompues, à columelle lamelleuse, de cloisons alternes obliques, réunies deux par deux sur une côte externe.
- 594. magnifica**, d'Orb., 1849. Rameaux grêles, allongés. France, Oyonnax (Ain).
- \***594'. Deshayesiaca**, d'Orb., 1849. *Lobophyllia Deshayesiaca*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 92, pl. 20, fig. 1. France, Saint-Mihiel, Tonnerre, environs de Nantua (Ain).
- PACHYGYRA**, Edwards et Haime, 1848.
- \***595. Cottaldina**, d'Orb., 1849. Espèce formant des mamelons sur lesquels sont des méandres souvent compliqués, séparés par une large partie lisse, peu excavée. France, Châtel-Censoir, environs de Nantua (Ain).
- \***596. tuberosa**, d'Orb., 1849. Grosse espèce dont l'ensemble est en gros mamelons, les cellules allongées, saillantes, séparées par un très-profond sillon. France, Châtel-Censoir.
- 596'. Delucii**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., p. 285, n° 2. *Meandrina Delucii*, Defrance, 1823, Dict. des Sc. nat., t. 29, p. 277. France, Lot??
- MYRIOPHYLLIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Oulophyllia* à grosses cloisons, dont le sommet des collines est marqué d'un sillon; une columelle irrégulière.
- \***597. rastellina**, d'Orb., 1849. *Meandrina rastellina*, Michelin, 1843, Icon., p. 99, pl. 18, fig. 7. France, St-Mihiel, Châtel-Censoir.
- MEANDRINA**, Lamarck, 1816.
- \***598. ornata**, d'Orb., 1847. Espèce en gros mamelons dont les cellules, très-méandriformes, sont profondes et séparées par des intervalles lisses. France, environs de Nantua.
- \***599. elegans**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. rastellina*, mais dont les cellules sont plus étroites (larges de 5 millim.), séparées par une petite côte dont le sommet est lisse. France, Châtel-Censoir, Poizat, près de Nantua (Ain).

- \***600.** *angustata*, d'Orb., 1847. Espèce voisine des deux précédentes, mais dont les cellules sont encore plus étroites, à séparations lisses plus larges. France, Oyonnax aux environs de Nantua.
- \***601.** *Bernardina*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. ornata*, mais à cellules plus larges, à cloisons plus espacées. France, Poizat, Landeyron, près de Nantua.
- \***602.** *linearis*, d'Orb., 1847. Espèce encore plus étroite que le *M. angustata*, à cloisons alternes. France, Wagnon?

**OULOPHYLLIA**, Edwards et Haime, 1848.

- \***604.** *lamellobidentata*, d'Orb., 1849. *Meandrina id.*, Michelin, 1843, Iconog. zooph., p. 99, pl. 18, fig. 9. France, Sampigny, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.
- 605.** *montana*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 11, p. 269. *Meandrina id.*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 100, pl. 22, fig. 1. France, St-Mihiel.
- \***606.** *macropora*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices sont énormes et très-irréguliers. Saintpuits (Yonne).
- \***607.** *corrugata*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., pl. 18, fig. 5, France, St-Mihiel.
- \***608.** *Corallina*, d'Orb., 1847. Espèce voisine d'aspect de l'*Otenella*, mais avec des cloisons bien plus fines. France, St-Mihiel, Saulce-aux-Bois.
- \***609.** *excavata*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules un peu plus larges que chez le l'*Otenella*, sont tellement profondes, qu'elles forment un sillon très-creux; cloisons grosses et espacées. Wagnon.
- \***610.** *dijuncta*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules larges de 7 à 15 millim., sont séparées par un intervalle costulé; cloisons serrées. France, Vauligny, près de Tonnerre (Yonne).
- 611.** *Michelinii*, d'Orb., 1847. *Lobophyllia meandrinoides*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., pl. 19, fig. 3 (non *Meandrinoides*, Michelin, pl. 22, fig. 3). France, St-Mihiel.

**MEANDROPHYLLIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Oulophyllia* pour les calices, mais dont l'ensemble est dendroïde, rameux.

- \***611'.** *Lotharinga*, d'Orb., 1849. *Meandrina id.*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 100, pl. 22, fig. 2. France, St-Mihiel, Sampigny, Landeyron, près de Nantua (Ain).

**AGARICIA**, Lamarck, 1816.

- \***612.** *irregularis*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules irrégulières sont par lignes dans des sillons larges de 4 millim. France, Châtel-Censoir.
- 614.** *planat*, d'Orb., 1847. *Agaricia Sæmmeringii*, Michelin, 1843, p. 103, pl. 23, fig. 2 (non Goldf.). France, Mécrin, Hannonville.
- 615.** *graciosa*, d'Orb., 1847. *Agaricia id.*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 104, pl. 23, fig. 3. France, Sampigny.

**AKOPHYLLIA**, d'Orb., 1849. Genre voisin des *Oulophyllia*, mais dont la columelle a un axe styloforme et six tubercules autour, au milieu de chaque calice.

- \***613.** *Nantuaensis*, d'Orb., 1847. Belle espèce voisine pour l'aspect général de l'*Agaricia Sæmmeringii*, mais dont les cellules

ont une columelle saillante au centre. France, Lândeyron, Poizat, près de Nantua.

**COMOSERIS**, d'Orb., 1849. C'est un *Agaricia*, dont les calices épars très-nombreux sont disposés entre des méandres saillants, simples, éloignés.

\***616. meandrinoides**, d'Orb., 1847. *Pavonia meandrinoides*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 100, pl. 22, fig. 3. France, Sampigny, Angoulins, près de La Rochelle, Saintpuits (Yonne).

**COMOPHYLLIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Latomeandra* dont les branches réunies forment une masse compacte; calices superficiels, obliques, souvent plusieurs de front dans la même vallée.

\***617. elegans**, d'Orb., 1847. Belle espèce dont les cellules sont obliques, superficielles, les collines peu contournées. France, Poizat, près de Nantua (Ain).

\***617'. Cottaldida**, d'Orb., 1849. Belle espèce à larges vallons où sont plusieurs calices de front.

**LATOMEANDRA**, d'Orb., 1847. Ce sont des cellules mi-stelliformes analogues à celles des *Agaricia*, portées sur des tiges libres aplaties, couchées et dichotomes pourvues de côtes régulières en dessous.

\***618. ramosa**, d'Orb., 1847. Belle espèce dont les rameaux déprimés, dichotomes, sont striés en dehors; les cellules creuses, subconfluentes. France, Loix, île de Ré.

**MICROPHYLLIA**, d'Orb., 1849.

**618'. corrugata**, d'Orb., 1849. *Meandrina corrugata*. Michelin, 1843, Icon., p. 93, pl. 18, fig. 5. *Latomeandra corrugata*, Edwards et Haime, 1849, loc. cit., 11, p. 271. France, St-Mihiel.

\***618". Raulinii**, d'Orb., 1849. *Meandrina id.*, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 99, pl. 18, fig. 8. *Latomeandra Raulini*, Edwards et Haime, 1849, p. 271. France, St-Mihiel, environs de Salins.

**618". Edwardsii**, d'Orb., 1849. *Meandrina id.*, Michelin, 1843, Iconog. zoophyt., p. 98, pl. 18, fig. 6. *Latomeandra Edwardsii*, Edwards et Haime, 1849, p. 272. France, St-Mihiel, Sampigny, Tonnerre, Châtel-Censoir, La Rochelle.

**LOBOCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Stylina* formé de rameaux cylindriques dont les polypierites espacés sont saillants en tubes creux, striés en dehors, pourvus en dedans de calices formés de six cloisons.

\***619. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce rameuse à branches irrégulières, anastomosées, cellules par séries souvent très-irrégulières. France, Wagnon.

\***619'. sublaevis**, d'Orb., 1847. *Madrepora id.*, Michelin, 1844, idem, p. 111, pl. 26, fig. 5. France, Wagnon, Sampigny, Maxey-sur-Vaise, Châtel-Censoir, Tonnerre.

\***619". obeliscus**, d'Orb., 1847. *Madrepora id.*, Michelin, 1844, id., p. 112, pl. 25, fig. 4. France, St-Mihiel, Maxey-sur-Vaise, Goussaincourt, Dun, Clamecy.

**CYATHOPHORA**, Michelin, 1843.

\***620. Richardi**, Michelin, 1843, Icon. zoophyt., p. 104, pl. 26, fig. 1. France, St-Mihiel, Tonnerre, Poizat, près de Nantua (Ain).



**POLYTREMA**, Risso, 1826. Voy. t. 1, p. 823.

**621. capilliformis**, Michelin, 1844, Iconog. zoophyt., p. 112, pl. 26, fig. 2. St-Mihiel, Dun, Clamecy, Tonnerre, Châtel-Censoir.

**621'. Corallina**, d'Orb., 1849. Espèce amorphe en gros mamelons couverts de parties coniques. France, Tonnerre.

#### FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**CONIOLINA**, d'Orb., 1849. C'est un *Conodictyum* sans pores, à surface divisée en hexagones réguliers.

**622. hexagona**, d'Orb., 1847. Espèce très-remarquable représentant un ovale de 33 millim. de diamètre, ornée partout de lignes concentriques et en quinconce d'hexagones très-réguliers. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle, environs de St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure); Suisse, Le Banné.

**MARGINULINA**, d'Orb., 1825. Voy. t. 1, p. 242.

**623. Moreana**, d'Orb., 1846. Foramin. de Vienne, p. xxvii; espèce longue de 5 mill., très-irrégulière. France, St-Mihiel.

**CRISTELLARIA**, Lamarck, 1819. Voy. t. 1, p. 242.

**624. Fleurbausa**, d'Orb., 1847. *Peneroplis id.*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 120, n° 4. Espèce lisse, comprimée. Angoulins.

**625. Rupellensis**, d'Orb., 1846. Foramin. de Vienne, p. xxvii. France, Pointe-du-Ché.

#### AMORPHOZOAIRES.

**EUDEA**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 209.

**626. elongata**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, cylindrique, pourvue d'un léger renflement près de l'extrémité qui est plus étroite que le reste. France, Pointe-du-Ché, environs de Besançon.

**CNEMIDIUM**, Goldfuss, 1830.

**627. pyriforme**, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 114, pl. 26, fig. 6 (non *Tragos pyriforme*, Goldf.). France, Verdun, Void.

**HIPPALIMUS**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 209.

**628. Corallinus**, d'Orb., 1847. *Spongia mamillifera*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 113, pl. 26, fig. 5 (non *S. mamillifera*, Lamour., 1821). France, St-Mihiel, Danvillers.

**629. Mosensis**, d'Orb., 1847. *Spongia furcata*, Michelin, 1844, id., p. 114, pl. 26, fig. 3 (non *furcata*, Goldf., 1830, pl. 2, fig. 6). France, Houdainville, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

**630. Moreanus**, d'Orb., 1847. *Spongia lagenaria*, Michelin, 1844, id., p. 114, pl. 26, fig. 4 (non Lamouroux, 1821). France, Danvillers.

**631. elegans**, d'Orb., 1847. Voy. étage oxfordien, n° 693. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

**632. clavatus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, en massue, à extrémité arrondie et très-élargie. Pointe-du-Ché.

**STELLISPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.

**633. Mosensis**, d'Orb., 1847. *Cnemidium stellatum*, Michelin, id.,

p. 115, pl. 26, fig. 8 (non Goldf., pl. 30, fig. 3). France, Danvillers.

**634. subrotula**, d'Orb., 1847. *Cnemidium rotula*, Michelin, 1848, Icon., pl. 26, fig. 7 (non *rotula*, Goldf., pl. 6, fig. 6). Danvillers.

**\*635. reptans**, d'Orb., 1847. Espèce en plaque, parasite sur les corps divers, munie de plusieurs étoiles sans saillie. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

**CUPULOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.

**\*636. undata**, d'Orb., 1847. Espèce en lame mince onduleuse, d'un tissu vermiculé, peu régulier. France, Pointe-du-Ché.

**\*637. punctata**, d'Orb., 1847. Espèce rampante, auriforme, d'un tissu ponctué très-régulier. France, Pointe-du-Ché.

**AMORPHOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 170.

**\*638. Corallina**, d'Orb., 1847. Espèce en gros mamelons arrondis, irréguliers, percée de trous irréguliers assez serrés. France, Pointe-du-Ché, près de La Rochelle.

---

## QUINZIÈME ÉTAGE : — KIMMÉRIDIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**ELEPHANTITES**, Lamarck. Voy. vol. 1, p. 212.

\*1. **Troslayanus**, d'Orb. Espèce voisine du *B. Sowichii*, mais plus allongée, à pointe plus aiguë et canaliculée. France, Trouville.

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. vol. 1, p. 52.

\*2. **subinflatus**, d'Orb., 1847. *N. inflatus*, d'Orb., Paléont. franç., terr. jurass., 1, p. 165, pl. 37 (non Montagu, 1808). France, Châtelailon (Charente-Inférieure), Honfleur (Calvados), Sénoncourt (Oise), Le Havre (Seine-Inférieure); Suisse, Hauteceuve, près de Porrentruy.

\*3. **Moreanus**, d'Orb., Paléont. franç., terr. jurass., 1, p. 167, pl. 39, fig. 4, 5. Honfleur (Calvados), Mauvage (Meuse).

\*4. **giganteus**, d'Orb., 1825, Paléont. franç., terr. jurass., 1, p. 163, pl. 36. *N. dorsatus*, Römer, 1836, Oolith., p. 179, pl. 12, fig. 64. Le Havre (Seine-Inférieure); Suisse, Alle, près de Porrentruy; Allem., Langenberge, près de Goslar, Walterberge, près de Eschershausen.

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. vol. 1, p. 181.

\*5. **Lallierianus**, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. cré., 1, p. 208. *A. inflatus*, Reineck, 1818 (non *inflatus*, Sow., 1817). Le Rocher, près de La Rochelle, St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Mauvage, Ruelle (Charente), Cirey-le-Château (Haute-Marne), Tonnerre, Auxerre (Yonne).

\*6. **longispinus**, Sow., 1825. D'Orb., Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 209. *A. bispinosus*, Zieten, 1830, pl. 16, fig. 4. St-Jean-d'Angely, Boulogne, Ruelle, Mauvage, environs d'Auxerre (Yonne); Angl., Weimouth.

\*7. **Yo**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 210. France, Boulogne (Pas-de-Calais), Mauvage (Meuse).

\*8. **decipiens**, Sow., 1821. D'Orb., Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 211. Villerville (Calvados), Vallée de la Blaise (Haute-Marne), Montperthuis, Hécourt (Oise), Mauvage (Meuse); Angl., Parkfield, près de Lowestoft (Suffolk).

\*9. **Erinus**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 212. *A. Hector*, d'Orb., id., pl. 215. Villerville (Calvados), Mauvage, Auxerre (Yonne), Blaise, Arentière (H.-Marne).

\*10. **Calisto**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 214, fig. 1, 2. Savoie, Chambéry.

- \*11. *Eudoxus*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 214, fig. 36. St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Tonnerre.
- \*12. *mutabilis*, Sow., 1823. D'Orb., Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 115. Mauvage, Bois-Aubert, Hécourt (Oise), Tonnerre (Yonne); Anglet., Young.
- \*13. *Eumelus*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 217, fig. 1. France, Mauvage.
- \*14. *Cymodoce*, d'Orb., 1847, Pal. franç., Terr. jurass., 1, pl. 202, 203, fig. 1. France, Honfleur (Calvados), Châtelailon (Charente-Inférieure), Le Havre (Seine-Inférieure), Ruelle (Charente).
- \*16. *Eupalus*, d'Orb., 1847, Pal. franç., Terr. jurass., 1, pl. 217. France, Lucy-le-Bois, près d'Auxerre (Yonne).
- \*16'. *orthocera*, d'Orb., 1848, Pal. franç., Terr. jurass., 1, pl. 218. France, Gye-sur-Saône, Aube.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

*CHEMNITZIA*, d'Orb., 1839. Voy. vol. 1, p. 172.

- \*17. *Danae*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Cleo*, mais avec des tours légèrement convexes, surtout à la partie inférieure, sans former de gradins; angle spiral, 130°. France, St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Le Havre.

- \*18. *Della*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Clytia*, mais avec les tours non renflés, lisses, sans saillie; angle spiral, 170°. France, Mauvage, Le Havre; Suisse, Le Raimeux, près de Delémont (Berne).

- \*19. *Bronnii*, d'Orb., 1847. *Melania Bronnii*, Römer, 1836, Oolith., p. 159, pl. 9, fig. 22. Allem., Wendhausen.

- \*20. *abbreviata*, d'Orb., 1847. *Melania abbreviata*, Römer, 1836, Oolith., p. 159, pl. 10, fig. 4. Allem., Wendhausen, Goslar.

*NERINEA*, Defrance, 1825. Voy. vol. 1, p. 263.

- \*21. *constricta*, Römer, 1836, Oolith., p. 143, pl. 11, fig. 30; pl. 11, fig. 27. Bronn., 1837, Jahrb., p. 550, pl. 6, fig. 4. Allem., Goslar.

- \*22. *Gosse*, Römer, 1836, Oolith., p. 143, pl. 11, fig. 27. Bronn., 1837, Jahrb., p. 551, pl. 6, fig. 5. France, Chargey lès Gray (Haute-Saône), Blaise (Haute-Marne), Audicourt (Doubs); All., Goslar.

- \*23. *suprajurensis*, Voltz, Goldf., 1843, 3, p. 41, pl. 175, fig. 10. Bronn., 1837, Jahrb., p. 551, pl. 6, fig. 2 (exclus. fig. 2). Suisse, Le Banné, près de Porrentruy.

- \*24. *Goodhallii*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 232, pl. 23, fig. 12. France, Ruelle, près d'Angoulême; Angl., Osmington.

*ACTEONINA*, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 118.

- \*25. *ventricosa*, d'Orb., 1847. Espèce très-ventrue, à spire courte. France, Villerville (Calvados).

*NATICA*, Adanson, 1757. Voy. vol. 1, p. 29.

- \*26. *hemisphærica*, d'Orb., 1847. *Nerita hemisphærica*, Römer, 1836, Oolith., p. 156, pl. 10, fig. 7. France, Châtelailon, St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Nantua (Ain), Villerville (Calvados); Allem., Wendhausen, Le Banné près de Porrentruy.

- \*27. *globosa*, Römer, 1836, Oolith., p. 156, pl. 10, fig. 9. France,

St-Jean-d'Angely, Châtelailillon, Gray (Haute-Saône); Allem., Wendhausen; Suisse, Le Banné.

\*28. *macrostoma*, Römer, 1836, Oolith., p. 157, pl. 10, fig. 11. St-Jean-d'Angely, Châtelailillon; Allemag., Wendhausen, Goslar.

\*29. *turbiniformis*, Römer, 1836, Oolith., p. 157, pl. 10, fig. 12. France, St-Jean-d'Angely, Châtelailillon, Villerville; All., Wendhausen, Goslar.

\*30. *dubia*, Römer, 1836, Oolith., p. 157, pl. 10, fig. 8. France, Châtelailillon, St-Jean-d'Angely; Allem., Wendhausen; Suisse, Le Banné, près de Porrentruy.

\*31. *Eudora*, d'Orb., 1847. Coquille oblongue, lisse, dont l'angle spiral est de 55°; les tours très-renflés, sans ombilic. France, Saint-Jean-d'Angely, Châtelailillon.

\*32. *Elea*, d'Orb., 1847. Coquille oblongue, lisse, dont l'angle spiral est de 65°, les tours lisses, le dernier énorme par rapport aux autres. France, St-Jean-d'Angely; Suisse, Le Banné.

**NERITOPSIS**, Sow., 1825. Voy. vol. 1, p. 172.

\*33. *delphinula*, d'Orb., 1847. Charmante espèce à tours profondément séparés, le dernier élargi et sillonné en long. France, Saint-Jean-d'Angely.

**NERITA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 214.

34. *jurensis?* v. Münster, Römer, 1836, Oolith., p. 155, pl. 10, fig. 5. All., Hoheneggelsen à Streitberg.

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.

\*35. *Eudoxus*, d'Orb., 1847. Petite espèce plus longue que large, à tours peu anguleux, ornés de stries granuleuses. Villerville.

**TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.

36. *viviparoides*, Römer, 1836, Oolith., p. 153, pl. 11, fig. 3. Allem., Goslar.

**PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.

\*37. *Mesione*, d'Orb., 1847. Coquille plus haute que large, dont l'angle spiral est de 70°. Les tours convexes costulés en long, striés en travers et pourvus de fortes ondulations transverses. France, Le Havre (Seine-Inférieure), Honfleur (Calvados), Saint-Jean-d'Angely; Suisse, Porrentruy (Berne).

38. *reticulatus*, d'Orb., 1847. *Trochus reticulatus*, Sow., 1820, Min. Conch., 3, p. 127, pl. 272, fig. 2. Angl., Ringstead-Bay, près de Weymouth.

39. *acutimargo*, d'Orb., 1847. *Trochus acutimargo*, Römer, 1839, Oolith., p. 45, pl. 20, fig. 7. Allem., Osterwald, Soleure.

**PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.

\*40. *Oceanus*, Delabèche. *Strombus Oceanus*, Brongniart, 1821, Annales des Mines, pl. 7, fig. a, b. P. Ponti, Deslongchamps, 1832, pl. 9, fig. 2, 3 (non Delabèche). France, Le Havre, Honfleur (Calvados), Châtelailillon; Matafelon, près de Nantua (Ain), St-Jean-d'Angely; Gray (Haute-Saône); Suisse, Le Banné (Berne).

\*41. *Ponti*, Delabèche. *Strombus Ponti*, Brong., 1821, Ann. des Mines, pl. 7, fig. b (exclus. fig. a). *P. sexcostata*, Deslongch., 1843, pl. 9, fig. 5. Nous conservons à cette espèce le nom de Ponti, M. Bro-

gniart y ayant confondu la fig. A, qui doit former une espèce distincte, spéciale au corallien. France, Le Havre.

- \*42. *lævis*, d'Orb., 1847. *Buccinum læve*, Römer, 1836, pl. 11, fig. 24. *Buccinum subcarinatum*, Römer, id., pl. 11, fig. 20. *Pterocera incerta*, Deslongch., 1842, Mém. Soc. linn. de Norm., t. 7, p. 165, pl. 9, fig. 6. France, Senantes (Oise), Le Havre (Seine-Inférieure).

- \*43. *strombiformis*, d'Orb., 1847. *Chenopus strombiformis*, Koch, 1837, Beitr., p. 47, pl. 5, fig. 10. Baise (H.-Marne); Allem., Rinteln.

- \*44. *Galatæa*, d'Orb., 1847. Jolie espèce allongée comme le *P. tetracera*, mais avec deux pointes sur l'aile. France, Châtelailon, St-Jean-d'Angely.

- \*45. *Glaucus*, d'Orb., 1847. Petite espèce voisine du *P. Cassiope*, à tours carénés, striés en long, l'aile peu dilatée, pourvue de deux longues pointes. France, Villerville.

46. *musca*, Deslongch., 1842, Mém. Soc. lin. de Norm., t. 7, p. 165, pl. 9, fig. 4. Villerville (Calvados).

47. *Vespertilio*, Deslongch., 1842, id., p. 161, pl. 9, fig. 1. Villerville.

- FUSUS**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 303.

48. *pseudofusiformis*, d'Orb., 1847. *Buccinum fusiforme*, Römer, 1836, Oolith., p. 139, pl. 11, fig. 21 (non Schum., 1817). Peut-être, est-ce le jeune du *Pterocera lævis*. Allem., Hoheneggelsen.

- CEBITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

- \*49. *avenaceum*, Deslongch., 1842, Mém., p. 198, pl. 11, fig. 10, 11. Villerville.

- \*50. *Melite*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme et d'ornement du *C. Russiense*, mais avec 5 côtes au lieu de 4 à tous les tours. France, Villerville (Calvados).

- HELICION**, Montfort, 1810. Voy. p. 9.

- \*51. *latissima*, d'Orb., 1847. *Patella latissima*, Sow., 1816, M. C., 2, p. 185, pl. 39, fig. 1-5. Deslongch., Mém. de la Soc. linn. de Norm., 7, pl. 7, fig. 15, 16. *Patella suprajurensis*, Buvignier, 1848, Mém. de la Soc. phil. de Verdun, 2, p. 15, pl. 5, fig. 11. Anglet, Packefield; France, Villerville (Calvados), Varennes (Meuse).

- DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. p. 73.

- \*52. *Normanianum*, d'Orb., 1847. *D. nitens*, Deslongch., 1842, Mém., t. 7, p. 129 (non *nitens*, Sow.). Villerville.

- BULLA**, Linné, 1758.

- \*53. *suprajurensis*, Römer, 1836, p. 137, pl. 9, fig. 33. Allem., Rinteln, Hoheneggelsen.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

- PANOPÆA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.

- \*54. *Aldouini*, d'Orb., 1847. *Donax Aldouini*, Brong., Ann. Min., t. 6, pl. 7, fig. 6 (non *Aldouini*, Goldf., pl. 152, fig. 8). France, Lanlu (Oise), Le Havre, Honfleur, Villerville; environs de Tonnerre, Saint-Sauveur (Yonne), Châtelailon, St-Jean-d'Angely, Boulogne-sur-mer.

- \*55. *sinuosa*, d'Orb., 1847. Voy. Etage corallien, n° 204. *Pleuromya*

- Gresslyi*, Agassiz, 1848, Etud. crit., p. 250, pl. 28, fig. 15-17. France, Villervillè; Suisse, Porrentruy, Le Banné (Berne), Laufon (Soleure).
- 56. tellina**, d'Orb., 1847. *Pleuromya tellina*, Agass., 1845, Etud. crit., p. 250, pl. 29, fig. 1-10. *Pleuromya Voltzii*, Agass., 1845, p. 249, pl. 26, fig. 1, 2; pl. 29, fig. 12-14. Suisse; France, Hennequeville (Calvados), Villerville, Honfleur, Le Havre, Boulogne-sur-mer.
- 57. robusta**, d'Orb., 1847. *Arcomya robusta*, Agass., 1844, p. 173, pl. 9 a, fig. 10-12. Châtelailion; Obergösgen, Born (Soleure).
- 58. Dunkeri**, d'Orb., 1847. *Solen Jurensis*, Dunker, 1847. Palæontographica, n° 1, p. 131, pl. 18, fig. 7 (non *P. Jurensis*, Brongniart, 1821). France, Châtelailion, environs d'Auxerre (Yonne); Allem., Schaumburg.
- 59. Idalia**, d'Orb., 1847. Espèce très-renflée, oblongue, très-courte et ronde au côté buccal, l'autre allongé, recourbé. France, St-Jean-d'Angely, Auxerre; Ile de Sardaigne (M. de la Marmora).
- 60. rugosa**, d'Orb., 1847. *Mya rugosa*, Römer, 1836, Nordd. Oolit., p. 125, pl. fig. 19, 7. Allem., Rinteln.
- 61. gracilis**, d'Orb., 1847. *Arcomya gracilis*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 168, pl. 10, fig. 1-3; pl. 10', fig. 1. Suisse, Porrentruy.
- 62. hiantula**, d'Orb., 1847. *Platymya hiantula*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 184, pl. 10 a, fig. 7-13. Suisse, Laufon (Soleure).
- PHOLADOMYA**, Sowerby, 1826. Voy. t. 1, p. 73.
- 63. rugosa**, d'Orb., 1847. *Mya gibbosa*, Sow., 1823, M. C., 5, p. 19, pl. 419, fig. 1 (non Sow., 1813). *Lutraria rugosa*, Goldf., 1839, pl. 152, fig. 9. France, Valbonne (Var); Angl., Osmington; All., Derneburg.
- 64. Protei**, DeFrance. *Cardium Protei*, Brong., 1821, Ann. des Mines, 6, pl. 7, fig. 7. *P. æqualis*, Sow., 1827, Min. Conch., 6, p. 88, pl. 546, fig. 3. *P. orbiculata*, Römer, pl. 15, fig. 8. *P. scutata*, Agass., pl. 60, fig. 1-5 (déformation). *P. rostralis*? Agass., p. 89, pl. 7 d, fig. 1-3 (déformation). *P. angulosa*, Agass., p. 89, pl. 7, fig. 10-12. *P. contraria*, Agass., p. 90, pl. 6, fig. 1-7 (déformation). *P. myacina*, Agass., p. 93, pl. 7 c. Angl., Weymouth; Suisse, Porrentruy; Allem., Waltersberge, Wahrenberge; St-Sauveur (Yonne), Le Havre, Oyonnax, Montafelon (Ain), Châtelailion, Saint-Jean-d'Angely.
- 65. acuticostata**, Sow., 1827, M. C., 6, p. 88, pl. 546, fig. 1, 2. Römer, pl. 9, fig. 15. *P. multicostata*, Agass., p. 52, pl. 2, fig. 3, 4; pl. 3, fig. 10. France, St-Jean-d'Angely, Le Havre, Châtelailion, Boulogne-sur-mer, Ruelle, près d'Angoulême; St-Sauveur, Tonnerre, Auxerre (Yonne), Mauvage (Meuse); Angl., Stonesfield; All., Wendhausen, Goslar; Suisse, Porrentruy.
- 66. parvula**, Römer, 1836, Oolith., p. 133, pl. 15, fig. 4. *P. tenuicostata*, Agass., p. 114, pl. 7, fig. 1-3. *P. recurva*? Agass., p. 115, pl. 3, fig. 3. St-Jean-d'Angely; Allem., Rinteln; Suisse, Laufon.
- 67. donacina**, Goldf., 1839, 2, p. 272, pl. 157, fig. 8 (non Voltz). France, Ruelle, près d'Angoulême, Le Havre, Mone, près de Besançon (Doubs); Allem., Ulm.
- 68. subtruncata**, d'Orb., 1847. *P. truncata*, Agass., 1842, Etud. crit., p. 91, pl. 7 d, fig. 4-10; pl. 8, fig. 5-7 (non Goldf., 1839). France, Châtelailion; Suisse, Laufon, Porrentruy, Born.
- 69. gracilis**, d'Orb., 1847. *Homomya gracilis*, Agass., 1844, p. 162,

- pl. 20, fig. 1-3. France, Châtelailon, Senantes (Oise); Suisse, St-Nicolas (Soleure).
- \*70. *hortulana*, d'Orb., 1847. *Homomya hortulana*, Agass., p. 155, pl. 15, fig. 1-3. *Homomya compressa*, Agass., pl. 19. France, Ville-en-Bray (Oise). St-Jean-d'Angely; Suisse, Porrentruy (Berne).
- \*71. *striatula*, Agass., 1842, p. 116, pl. 3 a, fig. 7-9. *P. modiolaris*, Agass., p. 123, pl. 3 a, fig. 1-6. *P. nitida*, Agass., p. 117, pl. 3 a, fig. 13-15; pl. 7, fig. 4-6. *P. tenera*, Agass., p. 123, pl. 3 a, fig. 16-18. Suisse, Porrentruy, Laufon; France, Châtelailon.
- \*72. *Normaniana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. trapezirosta*, mais avec les côtes du milieu moins larges. France, Villerville.
74. *pectinata*, Agass., 1842, p. 115, pl. 8, fig. 2-4. Suisse, Laufon.
75. *sinuata*, Agass., 1842, p. 10, pl. 1, fig. 3. Suisse, Porrentruy.
76. *depressa*, Agass., 1842, p. 124, pl. 3 a, fig. 10-12. Porrentruy.
77. *echinata*, Agass., 1842, p. 125, pl. 3 a, fig. 19-21. Suisse, cantons de Berne et de Soleure.
78. *truncata*? Goldf., 1839, 2, p. 271, pl. 157, fig. 6. Tyrol et en France.
79. *striata*? Müntz., Goldf., 1839, 2, p. 271, pl. 157, fig. 7. Regensburg, Kehlheim.
- CEROMYA**, Agassiz, 1844. Voy. t. 1, p. 275.
- \*80. *excentrica*, Agassiz, 1842. *Isocardia excentrica*, VOLTZ, Rœmer, 1836, Oolith., p. 106, pl. 7, fig. 4. Goldf., pl. 140, fig. 6. Agass., pl. 8 a, 8 b, 8 c. Châtelailon, St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Valbonne, près de Grasse (Var), Mauvage, Blaise (Haute-Marne), Nantua; Allem., Wendenhausen, Waltenberge, Dernburg; Suisse, Le Banné, près de Porrentruy (Berne); Italie, île de Sardaigne.
- \*81. *obovata*, d'Orb., 1847. *Isocardia striata*, d'Orb., 1822, Mém. du Mus., 8, p. 104, pl. 2, fig. 7-9 (non Sow., 1816). Goldfuss, 1839, pl. 140, fig. 4. Rœmer, pl. 7, fig. 1. *Isoc. obovata*, Rœmer, pl. 7, fig. 2. *Ceromya inflata*, Agass., pl. 8 r, fig. 13-21. France, Châtelailon, Riceys (Doubs), Ruelle, près d'Angoulême (Charente), Villerville (Calvados), Blaise (Haute-Marne); Allem., Goslar, Wendenhausen, Bassel; Suisse, Porrentruy (Berne).
- \*82. *Fleuriausa*, d'Orb., 1847. Charmante espèce ovale, peu renflée, presque rostrée à la région anale, presque lisse. France, St-Jean-d'Angely.
83. *tetragona*, d'Orb., 1847. *Isocardia tetragona*, Koch, 1837. Beitr., Oolith., p. 48, pl. 7, fig. 8. Allem., Goslar.
84. *orbicularis*, d'Orb., 1847. *Isocardia orbicularis*, Rœmer, 1836, Oolith., p. 107, pl. 7, fig. 5. Allem., Luden, Rinteln.
- THRACIA**, Leach, 1825. Voy. t. 1, p. 216.
- \*85. *depressa*, Morris, 1843. *Mya depressa*, Sow., 1823, M. C., 5, p. 18, pl. 418. *Corimya tenera*, Agassiz, Etud. crit., p. 271, pl. 36, fig. 4-9. *Corimya tenuistriata*, Agass., p. 270, pl. 38, fig. 1-4. France, Villerville (Calvados); Angl., Weymouth, Osmington et Horncastle, Shotover; Suisse, Trimbach (Soleure), Le Banné, près de Porrentruy.
- \*86. *suprajurensis*, Deshayes, 1834, Traité de Conchyl. *Tellina incerta*, Turm., Goldf., 1839, 2, p. 234, pl. 147, fig. 14. Rœmer, pl. 8, fig. 7. *Corimya Studeri*, Agass., pl. 35. Allem., Goslar, Wende-



lausen; Suisse, Le Banné, près de Porrentruy; France, Senantes, Meuthois (Oise), St-Jean-d'Angely, Châtelailon, Ile d'Oléron; Blaise (Haute-Marne), Tonnerre, Auxerre, Mauvage, etc.

**ANATINA**, Lamarck, 1809. Voy. t. 1, p. 74.

**87. striata**, d'Orb., 1847. *Cercomya striata*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 149, pl. 11, fig. 13-15; pl. 11 a, fig. 5-7. Suisse, environs de Chaux-de-Fonds (Neuchâtel).

**88. expansa**, d'Orb., 1847. *Cercomya expansa*, Agass., 1844, p. 151, pl. 11 a, fig. 1-4. *Cercomya gibbosa*, Agass., p. 152, pl. 11, fig. 9-12 (déformation). Suisse, Porrentruy; Hodenc-en-Bray, Senantes.

**89. sinuata**, d'Orb., 1847. *Arcomya sinuata*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 169, pl. 10, fig. 4-6. France, Rœdersdorf (H.-Rhén.).

**90. Helvetica**, d'Orb., 1847. *Arcomya Helvetica*, Agass., 1844, p. 167, pl. 10, fig. 7-10. France, Hodenc-en-Bray, Senantes (Oise); Suisse, Porrentruy.

**91. spatulata**, d'Orb., 1847. *Cercomya spatulata*, Agass., 1844, p. 150, pl. 11 a, fig. 19-21. Suisse, Ste-Croix (Vaud).

**92. plana**, d'Orb., 1847. *Cercomya plana*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 153, pl. 11 a, fig. 8. Suisse, Laufen.

**93. subrugosa**, d'Orb., 1847. *Tellina rugosa*, Römer, 1836, Oolith., p. 120, pl. 8, fig. 4 (non *rugosa*, Lam., 1818). All., Hildesheim.

**MACTRA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 216.

**94. ovata**, d'Orb., 1847. *Tellina ovata*, Römer, 1836, Oolith., p. 121, pl. 8, fig. 8. *Venus nuculaeformis*, Römer, 1836, p. 110, pl. 7, fig. 11. France, St-Jean-d'Angely, Mauvage, Châtelailon; Allem., Wendhausen, Goslar; Suisse, Le Banné, près de Porrentruy.

**95. Rupellensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais bien plus large et plus courte. France, Châtelailon, St-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure).

**96. acuta**, Römer, 1836, p. 123, pl. 8, fig. 10. Allem., Goslar.

**97. convexa**, d'Orb., 1847. *Tellina convexa*, Römer, 1836, Nordd. Oolith., p. 121, pl. 7, fig. 21. Allem., Goslar.

**98. Saussuri**, d'Orb., 1847. *Donax Saussuri*, Brong., 1821, Ann. des Mines, 6, pl. 7, fig. 5. *Venus Brongniartii*, Römer, 1836, p. 110. France, Le Havre.

**99. isocardioides**, d'Orb., 1847. *Venus isocardioides*, Römer, 1836, p. 111, pl. 8, fig. 12. France, Ruelle, près d'Angoulême; Allem., Marienhagen.

**LAVIGNON**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 306.

**100. rugosa**, d'Orb., 1847. *Mya rugosa*, Röm., 1836, Ool., p. 125, pl. 9, fig. 16-17. *Lutraria concentrica*, Goldf., 1839, p. 258, pl. 153, fig. 5. *Mactromya rugosa*, Agassiz, p. 197, pl. 9 c, fig. 1-23. France, Senantes (Oise), Riceys, Fontaine, Balnot-sur-Laignes, Merrey, Vilmoirin, Bar-sur-Aube (Aube), Châtelailon, Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Ruelle, près d'Angoulême (Charente), Boulogne, Tonnerre, Auxerre, Mauvage, Oyonnax; Suisse, Porrentruy; Allem., Goslar, Wendhausen, Ahrensburg, près de Rinteln, Kahleberg.

**LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.

**101. Cypris**, d'Orb., 1847. Jolie espèce ovale, oblongue, lisse, anguleuse à la région anale. France, Villerville (Calvados).

\*102. *Cyrena*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, lisse, bombée, les deux côtés également obtus. France, Villerville.

\*103. *gigantea*, d'Orb., 1847. *Nucula gigantea*, Rœm., 1836, Nordd. Oolith., p. 100, pl. 6, fig. 5. Allem., Rinteln.

\*104. *subclaviformis*, d'Orb., 1847. *Nucula subclaviformis*, Rœm., 1836, p. 100, pl. 6, fig. 4. Allem., Wendhausen, Goslar.

**VENUS**, Linné, 1758.

\*105. *parvula*? Rœmer, 1836, p. 111, pl. 7, fig. 13. Goldf., pl. 150, fig. 9. France, Senantes (Oise); Allem., Wendhausen, Spielberge, près de Dellingsen.

\*106. *acutirostris*? Rœmer, 1836, p. 111, pl. 17, fig. 7, 6. Allem. Wendhausen.

**CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.

\*107. *suprajurensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Neptuni*, mais moins large, plus anguleuse du côté anal, plissée au bord dans le sens de l'accroissement. France, Villerville.

**OPIS**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.

\*108. *angulosa*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*O. Phillipsianus*, mais plus longue, à côtes plus fines. France, Villerville, Le Havre.

**ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 1, p. 216.

\*109. *scalaria*, Rœmer, 1836, Oolith., p. 114, pl. 6, fig. 24. France, Villerville, Le Havre; Allem., Wendhausen.

\*110. *Mysis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine des *A. Phyllis* et *scalaria*, mais plus ronde et avec des côtes plus distinctes. Villerville, Le Havre.

\*111. *Cepha*, d'Orb., 1847. Belle espèce voisine de l'*A. Philea*, mais sans crénélures au bord des valves. France, Villerville.

\*112. *Amor*, d'Orb., 1847. Espèce curieuse par sa compression, sa forme circulaire et ses stries fines; point de lunule. France, Saint-Jean-d'Angély.

\*113. *lineata*, Sow., 1817, M. C., 2, p. 173, pl. 179, fig. 1. Angl., Heddington, près d'Oxford.

\*114. *Myrina*, d'Orb., 1847. *A. cuneata*, Rœm., 1839, Oolith., p. 40, pl. 19, fig. 29 (non Sow.). Allem., Wendhausen; Anglet.

\*115. *suprajurensis*, d'Orb., 1847. *Unio suprajurensis*, Rœmer, 1839, Oolith., p. 35, pl. 19, fig. 1. Allem., Fritzow.

\*115'. *Hichaudiana*, d'Orb., 1849. Espèce longue de 45 millim., ovale, à crochets proéminents, avec des côtes seulement sur les crochets. Le Havre.

\*115". *Moricæana*, d'Orb., 1849. Espèce petite, comprimée, ovale, avec des rides concentriques d'accroissement très-prononcées. Le Havre.

**CYPHINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.

\*116. *cornuta*, d'Orb., 1847. *Isocardia cornuta*, Klöden, pl. 3, fig. 8. Rœmer, 1839, p. 38, pl. 19, fig. 14. France, Châtelailon, Villerville, Saint-Jean-d'Angély, Mauvage; Allem., Fritzow, Wendhausen, Hildesheim, Porrentruy.

\*117. *Gea*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. cornuta*, mais ronde et courte, l'angle anal très-marqué. Châtelailon, St-Jean-d'Angély.

\*118. *Glycerie*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, lisse, sans angles sur

la région anale, obtuse, et bien plus longue que l'autre ; région buccale étroite. France, Châtelailon.

- 119. parvula**, d'Orb., 1847. *Venus parvula*, Römer, 1836, Oolith., p. 111, pl. 7, fig. 13. Allem., Wendhausen, Delligsen.

**TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.

- \*120. muricata**, Römer, 1839, p. 35. *Lyrodon muricatum*, Goldf., pl. 137, fig. 1. *T. Voltzii*, Agas., 1840, Étud. crit., p. 23, pl. 9, fig. 10-12 (moule intérieur). *T. clavellata*, Leymerie, 1846, Aube, pl. 9, fig. 5 (non Sowerby). France. Le Havre, Villerville, Argenteuay (Yonne), environs de Besançon (Doubs), Mauvage (Meuse), Boulogne, Mothois (Oise); Allem., Goslar; Portugal, Torre Vedras. Son principal caractère distinctif est d'avoir un sillon sur la région anale, et d'être plus allongée que la *T. Meriani*.

- \*121. concentrica**, Agassiz, 1840, p. 20, pl. 6, fig. 10. France, St-Jean-d'Angély, Auxerre (Yonne), Hodenc-en-Bray, Senantes (Oise). Alex, près de Nantua; Suisse, Laufon (Bâle).

- \*122. papillata**, Agassiz, 1840, p. 39, pl. 5, fig. 10 14. *T. suprajurensis*, Agassiz, 1840, p. 42, pl. 5, fig. 1-6. France, Villerville (Calvados), Senantes, Hécourt (Oise). Havre, Le Rocher, près de La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, Mauvage, Boulogne; Suisse, Laufon.

- 123. truncata**, Agassiz, 1840, p. 43, pl. 5, fig. 7-9. France, Courcelles-sous-Bois, Senantes (Oise); Suisse, Laufon (Soleure).

- 124. plicata**, Agass., 1840, p. 33, pl. 10, fig. 11. Besançon (Doubs), Hodenc-en-Bray (Oise).

- 125. Rostrum**, Agassiz, 1840, p. 15, pl. 91, fig. , et pl. 5, fig. 15. Laufon.

- 126. litterata**, d'Orb., 1847. *Lyrodon litteratum*, Goldf., 1839, 2, p. 200, pl. 136, fig. 5. Allem., Pegnitz, Grafenberg; Torre Vedras en Portugal.

**LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.

- \*127. substriata**, Römer, 1836, Oolith., p. 118, pl. 7, fig. 18. France, Lanlu, Hiancourt (Oise), St-Jean-d'Angély; Allem., Wendhausen, Goslar.

- \*128. Elsgaudia**, Thurmann, Mus. Espèce ovale, subéquilatérale, ornée de stries inégales. France, Saint-Jean-d'Angély; Suisse, Le Banné, près de Porrentruy (Berne).

- \*129. Georgeana**, d'Orb., 1847. Petite espèce ronde, concentriquement striée, ornée d'un sillon rayonnant aux deux extrémités. Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).

- 130. minima**, Römer, 1836, p. 118, pl. 7, fig. 19. Hoheneggelsen. **CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.

- \*131. Merope**, d'Orb., 1847. Grande espèce ovale, avec de petites côtes concentriques; la région buccale courte. Saint-Jean-d'Angély.

- \*132. Melissa**, d'Orb., 1847. Petite espèce ovale, moins large que la précédente, plus renflée, à petites côtes concentriques; la région anale un peu plus courte que l'autre. France, St-Jean-d'Angély.

**UNICARDIUM**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 218.

- \*133. excentricum**, d'Orb., 1847. Espèce singulière, renflée, gibbeuse, à peine ridée dans le sens de l'accroissement; très-courte sur

la région anale, très-longue et étroite sur la région buccale. France, Saint-Jean-d'Angély.

- \***134. costatum**, d'Orb., 1847. Grande espèce peu renflée, inéquilatérale; la région anale la plus courte, ornée de côtes concentriques rapprochées. France, Boulogne-sur-mer.

\***135. striolatum**, d'Orb., 1847. *Mactromya striolata*, Agass., Étud. crit., p. 199, pl. 9 c, fig. 24-25. Suisse, Olten.

**ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. t. 1, p. 132.

- \***136. Georgeana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*I. Rupellensis*, mais avec une légère côte rayonnante sur la région anale, le côté des crochets tronqué. France, Saint-Jean-d'Angély, Senantes (Oise).

**CARDIUM**, Bruguière, 1798. Voy. t. 1, p. 33.

- \***137. Erato**, d'Orb., 1847. Jolie petite espèce entièrement lisse, ronde, comprimée, avec seulement sa région anale séparée du reste par une légère saillie. France, Villerville.

\***138. Eupheno**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. semiseptiferum*, mais plus ovale encore, avec de légères stries concentriques. France, Villerville, Nantua.

**NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 12.

- \***139. Menkil**, Römer, 1836. Oolith., p. 98, pl. 6, fig. 10. France, Villerville, Châtelailon, Saint-Jean-d'Angély; Allem., Wendhausen, Echershausen.

\***140. Gabriellis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. Menkilii*, mais avec une partie excavée sous les crochets. France, St-Jean-d'Angély.

**ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.

- \***141. texta**, d'Orb., 1847. *Cucullæa texta*, Römer, 1836, p. 104, pl. 6, fig. 19. *A. ovalis*, Römer, 1839, Ool., p. 37, pl. 19, fig. 4. Fr., Le Rocher, Châtelailon, près de La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély; Villerville (Calvados), Bazancourt (Oise); Allemagne, Wendhausen, Spielberge, près de Delligsen.

\***142. longirostris**, d'Orb., 1847. *Cucullæa longirostris*, Römer, 1839, p. 37; pl. 19, fig. 2. France, Saint-Jean-d'Angély, Boulogne-sur-mer; Allem., Hildesheim, Fritzw; Suisse, Porrentruy.

\***143. Lydia**, d'Orb., 1847. Espèce ovale très-courte sur la région anale, très-prolongée du côté opposé, avec quelques stries rayonnantes aux extrémités. France, Ruelle, près d'Angoulême.

\***144. Laura**, d'Orb., 1847. Grande espèce ovale, renflée, rétrécie et oblique sur la région anale, élargie du côté opposé, treillissée partout. France, Boulogne-sur-mer, Villerville, Châtelailon.

\***145. Leda**, d'Orb., 1847. Petite espèce voisine de l'*A. Laura*, mais plus allongée, excavée sur la région anale et au milieu de la région palléale; treillissée partout. France, Villerville.

**PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.

\***146. granulata**, Sow., 1822, M. C., 4, p. 65, pl. 347. *Pinna ampla*, Goldf., pl. 129, fig. 1. France, Châtelailon, Blaise, Saint-Jean-d'Angély, Mauvage, Demange-aux-Eaux (Meuse), Ville-en-Bray, Bois-Aubert (Oise), Le Havre; Angleterre, Weymouth; Allem., Hildesheim, Ulm.

\***147. ornata**, d'Orb., 1847. Jolie espèce droite, étroite, pourvue sur la moitié du côté du ligament de cinq ou six côtes longitudinales, et

de l'autre côté de rides profondes, arquées. Fr., Villerville (Calvados).  
**148. socialis**, d'Orb., 1847. Espèce droite, conique, plus large que la précédente, anguleuse, presque lisse; elle vit en familles nombreuses. France, Châtelailon.

**MYTILUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.

**149. subpectinatus**, d'Orb. Voy. Etage 12, n° 197. France, Le Havre, Hodenc-en-Bray (Oise); Angl., Weymouth.

**150. Jurensis**, Merain, Römer, 1836, Oolith., p. 87, pl. 4, fig. 10. France, Châtelailon; Allem., Rinteln; Suisse, Le Banné.

**151. pernoides**, Römer, 1836, Nordd. Oolith., p. 89, pl. 5, fig. 2. France, Châtelailon, Villerville; Allem., Goslar.

**152. Medus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *M. plicatus*, mais plus allongée et pourvue sur toute la région anale de petites rides transverses, arquées et interrompues. France, Villerville, Châtelailon, Hauvoile (Oise).

**153. Midamus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *M. plicatus*, mais plus allongée, avec quelques plis sur la région cardinale du jeune âge seulement, le reste lisse. France, Boulogne-sur-mer.

**154. Lysippus**, d'Orb., 1847. Voy. Etage corallien, n° 320. France, Châtelailon, Le Havre.

**155. subquiplicatus**, Goldf., p. 177, pl. 131, fig. 7. *Modiola subquiplicata*, Römer, Ool., p. 93, pl. 5, fig. 7. *Modiola compressa*, Koch, 1837, Beitr., p. 44, pl. 5, fig. 5. France, Châtelailon, Senantes, Bourricourt (Oise), Matafelon, près de Nantua; Allem., Hanovre; Suisse, Le Banné.

**156. varians**, d'Orb., 1847. *Modiola varians*, Römer, 1836, Oolith., p. 93, pl. 4, fig. 15, 16. Hoheneggelsen.

**157. oblongus**, d'Orb., 1847. *Modiola oblonga*, Römer, 1839, Nordd. Oolith., p. 344, pl. 18, fig. 31. Allem., Hildesheim.

**PSIDONOMYA**, Bronn, 1837. Voy. t. 1, p. 13.

**158. Kimmeridgensis**, d'Orb., 1847. Espèce ovale transversalement, courte sur la région anale, lisse. France, Châtelailon.

**AVICULA**, Klein, 1753. Voy. t. 1, p. 13.

**159. subplana**, d'Orbigny, 1847. Voy. Etage corallien, n° 343. Suisse, Le Banné.

**160. modiolaris**, Münster, Römer, 1836, Oolith., p. 87, pl. 5, fig. 1. Goldf., pl. 118, fig. 5. France, Châtelailon; Allem., Goslar, Delligsen, Wendhausen.

**161. Ocyrrhoe** d'Orb., 1847. Jolie petite espèce très-étroite, allongée, pourvue de deux côtes longitudinales sur l'aile anale qui est très-longue. France, Villerville.

**162. Ophione**, d'Orb., 1847. Espèce bien plus large que la précédente, lisse et sans côtes sur l'aile. France, Villerville.

**163. Opis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme de l'*A. modiolaris*, plus étroite et ornée de côtes rayonnantes peu prononcées. Fr., Châtelailon; Suisse, Le Banné (Berne).

**GENVILIA**, DeFrance, 1830. Voy. t. 1, p. 201.

**164. Kimmeridgensis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 483. Espèce bien distincte du *G. aviculoides* par sa forme plus étroite, la disposition de la fossette du ligament, etc. *G. aviculoides*,

Goldf., p. 123, pl. 115, fig. 8 (non Sowerby). France, Lanlu, Hécourt, Senantes, Bourricourt (Oise), Le Havre, Saint-Jean-d'Angely, Abergemont, près de Nantua (Ain) ; Angleterre ; Allem., Dernburg.

**165. tetragona?** Römer, 1836, p. 85, pl. 4, fig. 11. Dörshelf.

**PINNIGENA**, Deluc, 1779. Voy. t. 1, p. 314.

\***166. Saussurii**, d'Orb., 1847. Voy. Etage corallien, n° 348. Fr., Châtelailion, Montperthuis (Oise), Le Banné, Le Havre.

**PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.

\***167. lamellosus**, Sow., 1819, Min. Conch., 3, p. 67, pl. 239. *P. annulatus*, Goldf., pl. 91, fig. 2 (non Sow.). *P. distriatus*, Leymerie, 1846, Aube, pl. 9, fig. 8 (jeune). *Pecten suprajurensis*, Buvignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, 2, p. 12, pl. 5, fig. 1-3. Angl., Chicks Grove, Thame dans l'Oxfordshire ; France, Boulogne-sur-mer, Mauvage (Meuse), Torcy, Montperthuis (Oise), Châtelailion, Saint-Jean-d'Angely ; Allem., Goslar, Dörshelf. C'est le jeune de cette espèce qu'on a souvent confondu avec le *P. lens*, et qui a été nommé *Distriatus* par M. Leymerie.

\***168. Doris**, d'Orb., 1847. *P. sublaevis*, Römer, 1836, p. 70, pl. 3, fig. 16 (non DeFrance, 1825). France, Saint-Jean-d'Angely, Viller-ville ; Allem., Goslar.

\***169. Minerva**, d'Orb., 1847. Jolie espèce ovale, allongée, déprimée, ornée de stries fines, régulières, simples, imbriquées sur les côtés. France, Le Havre.

\***170. Marcus**, d'Orb., 1847. Belle espèce ovale, déprimée, ornée de sillons indécis, rayonnants, et de petites lames concentriques, sinueuses en passant sur les sillons. France, Saint-Jean-d'Angely.

\***171. Midas**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, déprimée, ornée partout de petites côtes concentriques, confluentes et irrégulières, surtout aux côtés. France, Le Havre.

**PINNITES**, DeFrance, 1821.

\***172. inaequistriatus**, d'Orb., 1847. Voy. Etage corallien, n° 369. France, Châtelailion ; Suisse, Le Banné.

**OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.

\***173. deltoides**, Sow., 1816, M. C., 2, p. 111, pl. 148. France, Le Havre, Honfleur, Hécourt (Oise), Boulogne-sur-mer ; Angl., Portland, Oxford, Cambridge ; Allem., Hoheneggelsen, près de Hildesheim.

\***174. virgula**, d'Orb., 1827. *Esogyra virgula*, Goldf., 1835, p. 31, pl. 86, fig. 3. Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 302, pl. 23, fig. 10. *Gryphaea virgula*, DeFrance. France, Bois-Aubié, Beaulévrier, Villeneuve-en-Bray (Oise), Ruelle, près Angoulême, Tonnerre, Auxerre, Châtelailion, St-Jean-d'Angely, Boulogne-sur-mer ; Angl., Oxfordshire ; Allem., Deutschland, Rinteln, Lübbecke.

\***175. solitaria**, Sow., 1824. Voy. Etage corallien, n° 375. *O. lugosa*, Münster, 1836. Goldf., pl. 72, fig. 10. France, Châtelailion, Matafelon, près de Nantua, Le Havre, Honfleur, Lanlu, Torcy (Oise) ; Suisse, Le Banné ; Allem., Osterkappeln, Dellingsen.

\***176. multiformis**, Koch, 1837, Beitr., p. 45, pl. 5, fig. 11. Fr., Châtelailion ; Allem., Osterkappeln.

\***177. Roëmeri**, d'Orb. *Esogyra carinata*, Römer, 1836, Oolith., p. 66, pl. 3, fig. 15 (non *carinata*, Sow., 1815). Allem., Goslar.

**ANOMYA**, Linné, 1758.

- '178. *Kimmeridgenensis*, d'Orb., 1847. Espèce entièrement lisse, très-déprimée, souvent orbiculaire, à sommet latéral séparé du bord. France, Saint-Jean-d'Angely, Châtelaillon; Auxerre (Yonne), Bazancourt, Hécourt, Hannaches (Oise), Villerville.

### MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**RHYNCHONELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 92.

- '179. *inconstans*, d'Orb., 1847. Voy. Etage oxfordien, n. 383. Fr., Le Havre, Honfleur, Ruelle, près d'Angoulême, Mauvage (Meuse), Valhonne, près de Grasse (Var); Angl., Boat-Cove.

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

- '180. *subsellæ*, Leymerie, 1846. Voy. Etage corallien, n° 391. *T. sellæ*, Leymerie, 1846, Stat. de l'Aube, pl. 9, fig. 12 (non Sowerby). France, Le Havre, Honfleur, Châtelaillon, Mauvage, environs de Tonnerre; Ville-en-Bray, Hodenc-en-Bray (Oise), Saint-Jean-d'Angely, Boulogne-sur-mer, environs de Nantua.

**ORBICULOIDEA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 44.

- '181. *Mumpriesiana*, d'Orb. *Orbicula Humpriesiana*, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 3, pl. 506, fig. 2. Angl., Shotover, Oxon.

### MOLLUSQUES BRYOZOAIRES.

**DIASTOPORA**, Lamouroux, 1821.

- '182. *tenuis*, d'Orb., 1847. Espèce très-mince, en plaques arrondies sur les coquilles. France, Boulogne (Pas-de-Calais).

### ÉCHINODERMES.

**DIASASTER**, Agassiz.

- '183. *suprajurensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *D. granulatus*, mais plus déprimée et creusée en dessous. France, Le Rocher, près de La Rochelle (Charente-Inférieure).

**FIGURUS**, Agassiz.

- '184. *tenuis*, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 104. Oberbuchsiten, Soleure.

**CLYPEUS**, Klein.

- '185. *acutus*, Agassiz, 1847, Cat., p. 98; Echin. Suisse, 1, p. 38, pl. 10, fig. 1. Fr., Aiglepierre, près Salins; Suisse, Birse (Soleure).

**NUCLEOLITES**, Lamarck.

- '186. *major*, Agass., 1847, Cat., p. 96; Echin. Suisse, 1, p. 46, pl. 7, fig. 22-24. Suisse, vallée de Birse.

**MOLECTYPUS**, Agassiz.

- '187. *inflatus*, Desor, Monogr. des Galér., p. 70, pl. 9, fig. 7-10. Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 88: *Discoidea inflata*, Desor. Suisse, env. de Neuchâtel, vallée de Birse (Berne), Schaffhouse; France, Sancerre.

- '188. *speciosus*, Desor, Mon. des Galér., p. 72, pl. 10, fig. 13-15.

Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 88. *Discoidea speciosa*, Agassiz. Suisse, vallée de Birse, près de Laufon; Würtemb., Heidenheim."

**PYGASTER**, Agassiz.

**189. dilatatus**, Agassiz, 1847, Cat., p. 86. *P. umbrella*, Agassiz, Echin. Suiss., 1, p. 83, pl. 13, fig. 4-6. Suiss., env. de Soleure, Greif (Berne).

**GLYPTICUS**, Agassiz.

**190. affinis**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 57; Echin. Suisse, 2, p. 97, pl. 93, fig. 40-42. Suisse, Olten (Soleure), Obergösgen.

**DIADEMA**, Gray.

**191. Bruntrutana**, Desor, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 44. Le Banné.

**192. conformis**, Agassiz, 1847, Cat., p. 43. *Acrosalenia conformis*, Agassiz, Echin. Suisse, 2, p. 40, pl. 18, fig. 11-14. Porrentruy.

**HEMICIDARIS**, Agassiz.

\***193. Koenigii**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 33. *Diadema Koenigii*, Desmarests. France, Boulogne-sur-mer.

**194. stramonium**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 34; Echin. Suisse, 2, p. 47, pl. 19, fig. 13 et 14. *Cidarites Hofmanni*, Rœm. Rødersdorf (Soleure). Pfeffingen, Hoheneggelsen (Hannôver).

**CIDARIS**, Lamarck.

\***195. Orbignyana**, Agassiz. Voy. Etage corallien, n° 437. France, Villerville (Calvados), Montfaucon (Meuse), Lavaucourt (H.-Saône), Châtelailhon (Charente-Inférieure).

**196. baculifera**, Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 47; Echin. Suisse, 2, p. 80, pl. 21, fig. 12. Fr., Besançon, Salins; Suisse, Porrentruy, Rødersdorf.

## ZOOPHYTES.

**MONTLIVALTIA**, Lamouroux, 1821, Voy. t. 1, p. 207.

**197. Lesueurii**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., p. 257, n° 16. Fr., Le Havre. (C'est par erreur que MM. Edwards et Haime l'ont indiqué dans l'Oxford-Clay des Vaches-Noires; il est de l'étage kimméridgien du Havre.)

## AMORPHOZOAIES.

**AMORPHOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 178.

\***198. suprajurensis**, d'Orb., 1847. Espèce en grosse masse mamelonnée; pores petits. France, Châtelailhon, près de La Rochelle.



## SEIZIÈME ÉTAGE : — PORTLANDIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITES**, Lamarck. Voy. vol. 1, p. 212.

\*1. *Souichii*, d'Orb., Paléont. univ., pl. 64; Terr. jurass., 1, p. 133, pl. 22. France, Grès de Hauvringhen, près de Wimille, tour de Croi, près de Boulogne.

**NAUTILUS**, Breynius, 1752. Voy. vol. 1, p. 52.

\*2. *Marcousanus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. inflatus*, mais bien plus comprimée et à cloisons bien plus rapprochées. France, Suziau, près de Salins (Jura).

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. vol. 1, p. 181.

\*3'. *longispinus*, Sow. Voy. Etage kimm., n° 6. Cirey (H.-Marne).

\*3. *giganteus*, Sowerby, 1816, Min. Conch., 8, p. 55, pl. 126 (non d'Orb., pl. 221; non *A. gig.* Zieten, 1830). France, Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais); Angl., Portland.

\*4. *Iris*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jur., 1, pl. 222. France, Cirey-le-Château (Haute-Marne), près de Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), la Chaux de Charquemont (Doubs), Joinville.

\*5. *Gravesianus*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jurass., 1, pl. 219. France, Auxerre (Yonne), Cirey-le-Château (Haute-Marne), Hécourt (Oise).

\*6. *gigas*, Zieten, 1830. Wurtemberg, pl. 13, fig. 1. D'Orb., Jur., pl. 220. France, Auxerre (Yonne), Cirey-le-Château, Bouzancourt (Haute-Marne), Montperthuis, Bazancourt (Oise), Joinville; Riedlingen (sur le Danube).

\*7. *rotundus*, Sow., 1821. D'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. jur., 1, pl. 216, fig. 34. France, mont Blainville (Meuse), Châblis (Yonne), Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), Boulogne (Pas-de-Calais), Bois-Aubert, Montperthuis (Oise), Cirey, Bouzancourt (Haute-Marne), Poliset (Aube).

\*8. *suprajurensis*, d'Orb., 1849, Paléont., pl. 23. France, Cirey-le-Château (Haute-Marne).

### MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**CHERONITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. vol. 1, p. 172.

\*1. *gigantea*, d'Orb., 1847. *Melania gigantea*, Leymerie, 1846, Statis-

tiq. de l'Aube, pl. 9, fig. 1. Mauvais nom, attendu qu'il en existe une espèce le double plus grande dans l'étage corallien. France, Poliset (Aube).

**9. crenulata**, d'Orb., 1847. *Melania crenulata*, Cornuel, 1840, Mém. Soc. géol. de France, t. 4, p. 289, pl. 15, fig. 9. France, Vassy (Haute-Marne).

**NERINEA**, DeFrance, 1825. Voy. vol. 4, p. 263.

**\*10. grandis**, Voltz, 1835, Jahrb., p. 549, pl. 6, fig. 1 (non *N. grandis*, Goldf., pl. 175, fig. 8). Espèce sans plis sur la columelle. France, Bouhans, près de Gray (Haute-Saône).

**\*11. depressa**, Voltz, 1835, Jahrb., p. 549, pl. 6, fig. 17. Suisse, Soleure.

**\*12. cylindrica**, Voltz, 1835, in Litt. Thirr., Géogn. de la Haute-Saône, 6. Bronn, 1837, Jahrb., pl. 6, fig. 16, p. 552. Vy-le-Ferroux (Haute-Saône).

**\*13. trinodosa**, Voltz, 1835, Bronn, 1837, Jahrb., pl. 6, fig. 10, p. 562. France, Besançon (Doubs), Suziau, Aiglepierre, près de Salins (Jura), Alex, près de Nantua, Lons-Jargiat (Ain).

**\*14. subpyramidalis**, Münst., Goldf., 1843, Petref., 8, p. 40, pl. 175, fig. 7. France, Aiglepierre (Jura), Alex (Ain); Allemagne, Kehlheim, Donau.

**\*15. Salinensis**, d'Orb. Espèce remarquable par l'énorme bourrelet double et noueux de la suture et la profonde excavation des tours. France, Suziau et Aiglepierre (Jura).

**\*16. Eudora**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. grandis*, mais avec deux plis sur la columelle. France, Suziau, près de Salins (Jura), Batterans, près de Gray (Haute-Saône).

**\*17. Erato**, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, subcylindrique (angle spiral, 40°), à tours longs, impressionnés sur la suture. France, Aiglepierre, Suziau (Jura).

**\*18. Elea**, d'Orb., 1847. Espèce courte et large, à large ombilic, munie de deux plis sur le labre, l'un supérieur plus fort, élargi à sa partie externe. France, Aiglepierre, Suziau (Jura).

**\*19. Bruntrutana**, Thurm., Voltz, 1835, Jahrb., pl. 6, fig. 13, 18, p. 556. Goldf., pl. 175, fig. 5. *N. Bruntrutana*, Thurm., 17. Bronn, Leithæa, p. 399, pl. 21, fig. 13. Suisse, Porrentruy; Fr., Oyonnax (Ain).

**20. punctata**, Voltz, 1835, Jahrb., pl. 6, fig. 23, p. 559. France, Vy-le-Ferroux (Saône).

**21. Goldfussiana**, d'Orb. *N. grandis*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 40, pl. 175, fig. 8 (non *grandis*, Voltz). Cette espèce a trois plis à la columelle, tandis que le *N. grandis* n'en a pas. Allemagne, Ingolstadt.

**ACTEOWINA**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 118.

**22. cylindræa**, d'Orb., 1847. *Melania cylindræa*, Cornuel, 1840, Mém. Soc. géol. de France, t. 4, p. 289, pl. 15, fig. 14. France, Vassy (Haute-Marne).

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. vol. 1, p. 29.

**\*23. elegans**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 261, pl. 23, fig. 3. France, Alex et Plagne (Ain), Bourricourt (Oise) Angl., Portland, Wardour, Oxfordshire.

\*24. *Marconsana*, d'Orb., 1847. Grande et belle espèce oblongue, dont l'angle spiral, convexe, est de 62°, les tours peu renflés, des callosités à la bouche. France, Suziau, Aiglepierre (Jura), Alex, près de Nantua (Ain).

\*25. *Athleta*, d'Orb., 1847. Grande espèce, dont l'angle spiral est de 70°, les tours saillants en arrière en gradins, par suite d'un méplat. France, Suziau, Aiglepierre, près de Salins (Jura).

**NERITA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 214.

\*26. *angulata*, Swindon, Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 268, pl. 23, fig. 2 (peut-être le moule extérieur du *N. sinuosa*, Sow.). Angl., Portland, North Wiltshire.

\*27. *sinuosa*, Sow., 1818, M. C., 3, p. 31, pl. 217, fig. 2. Angl., Chilmark, près Tisbury.

**PTEROCERA**, Lamarck. Voy. vol. 1, p. 231.

\*28. *Oceani*, Delabèche. Voy. Étage kimméridgien, n° 40. Les échantillons sont toujours plus grands. France, Boulogne-sur-mer, environs d'Angoulême (Charente), Alex, près de Nantua; Suisse, Porrentruy.

\*29. *angulata*, d'Orb., 1847. *Buccinum angulatum*, Swindon, Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 262, pl. 23, fig. 5. Angleterre, Portland, North Wiltshire.

\*30. *naticoides*, d'Orb., 1847. *Buccinum naticoides*, Sow., 1836, in Fitton, p. 260, pl. 23, fig. 4. Angl., Portland, Wardour, North Wiltshire, Oxfordshire.

**CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. vol. 2, p. 96.

\*31. *Sirius*, d'Orb., 1847. *Turritella concava*, Sow., 1827, Min. C., 6, p. 125, pl. 565, fig. 5 (non Sow., 25-15, 28). *Cerithium excavatum*, Sow., 1836 (non Brongniart; 1821). Angl., Tisbury, Portland.

\*32. *Portlandicum*, d'Orb., 1847. *Terebra Portlandica*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 261, pl. 23, fig. 6. Angl., Portland, Wardour, Oxfordshire.

## MOLLUSQUES LAMÉLLIBRANCHES.

**PANOPAEA**, Ménard, 1807. Voy. vol. 1, p. 164.

\*33. *quadrata*, d'Orb., 1847. *Arcomya quadrata*, Agass., 1844, Étud. cit., p. 178, pl. 9, fig. 14-17. France, Bignay, au sud de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure); Suisse, Laufon (Soleure).

**NACTEA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 216.

\*34. *rostralis*, d'Orb., 1847. *Corbula trigona*, Römer, 1836, Nordd. Oolith., p. 125, pl. 8, fig. 5 (non 13-225). *Corbula rostralis*, Römer, pl. 8, fig. 9. France, St-Denis, Ile d'Oléron, Vassy (Haute-Marne); Allem., Wendhausen, Goslar.

\*35. *caudata*, d'Orb., 1847. *Venus caudata*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 245, pl. 150, fig. 16. France, Vassy (Haute-Marne), Hécourt (Oise), Auxerre, Nantua; Allem., Lübke.

\*36. *Insularum*, d'Orb., 1847. Grosse espèce un peu trigone, renflée, lisse, à crochets saillants, excavés en dessous. France, St-Denis (Ile d'Oléron).

**LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. vol. 1, p. 11.

- 37. parvula?** d'Orb., 1847. *Pholadomya parvula*, Cornuel, 1840, Mém. Soc. géol. de France, t. 4, p. 288, pl. 15, fig. 8. France, Vassy (Haute-Marne).
- CYCLAS**, Bruguière, 1791. *Cyclas*, *Cyrena*, Lam., *Piscidium*, Pfeifer,
- \*38. fossulata**, d'Orb. *Cyrena fossulata*, Cornuel, 1840; Mém. Soc. géol. de France, t. 4, p. 286, pl. 15, fig. 1 a, b, c, d. France, Vassy (Haute-Marne).
- ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. vol. 1, p. 216.
- \*39. cuneata**, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 85, pl. 137, fig. 2. Fr., Boulogne-sur-mer; Angl., Chilmark, près de Tisbury.
- \*40. socialis**, d'Orb., 1847. Petite espèce lisse, presque ronde, si commune dans les couches des environs de Boulogne, qu'elle compose pour ainsi dire la roche.
- \*41. rugosa**, d'Orb., 1847. *Cytherea rugosa*, Sow., 1836; in Pitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 260, pl. 22, fig. 13. France, Senantes (Oise); Angl., Portland, Wardour, North Wiltshire, Oxfordshire.
- TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 198.
- \*42. gibbosa**, Sow., 1819, Min. Conch., 3, p. 61, pl. 235, 236. Fr., Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), Senantes (Oise), Alex, près de Nantua (Ain); Angl., Tisbury, Purbeck.
- 43. incurva**, Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 231, pl. 22, fig. 14. Angl., Portland, North Wiltshire.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 76.
- 44. Portlandica**, Sow., 1836, in Fitt., Tr. geol. Soc., 4, p. 261, pl. 22, fig. 12. France, Hodenc-en-Bray, Senantes (Oise); Angleterre, Portland, Wardour, North Wiltshire, Oxfordshire.
- UNICARDIUM**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 218.
- \*45. circulare**, d'Orb., 1847. Espèce circulaire, renflée, plus courte sur la région anale, ridée concentriquement. France, Alex, près de Nantua.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 33.
- \*46. dissimile**, Sow., 1827, M. C., 6, p. 101, pl. 553, fig. 2. France, Boulogne; Bourricourt, Mothois (Oise), Saint-Denis (Ile d'Oléron), Alex, près de Nantua; Angl., Portland et Tisbury.
- PINNA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 135.
- \*47. suprajurensis**, d'Orb., 1847. *P. obliquata*, Leym., 1846, Statistiq. de l'Aube, pl. 9, fig. 2 (non Deshayes). France, environs de Vandœuvre, de Marolles (Aube), Saint-Sauveur, Auxerre (Yonne).
- MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 82.
- 48. pallidus**, d'Orb., 1847. *Modiola pallida*, Sow., 1812, M. C., 1, p. 29, pl. 8, fig. 5, 6. Angl., Fonthill.
- 49. subreniformis**, Cornuel, 1840, Mém. Soc. géol. de France, t. 4, p. 287, pl. 15, fig. 2 et 2 a. France, Vassy (Haute-Marne).
- \*50. Portlandicus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. furcatus*, mais plus grande, à côtes plus simples et plus divisées. Fr., Alex, près de Nantua (Ain).
- LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 175.
- 51. rustica**, *Plagiostoma rusticum*, Sow., 1822, Min. C., 4, p. 111, pl. 381. Angl., Shotover, près d'Oxford.
- AVICULA**, Klein, 1758. Voy. vol. 1, p. 13.

- 52. rhomboidalis**, Cornuel, 1840, Mém. Soc. géolog. de France, t. 4, p. 288, pl. 15, fig. 3 a. France, Vassy (Haute-Marne).
- 53. Octavia**, d'Orb., 1847. Jolie espèce ovale, comprimée, ornée alternativement d'une grosse et d'une petite côte rayonnante. France, Boulogne-sur-mer.
- PROTIN**, Gualtieri, 1742. Voy. vol. 1, p. 87.
- 54. lamellosus**, Sow., 1819. Voy. Étage kimméridgien, n° 167. Fr., Boulogne-sur-mer; Angl., Portland.
- 55. Insularum**, d'Orb., 1847. Espèce tout à fait lisse, ovale, fortement déprimée. France, Saint-Denis, Ile d'Oléron (Charente-Inférieure).
- OSTREA**, Linné, 1752. Voy. vol. 1, p. 166.
- 56. Bruntrutana**, d'Orb., 1847. *Exogyra denticulata*, Rœm., 1836, Ool., p. 65, pt. 3; fig. 13 (non Born, 1780). *Exogyra Bruntrutana*, Thurmann. Allem., Hoheneggelsen; France, Le Havre, Polisot, Arsonval (Aube), Blaise (Haute-Marne), Auxerre (Yonne), Saint-Denis (Ile d'Oléron), Hauvoile, Ville-en-Bray.
- 57. Hellica**, d'Orb., 1847. *O. falcata*, Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 264, pl. 23, fig. 1 (non Morton; 1834). France, Boulogne-sur-mer, Senantes, Hodenc-en-Bray (Oise); Angl., Portland, Wardour, North Wiltshire.
- 58. expansa**, Sow., 1819, Min. Conch., 8, p. 65, pl. 238, fig. 4. Fr., Boulogne-sur-mer; Angl., Tisbury.
- ANOMYA**, Linné, 1758.
- 59. Portlandica**, d'Orb., 1847. Espèce suborbiculaire, assez épaisse, surtout en dedans. France, Saint-Denis (Ile d'Oléron).

## ÉCHINODERMES.

### FIGURUS, Agassiz.

**60. jurensis**, Marcou. Agassiz, 1847, Cat., p. 104. Salins (Jura).

### DIADEMA, Gray.

**61. planissimum**, Agassiz, 1847, Cat., p. 46; Echin. Suisse, 2, p. 26, pl. 14, fig. 1-3. Suisse, Soleure.

# TERRAINS CRÉTACÉS.

## DIX-SEPTIÈME ÉTAGE : — NÉOCOMIEN.

### A. — NÉOCOMIEN INFÉRIEUR OU NÉOCOMIEN.

#### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITES**, Lamarck. Voy. vol. 1, p. 242.

- \*1. **binervius**, Raspail, d'Orb. (1), Paléont. univ., pl. 65, 66; Terr. crét. suppl., pl. 3. France, Lieous, Cheiron (Basses-Alpes); Suisse, Haute-Rive, près de Neuchâtel.
- \*2. **latus**, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 67, 68; Terr. crét., 1, p. 48, pl. 4; suppl., pl. 4. France, près de Castellanne (Basses-Alpes), Saint-Julien (Hautes-Alpes), Alais, Bes (Gard), Berrias (Ardèche); Bianconi du Vicentin.
- \*3. **Orbignyianus**, Duval, d'Orb., Paléont. univ., pl. 67; Terr. crét. suppl., pl. 4. Cheiron, Lieous (Basses-Alpes), Berrias (Ardèche).
- \*4. **bipartitus**, Catullo, d'Orb., Paléont. univ., pl. 69; Terr. crét., 1, p. 45, pl. 3. France, La Lagne (Basses-Alpes), Lâtie (Var), Chadres (Hautes-Alpes), Berrias (Ardèche);
- \*5. **pistilliformis**, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 64, 68, 70; Terr. crét., 1, p. 53, pl. 6. France, Robion, Peyroulles (Basses-Alpes), Saint-Julien; Crimée; Savoie, Chambéry; Bavière, Bredenbak; Suisse, Neuchâtel, La Sarra.
- \*6. **subquadratus**, Rœmer, d'Orb., Paléont. univ., pl. 71; Terr. crét. suppl., pl. 6. France, Wassy (Haute-Marne); Bavière, Schandellahie, Bredenbeck.
- \*7. **Baudouini**, d'Orb., 1840, Paléont. univ., pl. 76; Terr. crét., 1, p. 54, pl. 5. France, Auxerre.
- \*8. **bicanaliculatus**, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 69, 71; Terr. crét., 1, p. 47, pl. 3. France, montagne de Chadres (Hautes-Alpes), Lucana.
- \*9. **confusus**, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 68, 71; Terr. crét.,

(1) Voyez pour la synonymie des espèces de *Belemnites* et d'*Ammonites*, notre *Paléontologie Française, Terrains crétacées*, et *Mollusques vivants et fossiles*, tome 1.

- 1, pl. 6, fig. 1, 4. France, Cheiron (Basses-Alpes), Mont-Clus (Hautes-Alpes), Berrias (Ardèche).
- \*10. *polygonalis*, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 66, 72; Terr. crét. suppl., pl. 7. France, La Latte, La Lagne (Basses-Alpes).
- \*11. *Emerlei*, Raspail, d'Orb., Paléont. univ., pl. 66, 69, 73; Terr. crét. suppl., pl. 8. France, Seranon, Lirous (Basses-Alpes).
- \*12. *dilatatus*, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 65, 66, 69; Terr. crét. suppl., pl. 3. France, Saint-Auban, Gréolières, Escragnolles (Var), Ventoux (Vaucluse), Vassy (Haute-Marne).
- MEYNOCHOTRUTHIS**, d'Orb., 1846, Paléont. univ. Voy. t. 1.
- \*13. *alatus*, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pl. 80; Terr. crét. suppl., pl. 11. France, Cheiron, près de Castellanne (Basses-Alpes).
- NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 52.
- \*14. *pseudoelegans*, d'Orb., 1841, Pal. franç., Terr. crét., p. 70, pl. 8, 9. France, Vandœuvre, Beaucaire, Morteau (Doubs), Escragnolles (Var), Fontenoy (Yonne); Suisse, Haute-Rive; Crimée, Sabli; Colchide, Courtaïs; Angl., Ile de Wight.
- \*15. *Neocomiensis*, d'Orb., Pal. fr., Terr. crét., 1, p. 174, pl. 11. France, Escragnolles, Andon, Lamartre (Var).
- AMMONITES**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 181.
- \*16. *Leopoldinus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 104, pl. 22, 23. France, Vandœuvre (Aube), Escragnolles (Var), Auxerre, Fontenoy (Yonne), Nismes (Gard), Morteau (Doubs).
- \*17. *cryptoceras*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 106, pl. 24. France, Escragnolles, La Lagne, Latte, Neuchâtel (Suisse), Peycolle, Nismes, Mons (Gard), Marolles (Yonne), Russey, Vassy (Haute-Marne).
- \*18. *radiatus*, Bruguière, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., t. 1, p. 110, pl. 26 (*Am. Asper*). France, Vandœuvre, Escragnolles, Caussole (Var), Morteau (Doubs).
- \*19. *Asierianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., t. 1, p. 115, pl. 28. France, Berrias (Ardèche), Noseroy (Jura), Escragnolles (Var), La Lagne, Caussole; Suisse, Neuchâtel; Saint-Julien (Hautes-Alpes), Morteau (Doubs), Gigondas (Vaucluse).
- \*20. *subambriatus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., t. 1. France, Cheiron, Barrême (Basses-Alpes), La Doire, Saint-Martin (Var); Suisse, canton de Vaud, près de Bauvonnar.
- \*21. *clypeiformis*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., t. 1, p. 137, pl. 42, fig. 1-2. France, Escragnolles (Var), Rioux, Barjac.
- \*22. *Govrilianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 139, pl. 43. France, Noseroy, près de Pontarlier (Doubs).
- \*23. *Grasianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 141, pl. 44. France, Escragnolles, montée de Saint-Martin, Cheiron (Basses-Alpes), Mons (Gard), Charse (Drôme), Saint-Julien (Hautes-Alpes), Gigondas (Vaucluse), Berrias (Ardèche).
- \*24. *cultratus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 144, pl. 46, fig. 1-2. France, ravin de Saint-Martin.
- \*25. *Juilleti*, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 150, pl. 50, fig. 1-3; pl. 171, fig. 8. France, près de Sisteron, Chardavon

- (Basses-Alpes), Saint-Julien, Château-Neuf-de-Chabre (Hautes-Alpes) (non *Juillet*, Forbes, 1846).
- \***26. semisulcatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 172, pl. 53, fig. 4-6. France, près de Sisteron, près de Castellanne, Anglès (Basses-Alpes), Berrias (Ardèche), Gigondas (Vaucluse).
- \***27. Jeannoti**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 188, pl. 56, fig. 3-5. Hautes-Alpes?
- \***28. bidichotomus**, Leymerie, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 190, pl. 57, fig. 3-4. France, Brillon (Meuse), Haute-Marne, Censeau (Jura).
- \***29. verrucosus**, d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 1, p. 191, pl. 58, fig. 1-3 (*A. simplus*, d'Orb.). France, près de Sisteron (Basses-Alpes), Saint-Julien (Hautes-Alpes), Gigondas (Vaucluse).
- \***30. Neocomiensis**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 201, pl. 59, fig. 8-10. France, Lieous, Cheiron, près de Sisteron (Basses-Alpes), Saint-Julien (Hautes-Alpes).
- \***31. sinuosus**, d'Orb., Pal., 1, p. 205, pl. 60, fig. 1-3. Sisteron?
- \***32. asperimus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 206, pl. 60, fig. 4-6. France, Cheiron, près de Sisteron, Lieous (Basses-Alpes), Saint-Julien (Hautes-Alpes), Gigondas (Vaucluse).
- \***33. Carteroni**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 209, pl. 61, fig. 1-3. France, Jaannerots, près des Ecorces (Doubs), Lieous (Basses-Alpes), Gigondas (Vaucluse).
- \***34. incertus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 209, pl. 30, fig. 3-4. Saint-Martin, Lattes.
- \***35. strangulatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 165, pl. 49, fig. 8-10. France, Saint-Julien, Beauchêne, Château-Neuf-de-Chabre (Hautes-Alpes), Cheiron (Basses-Alpes).
- \***36. Tethys**, d'Orb., 1840, pl. 59, fig. 7-9 (jeune). *A. semistriatus*, d'Orb., 1840, Pal. franç., Terr. crét., 1, pl. 41. (non Hann., 1825). *A. Buchiana*, Forbes, 1825, Quart. Journ., 1, p. 177. France, Escragnolles (Var), Cheiron, Barrême (Basses-Alpes), Château-Neuf-de-Chabre, Saint-Julien (Hautes-Alpes), Gigondas (Vaucluse); Colombie, Petaquiero.
- \***37. Noricus**, Schlotheim, 1820; Römer, 1836, Nordd. Kreid., p. 89, n° 21, pl. 15, fig. 4. Hanovre, Elliger, Bredenbeck.
- \***38. Terverii**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 179, pl. 54. France, Hautes-Alpes.
- \***39. macilentus**, d'Orb., 1842, Paléontol. franç., Terr. crét., 1, p. 138, pl. 42, fig. 3-4. France, Anglès, Cheiron (Basses-Alpes); Alpes-Vénitiennes (M. de Zigno).
- 40. Aonis**, d'Orb., 1847. Magnifique espèce pourvue d'une quille saillante, ornée sur les côtés de sillons onduleux peu sensibles, outre quelques grosses côtes flexueuses; un grand nombre de sillons près du dos. France, Clar (Var).
- \***41. Boubaudianus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. neocomiensis* par ses côtes, ses tubercules du dos, mais s'en distinguant par les tours moins larges, les côtes plus grosses et la présence de sillons de distance en distance. France, Château-Neuf-de-Chabre, Saint-Julien, Beauchêne (Hautes-Alpes), La Doire (Var).
- \***42. Moutonius**, d'Orb., 1847. Espèce voisine, par ses tubercules du dos, de l'*A. cryptoceras*, mais s'en distinguant par son ombilic



- plus étroit, ses tubercules intérieurs moins nombreux, ses côtes grosses, fasciculées, et par cinq ou six forts sillons transverses, obliques. France, Source-du-Loup, Saint-Martin, La Martre, Les Lattes (Var), (M. Mouton).
- \*43. *Marcousianus*, d'Orb., 1847. Voisine de forme de l'*A. Georhianus*, mais pourvue de tubercules au pourtour de l'ombilic. France, Boucheraus (Jura); (M. Marcou).
- \*44. *Escragnollensis*, d'Orb., 1847. Cette espèce est voisine par ses sillons de l'*A. incertus*, mais elle s'en distingue par ses tours plus étroits, son large ombilic, et les côtes bien plus marquées et plus fines. France, ravin de Saint-Martin, près d'Escragnolles, Source-du-Loup (Var). Géovreissiat, près de Nantua (Ain).
- \*45. *Mitreanus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine par ses côtes de l'*A. Astierianus*, mais pourvue de tours plus étroits, garnis de longues pointes au pourtour de l'ombilic. Ravin de Saint-Martin (Var).
- \*46. *gibbosulus*, d'Orb., 1847. Espèce à tours étroits, pourvus de côtes étroites rapprochées, et de distance en distance, sur le milieu du dos, de gibbosités obliques en arrière, presque mucronée sur la ligne médiane. La Martre (Var).
- \*47. *Josephinus*, d'Orb., 1847. Espèce aussi large que haute, à tours comprimés, carénés et tuberculés sur les côtés, pourvue de légères côtes en dedans de l'ombilic en entonnoir. Saint-Julien, Beauchêne (Hautes-Alpes).
- \*48. *Nicolasianus*, d'Orb., 1847. Espèce lisse, à tours étroits, comprimés, carénés sur le dos. France, Saint-Julien (Hautes-Alpes).
- \*49. *furcatus*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 127. pl. 14, fig. 17. Kent, Folkstone, près Hythe, Atherfield.
- \*50. *Nutfieldensis*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 127; Min. Conch., pl. 108. Angleterre, Folkstone, Hythe, Nutfield, Surrey. Maidstone.
- \*51. *multiplicatus*, Roemer, 1841, Kreid., p. 86, n° 4, pl. 13, fig. 3. Bredenbeck.
- \*52. *subcapricornu*, d'Orb., 1847. *Hamites capricornu*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 92, n° 5, pl. 14, fig. 6. Hanovre, Helgoland.
- \*53. *ceramonis*, d'Orb., 1841, Paléont., 1, pl. 109, fig. 415. Cheiron.
- CRIOCKERAS**, Léveillé, 1837; d'Orb., Paléont., Terr. cré., 1, p. 457.
- \*54. *Davallii*, Léveillé, d'Orb., Pal. franç., Terr. cré., 1, p. 459, pl. 113. France, Cheiron, Chamateuil, Sisteron (Basses-Alpes), Escragnolles (Var); Savoie, près de Chambéry; Espagne.
- \*55. *Cornuelianus*, d'Orb., 1841, Paléont., 1, p. 465, pl. 115, fig. 1-3. Wassy.
- \*56. *Villiersianus*, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. cré., 1, p. 462, pl. 114. France, Castellanne, Escragnolles, Nîmes (Gard).
- ANCYLOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.
- \*57. *dilatatus*, d'Orb., 1, p. 494, pl. 121, fig. 1-2. Gigondas.
- \*58. *pulcherrimus*, d'Orb., Pal., 1, p. 495, pl. 121, fig. 3-7. Sisteron, Cheiron.
- \*59. *sexnodosus*, d'Orb., 1847. *Hamites id.*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 94, n° 17, pl. 14, fig. 10. Hanovre, Helgoland.

**TOXOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.

**61. bituberculatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 476, pl. 116, fig. 8-10. France, La Lagne, près de Castellanne.

**\*62. elegans**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 477, pl. 117, fig. 1-5. France, Château-Neuf (Hautes-Alpes), Cheiron.

**\*63. Duvalianus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 479, pl. 117, fig. 6-9. France, Castellanne, Escragnolles.

**\*64. annularis**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 480, pl. 118, fig. 1-6. France, Cheiron (Basses-Alpes).

**\*65. Astlerianus**, d'Orb., 1847. Espèce allongée comme l'*Elegans*, mais pourvue de stries égales, fines, qui passent sur le dos et le ventre sans s'interrompre. France, Cheiron (Basses-Alpes).

**BACULITES**, Lamarck, 1799. D'Orb., Paléont., Terr. crét., 1, p. 558.

**\*66. Neocomiensis**, d'Orb., Pal., Terr. crét., 1, p. 560, pl. 118, fig. 1-5. France, Lieous (Basses-Alpes), Saint-Julien, Beauchêne.

**BACULINA**, d'Orb., 1847. Cours élém. de Paléont., 1, p. 288. Ce sont des *Baculites* avec les cloisons non ramifiées, et simplement lobées comme les cloisons des Cératites.

**\*67. Bouyana**, d'Orb., 1847. Espèce très-effilée, lisse, dont les lobes sont arrondis. France, Saint-Julien (Hautes-Alpes).

**PTYCHOCERAS**, d'Orb., 1842, Paléontolog., Terr. crét., 1, p. 554.

**\*68. Emericianus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 555, pl. 137, fig. 1-4. Lieous, près de Senez, Vergons.

**HAMULINA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Hamites* qui n'ont qu'une crosse. (Nous ne connaissons pas de véritables *Hamites* dans l'étage néocomien de France.)

**\*69. incerta**, d'Orb., 1849. *Hamites incertus*, d'Orb., Paléontol., 1, p. 528, pl. 130, fig. 1-3. France, Cheiron.

**\*70. Emericana**, d'Orb., 1849. *Hamites Emericianus*, d'Orb., 1841, 1, p. 550, pl. 130, fig. 8-12. France, Castellanne.

**71. Roëmeri**, d'Orb., 1847. *Hamites Beani*, Roëmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 93, n° 9, pl. 13, fig. 11 (non Phillips, 1839). Helgoland.

**72. obliquecostata**, d'Orb., 1849. *Hamites id.*, Roëmer, 1841, Kreid., p. 93, n° 9, pl. 13, fig. 12. Hanovre, Helgoland.

**73. subaricostata**, d'Orb., 1849. *Hamites varicostatus*, Roëmer, 1841, Kreid., p. 93, n° 7, pl. 13, fig. 14 (non Phillips, 1835). Hanovre, Helgoland.

**74. subnodosa**, d'Orb., 1849. *Hamites subnodosus*, Roëmer, 1841, Kreid., p. 93, n° 8, pl. 13, fig. 10. Helgoland.

**75. semicincta**, d'Orb., 1849. *Hamites semicinctus*, Roëmer, 1841, p. 92, n° 1, pl. 15, fig. 2. Helgoland.

**76. decurrens**, d'Orb., 1849. *Hamites decurrens*, Roëmer, 1841, p. 92, n° 2, pl. 14, fig. 9. Helgoland.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**PALUDINA**, Lamarck, 1822.

**77. elongata**, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 11, pl. 509, fig. 1-2. Angleterre, île de Wight (Weald.).

- 78. carinifera**, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 11, pl. 509, fig. 3. Angleterre, Purbeck, Hollington.
- 79. suviorum**, Sow., 1813, Min. Conch., 1, p. 77, pl. 31, fig. 1. Angleterre, Tainise Hackney (Weald.).
- 80. Sussexiensis**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 22, fig. 6. Angleterre, Kent, Surrey, Sussex (Wealden).
- SCALARIA**, Lamarck, 1801.
- \*81. canaliculata**, d'Orb., 1842, Pal., Terr. crét., 2, p. 50, pl. 154, fig. 1-3. Marolles, Vassy, Renaud-du-Mont, Lieous, Saint-Sauveur.
- 82. Albensis**, d'Orb., Pal., p. 51, pl. 154, fig. 4-5. France, Marolles, Saint-Sauveur.
- TURBITELLA**, Lamarck, 1801. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 33.
- \*83. Dupiniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 84, pl. 151, fig. 1-3. France, Marolles.
- \*84. angustata**, d'Orb., 1843, Tabl., p. 449. *T. angulata*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 35, pl. 151, fig. 4-6 (non Sowerby, 1840). France, Marolles, Saint-Dizier.
- \*85. laevigata**, Leym., 1842, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 36, pl. 151, fig. 7-9. France, Marolles.
- \*86. Robineausa**, d'Orb., 1847. Coquille pourvue de stries longitudinales fines sur des tours plans, non saillants. France, Saint-Sauveur (Yonne), Marolles (Aube).
- EULINA**, Risso, 1825. Voy. t. 1, p. 116.
- \*87. Albensis**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 65, pl. 155, fig. 14-15. France, Marolles.
- 88. melanoides**, Deshayes, 1842. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 65, pl. 155, fig. 16-17. France, Marolles.
- CHERMITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 173.
- 89. Rouyana**, d'Orb., 1847. Espèce courte, à tours lisses ou pourvus de lignes d'accroissement. France, Château-Neuf-de-Chabre.
- NERINEA**, DeFrance, 1825. D'Orb. Voy. t. 1, p. 263.
- 90. Meyeriana**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 80, pl. 159, fig. 3-4. France, Saint-Dizier.
- \*91. Dupiniana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 81, pl. 159, fig. 5-8. Marolles, Ecorces, près de Russey, Saint-Sauveur.
- 92. Matronensis**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 82, pl. 159, fig. 9-10. France, Saint-Dizier.
- \*93. Carteroni**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 83, pl. 160, fig. 1-2. France, près de Russey.
- \*94. lobata**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 83, pl. 160, fig. 3. Morteau.
- \*95. bifurcata**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 84, pl. 160, fig. 4-5. Morteau.
- \*96. Marcousana**, d'Orb., 1847. Grande espèce à tours fortement excavés et largement ombiliqués. France, Noseroy (Jura).
- ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.
- \*97. Dupiniana**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 116, pl. 167, fig. 1-3. France, Marolles.
- \*98. Marullensis**, d'Orb., 1847. *A. affinis*, d'Orb., 1842, Paléont.

- franç., Terr. crét., 2, p. 117, pl. 167, fig. 6-6 (non *affinis*, Fitton, 1836). France, Marolles; Colombie.
- \*99. *marginata*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 119, pl. 167, fig. 8-9 (non *marginata*, Forbes, 1844). France, Marolles, Saint-Sauveur, Ville-en-Blaisois.
- \*100. *Albensis*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 120, pl. 167, fig. 10-12. France, Marolles, Saint-Sauveur.
101. *ringens*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 121, pl. 167, fig. 13-15. France, Marolles, Morteau.
102. *scalaris*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 125. France, Marolles.
103. *brevis*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 125. France, Marolles.
104. *Popii*, d'Orb., 1847. *Tornatella Popii*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 22, fig. 8. Kent, Surrey Sussex.
- \*105. *Nerei*, d'Orb., 1847. Espèce ornée comme l'*A. marginata*, mais plus allongée et plus régulièrement ovale. France, Marolles (Aube).
- AVELLANA, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 131.
106. *globulosa*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 132, pl. 168, fig. 9-12. France, Marolles.
- \*107. *sphæra*, d'Orb., 1847. Coquille sphérique fortement costulée en travers. À tours de spire convexes. France, Marolles (Aube).
- VARIGERA, d'Orb., 1847. Voyez Néocomien supérieur.
- \*107. *Bicordeana*, d'Orb., 1849. Espèce oblongue à fortes varices sur une surface lissée. Fontenoy (Yonne).
- NATICA, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.
- \*108. *sublaevigata*, d'Orb., 1847. *N. laevigata*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 148, pl. 170, fig. 6-7 (non Sow., 1818). France, Marolles, Saint-Sauveur, Vassy, Baudrecourt, Auxerre; Angleterre, île de Wight.
- \*109. *Coquandiana*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 151, pl. 171, fig. 1. France, Sassenage; Brunet (Var).
- \*110. *Hugardiana*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 151, pl. 171, fig. 2. *N. pseudoampullaria*, Mathéron, 1843. Savoie, Chambéry; Allauch, près de Marseille.
111. *praelonga*, Deshayes, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 152, pl. 171, fig. 1. France, Vandœuvre; Colombie, Rio-Subbé, affluent du Rio-Suarez.
- \*112. *bulimoides*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 153, pl. 172, fig. 2-3. *Natica Allaudiensis*, Mathéron. France, Marolles, Saint-Sauveur (Yonne), Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne), Marseille (Bouches-du-Rhône).
- \*113. *Bruguerii*, Mathéron, 1843. Catalogue, p. 230, pl. 39, fig. 1. France, Allauch (Bouches-du-Rhône), Morteau (Doubs).
- \*114. *Neptuni*, d'Orb., 1847. Espèce intermédiaire en longueur, entre les *N. laevigata* et *bulimoides*, sans ombilic. France, Beaudecourt (Haute-Marne), Marolles (Aube), Morteau (Doubs).
- \*115. *Carteroni*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. Bruguerii*, mais avec un ombilic bien plus large et plus profond. France, Le Pisseux, commune de Villers (Aube), Géovressiat, près de Nantua (Ain).
- NERITA, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 211.
116. *Fittonii*, d'Orb., 1847. *Neritina* id., Sow., 1836, in Fitton,

Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 23, fig. 7. Angleterre, Kent, Surrey, Sussex (Weald.).

**NERITOPSIS**, Sow., 1825. Voy. t. 1, p. 179.

\*117. *Robineausiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 174, pl. 176, fig. 1-4. France, Saint-Sauveur.

\*117'. *Maris*, d'Orb., 1849. Espèce voisine de la précédente, mais avec de simples stries longitudinales sur une surface lisse. Fontenoy.

**TROCHUS**, Linné; 1758. Voy. t. 1, p. 64.

\*118. *Albensis*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 183, pl. 177, fig. 1-3. France, Marolles.

\*119. *substriatulus*, d'Orb., 1847. *T. striatulus*, Desh., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 183, pl. 177, fig. 4-6 (non Desh., 1824). France, Marolles.

120. *Marollinus*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 184, pl. 177, fig. 7-8. France, Marolles.

\*121. *dentigerus*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 185, pl. 177, fig. 9-12. France, Marolles.

\*122. *Montonianus*, d'Orb., 1847. Grande espèce (60 mill.) carénée, tuberculeuse sur la spire. France, Caussols (Var).

\*123. *bicinctus*, Röem., 1841, Kreid. Ool., p. 81, n° 1, pl. 20, fig. 3. Schoppenstedt.

\*123'. *Haimeanus*, d'Orb., 1849. Espèce à quatre côtes longitudinales tuberculeuses aux tours. France, Fontenoy (Yonne).

**SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.

\*124. *Neocomiense*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 195, pl. 179, fig. 1-4. France, Marolles.

\*125. *alpinum*, d'Orb., 1847. Espèce très-déprimée, à large ombilic, à côtes treillisées. France, Lieoux (Basses-Alpes).

**STRAPAROLUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 6.

126. *Dupinianus*, d'Orb., 1847. *Solarium idem*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 194, pl. 178, fig. 10-13. Marolles.

**DELPHINULA**, Lamarck, 1804. Voy. t. 1, p. 191.

127. *Dupiniana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 209, pl. 182, fig. 1-4. France, Marolles.

**PHASIANELLA**, Lamarck, 1802. Voy. t. 1, p. 167.

\*128. *Neocomiensis*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 232, pl. 187, fig. 1. France, Marolles.

**TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.

129. *inconstans*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 213, pl. 182, fig. 14-17. France, Marolles.

\*130. *Mantellii*, Leymerie, 1842. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 214, pl. 183, fig. 5-7. France, Marolles, Saint-Sauveur.

131. *Yonninus*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 214, pl. 183, fig. 8-10. France, Saint-Sauveur.

132. *Adonis*, d'Orb., 1847. *T. elegans*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 2, p. 215, pl. 184, fig. 1-3 (non *elegans*, Gressly, 1789). Fr., Marolles.

\*133. *Hilsensis*, d'Orb., 1847. *Turbo pulcherrimus*, Römer, 1842, Kreid., p. 80 (non Phillips, 1829). Hanovre, Hilses. Elle diffère par ses deux côtes saillantes.

\*134. *subclathratus*, d'Orb., 1847. *T. clathratus*, Römer, 1841,

- Nordd. Kreid., p. 80, n° 2; Ool., pl. 11, fig. 2 (non Donovan, 1799). Hanovre, Elligser, Osterwald.
- 135. Desvoidii**, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 210, pl. 182, fig. 5-8. France, Marolles, Saint-Sauveur.
- 136. acuminatus**, Desh., 1842. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 211, pl. 182, fig. 9-11. France, Marolles.
- \***137. Marollinus**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 212, pl. 186, fig. 12-13. France, Marolles (Yonne), Saint-Julien.
- \***138. Acastus**, d'Orb., 1847. Belle espèce treillissée finement et ornée d'un méplat sur les côtés. France, Soulaines (Aube).
- \***139. Ixyon**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais à bien plus grosses côtes, à doubles carènes plus prononcées. France, Soulaines.
- \***140. subvaricosus**, d'Orb., 1847. Espèce grosse, à varices se correspondant sur deux lignes d'un tour à l'autre. France, Lisele (Var).
- \***140'. fenestratus**, d'Orb., 1849. Magnifique espèce à treillis qui laissent entre eux de profondes excavations. France, Fontenoy.
- PLEUROTOMARIA**, Defrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.
- \***141. Neocomiensis**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 240, pl. 188, fig. 8-12. France, Vassy, Saint-Sauveur, Marolles, Russey, Escragnolles.
- \***142. Pailletteana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 241, pl. 189. France, Génégat, Cheiron, Renaud-du-Mont.
- 143. Robinaldi**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 243, pl. 190, fig. 8. Saint-Sauveur.
- \***144. Dupiniana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 245, pl. 191, fig. 1-4. France, Marolles, Renaud-du-Mont, Auxerre.
- 145. Albensis**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 273. Marolles.
- \***146. Carteroni**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 273. Morteau.
- \***147. Jurensisimilis**, Rœm., 1841, Kreid., p. 82, n° 2, Ool., pl. 10, fig. 13. Elligser.
- 148. suprajurensis**, Rœm., [1841, p. 82, n° 3; Oolith., pl. 10, fig. 15. Elligser.
- 148'. gigantea**, Sow., in Fitton, 1837, Trans. geol. Soc., 4, pl. 14, fig. 16. Angleterre, île de Wight.
- \***149. Defranci**, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 237, pl. 39, fig. 14. France, Allauch (Bouches-du-Rhône), Trebief, près de Nozeroy (Jura).
- 150. Fittoni**, d'Orb., 1847. *P. striata*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 158, pl. 14, fig. 16 (non Sow., 1834, étage 3°). Angl., Folkstone, Boughton.
- \***151. Phidias**, d'Orb., 1847. Grosse espèce à ombilic non largement excavé, comme chez le *P. Pailletteana*. Suisse, Neuchâtel.
- 152. contraria**, d'Orb., 1847. Espèce à gauche de Morteau (Doubs).
- STRONBUS**, Linné, 1758. D'Orb., Paléont., Terrains crétacés, 2, p. 313.
- 153. subspeciosus**, d'Orb., 1847. *Pterocera id.*, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 303, pl. 211, fig. 3-4 (non Schl., 1820). France, Marolles, Saint-Sauveur, Attincourt.
- PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.

- \*154. *Moreausiana*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 301, pl. 211, fig. 1-2. Bujard (Meuse), Marolles, Attincourt.
- \*155. *Dupiniana*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 302, pl. 211, fig. 5-7. France, Marolles, Attincourt, Saint-Sauveur.
- \*156. *Pelagi*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 304, pl. 212. Vassy, Marolles, Morteau, Marseille, Géovressiat (Ain).
- \*157. *Emerici*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 306, pl. 216, fig. 1-2. France, Escragnolles.
- \*158. *Neocomiensis*, d'Orb., 1847. Espèce à côtes anguleuses, pourvue d'expansions nombreuses. France, Bettancourt (H.-Marne).
- \*159. *speciosa*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 31, pl. 303, fig. 3-4. France, Marolles (Aube), Bettancourt (H.-Marne).
- \*160. *tricarinata*, d'Orb., 1847. Espèce de moyenne taille à trois carènes au dernier tour de spire. Bettancourt-la-Ferrée (H. Marne).
- ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. D'Orb., Pal. Terr. crét., 2, p. 280.
- \*161. *Robinaldina*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 282, pl. 206, fig. 4-5. Saint-Sauveur, Marolles, Perte-du-Rhône.
- \*162. *scalaris*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 298. Vassy.
- \*163. *acuta*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 298. France, Marolles.
- \*164. *irregularis*, d'Orb., 1847. Espèce dont l'aile est courte, oblique, sinueuse en arrière. France, Château-Neuf (Hautes-Alpes).
- \*165. *Moyeriana*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 298. France, Vassy.
- CHENOPUS**, Philippi, 1837.
- \*166. *Dupinianus*, d'Orb., 1847. *Rostellaria* id., d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 281, pl. 206, fig. 1-3. France, Marolles, Saint-Sauveur, Auxerre.
- FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- \*167. *Neocomiensis*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 331, pl. 222, fig. 1. France, Marolles.
- \*168. *delphinulus*, d'Orb., 1847. Espèce courte et large, striée en travers, sans côtes ni varices. France, Morteau (Doubs).
- FYRULA**, Lamarck, 1801. Nous conservons seulement dans le genre les espèces *ficoides*, minces, à stries croisées.
- \*169. *infracretacea*, d'Orb., 1847. *Fusus* id., d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 332, pl. 222, fig. 2-5. France, Marolles.
- \*170. *ornata*, d'Orb., 1847. *Fusus* id., d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 333, pl. 222, fig. 11-13. France, Marolles.
- CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.
- \*171. *terebroïde*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 353, pl. 227, fig. 1. France, Marolles, Bettancourt.
- \*172. *Marollinum*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 353, pl. 227, fig. 2-3. France, Marolles.
- \*173. *Dupinianum*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 354, pl. 227, fig. 4-6. France, Marolles.
- \*173'. *Albense*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 255, pl. 227, fig. 10-12. France, Marolles.
- \*174. *Phillipii*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 256, pl. 227, fig. 7-8. France, Marolles, Chenay (Yonne).
- \*175. *Clementinum*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 337, pl. 228, fig. 1-3. France, Marolles, Saint-Sauveur.

- \***176. Gandryi**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 258, pl. 223, fig. 4-6. France, Marolles, Soulaines (Aube).
- \***177. subnassoides**, d'Orb., 1847. *C. nassoides*, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 359, pl. 223, fig. 7-19 (non Gratel, 1832). France, Marolles (Aube), Lieoux (Basses-Alpes).
- 178. Neocomiense**, d'Orb., 1843, id., 2, p. 360, pl. 232, fig. 8-10. France, Marolles.
- 179. subpyramidale**, d'Orb., 1847. *C. pyramidale*, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 361, pl. 206, fig. 7-8 (non Sow., 1816). France, Marolles.
- 180. Bouyanum**, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 382. France, Saint-Julien, Beauchêne.
- \***181. carbonarium**, d'Orb., 1847. *Potamides id.*, Roemer, Manuscrit. Médiocre espèce à sutures saillantes peu allongées. Hanovre.
- 182. attenuatum**, d'Orb., 1847. *Melanopsis attenuata*, Sow., 1836; in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 22, fig. 5. Anglet., Kent, Surrey, Sussex (Weald.).
- 183. subtricarlinatum**, d'Orb., 1847. *Melanopsis id.*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 22, fig. 4. Anglet., Kent, Sursey, Sussex (Weald.).
- 184. Varnsense**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. terebroides*, plus grande, sans tubercule sur la suture. France, Le Broc (Var).
- COLOMBELLINA**, d'Orb., 1848, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 346.
- 185. monodactylus**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 347, pl. 126, fig. 2-5. France, Marolles.
- EMARGINULA**, Lamarck, 1801, t. 1, p. 197.
- 186. Neocomiensis**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 392, pl. 235, fig. 4-8. France, Marolles.
- HELOION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.
- 187. lamellosa**, d'Orb., 1847. *Patella lamellosa*, Koch., 1837, Beitr. zur kenn. Ool., p. 51, pl. 6, fig. 4. Elligser-Brinke.
- 188. subquadrata**, d'Orb., 1847. *Patella quadrata*, Koch, 1837, Beitr. zur Kenn. Ool., p. 51; pl. 6, fig. 3. Allemag., Elligser-Brinkb.
- BULLA**, Linné, 1758.
- 189. mantilliana**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 176, pl. 22, fig. 3. Angl., Tilgate. Forest (Weald.).

### MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

- PHOLAS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.
- 190. prisca**, Sowerb., 1828, M. C., 6, p. 157, pl. 158. Angleterre, Sandgate.
- 191. Roëmeri**, d'Orb., 1847. *Fistulana constricta*, Roëmer, 1844, Kreid., n° 1, pl. 10, fig. 11 (non *Pholas constricta*, Phillips, 1822). Hanovre, Helgoland.
- PANOPEA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.
- \***192. Carteroni**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 332, pl. 255, fig. 1.



2. *Myopsis attenuata*, Agass., *Myopsis curta*, Agass., 1845. France, Morteau (Doubs); Neuchâtel, Suisse.
194. *Cottaldina*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 330, pl. 354, fig. 1, 2. France, Auxerre, Morteau.
195. *Dupiniana*, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 328, pl. 353, fig. 1, 2. Marolles, Brillon.
196. *irregularis*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 326, pl. 352, fig. 1, 2. *Myopsis lateralis*, Agass., 1845. France, St-Sauveur, Bettancourt, Marolles; Suisse, Neuchâtel.
197. *Neocomiensis*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 329, pl. 353, fig. 3-8. *Myopsis unioïdes*, Agass., 1845, Etud. crit., pl. 31, fig. 11, 12. France, Bettancourt, Vassy, Auxerre, Morteau, Marolles; Suisse, Neuchâtel; Martinet de Charis, près de Nantua (Ain).
198. *obliqua*, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 327, pl. 352, fig. 3, 4. France, Lattes.
199. *recta*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 334, pl. 356, fig. 1, 2. France, Marolles, Bettancourt, Morteau (Doubs).
200. *Robinaldina*, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 331, pl. 354, fig. 3-5. St-Sauveur, Auxerre.
201. *rostrata*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 333, pl. 355, fig. 3, 4. *Lutraria id.*, Mathéron. France, Bettancourt. Provence.
202. *Voltzii*, d'Orb., 1847. *Lutraria Voltzii*, Math., 1842, Catalog., p. 139, pl. 12, fig. 2, 3. France, Alpines, près de St-Remy, Peyrolles, Allauch (B.-du-Rhône).
203. *Urgonensis*, d'Orb., 1847. *Lutraria id.*, Mathéron, 1842, Catalog., p. 139, pl. 12, fig. 1. France, Peagère-au-Rocher, près d'Orgon.
204. *Massiliensis*, d'Orb., 1847. *Lutraria id.*, Mathéron, 1842, Catalog., p. 140, pl. 12, fig. 8, 9. *Lutraria cuneata*, Mathéron, *id.*, p. 140, pl. 12, fig. 4, 5. *Lutraria costata*, Römer. Allauch, La Latte (Var); Hanovre, Elligser-Biink.
205. *Albertina*, d'Orb., 1847. Espèce bien plus allongée et bien plus droite que le *Panopæa Robinaldina*. France, Morteau (Doubs).
206. *lata*, d'Orb., 1847. *Myopsis lata*, Agass., 1845, Etud. crit., p. 261, pl. 32, fig. 8, 9. Suisse, env. de Neuchâtel.
207. *scaphoïdes*, d'Orb., 1847. *Myopsis scaphoïdes*, Agass., 1845, Etud. crit., p. 261, pl. 32, fig. 4, 5. Suisse, env. de Neuchâtel.
- PHOLADOMYA, Sow., 1826. Voy. t. 1, p. 73.
208. *Agassizii*, d'Orb., 1844, Paléont. franc., Terr. crét., 3, p. 352, pl. 363, fig. 1-3. France, Vaux-sur-Blaise, Bettancourt.
209. *elongata*, Münster, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 351, pl. 362. *Ph. Scheucherii*, Agass., 1842? France, Brillon, Bettancourt, Marolles, sur le Fond, Jabron, Morteau; Savoie, Chambéry; Géovreissiat, près de Nantua.
210. *alternans*, Römer, 1840, Kreidi, p. 6, n° 5. Hanovre, Osterwald.
211. *Bouyana*, d'Orb., 1847. Espèce très-jolie, large du côté buccal, acuminée et terminée en rostre du côté anal, pourvue de fortes rides d'accroissement sur le crochet. France, St-Julien, Beauchêne (H.-Alpes).

- \***212. semicostata**, Agass., 1842, Etud. Crit., p. 51, pl. 2, fig. 1, 2; pl. 3, fig. 11. France, Auxerre (Yonne); Suisse, env. de Neuchâtel, Hauterive, Cressier; Lauderon.
- 213. caudata**, d'Orb., 1847. *Goniomya caudata*, Agass., 1842, Myes, p. 22, pl. 1, fig. 1; pl. 1 bis, fig. 1, 2, 3. Env. de Neuchâtel.
- 214. lævis**, d'Orb., 1847. *Goniomya lævis*, Agass., 1842, Myes, p. 23, pl. 1, fig. 4, 5. Suisse, Neuchâtel.
- LYONSIA**, Turton, 1822. Voy. t. 1, p. 10.
- 215. subrotundata**, d'Orb., 1847. *Panopæa rotundata*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., p. 129, pl. 13, fig. 2 (non *rotundata*, Phill., 1835). Angl., Folkstone, près Court-at-Street.
- THRACIA**, Leach, 1825. Voy. t. 1, p. 126.
- \***215'. Phillipsii**, Roemer, 1842, Kreid., p. 74, pl. 10, fig. 1 (non *depressa*, Phill.). Helgoland.
- \***216. subdepressa**, d'Orb., 1847. *Mya depressa*, Phillips, 1839. Yorkshire, pl. 2, fig. 8 (non Sow.). Anglet., Speeton; Morteau.
- 217. Nicoletti**, d'Orb., 1847. *Corimya Nicoletti*, Agass., 1845, Etud. crit., p. 272, pl. 37, fig. 1-6. Suisse, env. de Neuchâtel.
- 218. vulvaria**, d'Orb., 1847. *Corimya vulvaria*, Agass., 1845, Etud. crit., p. 272, pl. 37, fig. 7-11. Suisse, env. de Neuchâtel.
- 219. taurica**, d'Orb., 1847. *Corimya taurica*, Agass., 1845, Etud. crit., p. 273, pl. 39, fig. 12, 13. Simferopol en Crimée.
- 220. subangulata**, Desh., Leymerie, 1842, Mém. Soc. géol., p. 3, pl. 5, fig. 1. France, Soulaïnes (Aube).
- PERIPLOMA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- \***221. Neocomiensis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 380, pl. 372, fig. 3, 4. France, St-Sauveur, Marolles (Yonne).
- \***222. Robinaldina**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 380, pl. 372, fig. 1-3. France, Bettancourt (H.-Marne), St-Sauveur (Yonne), Morteau (Doubs).
- ANATINA**, Lamarck, 1809. Voy. t. 1, p. 74.
- \***223. Agassizii**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 371, pl. 369, fig. 1, 2. *Platymya rostrata*, Agass., 1844, (non *rostrata*, Chemnitz). France, Vassy, Bettancourt; Suisse, Neuchâtel.
- \***224. Astieriana**, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 374, pl. 370, fig. 4, 5. France, Jabron.
- \***225. Carteroni**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 375, pl. 371, fig. 1, 2. France, Renaud-du-Mont (Doubs).
- \***226. Cornuellianna**, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 372, pl. 369, fig. 3, 4. Bettancourt.
- 227. dilatata**, d'Orb., 1847. *Platymya id.*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 181, pl. 10, fig. 13, 14. Suisse, Lauderon, Cormondrèche (Neuchâtel).
- 228. subtenuis**, d'Orb., 1847. *Platymya tenuis*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 183, pl. 10 a, fig. 5, 6 (non Brown, 1827). Suisse, Hauterive (Neuchâtel).
- 229. inflata**, d'Orb., 1847. *Cercomya inflata*, Agass., 1844, Etud. crit., p. 153, pl. 11 a, fig. 22, 24. Suisse, Hauterive.
- \***230. Marullensis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 376, pl. 371, fig. 3, 4. France, Marolles, St-Dizier.

- 231. Robinaldina**, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 374, pl. 370, fig. 6-8. France, St-Sauveur.
- 231'. subsinuosa**, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 373, pl. 370, fig. 1-3. Trémilly, Marolles.
- 232. carinata**, d'Orb., 1847. *Solen carinatus*, Mathéron, 1842, Catalog., p. 133, pl. 11, fig. 1, 2. France, Allauch, près de Marseille.
- GASTROCHÆNA**, Spengler, 1783. Voy. t. 1, p. 275.
- 233. dilatata**, d'Orb., 1847. *Fistulana id.*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 394, pl. 375, fig. 1-4. France, Vandœuvre, Russey, près de Morteau.
- SOLECURTUS**, Blainville, 1824; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 38.
- 234. Robinaldinus**, d'Orb., 1847. *Solen id.*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 320, pl. 350, fig. 1, 2. France, St-Sauveur.
- MACTRA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 216.
- 235. Carteroni**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 367, pl. 368, fig. 6-9. Marolles, Morteau; Anglet., île de Wight.
- 236. Dupiniana**, d'Orb., 1844, *id.*, 3, p. 367, pl. 368, fig. 3-5. France, Marolles.
- 237. matronensis**, d'Orb., 1844, *id.*, p. 366, pl. 368, fig. 1, 2. France, Bettancourt.
- 238. substriata**, d'Orb., 1847. *Lutraria striata*, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 65, pl. 534, fig. 1 (non Gmel., 1789). Lyme-Regis.
- DONACILLA**, Lamk., 1812; d'Orb., Paléont., Terr. crét., 3, p. 401.
- 239. Couloni**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 401, pl. 376, fig. 1, 2. France, Auxerre, Brienne; Suisse, Chaud-de-Fond, Neuchâtel.
- LAVIGNON**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 306.
- 240. rhomboïdalis**, d'Orb., 1847. *Pholadomya rhomboïdalis*, Leym., 1842, Mém. de la Soc. géol., 5, p. 3, pl. 2, fig. 6. France, Ville-sur-Terre, La Doire (Var).
- ARCOPAGIA**, Brown, 1827; d'Orb., Paléont. franç., 3, p. 409.
- 241. subconcentrica**, d'Orb., 1847. *A. concentrica*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 410, pl. 378, fig. 1-6 (non Reuss, 1843). Bousseval, Bettancourt, Marolles, Morteau, Saint-Sauveur.
- TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.
- 242. Carteroni**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 420, pl. 380, fig. 12. France, Morteau, St-Sauveur, Marolles.
- LEDA**, Schum., 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- 243. scapha**, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 467, pl. 301, fig. 1-3. France, Ancerville, Marolles, St-Sauveur; Colombie, Bogota.
- VENUS**, Linné, 1758; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 428.
- 244. Cornucliana**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 436, pl. 383, fig. 10-13. France, Bettancourt, Marolles, St-Sauveur, Renaud-du-Mont.
- 245. Cottaldina**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 438, pl. 384, fig. 1-3. Bettancourt, Auxerre, St-Sauveur, Marolles.
- 246. Dupiniana**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 434, pl. 383, fig. 1-4. St-Sauveur, Marolles, Renaud-du-Mont.

- \***247. sub-Brongniartina**, d'Orb., 1847. *A. Brongniartina*, Leym., 1842; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 432, pl. 382, fig. 3-6, (non Payr., 1825). Bettancourt, Renaud-du-Mont, Auxerre, Marolles.
- \***248. Galdryna**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 437, pl. 383, fig. 14, 15. Bettancourt, Renaud-du-Mont, Saint-Sauveur.
- \***249. Icaunensis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 439, pl. 384, fig. 4-6. France, St-Sauveur, Marolles.
- \***250. matronensis**, d'Orb., 1845, *id.*, 3, p. 433, pl. 382, fig. 7, 8. Bettancourt.
- \***251. obesa**, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 434, pl. 383, fig. 9-11. Marolles.
- \***252. Ricodeana**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 431, pl. 382, fig. 1, 2. Seignelay, Auxerre, Trémilly, Bettancourt.
- \***253. Robinaldina**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 435, pl. 383, fig. 5-9. France, Marolles, Renaud-du-Mont, Moran-court, Baudrecourt.
- \***254. vendoperata**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 439, pl. 384, fig. 7-10. France, Seignelay, Auxerre, St-Sauveur, Bettancourt.
- CYCLAS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 2, p. 60.
- 255. angulata**, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 176, pl. 21, fig. 13. Angl., Weald.-Clay, Kent, Surrey, Sussex, Wardour (Weald.).
- 256. media**, Sowerby, 1826, Min. Conch., 6, pl. 527, *id.*, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 176, pl. 21, fig. 10, 11. Angleterre, Kent, Surrey, Sussex, Wardour, Oxfordshire (Weald.).
- 257. membranacea**, Sowerby, 1826, Min. Conch., 6, pl. 527, fig. 3, *id.*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 177. Anglet., Kent, Surrey, Sussex (Weald.), Punfield.
- 258. subquadrata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 177, pl. 21, fig. 8. Angl., Kent, Surrey, Sussex (Weald.).
- 259. elongata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 259, pl. 21, fig. 9. Angl., Wardour, Oxfordshire (Weald.).
- 260. parva** Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 259, pl. 21, fig. 7. Anglet., Wardour, Oxfordshire (Weald.).
- CORBULA**, Brug., 1791. Voy. t. 1, p. 275.
- \***261. compressa**, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 458, pl. 388, fig. 6-8. Coulaines.
- 262. incerta**, d'Orb., 1845, 3, p. 456, pl. 388, fig. 1, 2. France, Marolles.
- 263. Neocomiensis**, d'Orb., 1847. *C. carinata*, d'Orb., 1845, Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 457, pl. 388, fig. 3-5. France, Marolles, Bettancourt, Attencourt, St-Sauveur.
- \***264. striatula**, Sow., 1827; d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 459, pl. 388, fig. 9-13. France, St-Sauveur, Auxerre.
- 265. alata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 176, pl. 21, fig. 5. Anglet., Pounceford, près de Burwash, Sussex.
- OPIS**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.
- \***266. Neocomiensis**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 51, pl. 253, fig. 1-5. France, St-Sauveur, Marolles, Bernon.

- ASTARTE**, Sow., 1818. Voy. t. 1, p. 216.
- \***267. subacuta**, d'Orb., 1847. *A. carinata*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 63, pl. 262, fig. 1-3 (non *carinata*, Phillips, 1829). France, Brienne, Marolles.
- \***268. Beaumontii**, Leym., 1842; d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 60, pl. 260. France, St-Dizier, Brillon, Ancerville, Auxerre, Fontenoy; Anglet., île de Wight.
- \***269. disparilis**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 66, pl. 263, fig. 1-4. France, St-Sauveur, Marolles, Vaux-sur-Blaise, St-Dizier.
- \***270. elongata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 68, pl. 263, fig. 8-11. France, Marolles, St-Sauveur.
- \***271. Astieriana**, d'Orb., 1847. Petite espèce obronde, ridée concentriquement, mais à rides inégales. France, Lieous (B.-Alpes).
- \***272. subdentata**, Rœmer, 1841; Kreidl., p. 71, pl. 9, fig. 9. Hils.
- \***272'. subformosa**, d'Orb., 1847. *A. formosa*, d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 65, pl. 262, fig. 10-12 (non Fitton). Auxerre, Brienne.
- \***273. gigantea**, Desh., 1842; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 58, pl. 258. France, Vandœuvre, Gréoux, St-Dizier.
- 274. Moreana**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 60, pl. 259. France, Brillon.
- \***275. Neocomiensis**, d'Orb., 1847. *A. transversa*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 61, pl. 261. France, Brillon, St-Dizier, Morveau, St-Sauveur.
- \***276. Numismalis**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 63, pl. 262, fig. 4-6. France, St-Dizier, Marolles, St-Sauveur.
- \***277. subcostata**, d'Orb., 1847. *A. striato-costata*, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 64, pl. 262, fig. 7-9 (non Rœmer, 1836). France, Marolles, Attencourt, St-Sauveur.
- \***278. pseudostrata**, d'Orb., 1847. *A. substriata*, Leym., 1842; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 67, pl. 263, fig. 5-8 (non Bronn, 1835). France, Marolles, Auxerre.
- \***279. Buchii**, Rœmer, 1842, de Astarte genere, p. 20, fig. 4. France (Ain).
- CRASSATELLA**, Lamarck, 1801; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 72.
- \***280. Cornucliana**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 74, pl. 264, fig. 7-9. Bettancourt, Attencourt, Morancourt.
- \***281. Robinaldina**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 75, pl. 264, fig. 10-13. France, St-Sauveur, Auxerre, Marolles, Morancourt.
- CARDITA**, Brug., 1789. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 84.
- \***282. Neocomiensis**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 85, pl. 267, fig. 1-6. Fr., Marolles.
- \***283. quadrata**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 86, pl. 267, fig. 7-10. Fr., Marolles, Fontenoy.
- 284. fenestrata**, d'Orb., 1847. *Venus fenestrata*, Forbes, 1844, Quarterly Journal, 1, p. 240, pl. 2, fig. 6. Angl., Peasemmarsh.
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.
- \***285. Bernensis**, Leymerie, 1842. *C. rostrata*, d'Orb., 1843, Pal.

- franç., Terr. crét., 3, p. 98, pl. 271 (non *rostrata*, Sow., 1836). Fr., Marolles, Auxerre, Morteau (Doubs), Bernon (Aube).
- \***286. Carteroni**, d'Orb. Espèce moyenne, plus épaisse et plus allongée que le *C. Bernensis*. France, Morteau (Doubs), Auxerre (Yonne).
- 287. Sowerbyi**, d'Orb., 1847. *C. angulata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 128 (non Sow., Min. Conch.). Folkstone.
- TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.
- \***288. carinata**, Agassiz, 1840. D'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 132, pl. 286. *T. sulcato-carinata*, *T. elongata*, Sow., 1823, Min. Conch., pl. 431, fig. 112 (exclus. fig. 3). France, Saint-Sauveur, Morteau, Vaux-sur-Blaise, Brillon, Gréoux; Neuchâtel (Suisse).
- \***288'. divaricata**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 135, pl. 288, fig. 1 4. Bettancourt.
- \***289. longa**, Agass., 1840. Pal. fr., Terr. crét., 3, p. 130, pl. 285. *T. excentrica*, Math. (non Sow.). Fr., Bettancourt, Saint-Sauveur, Marolles, Géovreissiat, près de Nantua, Vaucluse, mont Mélian (Bouches-du-Rhône); Suisse, Neuchâtel; Colombie, Tocayma.
- \***290. ornata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 136, pl. 288, fig. 5-9. France, Saint-Dizier, Vassy, Ancerville, Auxerre, Perte-du-Rhône (Ain).
- 296. Robinaldina**, d'Orb., *id.*, 3, p. 139, pl. 299, fig. 1-2. Saint-Sauveur.
- \***291. rudis**, Parkinson, 1811. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 137, pl. 289. *T. cincta*. France, Saint-Sauveur, Vassy, Ventoux, Morteau; Suisse, Neuchâtel; Angl., île de Wight.
- \***292. caudata**, Agassiz, 1840. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 133, pl. 287. France, Bettancourt, Auxerre, Saint-Sauveur, Comble, Morteau; Suisse, Neuchâtel; Angl., île de Wight.
- \***293. scapha**, Agass., 1840, Etud. crit., Trigon., p. 15, pl. 7, fig. 17-20. France, Vorey, près de Besançon (Doubs).
- 294. paradoxa**, Agass., 1840, Etud. crit., Trig., p. 46, pl. 10, fig. 12 et 13. France, env. de Besançon (Doubs).
- LUCINA**, Brug., 1791. Voy. t. 1, p. 76.
- \***295. Cornuellianna**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 116, pl. 281, fig. 3-5. Bettancourt.
- \***296. Dupiniana**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 117, pl. 281, fig. 6-8. France, Marolles, Morteau.
- \***297. Rouyana**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 118, pl. 283 bis, fig. 8-10. France, Château-Neuf-de-Chabre.
- \***298. globiformis**, Leymerie, 1842, Mém. Soc. géol., p. 4, pl. 3, fig. 8. France, Chaource, Rumilly (Aube).
- CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.
- \***299. corrugata**, d'Orb., 1847. *Sphæra corrugata*, Sow., Min. C., 4, p. 42, pl. 335. *Corbis cordiformis* d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 111, pl. 279. *Venus cordiformis*, Leymerie. *Cardium gallo-provinciale*, Mathéron. France, Saint-Dizier, Vassy, Brillon, Gégéval, Marolles, Orgon; Lattes (Var); Angl., île de Wight.
- 300. obovata**, d'Orb., 1847. *Astarte obovata*, Sow., 1822, Min. C., 4, p. 73, pl. 353. Angl., île de Wight.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.

- \***301. Cottaldinum**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 22, pl. 242, fig. 1-4. France, Bettancourt, Marolles, Saint-Sauveur.
- \***302. imbricatarium**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 18, pl. 239, fig. 4-6. France, Marolles, Saint-Sauveur.
- \***303. impressum**, Desh., 1843, D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 20, pl. 240. France, Vandœuvre, Briel, Brillon.
- \***304. peregrinum**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 16, pl. 239, fig. 1-3. France, Bettancourt, Marolles, St-Sauveur.
- \***305. subhillanum**, Leymerie, 1842, D'Orb., Paléont., 3, p. 19, pl. 239, fig. 6-8. France, Marolles, Chenay, Saint-Sauveur; Nouvelle-Grenade, Tocayma.
- \***306. Voltzil**, Leymerie, 1842, D'Orb., Paléont. franç., 3, p. 21, pl. 241. France, Auxerre, Narcy, Marolles, Morteau.
- 307. sphaeroideum**, Forbes, 1844, Quarterly Journal, 1, p. 243, pl. 2, fig. 8. Angl., Culver, Hythe, Sandgate.
- UNICARDIUM**, d'Orb., 1847, Voy. t. 1, p. 218.
- \***308. inornatum**, d'Orb., 1847, *Cardium inornatum*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 24, pl. 256, fig. 3-6. France, Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne).
- ISOCARDIA**, Lam., 1799, Voy. t. 1, p. 132.
- \***309. Neocomiensis**, d'Orb., 1843, Pal. franç., 3, p. 44, pl. 250, fig. 9-11. France, Auxerre (Yonne), Brillon (H.-Marne), Vandœuvre.
- UNIO**, Retzius, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 126.
- 310. porrectus**, Sow., 1828, M. C., 6, p. 189, pl. 594, fig. 1. *U. Mantellii*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 179, pl. 21, fig. 14. Angl., Tilgate, Kent, Surrey, Sussex.
- \***311. compressus**, Sow., 1828, Min. Conch., 6, p. 189, pl. 594, fig. 2. *U. Martinii*, Sow., 1836, *id.*, 4, p. 179, pl. 21, fig. 17. Peut-être *Unio Waldensis*, Mantell, 1846, Lond. geol. Journ., 1, pl. 14. Angleterre, Kent, Surrey, Sussex, Ile de Wight, Tilgate.
- 312. antiquus**, Sow., 1828, M. C., 6, p. 189, pl. 594, fig. 3, 4, 5. Tilgate.
- 313. cordiformis**, Sow., 1828, 6, p. 191, pl. 595, fig. 1. Tilgate.
- 314. aduncus**, Sow., 1826, *id.*, 6, p. 191, pl. 595, fig. 2. Tilgate.
- 315. subtruncatus**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 21, fig. 15. Angl., Kent, Surrey, Sussex.
- 316. Gualtierii**, Sow., 1836, *id.*, 4, p. 179, pl. 21, fig. 16. Kent, Surrey, Sussex.
- ISOARCA**, Münster, 1843.
- \***317. Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*Isoarca dequasata*, mais bien plus large à l'extrémité anale. France, Jabron.
- MUCULA**, Lam., 1801, Voy. t. 1, p. 12.
- \***318. planata**, Desh., 1842. *N. obtusa*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 163, pl. 300, fig. 1-5 (non *N. obtusa*, Sow., 1836). France, St-Sauveur, Marolles, Vassy, Auxerre.
- \***319. Cornucliana**, d'Orb., 1847. *N. impressa*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 165, pl. 300, fig. 6-10 (non *impressa*, Sow., 1824). France, Vassy, Marolles, Auxerre.
- \***320. simplex**, Deshayes, 1842, D'Orb., Paléont. franç., 3, p. 166, pl. 300, fig. 11-15. France, Saint-Sauveur, Marolles, Auxerre.

**321. subtriangulata**, Koch, 1837, Beitr., p. 50, pl. 6, fig. 1. *N. subtrigona*, Rømer, 1841, Nord. Kreid., p. 68, pl. 8, fig. 25. Allem., Delligsen, Elligser-Brinke.

**PECTUNCULUS**, Lam., 1801. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 186.

**\*322. Marullensis**, Leym., 1842. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 187, pl. 306, fig. 1-6. Bettancourt-la-Ferrée, Marolles.

**ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.

**\*323. Carteroni**, d'Orb., 1843, Paléont. fr., Terr. crét., 3, p. 202, pl. 309, fig. 4-8. France, Marolles, Renaud-du-Mont.

**\*324. consobrina**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 209, pl. 311, fig. 4-7. Marolles.

**325. Dupiniana**, d'Orb., 1843, *id.*, 3, p. 207, pl. 310, fig. 9, 10. Marolles.

**\*326. Gabriellis**, d'Orb., 1843. *Cucullea id.*, Leym., 1842. D'Orb., Paléont. franç., 3, p. 198, pl. 308. *Cucullea tumida*, Mathéron (non d'Archiac). *Cucullea dilatata*, d'Orb., 1842 (Colombie). Bettancourt, Brousseval, Brillon, Auxerre, Russey, Lattes (Var); Anglet, île de Wight; Colombie, Nouvelle-Grenade, Zapatore, Rio Sube (Socorro).

**\*327. Marullensis**, d'Orb., 1843, 3, p. 205, pl. 310, fig. 3-5. Marolles, Auxerre.

**\*328. Neocomiensis**, d'Orb., 1843, 3, p. 206, pl. 310, fig. 6-8. Marolles.

**\*329. Moreana**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 200, pl. 309, fig. 1-3. France, Brillon, Bettancourt, Brousseval, Marolles.

**\*330. Baulini**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 204, pl. 310, fig. 1, 2. Marolles, Saint-Sauveur, Renaud-du-Mont; île de Wight.

**\*331. Robinaldina**, d'Orb., 1843, 3, p. 208, pl. 310, fig. 11-12. Marolles.

**\*332. securis**, d'Orb., 1843, 3, p. 203, pl. 309, fig. 9, 10. Vallereuil, Marolles.

**\*333. Cornuelliiana**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 208, pl. 311, fig. 1-3. France, Vassy, Marolles, Auxerre, Morteau.

**334. cor**, d'Orb., 1847. *Cucullæa cor*, Mathéron, 1842, Cat., p. 160, pl. 19, fig. 3. France, Allauch (Bouches-du-Rhône).

**335. Astieriana**, Mathéron, 1843, Cat., p. 162, pl. 21, fig. 1, 2. Lattes (Var).

**1336. Schusteri**, d'Orb., 1847. *Cucullæa Schusteri*, Rømer, 1841, Nordd. Kreid., p. 70, n° 1, pl. 9, fig. 3. Hanovre, Bredenbeck.

**MYOCONCHA**, Sow., 1824. Voy. t. 1, p. 165.

**\*336. Neocomiensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. crassa*, dont nous ne connaissons que le moule intérieur. France, Nantua.

**PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.

**\*337. Robinaldina**, d'Orb., 1844, Paléont. fr., 3, p. 251, pl. 330, fig. 1-3. France, Auxerre, Marolles; Angl., île de Wight.

**\*338. sulcifera**, Leymerie, 1842. D'Orb., Paléont. franç., 3, p. 250, pl. 329. Fr., Vassy (Haute-Marne), Auxerre (Yonne), Sault (Var), près d'Orgon (Bouches-du-Rhône).

**339. subrugosa**, d'Orb., 1847. *P. rugosa*, Rømer, 1841, Kreid., p. 65, n° 6; Oolith., pl. 18, fig. 37 (non Sow., 1835). Osterwald



**MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.

**140. æqualis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 265, pl. 337, fig. 3, 4. France, Saint-Sauveur, Marolles, Gréoux.

**141. Carteroni**, d'Orb., 1844, 3, p. 266, pl. 337, fig. 5, 6. Russey.

**142. Cornuëllianus**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 268, pl. 337, fig. 10-13. Fr., Vaux-sur-Blaise, Marolles, Auxerre.

**143. Fittoni**, d'Orb., 1847. *M. reversus*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 264, pl. 337, fig. 1, 2 (non *M. reversus*, Sow., 1836). Fr., Auxerre, Marolles.

**144. sublineatus**, d'Orb., 1847. *M. lineatus*, d'Orb., 1844, Pal., franç., Terr. crét., 3, p. 266, pl. 337, fig. 7-9 (non Gmelin, 1789). Fr., Marolles, Narcy.

**145. Matronensis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 269, pl. 337, fig. 14-16. France, Bettancourt; Hanovre.

**146. subsimplex**, d'Orb., 1847. *M. simplex*, 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 269, pl. 338, fig. 1-3 (non DeFrance, 1824). France, Vassy, Saint-Sauveur, Auxerre.

**147. pulcherrimus**, d'Orb., 1847. *Modiola pulcherrima*, Römer, Nordd. Kreid., p. 66, n° 1, pl. 4, fig. 14. Elligser, Bredenbeck.

**148. Couloni**, Marcou (manuscrit). Belle espèce voisine du *M. pectinatus* de l'étage oxfordien, mais plus anguleuse. France, Censeau.

**149. subangustus**, d'Orb., 1847. *Modiola angusta*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 66, n° 2; Ool., pl. 18, fig. 36 (non Deshayes, 1824). Hanovre, Schöppenstedt.

**150. subrugosus**, d'Orb., 1847. *Modiola rugosa*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 67, n° 4; Ool., pl. 5, fig. 10. Hanovre, Elligser.

**151. Lyellii**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 178, pl. 21, fig. 18. Angl., Kent, Surrey, Sussex, Oxfordshire (Weald.).

**152. densesulcatus**, d'Orb., 1847. Belle espèce à sillons profonds partout, avec des tubercules entre. France, Soullaines (Aube).

**LITHODOMUS**, Cuv., 1817. D'Orb., Paléont. franç., 3, p. 287.

**154. amygdaloïdes**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 290, pl. 344, fig. 7-9. Bettancourt, Baudrecourt, Saint-Sauveur.

**155. Archiacii**, d'Orb., 1844, 3, p. 290, pl. 344, fig. 11-12. Bettancourt, St-Sauveur.

**156. oblongus**, d'Orb., 1844, Paléont. fr., Terr. crét., 3, p. 289, pl. 344, fig. 4-6. France, St-Sauveur, Auxerre, Vaux-sur-Blaise.

**157. prælongus**, d'Orb., 1844, 3, p. 289, pl. 344, fig. 1-3. Brienne.

**LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.

**158. Carteroniana**, d'Orb., 1845, Paléont. fr., 3, p. 525, p. 414, fig. 1-4. France, Auxerre, Saint-Sauveur, Saint-Dizier, Vassy, Baudrecourt, Russey, Lattes.

**159. Dupiniana**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 535, pl. 415, fig. 18-22. France, Marolles, Saint-Sauveur.

**160. expansa**, Forbes, 1844. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 533, pl. 415, fig. 9-12. France, Morteau, Auxerre; Anglet.

**161. longa**, Römer, 1841. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 529, pl. 414, fig. 13-16. Hanovre, Elligser.

**162. Neocomiensis**, d'Orb., 1845, 3, p. 536, pl. 417, fig. 1, 2, 7, 8. Morteau.

- \***363. Robinaldina**, d'Orb., 1845, 3, p. 531, pl. 415, fig. 5-8. St-Sauveur, Brienne.
- \***364. Tombekiana**, d'Orb., 1845, Paléont. fr., 3, p. 534, pl. 415, fig. 13-17. France, Auxerre, Saint-Sauveur, Morteau, Marolles, Bettancourt, Vassy; Suisse, Neuchâtel; Savoie, Cluse.
- \***365. undata**, d'Orb., 1845, Paléont. fr., 3, p. 528, pl. 414, fig. 9-12. France, Auxerre, Saint-Sauveur, Saint-Dizier, Brienne.
- \***366. Boyeriana**, d'Orb., 1845, 3, p. 527, pl. 414, fig. 5-8. Morteau, Saint-Dizier.
- \***367. Moreana**, d'Orb., 1845, 3, pl. 6-10, fig. 416. France, Saint-Dizier.
- \***368. stricta**, Rœm., 1841, Kreid., p. 56, n. 7; Oolit., pl. 13, fig. 17. Allem., Elligser.
- \***369. subrigida**, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 57, n° 15; Ool., pl. 13, fig. 16. Allem., Elligser.
- \***370. plana**, Rœm., 1841, Nordd. Kreid., p. 57, n° 16; Ool., pl. 13, fig. 18. Peut-être *longa*, Rœmer. Elligser.
- \***371. Fittoni**, d'Orb., 1847. *L. semisulcata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., p. 129, pl. 11, fig. 10 (non Nilsson, 1818). Anglet., Folkstone.
- \***372. Massiliensis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 182, pl. 29, fig. 1, 2. France, Marseille, près de la tour des Catalans.
- \***373. Gallo-provincialis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 182, pl. 29, fig. 5. France, Allauch (Bouches-du-Rhône).
- AVICULA**, Klein, 1753. Voy. vol. 1, p. 13.
- \***374. Carteroni**, d'Orb., 1845. Paléont. franç., 3, p. 472, pl. 290. France, Renaud-du-Mont, Maisons-sous-les-Écorces, Auxerre, St-Sauveur.
- \***375. Cottaldina**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 470, pl. 389, fig. 1, 2. France, Auxerre, Brillon.
- \***376. Cornucliana**, d'Orb., 1845, 3, p. 471, pl. 389, fig. 3, 4. St-Dizier.
- \***377. pectinata**, Sow., 1836; d'Orb., 3, p. 473, pl. 391, fig. 1-3. St-Dizier.
- \***378. Allaudiensis**, Mathéron, 1843, Catal., p. 175, pl. 26, fig. 1. France, Allauch (Bouches-du-Rhône).
- GERVILIA**, Defrance, 1820. Voy. vol. 1, p. 201.
- \***379. anceps**, Desh., 1842, d'Orb., Paléont., 3, p. 482, pl. 394. France, Brillon, Seignelay, Auxerre, St-Sauveur, Vandœuvre, Marolles, Renaud-du-Mont; île de Wight à Atherfield, Pullborough.
- \***380. alaeformis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., 3, p. 484, pl. 395. France, Seignelay; Angl., île de Wight à Atherfield, Pullborough.
- PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 176.
- \***381. Muletii**, Desh., 1842. D'Orb., Paléont., franç., 3, p. 496, pl. 400, 401, fig. 1-3. France, Vandœuvre, Marolles, St-Sauveur, Auxerre, Trémilly, Renaud-du-Mont; Anglet., Peasemars, Reigate, Atherfield, île de Wight.
- \***382. Ricordeana**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 494, pl. 399, fig. 1-3. Seignelay.
- INOCERAMUS**, Parkinson, 1811. Voy. vol. 1, p. 237.

- '383. Neocomiensis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., 3, p. 503, pl. 403, fig. 1, 2. Bettancourt, St-Sauveur, Mont-de-Marsan; Cluse. **PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. vol. 1, p. 87.
- '384. Archiacianus**, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 583, pl. 429, fig. 7-10. Auxerre.
- '385. Carteronianus**, d'Orb., 1846. Pal., 3, p. 589, pl. 431, fig. 5, 6. Russey, Bettancourt.
- '386. Coquandianus**, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 591, pl. 432, fig. 1-3. Antibes.
- '387. Cottaldinus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 590, pl. 431, fig. 7-11. France, Auxerre, Vandœuvre, Renaud-du-Mont, Wassy, St-Dizier.
- '388. crassitesta**, Römer, 1839; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 584, pl. 430, fig. 1-3. France, Gatère, Renaud-du-Mont.
- '389. Goldfussii**, Desh., 1842, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 582, pl. 429, fig. 1-6. France, St-Dizier, Auxerre, St-Sauveur.
- '390. Robinaldinus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 587, pl. 431, fig. 1-4. France, St-Sauveur, Auxerre, Renaud-du-Mont, Vallerets, St-Dizier, Brillon, Gréoux.
- '391. striato-punctatus**, Römer, 1841. Hanovre, Elligser.
- '392. Astierianus**, d'Orb., 1847. Grande espèce, presque aussi large que haute, à côtes inégales alternes. France, environs de Castellanne (B.-Alpes), St-Auban (Var).
- '393. lineato-costatus**, Römer, 1841, p. 55, n° 39; Ool., pl. 18, fig. 27. Schoendelahe.
- HIMNITES**, DeFrance, 1821.
- '394. Leymerii**, Deshayes. *Pecten Leymerii*, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 581, pl. 428. France, St-Dizier, Renaud-du-Mont, Maillat, près de Nantua (Ain).
- JANIRA**, Schumacher, 1847. *Neithea*, Drouot, 1824; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 623.
- '395. atava**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 627, pl. 442, fig. 1-3. France, Marolles, Brienne, Auxerre, Renaud-du-Mont, Dampierre, Sancerre, Bettancourt, Géovreissiat (Ain).
- '396. Neocomiensis**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 629, pl. 442, fig. 4-9. St-Dizier, Bettancourt, Russey, Cerneux, St-Sauveur, Vandœuvre (Aube), Perte-du-Rhône (Ain); Suisse, Neuchâtel.
- SPONDYLUS**, Gessner, Linné, 1758, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 652.
- '397. Römeri**, Deshayes, 1842. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 655, pl. 451, fig. 1-6. Bettancourt, Auxerre, Vandœuvre.
- '398. striato-costatus**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 655, pl. 450. Allauch.
- FLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 1, p. 202.
- '399. asperima**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 679, pl. 462, fig. 1-4. France, Auxerre, Vassy; Suisse, Neuchâtel.
- '400. Carteroniana**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 680, pl. 462, fig. 5-7. France, Maisons-près-les-Écorces.
- '401. Römeri**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 681, pl. 462, fig. 8-10. Auxerre.

- \***402. placunea**, Lam., 1819, d'Orb., Paléont. franç., Ter. crét., 3, p. 682, pl. 462, fig. 11-12. France, Auxerre, Bettancourt, La Clape; Narbonne (Ain).
- 403. imbricata**, Koch, 1837, Beitr., p. 50, pl. 6, fig. 3. Elligser.
- OSTREA**, Linné, 1752. Voy. vol. 1, p. 166.
- \***404. Boussingaultii**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., 3, p. 702, pl. 468. *Os tuberculifera*, Kock, 1840. (Monstruosité due au corps sur lequel elle s'est fixée.) France, partout; Colombie.
- \***405. Couloni**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 693, pl. 466, 467, fig. 1-3. France, Vandœuvre, Bettancourt, Vassy, Génégal, Auxerre, Renaud-du-Mont, Trigrance, Mazac; Savoie, Chambéry; Suisse, Neuchâtel; Hanovre, Elligser.
- \***406. macroptera**, Sow., 1824, d'Orb., Paléont. franç., 3, p. 695, pl. 465. *O. gregaria*, Kock, pl. 6, fig. 8. (Non Sowerby). France, Trigrance, Sault, Génégal, St-Dizier, Vassy, Russey, Maisons-sous-les-Ecorces, Renaud-du-Mont, Jeannerot, Géoivreissiat, Maillat, près de Nantua (Ain); Hanovre, Schœndelahe, Vahlberg.
- \***407. Tombeckiana**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., 3, p. 701, pl. 467, fig. 4-6. France, Bettancourt, Vassy, Morteau; Hanovre, Elligser-Brinke, Schœndelahe, Schöppenstedt.
- \***408. bulla**, d'Orb., 1847. *O. distorta*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 229, pl. 22, fig. 21. *Exogyra bulla*, Sow. ? in Fitton, pl. 2, fig. 1. Anglet., Dorsetshire, Durtstone, Bay-Wardour (Veald.).
- \***409. Neocomiensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce, ornée de trois ou quatre grosses côtes ondulées, rayonnantes, irrégulières. Nantua.
- ANOMYA**, Linné, 1758.
- \***410. lævigata**, Sow., 1836; d'Orb., Paléont. franç., Ter. crét., 3, p. 1, pl. 489. France, Bettancourt; Anglet., île de Wight.
- \***411. Neocomiensis**, d'Orb., 1847, Paléont., 3, pl. 489. Castellanne.
- 412. pseudo-radiata**, d'Orb., 1847. *A. radiata*. Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, pl. 14, fig. 5 (non Risso, 1826). Anglet., île de Wight.
- \***413. costulata**, Rœmer, 1841, p. 49, n° 1. Ool., pl. 18, fig. 5. Schöppenstedt.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**LINGULA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 14.

**414. ovalis**, Sow., 1813, M. C., 1, p. 55, pl. 19, fig. 4. Sandgate.

**415. truncata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 129, pl. 14, fig. 15. Anglet., Folkstone, près Hythe.

**BYNCHONELLA**, Fischer, 1825. Voy. vol. 1, p. 92.

\***416. depressa**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., 4, p. 18, pl. 491, fig. 1-7. France, Vassy (H.-Marne), Marolles (Aube), Auxerre (Yonne), Escragnoles (Var), Brillon (Meuse), Éoux (B.-Alpes), Censeau (Jura), Grenoble; Hanovre, Elligser-Brinke.

\***417. lata**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 491, fig. 8-17, avec l'espèce précédente. Géoivreissiat, près de Nantua.

\***418. peregrina**, d'Orb., 1847, 4, p. 14, pl. 493. Châtillon (Drôme).

- \***419. Agassizii**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, p. 17, pl. 494, fig. 1-5. *R. paucicosta*, d'Orb. (non *Terebratula paucicosta*, Römer) ?? Suisse, Neuchâtel.
- \***420. Moutoniana**, d'Orb., 1847, 4, p. 15, pl. 494, fig. 16-19. Escagnolles (Var).
- \***421. Guerinii**, d'Orb., 1847, 4, p. 17, pl. 500, fig. 5-8. Cheiron.
- TEREBRATULINA**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Ter. crét., 4.
- \***422. biauriculata**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Ter. crét., 4, pl. 502, fig. 3-7 (non *T. auriculata*, Römer, 1842). France, La Couronne (B.-du-Rhône).
- TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. vol. 1, p. 43.
- \***423. Tamarindus**, Sow., 1836; d'Orb., Paléont. franç., 4, pl. 505, fig. 1-10. France, Auxerre, Bettancourt, Vassy, St-Dizier, Marolles, Morteau; Angl., Ile de Wight; Hanovre, Osterwald; Géovreissiat, Maillat, près de Nantua (Ain).
- \***424. pseudo-jurensis**, Leym., 1842, d'Orb., Paléont., 4, pl. 505, fig. 11-16. France, Auxerre, St-Dizier, Bettancourt, Morteau, Marolles; Suisse, Neuchâtel; Géovreissiat, Maillat, près de Nantua (Ain).
- \***425. praelonga**, Sow., 1836, d'Orb., Paléont., 4, p. 506, fig. 1-7. France, Baudrecourt, Bettancourt, Morteau, Auxerre, Castellanne, Marolles, Censeau, Brillon; Suisse, Neuchâtel; Angl., Sandgate; Hanovre, Osterwald.
- \***426. faba**, Sow., 1836, d'Orb., Paléont., 4, p. 506, fig. 8-12. St-Dizier; Angl., Ile de Wight, Folkstone; Hanovre, Osterwald.
- \***427. Moreana**, d'Orb., 1847, 4, pl. 506, fig. 13-16. Brillon, Morteau.
- \***428. Carteroniana**, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 507, fig. 1-5. Morteau.
- \***429. Collinaria**, d'Orb., 1847, 4, pl. 507, fig. 6-10. Morteau, Marolles.
- \***430. Marcousana**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Ter. crét., 4, pl. 507, fig. 11-14. France, Noseroy, Morteau, Castellanne.
- \***431. semistriata**, DeFrance, 1828. D'Orb., Paléont., 4, pl. 508, fig. 1-11. France, Vassy, St-Dizier, Marolles, Auxerre, Billeul, près de Noseroy; Suisse, Neuchâtel.
- \***432. hippopus**, Römer, 1841. D'Orb., Paléont. franç., Ter. crét., 4, pl. 508. France, Fontanil (Isère).
- TEREBRATELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 222.
- \***433. reticulata**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Ter. crét., 4, pl. 515, fig. 1-6. France, St-Dizier, Vassy; Hanovre, Berklengen.
- \***434. oblonga**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 515, fig. 7-19. France, St-Dizier, Vassy, Marolles; Angl., Hythe, Lockswell; Hanovre, Elligser-Brinke.
- \***435. Neocomiensis**, d'Orb., 1847, 4, pl. 516, fig. 1-5. Bettancourt.
- \***436. quadrata**, d'Orb., 1847. *Terebratula quadrata*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 130, pl. 14, fig. 9. Angleterre, Folkstone, près d'Hythe.
- TEREBRIOSTRA**, d'Orb., 1847, Pal. franç., Ter. crét., 4.
- \***437. Neocomiensis**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Ter. crét., 4, pl. 519, fig. 1-5. France, aux Écorces, près de Morteau, Peyroulles.

**CRANIA**, Retzius, 1781. Voy. t. 1, p. 21.

?**438. hexagona**, Rœmer, 1840, p. 36, n° 1, Ool., pl. 18, fig. 2. Schöppenstedt.

?**439. marginata**, Rœmer, 1840, p. 36, n° 2, Ool., pl. 18, fig. 3. Schöppenstedt.

**450. irregularis**, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 36, n° 4, Ool., pl. 9, fig. 20, 21, et pl. 18, fig. 1. Allem., Elligser, Schöppenstedt.

**THECIDEA**, Defrance, 1828.

**451. tetragona**, Rœmer, 1839. D'Orb., Paléont. franç., Ter. crét., pl. 522, fig. 1-6. France, Vassy; Allem., Hanovre, Schöppenstedt.

### MOLLUSQUES BRYOZOAIRE.

**HEMICELLARIA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Vincularia*, qui n'ont de cellules que d'un côté.

\***452. ramosa**, d'Orb., 1847. Jolie espèce en buisson, dont les branches sont courtes et dichotomes, les cellules en quinconce. France, St-Dizier (H.-Marne).

**ALECTO**, Lamouroux, 1821.

\***453. incrassata**, d'Orb., 1847. Jolie espèce à cellules larges épatées en rameaux dichotomes. France, Vassy (H.-Marne).

\***453'. granulata**, Edwards, Ann. des Sc. nat., 7, pl. 16, fig. 3. Vassy, Les Saints en Puisaye.

**IDMONEA**, Lamouroux, 1821.

\***454. divaricata**, d'Orb., 1847. *Aulopora divaricata*, Rœmer, 1840. Nordd. Kreid., p. 18, Oolith., pl. 17, fig. 3. Schœndelahe, Allem.

\***455. ziczac**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules peu distinctes sur trois ou quatre de front, formant des branches en zigzag. Vassy.

?**456. crassa**, d'Orb., 1847. *Aulopora crassa*, Rœmer, 1840, Kreid., p. 18, Oolith., pl. 17, fig. 5. Allem., Schöppenstedt.

**DEFRANCIA**, Rœmer, 1840.

**457. stellata**, Rœmer, 1840, Kreid., p. 20. *Ceripora stellata*, Koch, 1837, Beitr., p. 55, pl. 6, fig. 12. Allem., Elligser-Brinke.

**DIASTOPORA**, Lamouroux, 1821.

?**458. flabelliformis**, d'Orb., 1847. *Rosacella flabelliformis*, Rœmer, 1840, Kreid., p. 19, n° 4, Oolith., pl. 17, fig. 4. Hanovre, Schöppenstedt.

?**459. polystoma**, d'Orb., 1847. *Aulopora polystoma*, Rœmer, 1840, Kreid., p. 19, n° 3, Ool., pl. 17, fig. 6. Hanovre, Schöppenstedt.

\***460. gracilis**, Edwards, 1838, Ann. des Sc. nat., 2<sup>e</sup> série, pl. 14, fig. 2. Espèce à cellules très-petites, saillantes, formant des plaques arrondies, encroûtantes. France, Vassy, Fontenoy.

\***460'. tubulosa**, d'Orb., 1849. Espèce encroûtante, à cellules saillantes, dont l'ensemble s'élève souvent en tubes saillants. France, Fontenoy (Yonne).

\***460". megapora**, d'Orb., 1849. Espèce encroûtante, à cellules trois fois plus grandes que chez les espèces précédentes. Fontenoy (sur une *Synastrea*).

**TUBULIPORA**, Lamarck, 1816.

'461. *fascicularis*, d'Orb., 1847. Cellules par groupes, saillantes à la surface d'un ensemble encroûtant. France, Vassy.

**ASPENDESIA**, Lamouroux, 1821.

'461'. *Neocomiensis*, d'Orb., 1849. Espèce dont les crêtes forment des méandres irréguliers. Fontenoy.

**INTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.

'461". *Neocomiensis*, d'Orb., 1849. Espèce à grosses tiges dichotomes inégales. Fontenoy.

'461"'a. *Icaunensis*, d'Orb., 1849. Espèce à tiges très-grêles, pourvue d'un petit nombre de cellules. Fontenoy.

**CHRYSAORA**, Lamouroux, 1821.

'462. *irregularis*, d'Orb., 1847. Espèce pourvue de pointes irrégulières, mais dont les saillies sont à peine lisses. France, St-Dizier, Fontenoy.

**ZONOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. Revue zoologique, 1849.

'462'. *ramosa*, d'Orb., 1847. *Heteropora ramosa*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 24, n° 4, Oolith., pl. 17, fig. 17. France, St-Sauveur, Fontenoy (Yonne); Hanovre, Schöppenstedt.

'462". *Cottaldina*, d'Orb., 1849. Espèce à rameaux grêles dichotomes d'un tiers plus étroit que chez le précédent, à zone porifère saillante. France, Fontenoy.

'462"'b. *irregularis*, d'Orb., 1849. Espèce à tiges anastomosées, à zones très-peu régulières. Fontenoy.

**ACANTHOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 318.

'463. *Neocomiensis*, d'Orb., 1847. Espèce à pores peu visibles, formant des encroûtements tuberculés. France, Vassy.

'463'. *Icaunensis*, d'Orb., 1849. Espèce rameuse, à branches irrégulièrement dichotomes. Fontenoy.

## ÉCHINODERMES.

**DYASTER**, Agassiz.

'464. *ovulum*, Agass., 1847, Cat., p. 139. Desor, Monogr. des Dyasters, p. 22, pl. 3, fig. 5-8. Suisse, la Chaux-de-Fonds; France, Censeau (Jura), Fontanil, près de Grenoble (Isère).

'465. *anasteroides*, Leym., Agass., 1847, Cat., p. 138. France, Les Lattes, Martigues, Castellanne, Escragnolles, La Martre (Var), Vérou, près Grenoble.

**SOLASTER**, Agassiz.

'466. *L'Hardii*, Dubois, Voy. au Cauc., pl. 1, fig. 8-10. Agassiz, 1847, Cat., p. 133. France, Morteau (Doubs), Auxerre (Yonne), Vandœuvre (Aube), St-Dizier, Vassy, Bettancourt (H.-Marne), Nozeroy (Jura), Fontanil, près de Grenoble; Suisse, Neuchâtel.

'467. *cordatus*, Dubois, Voy. au Cauc., pl. 1, fig. 2-4; Agassiz, 1847, Cat., p. 134. Crimée.

**TOXASTER**, Agassiz.

'468. *gibbus*, Agass., 1847, Cat., p. 132. France, Castellanne (B.-Alpes), Escragnolles, Caussols (Var), Les Martigues (Bouches-du-Rhône), Montagne de Vérou, près de Grenoble (Isère).

'469. *Verrouy*, E. Sism., Mém. Echin. Foss. Nizza, p. 16, pl. 1.

- fig. 4, 5. Agass., 1847, Cat., p. 132. Sardaigne, Castiglione, près de Nice; France, La Pélagère, près d'Orgon (Bouch.-du-Rhône).
- \***470. complanatus**, Agass., 1847, Cat., p. 131. *Holaster complanatus*, Agass., Foss. crét., Jura, Neuch. Mém. Soc. Neuch., 1, p. 128, pl. 14, fig. 1. France, Chaource, Thieffrain (Aube), Morteau, Le Russey (Doubs), Nozeroy (Jura), Auxerre, St-Georges (Yonne), Dampierre, Vandeuvre (Aube), St-Dizier (H.-Marne), Les Angles (Var), Grenoble (Isère), Berrias, Le Theil (Ardèche), La Cluze, Narbonne (Aude), Vedènes, Castellanne, Barrême (B.-Alpes); Angl., Wiltshire; Hills (Hanovre).
- \***471. Couloni**, Agass., 1847, Cat., p. 132. *Holaster Couloni*, Agass., Echin. Suisse, 1, p. 22, pl. 4, fig. 9, 10. Suisse, Lasarraz, Mormont (Vaud); Savoie, St-Jean de Couz, près Chambéry; France, Morteau.
- PYGURUS**, Agassiz.
- 472. Montmollini**, Agass., 1847, Cat., p. 104, Echin. Suisse, 1, p. 69, pl. 11, fig. 1-3. Envir. de Neuchâtel; Savoie, envir. d'Aix.
- \***473. rostratus**, Agass., 1847, Cat., p. 104, Echin. Suisse, p. 71, pl. 9, fig. 4-6. France, Metabief (Doubs), Boucherans (Jura), Auxerre, St-Sauveur (Yonne).
- 474. productus**, Agass., 1847, Cat., p. 103. *Echinolampas productus*, Agass., Foss. crét. in Mém. Soc. Neuch., 1, p. 135, Echin. Suisse, 1, p. 72, pl. 13 bis, fig. 3, 4. Mormont, près Lasarraz; Suisse, Chaux-de-Fonds.
- \***475. minor**, Agass., 1847, Cat., p. 105. *Pygorhynchus minor*, Agass., Echin. Suisse, 1, p. 56, pl. 8, fig. 15-17. France, St-Sauveur (Yonne); Suisse, Mormont, près Lasarraz (Vaud), Neuchâtel.
- 476. obovatus**, Agass., 1847, Cat., p. 105. *Pygorhynchus obovatus*, Agass., Echin. Suisse, 1, p. 55, pl. 8, fig. 18-20. Suisse, Mormont, près Lasarraz (cant. de Vaud).
- PYGAULUS**, Agassiz.
- \***477. cylindricus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 101. France, Sassenage, près de Grenoble (Isère).
- NUCLEOLITES**, Lamarck.
- \***478. Nicoleti**, Agass., 1847, Cat., p. 97. *Nucleolites lacunorus*, Agass., Foss. crét. in Mém. Soc. Neuch., 1, p. 132. Echin. Suisse, 1, p. 40, pl. 7, fig. 4-6. France, Subligny, Martigues-les-Angles, Fontanil (Isère), Censeau (Jura); Suisse, Neuchâtel, Salève.
- 479. subquadratus**, Agass., 1847, Cat., p. 96, Echin. Suisse, 1, p. 41, pl. 7, fig. 1-3. France, Doubs, Nozeroy (Jura); Suisse, Chaud-de-Fonds, Ste-Croix (Vaud).
- \***480. Olfersii**, Agass., 1847, Cat., p. 97, Echin. Suisse, 1, p. 42, pl. 7, fig. 7-9. France, Dampierre (Nièvre), Leugny (Yonne), Chancénay (H.-Marne), Marolles (Aube), Subligny, Nozeroy (Jura); Suisse, Neuchâtel.
- \***481. Neocomiensis**, Agass., 1847, Cat., p. 98. *Catopygus neocomiensis*, Agass., Echin. Suisse, 1, p. 53, pl. 8, fig. 12-14. France, St-Sauveur en Puisaye (Yonne), Fontanil, près Grenoble (Isère), Auxerre (Yonne); Suisse (Neuchâtel), Douanne (Berne), Salève.
- \***482. Gresslyi**, Agass., 1847, Cat., p. 98. *Catopygus Gresslyi*, Agass.,



Echin. Suisse, 1, p. 49, pl. 8, fig. 1-3. France, Bettancourt (Haute-Marne); Suisse, Hauterive (Neuchâtel).

- 483. *Alpinus***, Agass., 1847, Cat., p. 98. *Catopygus Alpinus*, Agass., Echin. Suisse, 1, p. 52, pl. 8, fig. 10, 11. Suisse, Salève, Rautispitz, près de Nœfels.

**PYRINA**, Agassiz.

- \*484. *pygma***, Desor, Monogr. des Galér., p. 29, pl. 5, fig. 27-31. Agass., 1847, Cat., p. 92. Suisse, Neuchâtel, Salève, Censeau (Jura), St-Dizier; Hanovre, Hills.

**HOLECTYPUS**, Agassiz.

- \*485. *macropygus***, Desor, Monogr. des Galér., p. 73, pl. 7, fig. 8-11. Agass., 1847, Cat., p. 88. France, Dampierre (Nièvre), Le Theil (Ardèche), Fontanil (Isère), Bettancourt (H.-Marne), Nozeroy (Jura), Auxerre, St-Sauveur (Yonne); Suisse, Salève, Wolfenbuttel.

**ECHINUS**, Linné.

- 486. *fallax***, Agass., 1847, Cat. syst., p. 65, Echin. Suisse, 2, p. 86, pl. 22, fig. 7-9. France, Doubs.

**ARRACIA**, Gray.

- 487. *depressa***, Agass., 1847, Cat. syst., p. 51. Suisse, Neuchâtel.

- 488. *Pylos***, Agass., 1847, Cat. syst., p. 52. Suisse, Neuchâtel.

**DIADEMA**, Gray.

- \*489. *rotulare***, Agass., [1847, Cat., p. 42, Foss. crét. in Mém. Soc. Neuch., 1, p. 139, pl. 14, fig. 10-12. France, Mouthe (Doubs), Auxerre (Yonne), Censeau, Nozeroy (Jura); Suisse, Neuchâtel, Salève.

- \*490. *Bourgueti***, Agass., 1847, Cat., p. 42. *Diadema ornatum*, Agass., Foss. crét. in Mém. Soc. Neuch., 1, p. 139, Echin. Suisse, 2, p. 6, pl. 16, fig. 6-10. France, Auxerre (Yonne); Suisse, Neuchâtel; Morteau (Doubs), Censeau (Jura), Thieffrain (Aube).

- 491. *macrostoma***, Agass., 1847, Cat., p. 43, Echin. Suisse, 2, p. 10, pl. 16, fig. 22-26. France, Censeau (Jura); La Chaux-de-Fonds.

- \*492. *Grasii***, Desor. Agass., 1847, Cat. syst., p. 45. France, Fontanil, près Grenoble (Isère).

- \*493. *Picteti***, Desor. Agass., 1847, Cat. syst., p. 46. France, Censeau (Jura), St-Sauveur (Yonne).

**CONIOPYGUS**, Agassiz.

- 494. *peltatus***, Agass., 1847, Cat. syst., p. 40, Monogr. des Salén., p. 20, pl. 3, fig. 9-18. Suisse, env. de Neuchâtel.

**PELTASTES**, Agassiz.

- \*495. *stellulata***, Agass., 1847, Cat. syst., p. 35. *Salenia stellulata*, Agass., Monogr. des Salén., p. 13, pl. 2, fig. 25-32. France, Auxerre (Yonne); Suisse, La Chaux-de-Fonds; Angl., Wiltshire.

- 496. *punctata***, Desor., Agass., 1847, Cat. syst., p. 38. *Salenia areolata*, Agass., Monogr. des Salén., p. 16, pl. 3, fig. 1-8. Suisse, Hauterive, près Neuchâtel, Du Roc; France, Censeau (Jura).

**SALENIA**, Gray.

- \*497. *folium-querci***, Desor., Agass., 1847, Cat. syst., p. 38. Billecul (Jura).

**HEMIOIDARIS**, Agassiz.

- \*498. *patella***, Agass., 1847, Cat. syst., p. 35. Echin. Suisse, 2,

p. 53, pl. 18, fig. 15-18. France, Fontanil, près Grenoble (Isère); Suisse, Chaux-de-Fonds (Neuchâtel).

**CIDARIS**, Lamarck.

\*499. *clunifera*, Agass., Foss. crét. in Mém. Soc. Neuch., 1, p. 142, pl. 14, fig. 16-18. Agass., 1847, Cat. syst., p. 25. France, St-Sauveur (Yonne), Les Lattes, St-Auban (Var); Suisse, Neuchâtel.

\*199. *Neocomiensis*, Marcou, Agass., 1847, Cat. syst., p. 25. Censeau.

\*500. *hirsuta*, Marcou, Agass., 1847, Cat., p. 24. Censeau, St-Dizier.

\*501. *cydonifera*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 25. St-Auban (Var).

\*502. *punctatissima*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 26. Escragnolles (Var).

\*503. *punctata*, Roemer. *C. vesiculosa*, Agass. (non Goldf.), Ech. de Suisse, 2, p. 66, pl. 21, fig. 14-19. *C. variabilis*, Kock. France, Auxerre (Yonne), Censeau (Jura), St-Dizier (H.-Marne); Suisse, Merouillon, près Neuchâtel; Hanovre, Hills.

**PENTAGONASTER**, Linck, 1733.

\*504. *Malbosii*, d'Orb., 1847. Grande espèce pentagone, fortement déprimée, des environs de Berrias (Ardèche).

\*505. *variabilis*, d'Orb., 1847. *Cidaris variabilis*, Dunker et Koch, pl. 6, fig. 9. *Asterias Dunkeri*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 27, n. 1. Hanovre, Elliger.

**MILLERICHINUS**, d'Orb., 1839 ?

\*506. *Neocomiensis* d'Orb., 1847. Espèce pourvue de tubercules épineux, épars sur les pièces d'une tige ronde. France, Fontanil (Isère). M. Gras.

**HEMICRINUS**, d'Orb., 1847. C'est un *Egasterius*, dont une partie du calice dépend de la tige.

\*507. *Asterianna*, d'Orb., 1847. Espèce à sommet en cuilleron portée par une tige dont une partie vient former deux pièces du calice. France, Les Lattes (Var).

**PENTACRINUS**, Miller, 1821.

\*508. *Neocomiensis*, Dunker, 1847. Déc. sur les Crin. de Suisse, p. 14. Suisse, Neuchâtel; France, Censeau (Jura), La Ligne.

\*509. *annulatus*, Roemer, 1840, p. 27, n. 2. Crin. pl. 2, fig. 2. Elliger.

\*510. *alternatus*, Dunker, 1847. Espèce pourvue d'arêtes alternativement plus élevées et plus saillantes que les autres. Hanovre, Elliger.

**POPHYTES**

**BRACHYCYATHUS**, Fournier et Blum, 1848.

\*511. *Orthogonum*, Fournier et Blum, 1848, Ann. des Scienc. nat., p. 285, n. 4, fig. 6. France, St-Auban (Var), Berrias (Ardèche).

**MONOTRIVALVIA**, Lamarck, 1801.

\*512. *beccardii*, Fournier, 1848. France, Auxerre, par Fournier, pour le nom de France, blanda Lamarck.

**PORPHYRELLA**, Fournier, 1848. Déc. sur l'Encrinurus à arêtes

très-serrées, très-nombreuses, non débordantes; calice infundibuliforme.

- \*512. *explanata*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum explanatum*, Roemer, 1840, Kreid., p. 26, n° 1, Oolith., pl. 17, fig. 21. France, St-Dizier (H.-Marne); Hanovre, Schœndelaha, Schöppenstedt.

**FUNGINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. sous étage-urgonien.

- \*513. *Neocomiensis*, d'Orb., 1849. Espèce très-déprimée, à cloisons très-inégales dans leurs systèmes. Fontenoy, Chenay.

**BARYSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

- \*513. *gregaria*, d'Orb., 1849. Espèce à groupes nombreux, à cellules terminales, irrégulières, excavées en entonnoir, placées sur une seule tige. France, St-Dizier.

**AMBLOCYATHUS**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Cyathina*, à calice et à columelle circulaires.

- \*514. *conicus*, d'Orb., 1849. *Anthophyllum conicum*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 26, n° 2, Oolith., pl. 1, fig. 2. Schöppenstedt.

- \*515. *Neocomiensis*? d'Orb., 1849. Espèce voisine de l'*A. conicus*, mais à fortes côtes extérieures sur la racine. France, St-Dizier.

**LASMOSMILIA**, d'Orb., 1849. Voy. t. 1, p. 291.

- \*515. *Icaunensis*, d'Orb., 1849. Espèce à rameaux distincts, séparés, fortement costulée extérieurement. Chenay (Yonne).

**OCULINA**, Lamarck, 1816.

516. *Meyeri*, d'Orb., 1847. *Madrepora Meyeri*, Koch, 1837, Beitr., p. 55, pl. 6, fig. 11. *Lithodendron id.*, Roemer. Allem., Elligser.

**KNALLHELIA**, d'Orb., 1849. Voy. t. 1, p. 322.

- \*516. *Rathieri*, d'Orb., 1849. Espèce à gros rameaux, à calices rapprochés, striés en dehors. Fyé, Chenay (Yonne).

- \*516. *gracilis*, d'Orb., 1849. Espèce à rameaux grêles, à calices espacés. Chenay (Yonne).

**STYLOSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

- \*517. *organisans*, d'Orb., 1849. Espèce dont les tiges nombreuses sont grêles, costulées en long sous l'épithèque ridée et terminée par une cellule infundibuliforme, à cloisons nombreuses. France, Saint-Sauveur, Venay (Yonne).

- \*517. *Cottaldina*, d'Orb., 1849. Espèce dont les rameaux sont d'un tiers plus grêles que chez l'espèce précédente. St-Sauveur.

- \*517. *brevia*, d'Orb., 1849. Espèce dont les rameaux plus petits encore, sont courts, dichotomes de suite. St-Sauveur, Leugny.

**CALAMOPHYLLIA**, Blainville, 1834. Voy. t. 1, p. 292.

- \*517. *compressa*, d'Orb., 1849. Belle espèce à grosses tiges généralement comprimées, pourvues de fortes côtes externes. Leugny.

**PHYLOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

- \*518. *Cottaldina*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules, larges de 4 millim., sont infundibuliformes, à cloisons très-nombreuses et peu saillantes, les côtes externes très-marquées. France, Leugny, Fontenoy, Chenay, Lignerolles (Yonne).

- \*518. *Neocomiensis*, d'Orb., 1849. Espèce voisine de la précédente, mais en lames irrégulières, à calices plus ovales, à côtes plus petites. Fontenoy.

\*318<sup>n</sup>. *Icaunensis*, d'Orb., 1849. Espèce voisine du *P. Neocomiensis*, mais à calices quatre fois plus grands. Chenay.

**ACANTHOCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Stylina* à cinq systèmes, à calice saillant comme chez les *Phyllocenia*.

\*318<sup>a</sup>. *Bathieri*, d'Orb., 1849. Belle espèce à calices saillants, à troiscycles. France. Chenay.

**ELLIPSOCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Phyllocenia* à reproduction par fissiparité, à calices ovales.

\*318<sup>b</sup>. *regularis*, d'Orb., 1849. Espèce dont les jeunes sont trichiformes, ondulés en dehors, calices très-irréguliers. Fontenoy.

\*318<sup>c</sup>. *inequalis*, d'Orb., 1849. Espèce à calices inégalement saillants, les uns bien plus élevés que les autres.

**CRYPTOCENIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 322.

\*319. *Neocomiensis*, d'Orb., 1847. Espèce à cellules bien séparées, entourées extérieurement de sillons confluent. Saint-Dizier.

\*319<sup>n</sup>. *Icaunensis*, d'Orb., 1849. Espèce à calices plus grands (3 mill.) et à murailles presque communes. France, Cheray, Fontenoy, Lignerolles.

\*319<sup>n</sup>. *antiqua*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices sont d'un quart plus petits (2 mill.). Fontenoy. Chenay, Venay (Yonne).

\*319<sup>a</sup>. *excavata*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices sont un peu plus larges que chez le *C. Icaunensis*, mais séparés par des côtes confluentes prononcées. Chenay.

**PENTACENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Cryptocenia*, à cinq systèmes au lieu de six.

\*319<sup>b</sup>. *elegantula*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices ont deux millimètres de diamètre. Fontenoy.

\*319<sup>c</sup>. *pulchella*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices ont 1 1/2 millimètre de diamètre. Fontenoy.

\*319<sup>d</sup>. *microstema*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices ont 1 mill. de diamètre. Fontenoy.

**APLOSASTREA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Astrea* à columelle styliforme.

\*320. *Neptuni*, d'Orb., 1849. Espèce à petits calices espacés. Fr., Saint-Dizier.

\*320<sup>n</sup>. *elegans*, d'Orb., 1849. Espèce à calices la moitié plus petits encore que chez l'espèce précédente. Eyé. Fontenoy (Yonne).

**ASTROCCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*320<sup>n</sup>. *Cornucliana*, d'Orb., 1849. Espèce à cellules de deux millimètres de diamètre. France, Saint-Dizier (Haute-Marne), Venay, Chevay, Fontenoy, Saint-Sauveur (Yonne).

**STEPHANOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*321. *subornata*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices ont 3 1/2 millimètres de diamètre. France, Leugny (Yonne).

\*321<sup>n</sup>. *Cottaldina*, d'Orb., 1849. Espèce à calices d'un tiers plus petits que chez l'espèce précédente. Leugny.

\*321<sup>n</sup>. *Icaunensis*, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices sont d'un tiers plus petits encore. Fontenoy.

**THALANOCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Stephanocenia* sans columelle styliforme, celle-ci spongieuse.

**521 a. ornata**, d'Orb., 1849. Espèce à calices larges de 5 millimètres. Fontenoy.

**TRIONASTREA**, Edwards et Haime, 1848.

**522. Tombeckiana**, d'Orb., 1849. Espèce à cellules de 4 à 5 millimètres de diamètre, les cloisons épaissies près du centre. France, Saint-Dizier.

**523. gracilis**, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules sont inégales, de la même taille que chez la précédente espèce, mais dont les cloisons minces ne sont pas épaissies au centre. Fr., Fontenoy (Yonne).

**523'. Icaunensis**, d'Orb., 1849. Espèce à calices larges de 8 millimètres, peu excavés, à cloisons distinctes. Chenay.

**523". infundibulum**, d'Orb., 1849. Espèce à calices de la même largeur, mais très-profonds, et à cloisons plus étroites. Chenay.

**523"" mutabilis**, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices, irréguliers de taille et de forme, ont jusqu'à 15 mill. de diamètre. Chenay.

**ENTRASTREA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 209.

**524. microphylla**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules superficielles très-petites, peut-être les plus petites du genre. France, Venay (Yonne), Saint-Dizier (Haute-Marne).

**524'. excavata**, d'Orb., 1847. Espèce voisine, par le diamètre des calices, de l'espèce précédente, mais dont les calices sont excavés au centre; ensemble en surfaces planes, amorphes. Saint-Dizier, Leugny, Fontenoy, Saint-Sauveur, Chenay.

**524". collinaria**, d'Orb., 1849. Espèce voisine de la précédente, mais dont l'ensemble forme des monticules isolés sur toute la surface. Fontenoy, Chenay, Leugny, Venay.

**DIMORPHASTREA**, d'Orb., 1849. C'est un *Synastrea*, dont les calices sont inégaux; le calice primaire, au centre, étant bien plus grand que les autres qui forment des cercles autour et ont la columelle allongée non papilleuse. L'ensemble des côtes est rayonnant du calice primaire vers le bord.

**525. grandiflora**, d'Orb., 1849. Espèce dont le calice médian a jusqu'à 28 mill. de diamètre, les cloisons étroites. Fr., St-Dizier.

**525'. crassisepta**, d'Orb., 1849. Espèce à calices de 25 mill. de diamètre, à cloisons bien plus grosses que chez le *S. grandiflora*. Fr., Saint-Dizier, Fontenoy, Chenay, Venay.

**525"" alternata**, d'Orb., 1849. Espèce voisine de la précédente, mais avec des cloisons alternes, une grosse et une petite, et avec des calices plus petits. Fontenoy, Chenay, Leugny (Yonne).

**525 a. bellula**, d'Orb., 1849. Espèce voisine du *S. grandiflora*, mais à cellules d'un tiers plus petites. France, Leugny (Yonne), St-Dizier (Haute-Marne).

**525 b. excavata**, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices sont petits, les cloisons très-étroites; l'ensemble est en entonnoir, l'endothèque finement striée. Fontenoy.

**YNASTREA**, Edwards et Haime. Voy. t. 1, p. 208.

**526. Leunissii**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 11, p. 150. *Astrea Leunissii*, Römer, 1841, Kreid., p. 113, n° 1, pl. 16, fig. 26. France, Saint-Dizier (Haute-Marne); Allem., Berklingen.

**527. Tombeckiana**, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules sont,

- en diamètre, d'un tiers plus petites que chez le *S. Leunissii*, mais plus grandes que chez le *S. micrantha*, Römer. France, St-Dizier.
- \*528? micrantha**, d'Orb., 1849. *Astrea micrantha*, Römer, 1841, p. 113, n° 2, pl. 16, fig. 27. Hanovre, Berklingen.
- \*529. undulata**, d'Orb., 1849. Espèce en coupe ovale, ondulée sur les bords, à surface supérieure plane; calices excavés larges de 7 mill. à cloisons très-étroites. Fontenoy.
- \*529'. neocomiensis**, d'Orb., 1849. Espèce dont l'ensemble est en coupe régulière convexe en dessus; calices voisins de la précédente, mais avec des cloisons un peu plus grosses. Fontenoy, Leugny, Chenay, Lignerolles.
- \*530. bellula**, d'Orb., 1849. Magnifique espèce en toupie, plane en dessus, à calices de 8 mill. de diamètre, saillants tout autour, à cloisons alternes inégales. Fontenoy.
- \*530'. Icaunensis**, d'Orb., 1849. Espèce en toupie convexe en dessus, à calices de 9 à 10 mill. superficiels, à cloisons grosses fortement crénelées. Fontenoy.
- \*531. frondescens**, d'Orb., 1849. Espèce en grandes frondes, dont les calices sont très-irréguliers, et peu distincts au milieu de nombreuses cloisons irrégulières. Fontenoy, Saint-Sauveur, les Saints (Yonne).
- \*532. meandra**, d'Orb., 1849. Espèce voisine du *S. Leunissii*, mais avec des calices plus petits et des lamelles plus minces, et surtout bien plus contournées. Leugny, Fontenoy, Chenay.
- POLYPHYLLASTREA**, d'Orb., 1849. V. t. 2, p. 37.
- \*532'. convexa**, d'Orb., 1849. Espèce en gros mamelons, dont les calices espacés sont convexes et en dômes. Fontenoy, Chenay.
- \*532''. Icaunensis**, d'Orb., 1849. Espèce en grandes frondes, dont les calices sont superficiels et irréguliers. Fontenoy.
- MEANDRINA**, Lamarck, 1816.
- \*533. Neocomiensis**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules très-étroites, très-allongées et peu contournées. Leugny, Chenay, Venay, Fontenoy.
- \*533'. Cottaldina**, d'Orb., 1849. Espèce dont les sillons sont d'un tiers plus grands que dans l'espèce précédente. Fontenoy.
- AGARICIA**, Lamarck, 1816.
- \*533''. Neocomiensis?** d'Orb., 1849. Belle espèce à larges frondes, dont les lignes de calices sont régulières. Fontenoy, Chenay, Les Saints, St-Sauveur, Leugny.
- POLYTREMA**, Risso, 1826 (Bryozoaires).
- \*534. tuberosa**, d'Orb., 1847. *Ceriopora tuberosa*, Römer, 1840, p. 23, n° 5. Ool., pl. 17, fig. 9. France, Saint-Dizier (Haute-Marne); Hanovre, Schöppenstedt.
- \*535. subtuberosa**, d'Orb., 1847. *Heteropora tuberosa*, Römer, 1840, Kreid., p. 23, n° 2. Oolith., pl. 17, fig. 8. France, Gévrelissiat, près de Nantua (Ain); Allem., Schöndelaha.
- CERIOPORA**, Goldfuss, 1826 (Bryozoaires).
- \*536. arborea**, d'Orb., 1847. *Heteropora arborea*, Koch, 1837, Beitr., p. 56, pl. 6, fig. 14. France, St-Dizier, Vassy (Haute-Marne), Morteau (Doubs); Allem., Elligser-Brink.

- 1537. subnodulosa**, Römer, 1840, p. 23, n° 10. Ool., pl. 17, fig. 19. Schöppenstedt.  
**1539. biformis**, d'Orb., 1847. *Pustulopora biformis*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 22, n° 7. Oolith., pl. 17, fig. 20. Hanovre, Schöppenstedt.  
**1540. clavula**, Koch, 1837. Beitr., p. 55, pl. 6, fig. 13. Allem.  
**MONTICULIPORA**, d'Orb., 1847. V. t. 1, p. 25.  
**1541. verrucosa**, d'Orb., 1847. *Heteropora verrucosa*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 23, n° 3, pl. 5, fig. 26. Allem., Goslar.  
**1541'. neocomiensis**, d'Orb., 1849. Espèce tubéreuse, à monticules très-réguliers. Fontenoy, Chenay.

## FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

- NODOSARIA**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 241.  
**1542. paucicosta**, Römer, 1841, Kreid., p. 95, n° 3, pl. 15, fig. 7. Eschershausen.  
**1543. humilis**, Römer, 1841, Kreid., p. 95, n° 4, pl. 15, fig. 6. Eschershausen.  
**DENTALINA**, d'Orb., 1835. Voy. t. 1, p. 242.  
**1544. linearis**, d'Orb., 1847. *Nodosaria linearis*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 95, n° 2, pl. 15, fig. 5. Allem., Eschershausen.  
**VAGINULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.  
**1545. Kochii**, Römer, 1841, p. 96, n° 3, pl. 15, fig. 10. Eschershausen.  
**1546. harpa**, Römer, 1841, p. 96, n° 4, pl. 15, fig. 13. Eschershausen.  
**1547. Bronnii**, d'Orb., 1847. *Planularia Bronnii*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 97, pl. 15, fig. 12. Allem., Eschershausen.  
**MARGINULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.  
**1548. comma**, Römer, 1841, p. 96, n° 1, pl. 15, fig. 15. Eschershausen.  
**CRISTELLARIA**, Lamarck, d'Orbigny, Foraminifères de Vienne.  
**1549. Römeri**, d'Orb., 1847. *Planulina Orbignyi*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 1, pl. 15, fig. 24 (non 10-556). Allemagne, Eschershausen.  
**1550. ornata**, d'Orb., 1847. *Planulina ornata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 2, pl. 15, fig. 25. Allem., Eschershausen.  
**1551. Münsterii**, d'Orb., 1847. *Robulina Münsterii*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 1, pl. 15, fig. 30. Oolith., pl. 20, fig. 30. Allem., Schöppenstedt, Eschershausen.  
**1552. Ehrenbergii**, d'Orb. 1847. *Robulina Ehrenbergii*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 2, pl. 15, fig. 31. Eschershausen.  
**1553. crassa**, d'Orb., 1847. *Robulina crassa*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 3, pl. 15, fig. 32. Allem., Eschershausen.  
**LITUOLA**, Lamarck, d'Orb., Foraminifères de Vienne.  
**1554. æqualis**, d'Orb., 1847. *Spirolina æqualis*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 1, pl. 15, fig. 27. Allem., Eschershausen.  
**ROTALLA**, Lamarck, d'Orb., Foraminifères de Vienne.

- \*555. auricula**, d'Orb., 1847. *Anomalina*, id. Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 98, n° 1, pl. 15, fig. 26. Allem., Eschershausen.
- \*556. caracolla**, d'Orb., 1847. *Gyroïdina caracolla*, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 97, pl. 15, fig. 22. Allem., Eschershausen.
- ROOTALINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.
- \*557. sulcata**, Rœmer, 1841, p. 97, n° 2, pl. 15, fig. 20. Eschershausen.
- FLACOPSILINA**, d'Orb., 1847. Ce genre ressemble aux *Truncatolina*, mais est toujours fixe, et n'a d'ouverture qu'à la partie supérieure de la dernière loge.
- \*557'. neocomiensis**, d'Orb., 1847. Espèce fixe sur le *Belemnites subfusiformis* des Basses-Alpes.
- TEXTULARIA**, DeFrance, 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.
- \*558. Neocomiensis**, d'Orb., 1840. Espèce comprimée, rugueuse, des environs de Vandœuvre (Aube).

## AMORPHOZOAIRES.

- ORIBROSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 294.
- \*559. Alpina**, d'Orb., 1847. Jolie espèce conique, à sillons irréguliers externes. France, Châteauneuf-de-Chabre (Hautes-Alpes).
- THALAMOSPONGIA**, d'Orb., 1849. Ensemble polymorphe, quelquefois digité, formé d'un réseau de lames verticales irrégulières, entre lesquelles sont d'autres lames transverses formant des chambres irrégulières.
- \*559'. Cottaldina**, d'Orb., 1849. Belle espèce très-variée dans sa forme, ayant d'une jusqu'à cinq digitations irrégulières. Chenay, Leugny, Fontenoy (Yonne).
- VERTICILLITES**, DeFrance, 1828. C'est un *hippalimus*, dont l'intérieur est divisé par des cloisons transverses horizontales.
- \*560. truncata**, d'Orb., 1847. Branches isolées, tronquées, terminées par une partie régulièrement poreuse. France, St-Dizier.
- CNEMIDIUM**, Goldfuss, 1830.
- \*561. Bouyanum**, d'Orb., 1847. Petite espèce ficoïde, irrégulièrement bosselée à l'extérieur, à oscule très-large. France, Châteauneuf-de-Chabre.
- \*562. Alpinum**, d'Orb., 1847. Espèce déprimée, cupuliforme, à rayons irréguliers en dessus. France, Châteauneuf-de-Chabre.
- HIPPALIMUS**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 209.
- \*563. moniliferus**, d'Orb., 1847. *Scyphia monilifera*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n° 2. Oolith., pl. 17, fig. 29. Allemagne, Schöpenstedt.
- \*563'. Cottaldinus**, d'Orb., 1849. Espèce très-grêle, à tiges de 3 mill. de diamètre, rameuses. Fontenoy.
- \*564. Neocomiensis**, d'Orb., 1849. Espèce non tronquée en dessus, généralement isolée. France, St-Dizier, Vassy (Haute-Marne) Morteau (Doubs), Fontenoy, Chenay, Venay (Yonne).
- \*564'. Icaunensis**, d'Orb., 1849. Espèce voisine de l'*H. Tombeckianus*, mais à tiges plus grosses, plus courtes, plus obtuses à leur extrémité. France, Chenay.



- '565. Tombeckianus**, d'Orb., 1849. Magnifique espèce formant des branches nombreuses dichotomes réunies en buisson, et terminées par une surface tronquée très-irrégulièrement porée. France, St-Dizier, Fontenoy, Chenay, Venay.
- '565'. Ricordeanus**, d'Orb., 1849. Espèce à tiges courtes agglomérées ensemble par groupes. St-Dizier.
- '566. flabellatus**, d'Orb., 1847. Branches nombreuses réunies en éventail et terminées par une surface criblée irrégulièrement. Fr., St-Dizier.
- POROSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 388.
- '566'. Neocomiensis**, d'Orb., 1849. Espèce à pores saillants en protubérance, sur une surface encroûtante. Chenay.
- HEMISPONGIA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Hippalimus*, dont chaque oscule est incomplet et ne forme que la moitié d'un tube couchée sur le côté, et en groupes réunis.
- '567. Rouyana**, d'Orb., 1847. Jolie espèce formant groupe régulier, en buisson. France, Châteauneuf-de-Chabre (Hautes-Alpes).
- CUPULOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.
- '568. cupuliformis**, d'Orb., 1847. Belle espèce large, cupuliforme, souvent irrégulière, réticulée des deux côtés. Vassy, Saint-Dizier (Haute-Marne), Saint-Julien-Beauchêne (Hautes-Alpes), Fontenoy.
- '569. nummularis**, d'Orb., 1847. *Spongia nummularis*, Römer. Espèce lenticulaire très-déprimée. Hanovre.
- '570. neocomiensis**, d'Orb., 1847. Espèce à très-grandes expansions épaisses irrégulières. Fontenoy.

## DIX-SEPTIÈME ÉTAGE : — NÉOCOMIEN.

### B. — NÉOCOMIEN SUPÉRIEUR OU URGONIEN.

#### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**HELENINITES**, Lamarck. Voy. p. 212.

**'570. minaret**, Raspail, d'Orb., Paléont. univ., pl. 75. Terr. crét., supp., pl. 10. France, Escragnolles, Collette de Clar (Var), Berrias (Ardèche), Le Bourguet (B.-Alpes).

**'571. Grasianus**, Duval, d'Orb., Paléont. univ., pl. 73, 74. Terr. crét., supp., pl. 8. France, Blieux, Blavou, Vergons, Escragnolles; Italie, Col. Vignole (Vicentin).

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 54.

**'572. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. pseudo-elegans*, mais pourvue d'un large ombilic dans le jeune âge, et d'un ombilic médiocre dans l'âge adulte; petite taille. Escragnolles.

**ANKONITES**, Bruguière, 1789. Voy. vol. 1, p. 181.

- \*573. *fascicularis*, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 117, pl. 29. France, La Bedoule entre Aubagne et Cassis (Bouch.-du-Rhône); Italie, Col. Vignole (Vicentin).
- \*574. *inequalicostatus*, d'Orb., id., 1, p. 118, p. 29. Barrême.
- \*575. *Honoratianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 124, pl. 37. Barrême, Chardavon (Basses-Alpes), Escragnolles.
- \*576. *ligatus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 126, pl. 38. *Am. Inca*, Forbes, 1844, Quart. Journ., p. 177, fig. 19 a, b. France, Cheiron (B.-Alpes), Escragnolles (Var), La Charse (Drôme), Gigondas.
- \*577. *intermedius*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 128, pl. 38. France, Barrême, Angles (B.-Alpes), St-Martin, Andon.
- \*578. *Cassidea*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 130, pl. 39, fig. 1-3. France, Escragnolles, Barrême, Robion.
- \*579. *Bouyanus*, d'Orb., 1841. *A. infundibulum*, d'Orb., Terr. crét., 1, p. 131, pl. 39, fig. 4, 5; p. 362, pl. 110, fig. 3-5. Barrême, St-Martin, Escragnolles; du Brancone des Alpes vénitiennes.
- \*580. *Dumasianus*, d'Orb., 1842, Pal. de l'Am. mér., p. 69, pl. 2, fig. 1, 2. *A. pulchellus*, d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 1, p. 133, pl. 40, fig. 1, 2. France, Escragnolles (Var), Chamateuil, Trigance (Bass.-Alpes); Colombie, près Santa-Fé.
- \*581. *recticostatus*, d'Orb., 1841, Terr. crét., 1, p. 134, pl. 40, fig. 3, 4. France, Barrême, Angles, mont Ventoux; Suisse, canton de Vaud, près de Bovonnar.
- \*582. *difficilis*, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 135, pl. 41, fig. 1, 2. Escragnolles, Barrême (B.-Alpes), Ville-en-Blaisois (H.-Marne).
- \*583. *lepidus*, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 148, pl. 48, fig. 3, 4. France, Barrême, Angles (B.-Alpes), Escragnolles.
- \*584. *Ixyon*, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 186, pl. 56, fig. 1, 2. France, Cheiron, Barrême.
- \*585. *compressissimus*, d'Orb., 1840, Paléont., Terr. crét., 1, p. 210, pl. 61, fig. 4, 5. Escragnolles, St-Martin, Andon, Comps, Angles.
- \*586. *Didayanus*, d'Orb., 1841, Terr. crét., 1, p. 360, pl. 108, fig. 4, 5. *Am. Leai*, Forbes, 1844, Quart. Journ., p. 178. Escragnolles, Andon; Colombie, Petaquiero, près de Santa-Fé-de-Bogota.
- \*587. *Castellannensis*, d'Orb., Terr. crét., p. 109, pl. 25, fig. 3, 4. *A. flexisulcatus*, d'Orb., Paléont., pl. 45, fig. 3, 4. Andon, Aiglun, Escragnolles; Italie, Val Vignole (Vicentin).
- \*588. *angulicostatus*, d'Orb., Terr. crét., p. 146, pl. 46, fig. 3, 4. France, Chamateuil, Escragnolles (Var).
- \*589. *Charrierianus*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., p. 618. *A. Parandieri*, Quenstedt, pl. 17, fig. 7 (non d'Orb., 1842). St-Martin, Comps, Andon.
- \*590. *Feraudianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., p. 324, pl. 96. France, St-Martin, Andon, Barrême.
- \*591. *Heliacus*, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. crét., p. 108, pl. 25, fig. 1, 2. France, Barrême (B.-Alpes).
- \*592. *Galeatus*, de Buch, 1839, d'Orb., Paléont. de l'Am. mérid., p. 73, pl. 17, fig. 3-5. *Am. Sartousianus*, d'Orb., 1842, Paléont. franç.,

- Terr. crét., 1, pl. 94, fig. 4, 5. France, Escragnolles; Colombie, Petaquiero, près de Santa-Fé-de-Bogota.
- \*593. *Bogotensis*, Forbes, 1844, Quart. Journ., p. 178. France, Escragnolles; Colombie, Petaquiero, près de Santa-Fé.
594. *hystrix*, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 95, pl. 2, fig. 44. Angl., Yorkshire, Speeton; Alpes vénitiennes, M. de Zigno.
- \*595. *Causonianus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. semistriatus*, mais ayant l'ombilic fermé, des stries superficielles non visibles dans le moule. Barrême.
596. *Guerinianus*, d'Orb., 1847. Grosse espèce globuleuse, à tours très-renflés, costulés, arrondis, pourvus, dans le jeune âge, de pointes sur les côtés. Escragnolles, Castellanne, à Châteauneuf-de-Chabre (H.-Alpes).
- \*597. *Julius*, d'Orb., 1847. Espèce pourvue de sillons transverses, droits, intermédiaire, pour l'embrassement des tours, entre les *A. Honoratianus* et *ligatus*, mais très-distincte de l'une et de l'autre.
- \*598. *provincialis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. galeatus*, mais s'en distinguant par un sillon profond sur le milieu du dos de la coquille. Escragnolles, Barrême.
- \*599. *Perezianus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. Astierianus*, mais s'en distinguant par le manque de tubercules au pourtour de l'ombilic, par les tours renflés, costulés en travers et pourvus de distance en distance de côtes plus grosses munies de six tubercules comprimés. Escragnolles (Var), Symbola, près de Nice.
- \*600. *Caillaudianus*, d'Orb., 1847. Cette ammonite qui peut être confondue avec l'espèce précédente, s'en distingue par son dos aplati, orné seulement de deux rangées de tubercules comprimés, écartés. Escragnolles; Symbola à 9 kilom. à l'est de Nice.
- \*601. *Gastaldianus*, d'Orb., 1847. Voisine des *A. Perexianus* et *Caillaudianus*, mais sans grosses côtes, ni tubercules, mais avec des sillons très-espacés et de petites côtes nombreuses bifurquées. Escragnolles; Nice à Symbola.
- \*602. *Vandeckii*, d'Orb., 1847. Voisine de l'*A. intermedius*, mais ayant les tours plus renflés, les sillons transverses moins obliques. Escragnolles; Colombie, Petaquiero, près Santa-Fé-de-Bogota.
- \*603. *Acosta*, d'Orb., 1847. Voisine de l'*A. Deshayesii*, mais ayant des côtes simples, les tours plus étroits. Colombie, Petaquiero, canton de la Villeta, près de Santa-Fé-de-Bogota. M. Acosta.
- \*604. *Guaduasensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. nodosocostatus*, mais avec les tours plus étroits, les pointes plus longues, les grosses côtes plus obliques. Colombie, Petaquiero, près de Santa-Fé-de-Bogota. M. Acosta.
- \*605. *Hercules*, d'Orb., 1847. Grosse espèce très-remarquable qui atteint près d'un mètre de diamètre, à tours renflés, pourvus de côtes sinueuses, très-espacées, peu saillantes. Escragnolles.
- \*606. *alternatus*, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 35, no 4, pl. 1, fig. 5, 6. Nouvelle-Grenade, vallée de San-Juan, près Santa-Ibague, province de Santa-Fé-de-Bogota.
- \*607. *Boussingaultii*, d'Orb., 1842, id., p. 32, no 1, pl. 1, fig. 1, 2. Nouvelle-Grenade, près de Santa-Fé-de-Bogota.

\***608. Hopkinsii**, Forbes, 1844, Quarterly Journ., 1, p. 176. Nouvelle-Grenade, près de Santa-Fé-de-Bogota.

**609. Peruvianus**, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, p. 5, pl. 1, fig. 5, 6, 7. Amér. mérid., Montan.

**610. æquatorialis**, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, p. 15, pl. 1, fig. 11, 12. Amér. mérid., Tausa.

\***611. Alexandrinus**, d'Orb., 1839, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 75, pl. 17, fig. 8-11. Amérique mérid., Rio Velez, Nouv.-Grenade.

\***612. Santafecinus**, d'Orb., 1839, Paléont. de l'Amér. mér., p. 70, pl. 1, fig. 3, 4. Amér. mérid., Tina, Tocayma, près de Santa-Fé.

\***613. planidorsatus**, d'Orb., 1839, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 72, pl. 1, fig. 6-9. Amér. mér., Tina, Tocayma, Nouv.-Grenade.

\***614. colombianus**, d'Orb., 1839, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 77, pl. 17, fig. 12-15. Amér. mérid., vallée de San-Juan, prov. de Bogota, Nouvelle-Grenade.

\***615. horridus**, d'Orb., 1847. Curieuse espèce très-épaisse, à tours déprimés, costulés en travers et pourvus d'une rangée de sept longues pointes autour de l'ombilic et d'autant de chaque côté du dos. Escragnolles.

\***616. Seranonis**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. cré., pl. 109, fig. 4, 5. Barrême.

\***617. Camelinus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. asperimus*, mais ayant un caractère unique, celui d'avoir des tubercules très-gros, obtus, pourvus de trois grosses côtes en travers. C'est une des plus curieuses du genre. St-Martin.

\***618. Ludovicus**, d'Orb., 1847. Espèce très-remarquable par ses tours comprimés, ornés en travers de 22 grosses côtes simples, terminées chacune de chaque côté du dos par un tubercule comprimé. St-Julien (B.-Alpes).

**SCAPHITES**, Parkinson, 1811, d'Orb., Paléont. franç., Terr. cré., 1, p. 512.

**620. Ivanii**, Puzos, d'Orb., Paléont. franç., Terr. cré., 1, p. 515, pl. 128, fig. 1-3. France, Barrême (B.-Alpes).

\***621. Alpinus**, d'Orb., 1847. Espèce dont les tours sont étroits, légèrement costulés en travers et pourvus de distance en distance de tubercules saillants sur de plus grosses côtes. Barrême.

**ORIOCERAS**, Léveillé, 1837.

\***622. Puzosianus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. cré., 1, p. 466, pl. 115 bis, fig. 1, 2. Barrême.

\***623. cristatus**, d'Orb., 1842, Paléont., 1, p. 467, pl. 115, fig. 4-8. Escragnolles, Gréolières, La Doire (Var).

\***624. Alpinus**, d'Orb., 1847. Magnifique espèce à grosses côtes espacées, pourvues chacune de trois gros tubercules de chaque côté. Elle se distingue de l'*Ancyloceras Vandekianus*, par le manque de petites côtes intermédiaires. Anglès (B.-Alpes). M. Astier.

**ANCYLOCERAS**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. cré., p. 491.

\***625. Puzosianus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. cré., 1, p. 506, pl. 127, fig. 1-4. Les côtes à tubercules sont trop espacées dans la figure. *A. pulcherrimus*, Quenstedt, pl. 21, fig. 1 (non d'Orb.). Robion, Anglès (B.-Alpes), Escragnolles, quartier de la Feuille à Gigondas.

- \*626. brevis**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 508, pl. 127, fig. 5-7. France, ravin de Cassis.
- \*627. cinctus**, d'Orb., Crét., 1, p. 502, pl. 125, fig. 1-4. Cheiron.
- \*628. furcatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 509, pl. 127, fig. 8-11. France, Robion, Cheiron.
- \*629. Emerici**, d'Orb., *Crioceras Emerici*, Léveillé, d'Orb., Pal., 1, p. 463, pl. 114, fig. 3-5. *Crioceras Darii*, de Zigno, 1845, Mem. sopra due foss., etc. *Crioceras Fournetii*, Duval, Ann. des Sc. agric., t. 2, pl. 1. Escragnolles, Vergons, Chamateuil, Barrême, Anglès (B.-Alpes); Italie, dans le Riancone, Val Vignole (Vicentin). Cette espèce a jusqu'à 2 mètres de développement, j'en possède de complètes de cette taille.
- \*630. Duvalianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 1, p. 500, pl. 124. La Bedoule (Bouch.-du-Rhône); Italie, Val Vignole (Vicentin).
- \*631. Perezianus**, d'Orb. Très-belle et grande espèce contournée en crosse flexueuse, ornée de grosses côtes pourvues de chaque côté de trois tubercules et de deux petites côtes intermédiaires. Espèce découverte aux environs de Nice par M. Perez.
- \*632. Astierianus**, d'Orb. Grande espèce curieuse par l'élargissement et la compression de la crosse, lisse sur la région ventrale, costulée en travers, à dos lisse au milieu; les côtes de la partie spirale sont simples, interrompues sur le dos. Env. d'Escragnolles.
- \*633. ornatus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme de l'*A. dilatatus*, mais pourvue de grosses côtes ornées de trois tubercules de chaque côté. France, Cheiron.
- \*634. Humboldtianus**, Forbes, 1844, Quarterly Journal, 1, p. 174. *Orthocera Humboldtiana*, Lea. Colombie, Santa-Fé-de-Bogota.
- \*635. Buchianus**, d'Orb., 1847. *Ammonites Ithotomagensis*, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, p. 7, pl. 1, fig. 15 (non *A. Rhotomagensis*, Lam.). Colombie, Santa-Fé-de-Bogota.
- TOXOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.
- \*636. Emericianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 487, pl. 120, fig. 5-9. France, Barrême, Escragnolles, Andon.
- \*637. Honoratianus**, d'Orb., *id.*, 1, p. 483, pl. 119, fig. 1-4. Barrême.
- \*638. obliquatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 486, pl. 120, fig. 1-4. Barrême, St-Martin.
- \*639. plicatilis**, d'Orb., 1847. Grosse espèce qui, à en juger par son diamètre de 12 centimètres, devait avoir quelques mètres de longueur, pourvue de plis nombreux doublés à la région ventrale, effacés sur le dos. Escragnolles.
- \*640. Moutonianus**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine par ses grosses côtes du *T. obliquatus*, mais dont les côtes égales sont interrompues en dehors et doublées en dedans. Escragnolles.
- \*641. Joubertianus**, d'Orb., 1847. Espèce ornée de côtes inégales, de trois en trois une plus grosse, toutes peu marquées. Grande espèce. France, Escragnolles.
- \*642. nodosus**, d'Orb., 1847. Grosse espèce à côtes prononcées, pourvues de distance en distance de deux tubercules latéraux. Escragnolles; Nouvelle-Grenade, Bogota.

- \***643. Varusensis**, d'Orb., 1847. Petite espèce dont les côtes sont simples partout. France, Escragnolles.
- \***644. Bequienianus**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 474, pl. 116, fig. 1-7. France, Redennes (Vaucluse), Escragnolles.
- PTYCHOCERAS**, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 1, p. 556.
- \***645. Puzosianus**, d'Orb., Terr. crét., 1, p. 557, pl. 137, fig. 5-7. Nous en connaissons maintenant qui se recourbent en crosse aux deux extrémités. France, Barrême, Vergons, Anglès.
- HAMULINA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 66.
- \***645'. dissimilis**, d'Orb., 1849. *Hamites dissimilis*, d'Orb., 1842, Terr. crét., 1, p. 529, pl. 130, fig. 4-7. *H. Emericianus*, d'Orb., 1842, Paléont., pl. 130, fig. 9-12. Escragnolles (Var), Anglès.
- \***646. Orbignyana**, 1849. *Hamites Orbignyanus*, Forbes, 1844, Quarterly Journ., 1, p. 175. Santa-Fé-de-Bogota.
- \***647. Astleriana**, d'Orb., 1849. Crosse pourvue de grosses côtes; le reste droit, comprimé, orné de trois rangées de pointes sur des côtes obliques peu espacées, entre lesquelles sont de deux à quatre côtes simples. Anglès (Basses-Alpes).
- \***648. cincta**, d'Orb., 1849. *Ancyloceras id.*, d'Orb., 1842, Paléont., 1, pl. 125, fig. 1-4. Cette espèce est très-longue. Anglès.
- \***647'. subundulata**, d'Orb., 1849. Espèce dont la crosse a des renflements de distance en distance; le reste droit, cylindrique, presque lisse. France, Anglès (B.-Alpes), Escragnolles.
- \***648'. Alpina**, d'Orb., 1849. Grande espèce dont la crosse a des côtes tuberculeuses; le reste muni de côtes espacées tuberculeuses, entre lesquelles sont jusqu'à 10 côtes simples. Anglès (Escragnolles).
- \***649. subcylindrica**, d'Orb., 1849. Grosse espèce presque cylindrique à petites côtes égales obliques. Escragnolles.
- \***650. hamus**, d'Orb., 1849. *Hamites hamus*, Quenstedt, pl. 21, fig. 3, 4. France, Castellanne, Anglès (B.-Alpes).
- 651. Degenhardtii**, d'Orb., 1849. *Hamites Degenhardtii*, Buch, fig. 23, 24, 25. Forbes, 1844, Quarterly Journ., 1, p. 175. Colombie, Santa-Fé-de-Bogota.
- \***652. Varusensis**, d'Orb., 1849. Petite espèce voisine de l'*H. rotundus*, mais ayant des côtes plus fortes, plus aiguës et obliques. Escragnolles.
- HETERO CERAS**, d'Orb., 1847. C'est une *Turrilites* dont le dernier tour devient libre et se contourne en crosse, comme chez les *Ancyloceras*.
- \***653. Emericianus**, d'Orb., 1847. *Turrilites Emerici*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 580, pl. 141, fig. 3-6. (Jeune). Nous en connaissons quatre exemplaires complets. France, La Doire, Escragnolles (Var), Anglès (B.-Alpes), environs de Nice.
- HELICOCERAS**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 609.
- \***654. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce à tours très-disjoints, pourvus de côtes saillantes, obliques, simples, inégales. Escragnolles.
- \***655. interruptus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais ayant les côtes interrompues extérieurement. Ravin de Saint-Martin (Var).

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 67.

**656.** *Audii*, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 104, pl. 6, fig. 11. Près de Coquimbo (Chili), San-Felipe (Pérou).

**657.** *Moutoniana*, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, lisse, à tours saillants, convexes. Escragnolles (Var). M. Mouton.

**658.** *Astieriana*, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, lisse, à tours non convexes. Escragnolles (M. Astier).

**SCALARIA**, Lamarck, 1801.

**659.** *subinterrupta*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, dont les côtes au nombre de 14 à 15 par tour sont ondulées, interrompues près de la suture, et striées en travers. Escragnolles.

**660.** *elatior*, d'Orb., 1847. Espèce excessivement longue et grêle, à côtes peu élevées. France, Escragnolles.

**CHEMNITZIA**, d'Orb., 1849. Voy. t. 1, p. 172.

**661.** *Moutoniana*, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée, lisse, à suture convexe, bordée, à tours étroits. Escragnolles (Var).

**662.** *Varusensis*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, lisse, à tours larges, évidés au milieu. France, Escragnolles.

**NERINEA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 263.

**663.** *Coquandiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 75, pl. 156, fig. 3, 4. Martigues (B.-du-Rhône), côte de Châtillon, près de Nantua.

**664.** *Renauxiana*, d'Orb., 1842, id., 2, p. 76, pl. 157. Orgon.

**665.** *gigantea*, d'Hombres-Firmas. D'Orb., Pal. franç., Ter. crét., 2, p. 77, pl. 158, fig. 1, 2. Orgon, Fontaine-de-Vaucluse.

**666.** *Archimedi*, d'Orb., 1842, id., 2, p. 78, pl. 158, fig. 3-4. Orgon.

**667.** *Chamousseti*, d'Orb., 1842, id., 2, p. 79, pl. 159, fig. 1, 2. Chambéry.

**668.** *Martiniana*, d'Orb., 1847. Grande espèce à tours larges, fortement évidés, pourvus de tubercules à la partie supérieure. Martigues.

**ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.

**669.** *Astieriana*, d'Orb., 1842, Pal. franç., Ter. crét., 2, p. 118, pl. 167, fig. 7. Ravin de Saint-Martin.

**670.** *Moutoniana*, d'Orb., 1842. Espèce courte à tours de spire très-globuleux, costulés en long et striés en travers. C'est une des plus courtes connues. Escragnolles.

**671.** *ornata*, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Am. mér., p. 79. Amér. mérid., Nouvelle-Grenade, environs de Santa-Fé.

**VARIGERA**, d'Orb., 1847. Genre voisin des Actéons, mais toujours lisse et pourvu de bouches épaissies successives, placées sur le côté, de manière à former une ou deux séries de varices longitudinales prolongées d'un bout à l'autre de la spire, comme chez les *Scarabæus*.

**672.** *Bochatiana*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, conique, à tours convexes saillants, munis d'un seul côté de varices formées par les anciennes bouches. Perte-du-Rhône (Ain).

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

\***673. Escragnollensis**, d'Orb., 1847. Espèce intermédiaire en longueur entre les *N. lævigata* et *prælonga*, lisse. Escragnolles.

\***674. Bogotina**, d'Orb., 1837. Espèce très-courte, lisse, non ombiliquée, à tours renflés. Escragnolles; Colombie, Bogota.

**NERITA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 214.

\***675. Mammæformis**, d'Orb., 1837. *Trochus mammæformis*, Renaux, congrès de Nîmes. Orgon.

**NERITOPSIS**, Sowerby, 1825. Voy. t. 1, p. 64.

\***676. Moutoniana**, d'Orb., 1837. Espèce pourvue de grosses côtes espacées transverses, et de petites côtes qui les coupent. Escragnolles.

\***677. sublævigata**, d'Orb., 1837. Espèce lisse, avec quelques lignes d'accroissement irrégulières, spire ayant un accroissement très-rapide. Escragnolles.

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.

\***678. Astierianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 182, pl. 176, fig. 16, 17. Escragnolles.

**SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.

\***679. pulchellum**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *S. granosum*, mais pourvue de grandes lames au pourtour. Escragnolles; Simbola près de Nice.

**STRAPAROLUS**, Montfort, 1801. Voy. t. 1, p. 6.

\***680. Moutonianus**, d'Orb., 1847. Belle espèce à tours étroits, tous apparents, couverts de grosses côtes éloignées. Escragnolles.

**TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.

\***681. Alcea**, d'Orb., 1847. Espèce allongée comme le *T. elegans*, mais ayant les tours plus étroits, plus renflés, et ornés de côtes en treillis. Escragnolles.

**PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.

\***681'. Astieriana**, d'Orb., 1837. *P. elegans*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 242, pl. 190, fig. 1-4 (non Verneuil, 1842). Ravin de Saint-Martin.

\***682. provincialis**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 244, pl. 190, fig. 9-10. Escragnolles.

\***683. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce plus grande, plus carénée et à tours plus larges que le *P. Robinausiana*. France, Escragnolles.

\***684. Barremensis**, d'Orb., 1847. Très-grande espèce ombiliquée en dessous, finement striée en dessus, à tours larges, convexes. Barre-me.

\***685. Jason**, d'Orb., 1847. Espèce conique, peu élevée, à tours non saillants, ridés en travers. Escragnolles.

\***686. Pollux**, d'Orb., 1847. Espèce conique, élevée, à tours non saillants, costulés en travers d'une manière très-régulière. Escragnolles.

**PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 331.

\***687. Beaumontiana**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 305, pl. 213. Martigues.

\***688. Rochatiana**, d'Orb., 1847. Charmante espèce, longue de 1 millim., courte, gibbeuse, avec des stries alternes dans le jeune âge.



un tube très-développé, chez les adultes. Perte-du-Rhône.

**ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801.

'689. *Astleriana*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 283, pl. 207, fig. 1. Escragnolles.

'690. *provincialis*, d'Orb., 1843, id., 2, p. 298. Escragnolles.

'691. *Americana*, d'Orb., 1842, Foss. de Colombie, pl. 3, fig. 5. Escragnolles, St-Julien (H.-Alpes); Colombie, Petaquiero, près de Bogota. M. Acosta.

'692. *angulosa*, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 45, n° 13, pl. 3, fig. 4. Nouvelle-Grenade, au Coyal, Anapoyma (Santa-Fé).

'693. *Boussingaultii*, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 79, pl. 18, fig. 2, 3. Nouvelle-Grenade, Tina et Tocaima.

'694. *Varusensis*, d'Orb., 1847. Espèce très-allongée avec une double nodosité au dernier tour seulement, striée finement en travers. Escragnolles.

'695. *Moutoniana*, d'Orb., 1847. Belle espèce pourvue de grosses côtes transverses, dont une en carène, à aile épaisse et droite. Escragnolles.

**CRITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

'696. *Moutonianum*, d'Orb., 1847. Espèce grosse, courte, conique, à tours lisses, évidés au milieu. Escragnolles.

**HELICION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.

'697. *Martinianus*, d'Orb., 1847. Jolie espèce presque circulaire, lisse, peu élevée, à sommet latéral. Martigues (Bouches-du-Rhône).

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**PANOPÆA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 173.

'698. *Prevostii*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 334, pl. 356, fig. 3, 4. Vassy (H.-Marne), Orgon (Bouches-du-Rhône), Perte-du-Rhône (Ain).

**PHOLADOMYA**, Sow. Voy. t. 1, p. 73.

'699. *Cornueliana*, d'Orb., 1847. *Cardium Cornuelianum*, d'Orb., Paléont., Terr. crét., 3, p. 23, pl. 256, fig. 1, 2. Perte-du-Rhône.

**PERIPLOMA**, Schumacher, 1817, t. 1, p. 11.

'700. *Colombiana*, d'Orb., 1847. *Anatina*, id., 1842, Coquill. foss. de Colombie, p. 49, n° 23, pl. 3, n° 16, 17. Nouvelle-Grenade, Anapoyma (Santa-Fé-de-Bogota).

**TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.

'701. *Bogotina*, d'Orb., 1842, Coquill. foss. de Colombie, pl. 49, n° 21, pl. 3, fig. 15. Tabia, près de Santa-Fé-de-Bogota.

**VENUS**, Linné, 1758.

'702. *Chia*, d'Orb., 1842, Coquill. foss. de Colombie, p. 47, n° 17, pl. 3, fig. 9, 10. Entre Tina et Tocayma, province de Santa-Fé-de-Bogota.

'703. *cretacea*, d'Orb., 1842, Coquill. foss. de Colombie, p. 47, n° 18. De Tina, près Tocayma, province de Santa-Fé-de-Bogota.

**COBBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.

- \*704. Colombiana**, d'Orb., 1842, Coquill. foss. de Colombie, p. 49, n° 22. Analayma, province de Santa-Fé-de-Bogota.
- ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 1, p. 216.
- \*705. exotica**, d'Orbigny, 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 48, n° 49, pl. 3, fig. 11-12. Nouvelle-Grenade, à las Palmas, province de Socorro.
- \*706. truncata**, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, pl. 1, fig. 17. Amér. mérid., Colombie, Zipaquira.
- \*707. dubia**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 106, pl. 6, fig. 12, 13. Amér. mérid., Pérou.
- TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.
- \*709. ornata**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 136, pl. 288, fig. 5-9. Orgon.
- \*709'. abrupta**, de Buch, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 51, n° 26, pl. 4, fig. 4-6. Nouvelle-Grenade, entre Oyba et Suarez, province de Socorro.
- \*710. subcrenulata**, d'Orbigny, 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 52, n° 27, pl. 4, fig. 7-9. Non loin de Tocayma, province de Santa-Fé-de-Bogota.
- \*711. Hondaana**, Lea, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 50, n° 28, pl. 4, fig. 1-3. Environs de Santa-Fé-de-Bogota.
- \*712. Humboldtii**, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, p. 9, pl. 2, fig. 28, 29, 30. Amér. mérid., San-Felipe.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 32.
- \*713. plicato-costata**, d'Orb., 1843, Fossiles de Colombie, pl. 3, fig. 13. Colombie, Bogota.
- CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.
- \*714. corrugata**, d'Orb., 1847. *Corbis cordiformis*, d'Orb., 1843, Paléont., Crét., 1, p. 42, pl. 335. France, Vassy.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- \*714'. Colombianum**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 82. Nouvelle-Grenade, Tabia.
- UNIO**, Retzius, 1788.
- \*715. Cornucliana**, d'Orb., 1847. *Unio Martinii*, Paléont. franç., Terr. crét., 1, pl. 384 (non Sowerby, 1836). France, Vassy.
- ISOARCA**, Münster, 1843.
- \*716. globulosa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*I. texata*, mais plus arrondie, treillissée. Escragnolles.
- NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 12.
- \*717. incerta**, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 50, n° 24. Tina, près de Tocayma, prov. de Santa-Fé-de-Bogota.
- ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.
- \*718. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce petite (13 mill.), de la forme de l'*A. Gabrielis*, mais plus fortement striée et très-renflée. Escragnolles.
- \*719. subrostellata**, d'Orb., 1847. *A. rostellata*, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, pl. 1, fig. 16 (non Morton, 1834). Saint-Gil, près de Socorro, Nouvelle-Grenade.
- \*720. brevis**, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 55, n° 31, pl. 5, fig. 2-4. Entre Tina et Tocayma, prov. de Santa-Fé-de-Bogota.

**721. Tocaymensis**, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 55, n° 32, pl. 6, fig. 1-3. Entre Tina et Tocayma.

**MYXILUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.

**722. abruptus**, d'Orb., 1847. *M. lanceolatus*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., terr. crét., 3, p. 270, pl. 338, fig. 51 (non Sow.). Auxerre; Savoie, Cluse; Angleterre, Ile de Wight.

**723. Socorrinus**, d'Orb., 1847. *Modiola idem*, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 56, n° 33, pl. 3, fig. 18. Nouvelle-Grenade, à las Palmas, prov. de Socorro.

**LITHODOMUS**, Cuvier, 1817.

**724. avellana**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 291, pl. 344, fig. 13-15. Orgon.

**725. socialis**, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 56, n° 34. Nouvelle-Grenade, Cacota de Mantanza, prov. de Tunja.

**LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.

**726. Orbignyana**, Mathéron, 1842, d'Orb., Paléont. franç., terr. crét., 3, p. 530, pl. 418, fig. 14. France, Orgon.

**726'. Royeriana**, d'Orb., 1845, id., 3, p. 527, pl. 414, fig. 5-8. Orgon.

**727. Bolina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. Albensis*, mais plus large et entièrement lisse. Escragnolles.

**INOCERAMUS**, Parkinson, 1811. Voy. t. 1, p. 237.

**728. plicatus**, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombie, p. 56, n° 35, pl. 3, fig. 19. France, Saint-Auban (Var); Nouvelle-Grenade, au Rio de Coello, près de Ibague, province de Santa-Fé-de-Bogota.

**PINNIGENA**, Deluc, 1779. Voy. t. 1, p. 314.

**729. magna**, d'Orb., 1847. Espèce qui paraît avoir un tiers de mètre de largeur, très-épaisse, à empreinte musculaire très-saillante. France, environs de Nantua (Ain).

**PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.

**730. Alpinus**, d'Orb., 1846, Pal. franç., 3, p. 586, pl. 430, fig. 4-6. Barrême.

**731. Martinianus**, d'Orb., 1847. Espèce déprimée, pourvue de vingt côtes rayonnantes simples, espacées. Martigues, couches à Caprotina.

**732. proboscideus**, d'Orb., 1847. Espèce qui ressemble par ses grosses côtes au *Lima proboscidea*, mais qui est bien un Pecten. Escragnolles.

**733. Matheronianus**, d'Orb., 1847. *P. pulchellus*, Mathéron, 1842, Catalogue, pl. 30, fig. 4, 5 (non Nilsson, 1827, exclus. fig. 6). Martigues.

**JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 2.

**733'. Deshayesiana**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 626, pl. 441. *Pecten Deshayesianus*, Mathéron. France, Martigues, Orgon.

**734. Dufrenoyi**, d'Orb., 1847. *Pecten Dufrenoyi*, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amériq. méridion., p. 106, pl. 22, fig. 5-9. Coquimbo (Chili).

**734'. alatus**, d'Orb., 1847. *Pecten alatus*, de Buch, 1839, Pétrif. à

- Humboldt, p. 3, pl. 1, fig. 1, 2, 3, 4. Amér. mérid., Équateur, entre Quambos et Montan.
- SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.
- \*736. **striato-costatus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 655, pl. 450. Allauch (Bouches-du-Rhône), Escagnolles.
- OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 176.
- \*737. **Leymerii**, Desh., 1842 ; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 704, pl. 469. Vassy, Saint-Dizier, Auxerre, Renaud-du-Mont, Noël-Cerneux.
- \*738. **Urgonensis**, d'Orb., 1847. Espèce ondulée comme l'*O. Tur-nensis*, mais transverse et très-mince. Orgon, Martigues.
- \*739. **inoceramoides**, d'Orb., 1842, Coquilles foss. de Colombia, p. 59, n° 40. Nouvelle-Grenade, Suata, province de Socorro.
- \*740. **subsquamata**, d'Orb., 1847. *Exogyra squamata*, d'Orb., 1842. Pal. de l'Amér. mérid., p. 92, pl. 19, fig. 12-15 (non Gmelin, 1789). Nouvelle-Grenade, Capitanejo, Rio-Suarez, Cacota de Matanza.
- \*741. **abrupta**, d'Orb., 1847, Paléont. de l'Amériq. mérid., p. 86, pl. 21, fig. 4-6. Nouvelle-Grenade, Rio-Capitanejo, Cacota de Matanza, Chicamocha, Chita.
- \*742. **polygona**, de Buch, 1839, Pétrif. de Humboldt, p. 5, pl. 2, fig. 18, 19. Amér. mérid., Montan.

### MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

- RHYNCHONELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 92.
- \*743. **Renauxiana**, d'Orb., 1847, Pal., 4, p. 23, pl. 492, fig. 5-8. Orgon.
- \*744. **contracta**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., terr. crét., 4, p. 24, pl. 494, fig. 6-12. *Terebratula id.*, d'Hombre, 1841. Vacherie (Lozère), Berrias (Ardèche).
- \*745. **lata**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, p. 21, pl. 491, fig. 8-17. Berrias (Ardèche) ; Chambéry, Cluse (Savoie).
- TEREBRATULA**, Lwyd, 1799. Voy. t. 1, p. 43.
- \*746. **hippopus**, Römer, 1841 ; d'Orb., Paléont., 4, pl. 508, fig. 12-18. Barrême, Fontanil (Isère).
- \*747. **diphyoides**, d'Orb., 1847, Pal. franç., terr. crét., 4, pl. 509. Barrême, Lieoux, Berrias, Mons, près d'Alais.
- \*748. **Moutoniana**, d'Orb., 1847, Paléontolog., 4, pl. 510, fig. 4-5. Caussols, Escagnolles, Morteau, Berrias ; Hanovre, Osterwald.
- \*749. **Sella**, Sow., 1823, d'Orb., Paléont. franç., 4, pl. 510, fig. 6-12. Renaud-du-Mont, aux Lattes, Brillon, Martigues.
- CAPRINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. Paléont. franç., terr. crét., t. 4.
- \*750. **Doublieri**, d'Orb., 1847, Pal. franç., terr. crét., 4, pl. 541. Martigues (Bouches-du-Rhône).
- RADIOLITES**, Lamarck, 1801 ; d'Orb., Paléont. franç., terr. crét., 4.
- \*751. **Neocomiensis**, d'Orb., 1842, Ann. des Sc. nat., p. 180 ; Paléont. franç., terr. crét., 4, pl. 543. France, Martigues, Orgon ; Chambéry (Savoie).

- \*751'. **Marticensis**, d'Orb., 1849, Paléont. franç., 4, pl. 543. Martigues.
- CAPROTINA**, d'Orb., 1842. *Requienia*, *Monopleura*, *Dipilidia* et *Caprina*, Mathéron, 1843; d'Orb., Paléont. franç., terr. crét., 4.
- \*752. **ammonia**, d'Orb., 1842, Ann. des Sc. nat., p. 180; Paléont. franç., pl. 572. *Chama id.*, Goldf. Orgon, Cassis (Bouches-du-Rhône), Maillot, Jeargues, Cessiat, Saint-Germain de Joux, Bellegarde (Ain); Savoie, Chambéry.
- \*753. **Lonsdallii**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., terr. crét., 4, pl. 573-574; Ann. des Sc. nat., p. 180. *Diceras id.*, Sow., 1836, in Trans. geol. Soc., 4, p. 268, pl. 13, fig. 4. *Requienia carinata*, Mathéron, 1842. France, Orgon, Martigues, Ventoux; Savoie, Chambéry; Anglet., North-Wiltshire.
- \*754. **trilobata**, d'Orb., 1842, Pal. franç., terr. crét., 4, pl. 575. *Caprina trilobata*, d'Orb., 1841, Revue zool., p. 819. *Monopleura bistrostrata*, *Urgonensis* et *Dipilidia unisulcata*, Math. *Caprina*, id., 1839. France, Martigues. Orgon.
- \*755. **lamellosa**, d'Orb., 1842, Pal. franç., terr. crét., 4, pl. 576. Martigues, Orgon.
- \*756. **Gryphoides**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., terr. crét., 4, pl. 577. *Requienia id.*, Mathéron, 1843, Catal. Orgon.
- \*757. **varians**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., 4, pl. 578. *Monopleura varians* et *cingulata*, *Caprina Michelini*, Mathéron, Catalogue. Orgon.
- \*758. **sulcata**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., terr. crét., 4, pl. 579. *Monopleura id.*, Mathéron. Orgon.
- \*759. **imbricata**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., terr. crétacés, 4, pl. 580. *Monopleura imbricata*, Mathéron. Orgon.

## MOLLUSQUES BRYOZOAIRES.

**ALECTO**, Lamouroux, 1821.

\*760. **gracilis**, d'Orb., 1847; Edwards. Vassy.

**DIASTOPORA**, Edwards, 1839.

\*761. **Vassiacensis**, d'Orb., 1847, Paléont. franç. Vassy.

**IDMONEA**, Lamouroux, 1821.

\*762. **depressa**, d'Orb., 1847. Espèce très-déprimée, dont les rameaux rampants sont larges, mais à peine saillants. Vassy.

## ÉCHINODERMES.

**FIGURUS**, Agassiz.

\*763. **Columbianus**, Agassiz, 1847, Cat., p. 105. *Laganum Columbianum*, d'Orb., Paléont. de l'Amér. mérid., pl. 21, fig. 10. Colombie.

**FIGAULUS**, Agassiz.

\*764. **Desmoulini**, Agassiz, 1847, Cat., p. 101. Orgon, Martigues (Bouches-du-Rhône), Perte-du-Rhône (Ain).

**NUCLEOLITES**, Lamarck.

**765. Renaudi**, Agass., 1847, Cat., p. 97. *Catopygus Renaudi*, Agass., Echin. Suisse, 1, p. 51, pl. 8, fig. 7-9. France, départem. du Doubs; Suisse, envir. de la Chaux-de-Fonds.

**CIDARIS**, Lamarck.

**766. cornifera**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 25. Oignon (Bouches-du-Rhône); Savoie, Salève.

**ACROURA**, Agassiz.

**766'. Cornucliana**, d'Orb., 1849. Cornuel, Mém. de la Soc. géol., 1848, p. 258, pl. 2, fig. 26-30. Vassy (Haute-Marne).

**PHYLLOCRINUS**, d'Orb., 1847. C'est un *Pentremites*, dont les cinq ambulacres sont creusés et divisent l'ensemble du calice en cinq feuilles.

**767. Malbosianus**, d'Orb., 1847. Belle espèce, unique dans son genre; découverte par M. de Malbos. Berrias (Ardèche), Barême (Basses-Alpes).

**PENTACRINUS**, Miller, 1821.

**768. Neocomiensis**, Désor. Voy. Néocomien inférieur, n° 508. Orgon.

#### ZOOPHYTES.

**FUNGINELLA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Cyclolites* circulaires dont la columelle ronde, simplement creusée, n'est pas transverse; les cloisons grosses.

**769. Assilina**, d'Orb., 1847. Espèce très-large, avec une dépression centrale ronde; lamelles fines. Saint-Auban (Var).

#### FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**NODOSARIA**, Lamarck, 1822. Voy. t. 1, p. 241.

**770. subclava**, d'Orb., 1849. *N. clava*, Cornuel, 1848, Mém. de la Soc. géol. de France, t. 3, 2<sup>e</sup> part., p. 250, pl. 1, fig. 16, 17 (non Michelotti, 1841). Vassy (Haute-Marne).

**DENTALINA**, d'Orb., 1825. Voy. t. 1, p. 242.

**771. moule**, Cornuel, 1848, id., p. 250, pl. 1, fig. 18. Vassy.

**772. antenna**, Cornuel, 1848, id., p. 250, pl. 1, fig. 19. Vassy.

**773. intermedia**, Cornuel, 1848, id., p. 251, pl. 1, fig. 20. Vassy.

**774. chrysalis**, Cornuel, 1848, id., p. 251, pl. 1, fig. 21. Vassy.

**MARGINULINA**, d'Orb., 1825. Voy. t. 1, p. 242.

**775. crassa**, Cornuel, 1848, Mém. de la Soc. géol. de France, t. 3, 2<sup>e</sup> part., p. 251, pl. 1, fig. 22, 25. Vassy.

**776. mutabilis**, Cornuel, 1848, id., p. 252, pl. 1, fig. 26, 29. Vassy.

**777. gracilis**, Cornuel, 1848, id., p. 252, pl. 1, fig. 32, 33. Vassy.

**778. lata**, Cornuel, 1848, id., p. 252, pl. 1, fig. 34-37. Vassy.

**VAGINULINA**, d'Orb., 1825. Foram. de Vienne, p. 64.

**779. longa**, d'Orb., 1849. *Planularia longa*, Cornuel, 1848, Mém. de la Soc. géol. de France, t. 3, 2<sup>e</sup> part., p. 253, pl. 1, fig. 38, 39. Vassy.

**780. reticulata**, d'Orb., 1849. *Planularia reticulata*, Cornuel, 1848, id., p. 253, pl. 2, fig. 1-4. Vassy.

**781. subcostata**, d'Orb., 1849. *Planularia costata*, Cornuel, 1848, Mém., p. 253, pl. 2, fig. 5, 6, 7, 8 (non d'Orb., 1825). Vassy.

**WEBBINA**, d'Orb., 1839.

**782. flexuosa**, d'Orb., 1849. Cornuel, 1848, id., pl. 2, fig. 36 à droite. Vassy.

**783. irregularis**, d'Orb., 1849. Corn., 1848, id., pl. 2, fig. 37. Vassy.

**CRISTELLARIA**, Lamarck, 1822. Voy. t. 1, p. 242.

**784. lituola**, Cornuel, 1848, id., p. 254, pl. 2, fig. 9, 10. Vassy.

**785. excentrica**, Cornuel, 1846, id., p. 254, pl. 2, fig. 11, 13. Vassy.

**786. velata**, Cornuel, 1848, id., p. 255, pl. 2, fig. 14, 16. Vassy.

**OPERCULINA**, d'Orb., 1825. Foraminifères de Vienne, p. 117.

**787. angularis**, Cornuel, 1848, id., p. 256, pl. 2, fig. 20, 22. Vassy.

**ROTALIA**, Lamarck, 1822. Voy. t. 1, p. 242.

**788. submarginata**, d'Orb., 1849. *R. marginata*, Cornuel, 1848, Mém., t. 3, 2<sup>e</sup> part., p. 257, pl. 2, fig. 17, 18, 19 (non d'Orb., 1825). Saint-Dizier (Marne).

**TEXTULARIA**, DeFrance, 1824; d'Orb., Foram. de Vienne, p. 241.

**789. spica**, Cornuel, 1848, id., p. 257, pl. 2, fig. 23, 24. Vassy.

**790. subelongata**, d'Orb., 1849. *T. elongata*, Cornuel, 1848, id., pl. 2, fig. 25 (non d'Orb., 1825). Vassy.

**PLACOPSILINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 259.

**791. Cornucliana**, d'Orb., 1849, OEufs de mollusques. Cornuel, 1848, id., pl. 2, fig. 36 à gauche. Vassy.

---

## DIX-HUITIÈME ÉTAGE : — APTIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**CONOTEUTHIS**, d'Orb., 1839, Paléont. univ., Moll. viv. et foss., p. 444.

\*1. **Dupinianus**, d'Orb., Pal. univ., pl. 30, Terr. crét., Suppl., pl. 1. Seignelay (Yonne), St-Dizier (H.-Marne).

**BELEMNITES**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 312.

\*2. **Grasianus**, Duval, d'Orb., Paléont. univ., pl. 73, 74, Terr. crét., Suppl., pl. 9. France, Vergons, Gargas (Vaucluse).

\*3. **semicanaliculatus**, Blainv., d'Orb., Paléont. univ., pl. 74, 74, Terr. crét., Suppl., pl. 9. Gargas (Vaucluse), Blieux, St-André-de-Méouille, Vergons (B.-Alpes).

**RHYNCHOTEUTHIS**, d'Orb., 1846. Voy. t. 1, p. 326.

\*4. **Astlerianus**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 80, fig. 5-7, Terr. crét., Suppl., pl. 11, fig. 5-7. Blieux (B.-Alpes), Apt (Vaucluse), Rozan au sud-ouest de Gap (H.-Alpes).

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 54.

\*5. **plicatus**, Sow., 1836, in Fitton. *N. Requienianus*, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 72, pl. 10. France, entre Ervy et Marolles (Aube), Cassis, Jargues, près Sommières, Barrême, Malataverne-sur-Lussan (Gard), Vassy (H.-Marne).

\*6. **Lallierianus**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 620; Revue zoologique, 1841, p. 318. *Nautilus Saxbii*, Morris, 1847, Ann. ant. mag. France, Gurgy (Yonne); Angl., île de Wight.

\*7. **Ricordeanus**, d'Orb., 1847. Espèce à cloisons sinueuses comme le *N. Lallierianus*, mais à dos rond. Gurgy.

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. t. 1, p. 181.

\*8. **picturatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 178, pl. 54, fig. 4-6. France, Gévaudan, Barrême.

\*9. **inornatus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 183, pl. 55, fig. 4-6. Gargas, Barrême.

\*10. **Nisus**, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 184, pl. 55, fig. 7-9. *A. planus*, Paillips (non Mantell). France, Gargas (Vaucluse), Villeneuve (Aube), Blieux (B.-Alpes); Yorkshire, Kuapton.

\*11. **pretiosus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 193, pl. 58, fig. 4-6 Vergons.



- \*12. **Martinii**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 195, pl. 58, fig. 7-10. Gargas, Vergons, Blieux, Hyèges, Barrême ; Anglet., île de Wight.
- \*13. **crassicosatus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 197, pl. 59, fig. 1-4. Gargas (Vaucluse), Blieux, Hyèges.
- \*14. **Gargasensis**, d'Orb., Paléont., p. 199, pl. 59, fig. 5-7. Gargas, Barrême.
- \*15. **Stobieckii**, d'Orb. Grosse espèce voisine de l'*A. Mantellii*, mais avec des pointes sur les grosses côtes près de l'ombilic et d'autres sur les côtés, en tout, quatre rangées. Barrême, Bedoule près de Cassis (Bouches-du-Rhône), du département du Vaucluse, Gurgy (Yonne).
- \*16. **bicurvatus**, Michelin, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 286, pl. 84, fig. 3 (exclus. fig. 1, 2, 4). France, Villeneuve (Aube), Gurgy.
- \*17. **rareulcatus**, Leym., d'Orb., Paléont., 1, p. 288, pl. 85, fig. 5-7. Villeneuve.
- \*18. **Cornuelianus**, d'Orb., 1841, Paléont., 1, p. 365, pl. 112, fig. 1, 2. Louvemont (H.-Marne), Clansayes (Drôme), Perte-du-Rhône (Ain), Anglet., île de Wight.
- \*19. **Boyerianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 365, pl. 112, fig. 3-5. Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), Gurgy (Yonne), Barrême (Basses-Alpes), Clansayes (Drôme).
- \*20. **Jaubertianus**, d'Orb., 1847. Belle espèce très-remarquable, à tours très-larges, aplatis sur le dos, anguleux et carénés sur les côtés, à large ombilic. Hièges (B.-Alpes).
- \*21. **Ricordeanus**, d'Orb., 1847. Espèce très-remarquable par sa forme plus épaisse que large, comme l'*A. coronatus*, mais avec des tubercules saillants, énormes au pourtour de l'ombilic. Gurgy (Yonne).
- \*22. **Hambrovi**, Forbes, 1844, Quart. journ., 1, p. 354, pl. 5, fig. 4. France, Gurgy ; Anglet., île de Wight, Atherfield. / 2
- \*23. **Carlavantii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. tatricus*, mais pourvue de larges sillons droits, lisse au milieu, striée au pourtour. Hièges.
- \*24. **assicostatus**, Phillips, 1839 (non d'Orb.). *A. consobrinus*, d'Orb., Paléont., p. 147, pl. 47. Idem, *A. Deshayesi*, Leymerie. France, La Bedoule (Bouches-du-Rhône), Vassy, Gurgy, Villeneuve, Gargas ; Anglet., île de Wight, Speeton.
- \*25. **Matheroni**, d'Orb., Paléont., *A. cesticulatus*, Leymerie, d'Orb., pl. 81, fig. 4. *A. rotula*, Phillips, 1829 (non Sow.). La Bedoule (B.-du-Rhône), Villeneuve (Aube), Gargas (Vaucluse), Anglès (B.-Alpes) ; Anglet., Speeton.
- \*26. **striatissulcatus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 153, pl. 49, fig. 4-7. France, Vergons, Blieux, Gargas, Apt (Vaucluse).
- \*27. **Duvalianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 158, pl. 50, fig. 4, 5. Vergons, Blieux, St-André-de-Méouilles, Barrême (B.-Alpes).
- \*28. **Emeriei**, Raspail, d'Orb., Paléont., 1, p. 160, pl. 51, fig. 1-3. Vergons, Blieux, Barrême (B.-Alpes), Gargas (Vaucluse).
- \*29. **impressus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 164, pl. 52, fig. 1-3. France, Vergons, Blieux (B.-Alpes).

- \***30. Belus**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 166, pl. 52, fig. 4-6. France, Gaugas, Blieux, Hièges.
- \***31. Guettardi**, Raspail, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 169, pl. 53, fig. 1-3. France, Barrême, Vergons, Gargas, Hièges.
- \***32. Dufrenoyi**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 200, pl. 33, fig. 4-6. France, Gargas (Vaucluse), Blieux (B.-Alpes).
- 33. curvinodus**, Phillips, 1839, Yorksh., p. 95, pl. 2, fig. 50. Anglet., Speeton.
- 34. venustus**, Phill., 1839, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 48. Speeton.
- 35. concinnus**, Phillips, 1839, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 47. Speeton.
- 36. marginatus**, Phillips, 1839, Yorkshire, p. 95, pl. 2, fig. 41. *Ammonites Royerianus*, d'Orb.? Angl., Speeton.
- 37. rotula**, Sowerby, 1827, Min. Conch., 6, p. 134, pl. 570, fig. 4. Espèce voisine de l'*A. Belus*, mais plus épaisse. Angl., Speeton.
- SCAPHITES**, Parkinson, 1811.
- \***38. Bowerbanksii**, d'Orb., 1847. *Crioceratites id.*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> sér., vol. 5, p. 410, pl. 34, fig. 1. Anglet., île de Wight.
- 39. Phillipsii**, d'Orb., 1847. *Hamites Phillipsii*, Bean, Phill., 1839, Yorkshire, p. 95, pl. 1, fig. 30. Angl., Speeton.
- CRIOCERAS**, Lèveillé, 1837.
- 40. plicatilis**, d'Orb., 1847. *Hamites plicatilis*, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 95, pl. 1, fig. 29. Angl., Speeton.
- ANCYLOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.
- \***41. Matheronianus**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., 1, p. 497, pl. 122. *Ancyloceras varians*, d'Orb., 1, p. 504, pl. 126. Barrême, Bedoule, Bailly-aux-Forges, Nancy; détroit de Magellan (Port Famine).
- \***42. gigas**, d'Orb., 1847. *Hamites gigas*, Sow. *Scaphites gigas*, Forbes. *Ancyloceras Renauxianus*, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 499, pl. 12. Bedoule (Bouches-du-Rhône). Apt; Anglet., île de Wight, Folkstone, Pesthouse, Sandgate.
- \***43. simplex**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., 1, p. 503, pl. 125, fig. 5-8. *Hamites elatior*, G. B. Sowerby, in Darwin, 1846, p. 265. France, Bedoule; Amér. mér., Port Famine, détroit de Magellan.
- \***44. Orbignyanus**, Mathéron, 1843, Cat., p. 265, pl. 41, fig. 1, 2. France, Bedoule, près de Cassis (Bouch.-du-Rhône).
- \***45. Cornuelianus**, d'Orb. *Toxoceras id.*, d'Orb., Paléont. franç., p. 484, pl. 119, fig. 5-9. France, Bailly-aux-Forges (Haute-Marne), Gargas (Vaucluse).
- 46. Beanii**, d'Orb., 1842. *Hamites Beanii*, Young and Bird, Phill., 1839. Yorksh., p. 95, pl. 1, fig. 28. Angl., Speeton.
- 47. intermedius**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 1, p. 494. *Hamites intermedius*, Phill., 1839, Yorksh., p. 95, pl. 1, fig. 22. Angl., Speeton.
- 48. grandis**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 1, p. 494. *Hamites grandis*, Sowerby, 1836, Min. Conch., 6, pl. 593, fig. 1. Angl. (Folkstone), Lympne, Hythe.
- 49. Hillsii**, d'Orb., 1842, Paléont., 1, p. 494. *Scaphites Hillsii*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 128, pl. 15, fig. 1, 2. Angl. (Folkstone), Quarries, près d'Hythe.

**TOXOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.

'50. **Royerianus**, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 481, pl. 118, fig. 7-11. Bailly-aux-Forges, Chapelle Merigny, Gargas (Vaucluse).

**PTYCHOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. p. 66.

'51. **laevis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 266, pl. 41, fig. 3. Cassis, Gargas.

**HAMULINA**, d'Orb., 1849. Voy. t. 2, p. 66.

'52. **Royeriana**, d'Orb., 1849. *Hamites Royerianus*, d'Orb., 1842, Paléont., 1, p. 531, pl. 131, fig. 1-5. France, Vandœuvre, Villeneuve (Aube), St-Dizier, Seignelay (Yonne).

'53. **raricostata**, d'Orb., 1849. *Hamites raricostatus*, Phillips, 1839, Yorksh., p. 95, pl. 1, fig. 23. Speeton.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**VERMETUS**, Adanson, 1757.

'54. **Bouyanus**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 386, pl. 233, fig. 5-7. Alichamp, près de Vassy (H.-Marne), aux Croûtes (Aube).

'55. **Albensis**, d'Orb., 1843, Paléont., p. 386, pl. 233, fig. 8-9. Les Croûtes.

**SCALARIA**, Lamarck.

'55'. **Bicordeana**, d'Orb., 1849. Belle espèce à tours de spire très-saillants, à côtes espacées, striées en travers dans l'intervalle. Gurgy (Yonne).

**ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.

'56. **Forbesiana**, d'Orb., 1847. *Tornatella marginata*, Forbes, 1844, Quart. journ., 1, p. 347, pl. 4, fig. 1 (non *marginata*, d'Orb., 1843). France, Seignelay (Yonne); Anglet., Atherfield. Cette espèce diffère par des stries partout.

'57. **subalbensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. albensis*, mais distincte par les stries. Angl., Atherfield.

**VANIGERA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 68.

'58. **Fittoni**, d'Orb., 1847. Espèce petite, à tours allongés, lisses. Anglet., Ile de Wight.

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

'59. **Cornucliana**, d'Orb., 1842, Paléont., p. 150, pl. 170, fig. 4, 5. Vassy.

'60. **sublaevigata**, d'Orb. V. Néocomien, n° 108. France, St-Dizier; Anglet., Atherfield.

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.

'61. **subreticulatus**, d'Orb., 1847. *Trochus reticulatus*, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 94, pl. 2, fig. 37 (non Sow.). Angl., Speeton.

'62. **minimus**, d'Orb., 1847. *Solarium minimum*, Forbes, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 348, pl. 4, fig. 3. Angl., Atherfield.

'63. **subpulcherrimus**, d'Orb., 1847. *Turbo pulcherrimus*, Phill., 1829, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 35 (non Wood, 1825). Angl., Speeton.

'64. **Barrémensis**, d'Orb., 1847. Espèce carénée, à tubercules sur la carène qui est saillante. Barrême.

**SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.

'65. **Carcitanense**, Mathéron, 1843, Catal., p. 234, pl. 39, fig. 3, 5. Cassis.

**66. tabulatum**, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 94, pl. 2, fig. 36. Speeton.

**TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.

**67. Forbesianus**, d'Orb., 1847, *T. minutus*, Forbes, 1845, Quart. journ., 1, p. 348, pl. 4, fig. 2 (non *minutus*, Brown). Angl., Pease-marsh.

**\*68. Martinianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 218, pl. 184, fig. 4-7. Clansayes (Drôme), Gargas (Vaucluse).

**PLEUROTOMARIA**, Defrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.

**69. Anstedii**, Forbes, 1845, Quarterly journal, 1, p. 349, pl. 5, fig. 1. Angl., Nutfield, près de Reigate.

**PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.

**70. Fittoni**, Forbes, 1845, Quarterly journal, 1, p. 351, pl. 4, fig. 6. Angl., Atherfield.

**ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.

**\*71. glabra**, Forbes, 1845, Quarterly journal, 1, p. 350, pl. 4, fig. 5. France, Vassy (H.-Marne); Angl., Atherfield.

**72. subcomposita**, d'Orb., 1847. *Rostellaria composita*, Phillips, 1829, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 33, 34 (non Sow.). Angl., Speeton.

**\*73. Gargasensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *R. Robinaldina*, mais infiniment plus grande, à côtes jusqu'au dernier tour. Gargas (Vaucluse).

**CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

**74. Cornuellanum**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 361, pl. 228, fig. 11-13. France, Grange-au-Ru, près de Vassy.

**\*75. Aptiense**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 363, pl. 229, fig. 1-3. *Cerithium tuberculatum*, Forbes, 1844, Quart. journ. Gargas (Vaucluse), Les Croûtes (Aube), Barrême, Hièges (Bass.-Alpes); Anglet., île de Wight.

**76. Matronense**, d'Orb., 1843, Paléont., p. 381. Vassy.

**\*77. Gargasense**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 382. Gargas, Les Croûtes, Seignelay.

**\*78. Forbesianum**, d'Orb., 1847. *Cer. Phillipsii*, Forbes, 1844, Quart. (non Leymerie). Angl., île de Wight.

**\*79. Alpium**, d'Orb., 1847. Petite espèce presque cylindrique, dont les tours non saillants sont ridés irrégulièrement en travers. Barrême.

**\*80. Fittoni**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Lallierianum*, mais beaucoup plus petite et plus courte à proportion. Anglet., île de Wight.

**\*81. turriculatum**, Forbes, 1845, Quarterly journal, 1, p. 352, pl. 4, fig. 7 a. Angl., Atherfield.

**82. subattenuatum**, d'Orb., 1847. *C. attenuatum*, Forbes, 1845, Quarterly journal, 1, p. 352, pl. 4, fig. 11 (non Sow., 1836). Anglet., Atherfield.

**\*83. Barremensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Lallierianum*, mais plus allongée, pourvue de côtes longitudinales plus marquées et de stries transverses plus fines. La Baume, Barrême (B.-Alpes), Gargas (Vaucluse).

**DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. p. 73.

- \*84. *cylindricum*, Sow., pl. 79, fig. 2. Seignelay; Anglet., île de Wight.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

- PHOLAS**, Linné, 1758; d'Orb. Voy. t. 1, p. 251.
- \*85. *Cornucliana*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 305, pl. 349, fig. 1-4. Vassy, Combles, Narcy, Les Croûtes, Gurgy.
- \*86. *constricta*, Phillips, 1829, Yorksh., p. 93, pl. 2, fig. 17. Speeton.
- PANOPÆA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 173.
- \*87. *Prevosti*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 334, pl. 356, fig. 3, 4. France, Vassy, Croûtes.
- \*88. *Neocomiensis*, d'Orb., 1844, *id.*, p. 229, pl. 353, fig. 3-8. Vassy.
- PHOLADOMYA**, Sow., 1826. Voy. t. 1, p. 13.
- \*89. *Martini*, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 238, pl. 2, fig. 3. Angl., Pulborough, Atherfield.
- \*90. *Cornucliana*, d'Orb., 1847. *Cardium id.*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 23, pl. 256, fig. 1, 2. France, Pont-Varin, près de Vassy; Angl., Atherfield.
- LYONSIA**, Turton, 1822. Voy. t. 1, p. 10.
- \*91. *Bicordeana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. Rouyana*, mais plus large, à crochets saillants, à carène anale, et striée en travers. France, Seignelay (Yonne).
- THRACIA**, Leach, 1825. Voy. t. 1, p. 216.
- \*92. *recurva*, d'Orb., 1847. *Mya depressa*, Phillips, 1829. Yorkshire, p. 93, pl. 2, fig. 8 (non Sow.). Angl., Speeton.
- CASTROCHENA**, Spengler, 1783. Voy. t. 1, p. 275.
- \*93. *dilatata*, d'Orb., 1847. *Fistulana id.*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 394, pl. 375, fig. 1-4. France, Combles.
- \*94. *Matronensis*, d'Orb., 1847. *Fistulana id.*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 395, pl. 375, fig. 5-8. Pont-Varin.
- SOLEOURTUS**, Blainville, 1824.
- \*95. *Warburtoni*, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 237, pl. 2, fig. 1. Angl., Atherfield.
- LAVIGNON**, Cuvier, 1817, Paléont., Terr. créét., 3, p. 403.
- \*96. *minuta*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 405, pl. 377, fig. 1-4. *Platymia id.*, Agassiz. Pont-Varin; Savoie, Mont Salève.
- \*97. *phaseolina*, d'Orb., 1844. *Mya phaseolina*, Phillips, 1829, Yorksh., p. 93, pl. 2, fig. 13. Speeton.
- LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- \*98. *lingulata*, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, d'Orb., 1843, Paléont. fr., 3, p. 168, pl. 304, fig. 1-3. *Nucula spathulata*, Forbes, 1844, Quart. journ., 1, p. 245, pl. 3, fig. 4. France, Marolles; Angl., Atherfield.
- VENUS**, Linné, 1758. Voy. p. 75.
- \*99. *Belssyi*, d'Orb., 1844, Pal. franç., 3, p. 441, pl. 384, fig. 13-15. Marolles; Angl., île de Wight.
- \*100. *Vassiacensis*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 441, pl. 384, fig. 11, 12. Marolles, Vassy, St-Paul (Oise).

- 101. Orbignyana**, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 240, pl. 2, fig. 5. *Venus Roissyi*, d'Orb. ? Cracker, Atherfield.
- 102. Vectensis**, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 240, pl. 2, fig. 4. Angl., Cracker, Atherfield.
- THETIS**, Sow., 1826, d'Orb., Paléont. franç., 3, p. 450.
- \***103. lævigata**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 452, pl. 387, fig. 1-3. St-Paul (Oise); Angl., île de Wight.
- CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.
- \***104. striatula**, Sow., 1827, d'Orb., Paléont., 3, p. 459, pl. 388, fig. 9-13. Combles, Vassy, Gurgy; Anglet., île de Wight, Sûssex, Pulborough.
- \***105. elegantula**, d'Orb., 1847. *C. elegans*, d'Orb., 1845, Paléont. franç., 3, p. 460, pl. 388, fig. 14-17 (non Sow., 1827). Seignelay; Angl., île de Wight.
- 106. punctum**, Phillips, 1829, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 6. Speeton.
- ASTARTE**, Sow., 1818. Voy. t. 1, p. 246.
- \***107. sinuata**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 69, pl. 264, fig. 1-3. Marolles.
- 108. lævis**, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 94, pl. 2, fig. 18-19. Speeton.
- OPIS**, Defrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.
- 109. ornata**, d'Orb., 1847. *Isocardia ornata*, Forbes, 1844, Quart. journ., 1, p. 242, pl. 2, fig. 10. Angl., Atherfield.
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 178.
- \***110. inornata**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 99, pl. 272, fig. 1-2. Vassy.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 32.
- \***111. sculpta**, Phillips, 1829, d'Orb., Paléont., 3, p. 118, pl. 283, fig. 1-4. Dienville (Aube), Gargas (Vaucluse), Barrême (B.-Alpes) Angl., Yorkshire.
- \***112. excentrica**, Sow., Forbes. in Darw., 1846, South Amer., p. 267, pl. 5, fig. 21. Patagonie, Port-Famine, Terre-du-Feu.
- 113. solidula**, Forbes, 1844, Quart. journ., 1, p. 239, pl. 2, fig. 7. Angl., Atherfield, Redhill, Peasemars.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- 114. Ibbetsoni**, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 243, pl. 2, fig. 9. Angl., Cracker, Atherfield.
- ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. t. 1, p. 42.
- \***115. angulata**, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 94, pl. 2, fig. 20, 21. Speeton.
- NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 12.
- 116. subobtusa**, d'Orb., 1847. *N. obtusa*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 163, pl. 300. *N. subrecurva*, Phillips, 1829, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 11. Angl., Speeton.
- ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.
- \***117. Cornucliana**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 208, pl. 311, fig. 1-3. Pont-Varin, près de Vassy, Seignelay.
- \***118. Austeni**, d'Orb., 1847. *Cardium Austeni*, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 244, pl. 3, fig. 3. C'est bien une arca à en juger

par la facette du ligament. France, Seignelay (Yonne) ; Angl., Pease-marsh, Atherfield.

**PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.

**119. gracilis**, Phill., 1839, Yorksh., p. 94, pl. 2, fig. 22. Speeton.

**MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 32.

**120. sublineatus**, Voy. Etage 17, n° 344. Vassy.

**121. undulatus**, d'Orb., 1847. *Cypricardia undulata*, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 242, pl. 3, fig. 1. Angl., Atherfield.

**LITHODOMUS**, Cuvier, 1817.

**122. subintermedius**, d'Orb., 1847. Espèce plus courte que toutes celles de l'Étage néocomien. France, Vassy.

**LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.

**123. Cottaldina**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 537, pl. 416, fig. 4-5. Vassy, Marolles, Gurgy, La Bedoule.

**124. Moreana**, d'Orb., 1845, id., 3, p. 538, pl. 416, fig. 6-10. Combles.

**AVICULA**, Klein, 1758. Voy. t. 1, p. 13.

**125. sublanceolata**, d'Orb., 1847. *A. lanceolata*, Forbes, 1844, Quarterly journal, 1, p. 247, pl. 3, fig. 8 (non Sow., 1826). Anglet., Peasemarsh, Atherfield, Parham, Hythe.

**126. subdepressa**, d'Orb., 1847. *A. depressa*, Forbes, 1844, id., 1, p. 247, pl. 3, fig. 7 (non Münster, 1841). Seignelay (Yonne) ; Angl., Atherfield.

**127. ephamera**, Forbes, 1844, id., 1, p. 247, pl. 8, fig. 6. Atherfield.

**128. Aptiensis**, d'Orb., 1847. Espèce ronde, très-inéquivale, qui rappelle les espèces du muschelkalk. Elle a la forme d'un *Inoceramus*. La Baume, près de Castellanne (B.-Alpes).

**GERVILLIA**, DeFrance, 1820. Voy. t. 1, p. 201.

**129. linguloïdes**, Forbes, 1845, d'Orb., Paléont., 3, p. 485, pl. 396, fig. 1-4. Grange-au-Ru, près de Vassy ; Angl., Atherfield.

**130. Forbesiana**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., 3, p. 486, pl. 396, fig. 5, 6. Angl., Ile de Wight à Atherfield, Shanklin.

**PIOTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.

**131. Aptiensis**, d'Orb., 1847. *P. interstriatus*, Leym., 1842, d'Orb., Paléont. franç., 3, p. 594, pl. 433, fig. 4-5 (non Münster, 1841). St-Gihle, Nancy, Les Croûtes, St-Dizier.

**132. striato-punctatus**, Römer, 1839, d'Orb., Paléont., Terr. crét., 3, p. 594, pl. 433, fig. 4-7. France, St-Dizier.

**JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. p. 83.

**133. Boyeriana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine par le nombre de ses côtes du *J. quadricostata*, mais avec plus d'inégalité dans leur largeur et leur disposition. Grange-au-Ru, près de Vassy, Gurgy (Yonne). M. Ricordeau.

**SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.

**134. complanatus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 657, pl. 451, fig. 7-10. France, Grange-au-Ru, Vassy, St-Dizier.

**PLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 202.

**135. Placuna**, Lam., 1819, d'Orb., Paléont., 3, p. 682, pl. 462,

fig. 11-18. Gargas, Narcy, Combles, Seignelay, Villeneuve, St-Dizier Gignac.

\***136. radiola**, Lam., 1819, d'Orb., Paléont., 3, p. 683, pl. 4 fig. 1-7. France, Gargas, Vassy.

**OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 176.

\***137. aquila**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 706, pl. 4 France, Vassy, Ervy, Auxerre, Gargas.

\***138. macroptera**, Sow., 1824, d'Orb., Paléont., Terr. crét., p. 695, pl. 465. France, St-Dizier.

### MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**RHYNCHONELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 92.

\***139. decipiens**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 494, fig. 13. France, Gargas (Vaucluse), Hièges (B.-Alpes).

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

\***140. Moutoniana**, d'Orb., 1847, Paléont., pl. 510, fig. 4-5. Gévaudan, Gargas.

\***141. sella**, Sow., 1823, d'Orb., Paléont. fr., Terr. crét., 4, pl. 1 fig. 6-12. Combles, Gargas.

**142. lineolata**, Phillips, 1829, Yorkshire, p. 94, pl. 2, fig. 27. Glet., Speeton, Knapton.

**TEREBRATELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 222.

**143. Astieriana**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 516, fig. 6. Vassy, St-Dizier, Auxerre, Hièges, Gévaudan, Combles.

**ORBICULOIDEA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 44.

\***144. subradiata**, d'Orb., 1847. Jolie espèce pourvue de rayons très-prononcés, du centre à la circonférence. France, Les Croix (Aube).

### MOLLUSQUES BRYOZOAIRES.

**DIASTOPORA**, Lamouroux, 1821.

\***145. Clementina**, d'Orb., 1847. Espèce discoïdale dans son ensemble et presque plane, à cellules à peine saillantes, plus grandes et plus longues que chez le *D. Vassiacensis*, d'Orb. Les Croûtes (Aube) Vassy à la Grange-au-Ru.

**DEFRANCIA**, Römer, 1840.

\***146. Vassiacensis**, d'Orb., 1847. Espèce à rosace irrégulière, cellules par lignes rayonnantes au pourtour seulement. Vassy, Grange-au-Ru.

**MONTICULIPORA**, d'Orb. Voy. t. 1, p. 25.

\***146'. Ricordeana**, d'Orb., 1849. Espèce à rameaux courts et comprimés. France, Gurgy (Yonne).

### ÉCHINODERMES.

**CIDARIS**, Lamarck.

\***147. Phillipsii**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 30. C. spinosa, P. Yorksh., pl. 2, fig. 3. Angl., Speeton.



**DECAMEROS**, Linck, 1752. (*Alecto*, Leach; *Antedon*, Fréminville; *Phytocrinus*, Blainville.)

'147'. **Ricordeanus**, d'Orb., 1849. Magnifique espèce, dont le calice est déprimé, granuleux en dessous, à deux rangées de ramules. France, Gurgy.

'147''. **depressus**, d'Orb., 1849. Espèce à trois rangées de ramules à surface inférieure moins large. France, Gurgy.

## ZOOPHYTES.

**TETRACONIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Cryptocœnia*, à 4 systèmes.

'148. **Dupiniana**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules de 4 millim., très-profondes, à grosses cloisons inégales, divisées en 4 doubles cavités. France, Les Croûtes (Aube), Seignelay (Yonne).

**MONTLIVALTIA**, Lamouroux, 1821.

'148'. **Ricordeana**, d'Orb., 1849. Petite espèce, courte et large, à épithèque partielle. Gurgy.

**GERIOPORA**, Goldf., 1826.

'149. **Muletiana**, d'Orb., 1847. Espèce pourvue de gros mamelons convexes, mais peu élevés qui représentent des branches rudimentaires. Les Croûtes (Aube).

'149'. **Ricordeana**, d'Orb., 1849. Espèce à gros rameaux dichotomes, à pores inégaux. Gurgy.

## AMORPHOZOAIRES.

**OPULOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.

'150. **Aptiensis**, d'Orb., 1847. Espèce infundibuliforme, irrégulière, large, à bords épais. France, Gargas (Vaucluse).

## DIX-NEUVIÈME ÉTAGE : — ALBIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITES**, Lamarck, 1801. Voy. t. 4, p. 211.

\*1. *minimus*, Lister, d'Orb., Paléont. univ. : pl. 76. Terr. crét. 1, p. 57, pl. 5. France, Wissant (Pas-de-Calais), Grand-Pré (Ardennes), Clar (Var), etc.

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 54.

\*2. *Bouchardianus*, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 76, pl. 13. Wissant (Pas-de-Calais), Clar (Var), Novion (Ardennes).

\*3. *Clementinus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 77, pl. 13 bis. France, Géraudot, Varennes, Novion, Escragnolles, Clar (Var).

\*4. *Astierianus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *N. Clementinus*, mais s'en distinguant par son siphon plus près du bord extérieur que du bord interne. Escragnolles.

\*5. *Albensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. Neckerianus*, Pictet, mais s'en distinguant par son siphon placé au tiers interne des tours, et par une dépression de la cloison près du retour de la spire. Novion, Clar (Var).

\*6. *Neckerianus*, Pictet, 1847, Descrip. moll. foss., p. 16, pl. 1, fig. 2. Perte du Rhône (Ain).

\*7. *Saussureanus*, Pictet, 1847. *Id.*, p. 17, pl. 1, fig. 3. Saxonet, Perte du Rhône.

\*8. *Rhodani*, Roux, Pictet, 1847, Descrip. moll. foss., p. 19, pl. 1, fig. 4. France, Perte du Rhône (Ain).

**CERATITES**, de Haan, 1825. Voy. t. 1, p. 171.

\*9. *Senecquieri*, d'Orb. *Ammonites idem*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 292, pl. 86, fig. 3, 5. France, Escragnolles.

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. t. 1, p. 181.

\*10. *Delucii*, Brongniart, 1822. *A. interruptus*, d'Orb. (non Brug.), Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 211, pl. 31, 32. *A. Chabreyanus*, Pictet, pl. 7, fig. 1 (jeune). France, Partout, Géraudot, Ervy, Wissant, Varennes, Escragnolles, Clar, Bussy-lès-Gy, Perte du Rhône; Angl., Folkstone, Warmünster; Savoie, Cluse; Suisse, Vaud, lac du Bournet.

\*11. *splendens*, Sow., 1815, d'Orb., Paléont., 1, p. 222, pl. 63, 64, *id. A. crenatus*, Sow. *A. Fittoni*, d'Arch. Wissant, Perte du Rhône, Escragnolles, Clar; Angl., Folkstone.

- '12. *auritus*, Sow., 1816, d'Orb., Paléont., 1, p. 227, pl. 65. Wissant, Charbonny, près de Noseroy (Jura); Angl., Folkstone.
- '13. *lautus*, Parkinson, 1818, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 230, pl. 64, fig. 3-5. Wissant; Angl., Folkstone.
- '14. *tuberculatus*, Sow., 1821, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 232, pl. 66. Wissant; Angl., Folkstone.
- '15. *Mosensis*, d'Orb., *id.*, 1, p. 237, pl. 67, fig. 5-7. Varennes.
- '16. *Baulinianus*, d'Orb., 1841, Paléont., 1, p. 238, pl. 68. *Amm. Guersanti*, d'Orb., pl. 67, fig. 1-4. Novion, Macheroménil, Varennes, Seignelay.
- '17. *Camatteanus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 241, pl. 69, fig. 1, 2. Caussols, Escragnolles, Clar, Saint-Pons.
- '18. *Michelinianus*, d'Orb., *id.*, p. 242, pl. 69, fig. 3-5. Novion.
- '19. *Archiacianus*, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 244, pl. 70. Novion, Macheroménil (Ardennes), Andon (Var).
- '20. *regularis*, Bruguière, d'Orb., Paléont., 1, p. 245, pl. 71, fig. 1-3. Novion (Ardennes), Varennes, Ervy (Aube), Perte du Rhône (Ain); Savoie, Cluse.
- '22. *tarde furcatus*, Leym., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 248, pl. 71, fig. 4, 5. Varennes, Ervy; Savoie, Cluse.
- '23. *mammillatus*, Schloth., 1813, d'Orb., Paléont., 1, p. 249, pl. 72, 73, *idem*. *A. Clementinus*, d'Orb. Macheroménil, Géraudot, Varennes, Escragnolles, Morteau, Perte du Rhône, Wissant; Savoie, Saxonet; Angl., Folkstone; Suisse, canton de Vaud au lac Bournet.
- '24. *Lyellii*, Leym., d'Orb., Paléont., 1, p. 255, pl. 74. *Amm. Huberianus*, Pictet, pl. 7, fig. 7. Géraudot, Ervy, Escragnolles, Varennes, Morteau, Clansayes; Savoie, Reposoir, montagne des Fis, etc., Saxonet.
- '25. *nodosocostatus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 258, pl. 75, fig. 1-4. Clansayes.
- '26. *Dutempleanus*, d'Orb., 1847. *A. fissicostatus*, d'Orb., Pal., 1, p. 261, pl. 76 (non Phillips). Novion, Varennes, Escragnolles, Morteau, Wissant.
- '27. *Milletianus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 263, pl. 77. Aubenton, Saint-Paul de Fenouillet, entre Opoul et Rivesaltes, Varennes, Novion, Clansayes, Perte du Rhône, Andon (Var), Morteau; Savoie.
- '28. *Puzosianus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 265, pl. 78. Novion.
- '29. *Mayorianus*, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 267, pl. 79. Perte du Rhône, Clansayes, Escragnolles; Savoie; Angleterre.
- '30. *latidorsatus*, Michelin, d'Orb., Paléont., 1, p. 270, pl. 80. *A. Jallabertianus*, Pictet, pl. 4, fig. 2. Géraudot, Ervy, Escragnolles, Clansayes, Partout.
- '31. *Parandieri*, d'Orb., Paléont., 1, p. 129, pl. 38, fig. 7-9. Escragnolles, Bussy-lès-Gy; montagne des Fis.
- '32. *Dupinianus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 276, pl. 81, fig. 6-8. Ervy, Géraudot, Macheroménil, Wissant; Savoie; Suisse (Vaud), lac du Bournet.
- '33. *Bendanti*, Brongniart, d'Orb., Pal., p. 278, pl. 33, fig. 1-3, pl. 34. Géraudot, Escragnolles, Wissant, Perte du Rhône, Novion.

Bussy-lès-Gy ; Savoie ; Angl., Folkstone ; Suisse (Vaud), lac du Bournet.

- \*34. *Velledæ*, Michelin, d'Orb., Paléont., 1, p. 280, pl. 82. Géraudot, Macheroménil, Perte du Rhône ; Savoie.
- \*35. *subalpinus*, d'Orb., 1847. *A. alpinus*, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 283, pl. 83, fig. 1-3 (non Risso, 1825). Escragnolles.
- \*36. *quercifolius*, d'Orb., 1842, Paléont., 1, p. 284, pl. 83, fig. 4-6. *A. Gossianus*, Pictet, 1847, pl. 4, fig. 5. Novion(Ardenne), Clar (Var), Martigues, Perte du Rhône (Ain).
- \*37. *versicostatus*, Michelin, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 273, pl. 81, fig. 1, 3. Géraudot, Escragnolles.
- \*38. *Cleon*, d'Orb., 1847, d'Orb. *A. Constantii*, Paléont., 1, p. 286, pl. 84, fig. 1, 2, 4, (exclus. fig. 3). Confondu à tort avec l'*A. bicurvatus* de l'étage aptien. Macheroménil.
- \*39. *Brottianus*, d'Orb., *id.*, p. 290, pl. 85, fig. 8-10. Perte du Rhône.
- \*40. *Hugardianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 291, pl. 86, fig. 1, 2. Perte du Rhône ; Savoie, montagne des Fis.
- \*41. *varicosus*, Sow., d'Orb., Paléont., 1, p. 294, pl. 87, fig. 1-5. Wissant, Perte du Rhône, Clar ; Angl., Folkstone.
- \*42. *Delaruei*, d'Orb., *id.*, p. 296, pl. 87, fig. 6-8. Escragnolles.
- \*43. *cristatus*, Deluc, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 298, pl. 88, fig. 1-5. Perte du Rhône, Wissant ; Savoie, montagne des Fis.
- \*44. *Bouchardianus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 300, pl. 88, fig. 6-8. France, Wissant, Perte du Rhône ; Angl., Folkstone.
- \*45. *Roissyanus*, d'Orb., *id.*, p. 302, pl. 89. Escragnolles, Clar, Dienville.
- \*46. *inflatus*, Sow., d'Orb., *id.*, 1, p. 304, pl. 90. *A. Balmatianus*, Pictet, pl. 9, fig. 1. *A. Rouzianus*, Pictet, pl. 9, fig. 2. *A. Candollianus*, Pictet, pl. 11. *A. varicosus*, Quenstedt, pl. 17, fig. 2 (non Sow.). Wissant, Perte du Rhône, Géraudot, Havre, Escragnolles ; Savoie, montagne des Fis, Saxonet.
- \*47. *Itterianus*, d'Orb., *id.*, p. 367, pl. 112, fig. 6, 7. Perte du Rhône.
- \*48. *proteus*, d'Orb., *id.*, p. 623. Clar. 7
- \*49. *cornutus*, Pictet, 1847. Descrip. moll. foss., p. 93, pl. 8, fig. 6. France, Perte du Rhône (Ain), Clar (Var).
- \*50. *Agassizianus*, Pictet, 1847, *id.*, p. 47, pl. 4, fig. 3, 4. *A. ventrocinctus*, Quenstedt, pl. 17, fig. 14. Clar ; Saxonet.
- \*51. *Denarius*, Sow., d'Orb., Paléont., 1, pl. 62. Wissant.
- \*52. *Timotheanus*, Mayor. Pictet, 1847. Descrip. moll. foss., p. 39, pl. 2, fig. 6, pl. 3, fig. 1, 2. *A. Jurinianus*, Pictet, pl. 3, fig. 3. *A. Bourretianus*, Pictet, pl. 4, fig. 1. Clar (Var) ; Savoie, Saxonet.
- \*53. *Mirapellianus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. Roissyanus*, mais ayant les tours plus étroits, les côtes simples, plus grosses et fortement épaissies et obtuses extérieurement. *A. cristatus*, Quenstedt, pl. 17, fig. 1 (non Deluc). Collette de Clar (Var).
- \*54. *Michellianus*, d'Orb., 1847. Singulière espèce sphérique,

striée en travers, plus haute que large, carénée au pourtour de l'ombilic qui est en entonnoir régulier, à pans droits. Clar.

\*55. *Adonis*, d'Orb., 1847. Jolie espèce comprimée, à dos tranchant, ornée de faibles côtes, espacées, arquées, distinctes. Elle rappelle des formes des étages jurassiques. Clar (Var).

\*56. *Aolus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. ambriatus*, mais à tours plus étroits, lisse dans le jeune âge, avec quatre côtes transverses; plus âgée, elle paraît avoir quelques petites côtes espacées. Clar (Var).

57. *Senebrianus*, Pictet, 1847, Descript. moll. foss., p. 73, pl. 6, fig. 7. Aux Escaliers-de-Sommier (Savoie).

58. *Tolletianus*, Pictet, 1847, Descript., p. 109, pl. 10, fig. 5. Lessex, au-dessus du lac de Flaine (Faucigny).

59. *Bonnetianus*, Pictet, 1847, Descript., p. 50, pl. 4, fig. 6. *A. Browniartianus*, Pictet, 1847, pl. 5, fig. 3 (jeune?). Savoie, Saxonet.

60. *Colladoni*, Pictet, 1847, Descript., p. 89, pl. 8, fig. 1. Châtillon-de-Michaille, près Bellegarde, Perte-du-Rhône (Ain).

61. *circularis*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 112, pl. 11, fig. 20. Angleterre (Kent), Burman, près de Maidstone.

\*61'. *Pictetianus*, d'Orb., 1849. Très-belle espèce voisine de l'*A. splendens*, mais à tours bien plus épais, à lobe dorsal régulier, avec des côtes transverses obliques de chaque côté du dos. France, Seignelay (Yonne); découverte par M. Ricordeau.

SCAPHITES, Parkinson, 1811. Voy. t. 2, p. 100.

\*62. *Astierianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 521. France, Clar.

\*63. *Hugardianus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 521; Pictet. Montagne des Fis.

CRIOCCERAS, Léveillé, 1837. Voy. t. 2, p. 65.

\*64. *Astierianus*, d'Orb., Paléontol., p. 468, pl. 115 bis, fig. 3-5. Escagnolles.

65. *Vaucherianus*, Pictet, 1847, Descript., p. 111, pl. 12, fig. 1. Savoie; Châtillon-de-Michaille, près Bellegarde.

ANCYLOCERAS, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.

\*66. *Saussureanus*, d'Orb., 1847. *Hamites Saussureanus*, Pictet, 1847, Descript., p. 118, pl. 13, fig. 1-7. Savoie, Saxonet; Perte-du-Rhône (Ain).

67. *spiniger*, d'Orb., 1847. *Hamites spiniger*, Sow., 1818, Min. Conch., 3, p. 29, pl. 216, fig. 2. *H. nodosus*, Sow., fig. 3. *H. tuberculatus*, Sow., fig. 4-5. Angl., Folkstone.

PTYCHOCERAS, d'Orb., 1842. Voy. t. 2, p. 66.

\*68. *adpressus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 555. *Ham. idem*, Sowerby. France, Escagnolles; Angl.

\*69. *Astierianus*, d'Orb., 1847. Espèce petite, pourvue de côtes égales obliques et assez petites partout. En cela, elle est bien différente du *Gaultinus*, Pictet. Clar.

70. *Gaultinus*, Pictet, 1847, Descript. moll. foss., p. 139, pl. 15, fig. 5 et 6. *P. Puxosianus*, Quenstedt, pl. 21, fig. 22 (non d'Orb., 1842). Savoie, Saxonet; Perte-du-Rhône (Ain).

**HAMITES**, Parkinson, 1811, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 526.

\*71. *punctatus*, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 532, pl. 131, fig. 6-8. France, Clansayes, Valcourt, Droyes.

\*72. *attenuatus*, Sow.; d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 533, pl. 131, fig. 9-13. Wissant, Perte-du-Rhône; Angl., Folkstone. M. Fitton l'a figurée avec deux crosses.

\*73. *flexuosus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 535, pl. 131, fig. 14-16. Wissant.

\*74. *rotundus*, Sow., d'Orb., Pal., 1, p. 536, pl. 132, fig. 1-4. Wissant, Escragnolles, Perte-du-Rhône, Clansayes. M. Clément Mulet l'a rencontrée avec deux crosses.

\*75. *alterno-tuberculatus*, Leym.; d'Orb., Paléont., 1, p. 538, pl. 133, fig. 5-10. Géraudot, Droyes, Valcourt, Escragnolles, Saint-Martin-le-Nœud. Nous la possédons avec ses deux crosses.

\*76. *Bouchardianus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 540, pl. 132, fig. 11-13. Wissant.

\*77. *elegans*, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 542, pl. 133, fig. 1-5. Escragnolles, Ervy; Savoie, montagne des Fis.

\*78. *Sablieri*, d'Orb., Paléont., 1, p. 543, pl. 133, fig. 6-10. Escragnolles.

\*79. *virgulatus*, d'Orb., Paléontol. franç., Terr. crét., 1, p. 545, pl. 134, fig. 1-4. Géraudot, Clar (Var); Savoie.

\*80. *Baulinianus*, d'Orb., Paléont. franç., 1, p. 546, pl. 134, fig. 5-11. France, Varennes, Macheroménil, Perte-du-Rhône.

\*81. *Neptuni*, d'Orb., 1847. Espèce grosse, ronde, de deux centimètres, munie de côtes nombreuses, inégales, effacées en dedans. Clar.

\*82. *Acteon*, d'Orb., 1847. Assez grosse espèce ronde, pourvue d'énormes côtes simples, interrompues en dedans. France, Clar.

\*83. *Favrinus*, Pictet, 1847, Descript., p. 124, pl. 12, fig. 5, 7. Saxonet; Perte-du-Rhône (Ain).

\*84. *Desorianus*, Pictet, 1847, Descript. moll. foss., p. 125, pl. 12, fig. 8. France, Perte-du-Rhône (Ain).

\*85. *Charpentieri*, Pictet, 1847, Descript., p. 131, pl. 14, fig. 2-4. Wissant (Pas-de-Calais), Perte-du-Rhône (Ain); Savoie, Saxonet.

\*86. *Studerianus*, Pictet, 1847, Descript., p. 137, pl. 15, fig. 1-4. Clar, Perte-du-Rhône; Savoie, Saxonet.

\*87. *Ixyon*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *H. alternato-tuberculatus*, mais ayant des pointes latérales placées plus sur la région ventrale. Clar (Var).

**TURRILITES**, Lamarck, 1801; d'Orb., Paléont., Terr. crét., 1, p. 569.

\*88. *catenatus*, d'Orb., Paléontol. franç., Terr. crét., 1, p. 574, pl. 140, fig. 1-3. France, Escragnolles, Perte-du-Rhône.

\*89. *Mayorianus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 576, pl. 140, fig. 4-5. Perte-du-Rhône.

\*90. *elegans*, d'Orb., *id.*, 1, p. 577, pl. 140, fig. 6-7. Perte-du-Rhône, Clar.

\*91. *Astierianus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 578, pl. 140, fig. 8-11. Escragnolles.

\*92. *Senecquierianus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 579, pl. 141, fig. 1-2. Aiglun, Clar.

- \*93. *bituberculatus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 582, pl. 141, fig. 7-10. Escragnolles.
- \*94. *Moutonianus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 584, pl. 147, fig. 7-8. Escragnolles.
- \*95. *Robertianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 585, pl. 142. France, Perte-du-Rhône, Clar.
- \*96. *Puzosianus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 587, pl. 143, fig. 1-2. France, Villard-de-Lans ; Savoie.
- \*97. *Hugardianus*, d'Orb., *id.*, 1, p. 588, pl. 147, fig. 9-11. Mont. des Fis.
- \*98. *Vibrayeanus*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 589, pl. 148, fig. 1-4. France, Dienville (Aube), Clar (Var).
- \*99. *Bergeri*, Brongniart, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 590, pl. 143, fig. 3-6. Aiglun ; Savoie.
- 100. *Escherianus*, Pictet, 1847, Descript., p. 154, pl. 15, fig. 11. Tanneverges.
- HELICOCERAS**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 609.
- \*101. *annulatus*, d'Orb., 1842, Pal., 1, p. 611, pl. 148, fig. 7-9. Escragnolles.
- 102. *gracilis*, d'Orb., 1842, Paléont., 1, p. 612, pl. 148, fig. 10-15. Dienville.
- \*103. *plicatilis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *H. annulatus*, mais couverte de bien plus petites côtes. Il devient aussi bien plus grand et plus disjoint. Clar (Var).
- \*104. *obliquatus*, d'Orb., 1847. Espèce à côtes simples, très-obliques, à tours infiniment moins ouverts que chez les espèces précédentes. Clar.
- \*105. *depressus*, d'Orb., 1847. Espèce à tours très-séparés, dont les côtes larges, obtuses, simples, sont interrompues en dedans et pourvues d'une dépression en dehors. Clar.
- \*106. *Moutonianus*, d'Orb., 1847. Espèce ornée de côtes inégales, pourvue de trois en trois d'une côte plus grosse, munie de deux tubercules ; tours très-lâches ; petite espèce. Clar.
- \*107. *Astierianus*, d'Orb., 1847. *Turrilites catenatus evolutus*, Quenstedt, pl. 21, fig. 25 (non d'Orb., 1842). Belle espèce à tours peu écartés, munie de petites côtes qui s'agglomèrent trois par trois à deux rangées de tubercules externo-supérieurs. Clar, Seignelay (Yonne).
- \*108. *tuberculatus*, d'Orb., 1847. Curieuse espèce à tours peu écartés, pourvue de quatre rangées de tubercules sur des côtes simples. Clar.
- \*109. *elegans*, d'Orb., 1847. Espèce pourvue de côtes simples, rapprochées qui ont, de onze en onze, un tubercule latéro-supérieur ; tours très-disjoints. Clar.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**RISSOA**, Fréminville, 1814. Voy. t. 1, p. 182.

- 110. *Dupiniana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 60, pl. 155, fig. 8-10. Ervy.

**RISSOINA**, d'Orb., 1840. Voy. t. 1, p. 297.

**111. incerta**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 62, pl. 153, fig. 11-13. Ervy.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801.

\***112. Clementina**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 2, p. 52, pl. 154, fig. 6-9. *Melanopsis Clementina*, Michelin, 1833. Géraudot, Ervy, Clansayes, Clar, Morteau, Macheroménil.

\***113. Dupiniana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 2, p. 54, pl. 154, fig. 10-13. Ervy, Géraudot, Clansayes, Wissant, Novion.

\***114. Gaultina**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 56, pl. 154, fig. 14-16. Wissant.

\***115. Rauliniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 57, pl. 155, fig. 1-4. Macheroménil.

\***116. Gastina**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 58, pl. 155, fig. 5-7. Géraudot.

**116'. Rhodani**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 169, pl. 16, fig. 3. Perte-du-Rhône (Ain); Saxonet.

**116". gurgitis**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 170, pl. 16, fig. 4. Perte-du-Rhône.

**TURRITELLA**, Lam., 1801. Voy. t. 2, p. 67.

\***117. Vibrayeana**, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 37, pl. 151, fig. 10-12. Géraudot, St-Paul de Fenouillet.

\***118. Hugardiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 2, p. 38, pl. 151, fig. 13-16. France, Escragnolles; Savoie, près de Cluse.

**119. Rauliniana**, d'Orb., 1842, Paléont., p. 38, pl. 151, fig. 17, 18. Macheroménil.

**119'. Faucignyana**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 166, pl. 16, fig. 1. Perte-du-Rhône (Ain); Savoie, Faucigny.

**ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.

\***120. Vibrayeana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 123, pl. 167, fig. 16-18. Géraudot, Ervy.

**VARIGERA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 68.

**121. Escragnollensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce, longue de 60 mill., lisse, allongée, avec des varices qui se correspondent. France, Escragnolles, St-Pons.

**AVELLANA**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 131.

\***122. lacryma**, d'Orb., 1847. *Ringinella id.*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 127, pl. 167, fig. 12-21-23. France, Géraudot, Ervy, Clansayes.

\***123. inflata**, d'Orb., 1847. *Ringinella id.*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 128, pl. 168, fig. 1-4. Macheroménil, Novion, Varennes, Ervy, Clansayes; Angl., Ridge.

**124. Clementina**, d'Orb., 1847. *Ringinella id.*, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 129, pl. 168, fig. 5-8. Géraudot, Ervy.

\***125. subincrassata**, d'Orb., 1847. *Avellana incrassata*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 133, pl. 168, fig. 13-16 (non Sow., 1817). Ervy, Perte-du-Rhône, Varennes, Clar; Savoie, près de Cluse.

\***126. Hugardiana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 135, pl. 168, fig. 17-19. Cluse.

\***127. Dupiniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 136, pl. 169, fig. 1-4. Ervy.



- 128. Ovula**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 137, pl. 169, fig. 5-6. Ervy.
- 128'. Alpina**, d'Orb., 1849. *Ringinella Alpina*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 172, pl. 16, fig. 5. Perte-du-Rhône; Saxonet (Savoie).
- NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.
- \*129. Clementina**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 154, pl. 172, fig. 4. Ervy, Novion, Martigues; Savoie, Cluse.
- \*130. excavata**, Michelin, 1836; d'Orb., Paléont., 2, p. 155, pl. 173, fig. 1, 2. France, Ervy, Géraudot.
- \*131. Gaultina**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 156, pl. 173, fig. 3, 4. Wissant, Novion, Perte-du-Rhône, Ervy, Clar, Clansayes, Morteau; Savoie, Cluse; Angl.
- \*132. Dupinii**, Leymerie, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 158, pl. 173, fig. 5, 6. France, Géraudot, Clansayes.
- \*133. Ervyna**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 159, pl. 173, fig. 7. Ervy, Novion, Clansayes, Perte-du-Rhône.
- \*134. Bauliniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 160, pl. 174, fig. 1. Novion, Chepy, Clansayes, Ervy; Savoie, Cluse.
- 134'. truncata**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 185, pl. 18, fig. 2. Saxonet; Perte-du-Rhône.
- 134". perspicua**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 187, pl. 18, fig. 4. Perte-du-Rhône.
- \*135. Arduennensis**, d'Orb., 1847. Espèce intermédiaire pour la longueur entre le *N. Clementina* et le *Natica Ervyna*, à ombilic fermé. Novion (Ardennes).
- 135'. Favrina**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 181, pl. 17, fig. 4. Saxonet (Savoie); Perte-du-Rhône (Ain).
- 135". Rhodani**, Pictet et Roux, 1849, p. 182, pl. 17, fig. 3. Perte-du-Rhône.
- NARICA**, d'Orb., 1839.
- 135"" Genevensis**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 188, pl. 18, fig. 5. Saxonet; Perte-du-Rhône.
- NERITOPSIS**, Sowerby, 1825. Voy. t. 1, p. 64.
- \*136. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce à tours très-détachés, au moins dans le moule interne que nous connaissons. France, Clar.
- TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.
- \*137. conoideus**, d'Orb., 1847. *Solarium conoideum*, Fitton, d'Orb. Paléont., 2, p. 198, pl. 179, fig. 13-15. Wissant, Perte-du-Rhône, Clar; Angl., Folkstone.
- 137'. Guyotianus**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 202, pl. 19, fig. 8. Perte-du-Rhône.
- 137". Tolletianus**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 203, pl. 19, fig. 9. Perte-du-Rhône.
- 137"" Nicoletianus**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 204, pl. 19, fig. 10. Saxonet.
- 137 a. Alpinus**, d'Orb., 1849. *Solarium Alpinum*, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 222, pl. 21, fig. 9. Saxonet, envir. de Cluse; Lessex, au-dessus du lac de Flaine (Faucigny).
- 137 b. triplex**, d'Orb., 1849. *Solarium triplex*, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 216, pl. 21, fig. 3. Saxonet; Perte-du-Rhône.

- 137 c. Hugianus**, d'Orb., 1849. *Solarium Hugianum*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 221, pl. 21, fig. 8. Au Saxonet, au Reposoir, et à la Perte-du-Rhône.
- SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.
- \***138. Astierianum**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 196, pl. 179, fig. 5-7. Clar.
- \***139. moniliferum**, Michelin, d'Orb., Paléont., 2, p. 197, pl. 179, fig. 8-12. Géraudot, Ervy, Macheroménil, Clansayes.
- \***140. subornatum**, d'Orb., 1847. *S. ornatum*, Fitton, 1836, d'Orb., Paléont., 2, p. 199, pl. 180, fig. 1-4 (non Lea, 1833). Wissant, Lacholade (Meuse), Perte-du-Rhône.
- \***141. dentatum**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 201, pl. 180, fig. 5-8. Ervy, Valcourt, Clansayes, Avaucourt, Clar; Savoie, Cluse.
- \***142. cirrhoide**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 202, pl. 180, fig. 9-12. Perte-du-Rhône.
- \***143. granosum**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 203, pl. 181, fig. 1-8. Ervy, Perte-du-Rhône, Clar; Savoie, Cluse.
- \***144. Albense**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 205, pl. 183, fig. 1-4. Ervy.
- 144'. Rochatianum**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 209, pl. 20, fig. 2. Perte-du-Rhône.
- 144". Deshayesi**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 214, pl. 20, fig. 6. Perte-du-Rhône.
- 144 a. Tingryanum**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 215, pl. 21, fig. 1. Perte-du-Rhône; Saxonet.
- 144 b. Tollotianum**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 218, pl. 21, fig. 6. Perte-du-Rhône.
- STRAPAROLUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 6.
- \***145. Martinianus**, d'Orb., 1847. *Solarium id.*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 204, pl. 181, fig. 9-14. Clar, Perte-du-Rhône.
- PHASIANELLA**, Lamarck, 1802. Voy. t. 1, p. 67.
- \***146. Gaultina**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 233, pl. 187, fig. 3. Géraudot.
- \***147. Ervyna**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 234, pl. 188, fig. 1-3. Ervy, Novion.
- \***148. Ovula**, d'Orb., 1847. Assez grosse espèce renflée dont le dernier tour est très-grand, finement strié en travers. Novion.
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.
- \***149. Astierianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 216, pl. 182, fig. 18-20.
- \***150. plicatilis**, Deshayes, 1842; d'Orb., Paléont., 2, p. 217, pl. 183, fig. 11-13. Ervy.
- \***151. Pictetianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 219, pl. 184, fig. 8-10. Perte-du-Rhône.
- \***152. Alsus**, d'Orb., 1847. *T. decussatus*, d'Orb., 1842, Paléont. fr., 2, p. 219, pl. 184, fig. 11-13 (non Montagu, 1803). France, Ervy.
- \***153. Chassianus**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 220, pl. 185, fig. 1-3. France, Clar, Perte-du-Rhône.
- \***154. subdispar**, d'Orb., 1847. *T. dispar*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 2, p. 222, pl. 185, fig. 4-6 (non Turton, 1819). France, Ervy.

- 155. *Alpinus***, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 230. Clar, Perte-du-Rhône.
- 156. *indecisus***, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 230. Clar, Clansayes, Perte-du-Rhône.
- 157. *Icarus***, d'Orb., 1847. Espèce globuleuse à fines stries en long et en travers. Côtes-Noires (Haute-Marne).
- 157". *Gresslyanus***, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 194, pl. 19, fig. 2. Perte-du-Rhône (Ain).
- 157". *Golezianus***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 196, pl. 19, fig. 4. Perte-du-Rhône.
- 157 a. *Faucignyanus***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 195, pl. 19, fig. 3. Saxonet.
- 157 b. *Saxoneti***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 197, pl. 19, fig. 5. Saxonet.
- 157 c. *Montmollini***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 198, pl. 19, fig. 6. Perte-du-Rhône.
- FLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1835. Voy. t. 1, p. 7.
- 158. *dimorpha***, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 246, pl. 191, fig. 5-9. Clar.
- 159. *Gaultina***, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 247, pl. 191, fig. 10, 11. Wissant.
- 160. *Lima***, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 248, pl. 192, fig. 1-3. Clar.
- 161. *Gibbsii***, d'Orb., 1847. *P. gurgites*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 249, pl. 192, fig. 4-6. *Trochus Gibbsii*, Sowerby. Perte-du-Rhône, Varennes, Wissant, Clansayes, Clar; Angl., Folkstone.
- 162. *Rhodani***, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 2, p. 250, pl. 192, fig. 7, 8. *P. Saussureana*, Pictet, 1849, Descr., pl. 23, fig. 1. France, Perte-du-Rhône, Clar.
- 163. *Alpina***, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 273. Saulce-aux-Bois; Savoie, Cluse.
- 164. *Paris***, d'Orb., 1847. Espèce de la forme du *P. Lima*, mais avec de fortes côtes longitudinales grenues. Clansayes.
- 165. *Montonianus***, d'Orb., 1847. Espèce à tours plus larges que chez le *P. Gaultina*, et d'une taille moyenne. Clar.
- 166. *Sabaudiana***, d'Orb., 1847. Grosse espèce conique, à tours étroits et à ombilic large. Clar; Savoie, Cluse.
- 166". *plicata***, d'Orb., 1847. *Cirrus plicatus*, Sow., 1818, M. C., 2, p. 93, pl. 141, fig. 3. Angl., Folkstone.
- 166". *Thurmanni***, Pictet et Roux, 1849, Descrip., p. 230, pl. 22, fig. 1. Saxonet.
- 166 a. *Faucignyana***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 232, pl. 22, fig. 2. Saxonet.
- 166 b. *Itieriana***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 233, pl. 22, fig. 3. Perte-du-Rhône.
- 166 c. *Carthusius***, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 235. Près de la Chartreuse du Reposoir.
- 166 d. *Saxoneti***, Pictet et Roux, 1849, Descr., p. 236. Saxonet.
- 166 e. *Allobrogeus***, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 240, pl. 23, fig. 3. Perte-du-Rhône et dans le val Chézery.
- 166 f. *Pictetiana***, d'Orb., 1849. *P. coronata*, Pictet et Roux, 1849,

- id.*, p. 241, pl. 23, fig. 4 (non Etage 6, n° 389). Saxonet, Perte-du-Rhône et Reposoir.
- 166 g. *Begina***, Pictet et Roux, 1849, Descr., p. 243, pl. 24, fig. 2. Le Saxonet, le val Chézery et la Perte-du-Rhône.
- 166 h. *Beuxii***, d'Orb., 1849. *P. Fittoni*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 244 (non Rœmer). Perte-du-Rhône.
- 166 i. *Saussureana***, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 239, pl. 23, fig. 1. Saxonet.
- Genre **STOMATIA**, Lam. Voy. t. 1, p. 7.
- 166 j. *Gaultina***, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 245, pl. 24, fig. 3. Saxonet et à la Perte-du-Rhône.
- STROMBUS**, Linné, 1758; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 313.
- \*167. *Dupinianus***, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 313, pl. 217, fig. 3. Ervy; Savoie, Cluse.
- PTEROCEA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.
- \*168. *bicarinata***, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 307, pl. 208, fig. 5. Ervy, Courtaout, Macheroménil.
- 168'. *subretusa***, d'Orb., 1849. *P. retusa*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 263, pl. 25, fig. 11 (non Sowerby, 1836). Saxonet; Perte-du-Rhône, Reposoir, Samoëns.
- 168". *Gaultina***, d'Orb., 1849. *Pterodonta Gaultina*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 266, pl. 26, fig. 1. Perte-du-Rhône; Saxonet, Reposoir.
- 168 c. *carinella***, d'Orb., 1849. *Pterodonta carinella*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 267, pl. 26, fig. 2. Perte-du-Rhône.
- ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.
- \*169. *carinata***, Mantell, 1822; d'Orb., Paléont., 2, p. 284, pl. 207, fig. 2. Dienville, Wissant, Clar, Arrancourt; Angl., Ringemer, Folkstone, Ridge.
- \*170. *Muleti***, d'Orb., 1847. *R. calcarata*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 285, pl. 207, fig. 3, 4 (non *carinata*, Sow., 1832). Ervy, Courtaout.
- \*171. *tricostata***, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 287, pl. 207, fig. 1, 6. Ervy.
- \*172. *carinella***, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 287, pl. 207, fig. 1, 8. Ervy, Epothermont, Dienville, Géraudot.
- \*173. *costata***, Michelin, 1836. *R. Parkinsoni*, d'Orb., Paléont., 2, p. 288, pl. 208, fig. 1, 2 (non Mantell, 1822). *R. Orbignyana*, Pictet et Roux, 1849, pl. 24, fig. 4. Perte-du-Rhône, Ervy, Wissant, Valcourt, Novion, Varennes, Clar; Angl., Folkstone.
- \*174. *Drumensis***, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 298. Clansayes.
- \*175. *Itieriana***, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 298. Perte-du-Rhône.
- 176. *elongata***, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 114, pl. 11, fig. 16. Angl. (Kent), Copt-Point, Folkstone.
- \*176'. *Parkinsoni***, Mantell, 1822, Parkinson, 1811, Org. rem., 2, pl. 5, fig. 11. Pictet et Roux, 1849, p. 251, pl. 24, fig. 5 (exclus. syn.). Perte-du-Rhône; Saxonet.
- 176". *subsubulata***, d'Orb., 1849. *R. subulata*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 254, pl. 25, fig. 1 (non Reuss). Perte-du-Rhône; Saxonet.

- 176 a. Grasiata**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 255, pl. 27, fig. 1. Perte-du-Rhône.
- 176 b. Neckeriana**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 256, pl. 25, fig. 3. Saxonet; Perte-du-Rhône.
- 176 c. submarginata**, d'Orb., 1849. *R. marginata*, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 257, pl. 25, fig. 5 (non Sowerby, 1836). Perte-du-Rhône, val Romey (Ain).
- 176 d. Timotheana**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 258, pl. 25, fig. 6. Saxonet.
- 176 e. fusiformis**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 259, pl. 25, fig. 8. Perte-du-Rhône.
- 176 f. cingulata**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 261, pl. 25, fig. 7. Perte-du-Rhône.
- 176 g. Deluci**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 262, pl. 25, fig. 2. Perte-du-Rhône.
- FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- \*177. Dupinianus**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 334, pl. 222, fig. 6, 7. Ervy.
- \*177'. Albensis**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 334, pl. 222, fig. 8-10. Ervy.
- \*178. Gaultinus**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 335, pl. 223, fig. 1. Géraudot.
- \*179. Itierianus**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 336, pl. 223, fig. 2, 3. Perte-du-Rhône.
- \*180. subelegans**, d'Orb., 1847. *F. elegans*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 337, pl. 223, fig. 4, 5 (non Brown, 1827). France, Courtaout.
- \*181. Vibrayanus**, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. créét., 2, p. 338, pl. 223, fig. 6, 7. France, Dienville, Géraudot, Ervy.
- \*182. Clementinus**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 339, pl. 223, fig. 8, 9. Géraudot.
- \*183. indecisus**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 344. Géraudot.
- \*184. Cottaldinus**, d'Orb., 1847. Jolie espèce allongée, pourvue de grosses ondulations longitudinales et de côtes transverses. Géraudot, Perte-du-Rhône.
- \*185. Alpinus**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, qui se rapproche un peu des Tritons, par sa forme et la présence de quelques varices. Clar.
- 186. Smithii**, d'Orb., 1847. *Pyrula Smithii*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 114, pl. 11, fig. 15. Angl. (Kent), Copt-Point.
- 186'. Genevensis**, d'Orb., 1849. *Murex Genevensis*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 269, pl. 26, fig. 3. Perte-du-Rhône.
- 186". trunculus**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 271, pl. 26, fig. 4. Perte-du-Rhône.
- 186 a. subbillineatus**, d'Orb., 1849. *F. bilineatus*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 272, pl. 26, fig. 6 (non Brown, 1837). Perte-du-Rhône.
- 186 b. Fisiannus**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 273, pl. 26, fig. 5. Montagne des Fis, Saxonet.

- 186 c. Sabaudianus**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 273, pl. 226, fig. 7 et pl. 27, fig. 2. Saxonet.
- 186 d. subdeccussatus**, d'Orb., 1849. *F. deccussatus*, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 275, pl. 27, fig. 3 (non Desh., 1830, non Brown, 1837). Perte-du-Rhône.
- ORITHIUM**, Bruguière, 1757. Voy. t. 1, p. 196.
- \***187. subspinosum**, Desh., 1842, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 364, pl. 229, fig. 4-6. Ervy, Géraudot, Novion.
- \***188. Lallierianum**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 365, pl. 229, fig. 7-9. Ervy, Géraudot, Macheroménil.
- \***189. Vibrayanum**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 366, pl. 229, fig. 10-13. Dienville, Ervy.
- \***190. Ervynum**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 367, pl. 230, fig. 1-3. Ervy.
- \***191. tectum**, d'Orb., 1843, Paléont. fr., 2, p. 368, pl. 230, fig. 4-6. France, Dienville (Aube), Novion (Ardennes).
- \***192. trimonile**, Michelin, 1838; d'Orb., Paléont., 2, p. 369, pl. 230, fig. 7-9. France, Géraudot, Clansayes, Novion.
- \***193. ornatissimum**, Deshayes, 1842; d'Orb., 1843, Pal. franç., 2, p. 370, pl. 230, fig. 10, 11. Ervy, Varennes, Novion.
- \***194. excavatum**, Brongniart, 1822; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 371, pl. 230, fig. 12. Perte-du-Rhône.
- \***195. Hugardianum**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. excavatum*, mais s'en distinguant par un canal sur la suture des tours. Montagne des Fis.
- 196. buccinoides**, d'Orb., 1847. *Rostellaria buccinoides*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 114, pl. 17, fig. 77. Angleterre, (Kent), Eastware Bay.
- 196'. Derignyanum**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 277, pl. 27, fig. 4. Perte-du-Rhône.
- 196". Sabaudianum**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 278, pl. 27, fig. 5. Saxonet.
- 196 a. Rhodani**, Pictet et Roux, 1849, *id.*, p. 279, pl. 27, fig. 6. Perte-du-Rhône.
- 196 b. gurgitis**, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 280, pl. 27, fig. 8. Saxonet; Perte-du-Rhône.
- BUCCINUM**, Linné, 1758, d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 349.
- \***197. Gaultinum**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 350, pl. 233, fig. 1, 2. France, Macheroménil.
- EMARGINULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 197.
- \***198. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce conique, à ventral et latéral recourbé, à large fissure. Clar.
- HELOXION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.
- \***199. tenuicosta**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 398, pl. 235, fig. 7-10. Géraudot, St-Florentin.
- \***200. conica**, d'Orb., 1847. Espèce aussi haute que large, conique, lisse. France, Clar.
- 200'. laevis**, d'Orb., 1847. *Patella laevis*, Sow., 1819, Min. Conch., 2, pl. 139, fig. 3, 4. Angl., Folkestone.

- 200<sup>n</sup>.** *inflata*, d'Orb., 1849. *Acmea inflata*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 283, pl. 27, fig. 10. Perte-du-Rhône.
- 200 a.** *Gaultina*, d'Orb., 1849. *Acmea Gaultina*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 284, pl. 27, fig. 11. Perte-du-Rhône.
- DENTALIUM**, Linné, 1758. D'Orb., t. 1, p. 73.
- 201.** *decussatum*, Sowerby, 1814; d'Orb., Paléont., 2, p. 400, pl. 236, fig. 1-6. Géraudot, Epothermont, Varennes, Avancourt; Angl. Folkstone.
- 201'** *serratum*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 286, pl. 27, fig. 12. Perte-du-Rhône.
- 201<sup>n</sup>.** *Rhodani*, Pictet et Roux, 1849, Descr. des Moll. foss., p. 286, pl. 27, fig. 13. Perte-du-Rhône; Saxonet.
- BELLEOPHINA**, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 410.
- 202.** *Vibrayei*, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 411, pl. 236, fig. 7-12. Dienville.

### MOLLUSQUES LA MELLIBRANCHES.

- TEREDO**, Linné, 1758. D'Orb., Pal., Terr. crét., 3, p. 301.
- 203.** *Argonensis*, Buvignier, 1843; d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 202, pl. 248, fig. 1, 2. France, Grand-Pré, Varennes.
- PHOLAS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.
- 204.** *subcylindrica*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 308, pl. 349, fig. 5-8. Maufaucou, Macheroménil, Seignelay.
- SOLEN**, Linné, 1758. D'Orb., Paléont., Terr. crét., 3, p. 318.
- 205.** *Dupinianus*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 320, pl. 350, fig. 3, 4. Ervy.
- PANOPAEA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.
- 206.** *acutisulcata*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 336, pl. 357, fig. 1-3. Varennes, Novion, Ervy; Savoie, Cluse.
- 207.** *Arduennensis*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 338, pl. 358, fig. 1, 2. Varennes.
- 208.** *Constantii*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 339, pl. 358, fig. 3, 4. Saulce-aux-Bois.
- 209.** *inæquivalvis*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 340, pl. 258, fig. 5-7. Novion, Ervy, Varennes.
- 210.** *plicata*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 337, pl. 357, fig. 4, 5. Ervy, Escagnolles.
- PHOLADOMYA**, Sowerby, 1826. Voy. t. 1, p. 18.
- 211.** *Fabrina*, Agassiz, 1844; d'Orb., Paléont., Terr. crét., 3, p. 354, pl. 363, fig. 6, 7. Ervy, Perte-du-Rhône.
- 212.** *Bauliniana*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 355, pl. 363, fig. 4, 5. Fléville.
- 213.** *Dutempleana*, d'Orb., 1847. Belle espèce pourvue d'une carène qui sépare la région anale de la région palléale, très-ventrue aux crochets. La Vignette (Marne).
- PERIPLONA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- 214.** *simplex*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 352, pl. 372, fig. 5, 6. Varennes, Novion, Ervy.

**SAXICAVA**, Fleuriau, 1802. .

\*215. *antiqua*, d'Orb., 1847. Espèce oblongue, renflée, ridée. France, Novion.

**LA VIGNON**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 306.

\*216. *Clementina*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 406, pl. 377, fig. 5-7. Géraudot, Dienville.

\*217. *subphascolina*, d'Orb., 1847. *L. Phascolina*, d'Orb., 1844, Paléont., Terr. crét., 3, p. 407, pl. 379, fig. 8-10 (non 18, 97). Géraudot.

**ARCOPAGIA**, Brown, 1827. Voy. t. 2, p. 75.

\*218. *Bauliniana*, d'Orb., 1844, Paléont., Terr. crét., 3, p. 411, pl. 378, fig. 7-10. Macheroménil, Varennes.

**TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.

\*219. *Morcana*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 411, pl. 380, fig. 3-5. Mau-faucon.

**LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.

\*220. *Maris*, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 169, pl. 301, fig. 4-6. Côtes-Noires, près de Mœlain, Ervy.

\*221. *solea*, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 170, pl. 304, fig. 4-6. Ervy.

\*222. *subrecurva*, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, d'Orb., 1843, Pal. 3, p. 170, pl. 301, fig. 7-9. Géraudot, Ervy, Mœlain, Morteau; Angl.

\*223. *Vibrayeana*, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 172, pl. 301, fig. 12-14. France, Dienville, Macheroménil.

\*224. *undulata*, d'Orb., 1847. *Nucula undulata*, Sow., 1827, Min. Conch., 6, p. 103, pl. 554, fig. 3. Angl., Folkstone.

**VENUS**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 15.

\*225. *Vibrayeana*, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 442, pl. 384, fig. 16-20. Varennes, Novion, Ervy, Dienville; Savoie, montagne des Fis.

**THETIS**, Sowerby, 1826. Voy. t. 1, p. 75.

\*226. *minor*, Sow., 1826; d'Orb., Paléont., 3, p. 454, pl. 387, fig. 4-7. Novion, Macheroménil, Varennes, Clansayes, Seignelay (Yonne); Angleterre.

**CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.

\*227. *socialis*, d'Orb., 1847. Petite espèce renflée qui se trouve en nombre considérable dans la roche. Wissant.

**OPIS**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.

\*228. *Hugardiana*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 52, pl. 253, fig. 6-8. Cluse (Savoie); Seignelay (Yonne).

\*229. *Sabaudiana*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 53, pl. 254, fig. 1, 3; pl. 257, fig. 4-6. Clansayes; Savoie, Cluse.

**ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 2, p. 216.

\*230. *Dupiniana*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 70, pl. 264, fig. 4-6. Ervy.

\*231. *Bellona*, d'Orb., 1847. Grande espèce circulaire et comprimée, à rides concentriques. Novion.

**CRASSATELLA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 77.

\*232. *inornata*, d'Orb., 1847. Espèce un peu carrée, dont je ne connais que le modèle intérieur. Wissant.

**ARDITA**, Bruguière, 1789. Voy. t. 2, p. 77.



- '233. *Constantii*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 89, pl. 269, fig. 1-5. France, Saulce-aux-Bois, Varennes, Clar.
- '234. *Dupiniana*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 88, pl. 268, fig. 6-10. France, Ervy, Géraudot, Mont-Blainville.
- '235. *tenuicosta*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 87, pl. 268, fig. 1-5. Wissant, Géraudot, Dienville, Novion, Varennes, Saint-Paul-de-Fenouillet; Angl., Kent.
- '236. *exaltata*, d'Orb., 1847. Espèce carrée, carénée sur la région anale, à crochets très-saillants et très-séparés. Morteau.
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.
- '237. *cordiformis*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 101, pl. 273. France, Novion, Varennes, Ervy, Wissant.
- '238. *Ervyensis*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 102, pl. 274. Macheroménil, Beaumé, Wissant, Ervy; Savoie, montagne des Fis.
- '239. *regularis*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 100, pl. 272, fig. 3-6. Ervy, Novion, Varennes, Clansayes; Savoie, Cluse.
- FRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.
- '240. *aliformis*, Parkinson, 1811; d'Orb., Paléont., 3, p. 143, pl. 291, fig. 1-3. France, Novion, Varennes, Seignelay; Angleterre, Parkham.
- '241. *Archiaciana*, d'Orb., 1843, Paléontol., 3, p. 142, pl. 290, fig. 6-10. Varennes, Saulce-aux-Bois, Mont-Blainville, Seignelay.
- '242. *Constantii*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 144, pl. 291, fig. 4-6. Macheroménil.
- '243. *Fittoni*, Desh., 1842; d'Orb., Paléont., 3, p. 140, pl. 290, fig. 1-5. Géraudot, Ervy, Epothermont, Macheroménil, Seignelay.
- LUONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.
- '244. *Arduennensis*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 120, pl. 283, fig. 8-10. Macheroménil.
- '245. *Vibraycana*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 120, pl. 283, fig. 5-7. Géraudot.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- '246. *Constantii*, d'Orb., 1843. Paléont., 3, p. 26, pl. 242, fig. 5-6. Novion, Ervy.
- '247. *Dupinianum*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 26, pl. 242 bis. Ervy.
- '248. *Baulinianum*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 2, pl. 242, fig. 7-10. Fréville, Géraudot.
- ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. t. 1, p. 132.
- '249. *crassicornis*, d'Orb., 1847. *Ceromya crassicornis*, Agass., 1842, Étud. crit., p. 36, pl. 8, fig. 4-10. Chablais; Saxonet.
- MUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 12.
- '250. *Albensis*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 172, pl. 301, fig. 15-17. Dienville, Géraudot, Ervy, Mœlain.
- '251. *Arduennensis*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 174, pl. 302, fig. 4-8. Macheroménil, Varennes.
- '252. *bivirgata*, Fitton, 1836; d'Orb., Paléont., 3, p. 176, pl. 303, fig. 1-7. Géraudot, Dienville, Mœlain, Wissant.
- '253. *ovata*, Mantell, 1822; d'Orb., Paléont., 3, p. 173, pl. 302.

- fig. 1-3. Géraudot, Ervy, Epothermont, Varennes, Vauquois, Morteau ; Angleterre, Sussex.
- \*254. ornatissima**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 176, pl. 362, fig. 9-12. Wissant.
- \*255. pectinata**, Sow., 1843 ; d'Orb., Paléont., 3, p. 177, pl. 303, fig. 8-14. Géraudot, Dienville, Mœlain, Morteau, Wissant, Novion, Seignelay, Saint-Paul-de-Fenouillet ; Savoie, Cluse ; Anglet, Kent.
- ISOARCA**, Münster, 1843.
- \*256. costata**, d'Orb., 1847. Belle espèce renflée, couverte de petites côtes rayonnantes. Clar.
- PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 80.
- \*257. alternatus**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 188, pl. 306, fig. 7-11. Varennes, Novion.
- ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.
- \*258. carinata**, Sow., 1818 ; d'Orb., Paléont., 2, p. 311, pl. 313, fig. 1-3. Géraudot, Ervy, Perte-du-Rhône, Clansayes, etc., etc.
- \*259. Cottaldina**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 217, pl. 312, fig. 7-9. Varennes, Ervy ; Savoie, Cluse.
- \*260. fibrosa**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 212, pl. 312. Novion, Ervy, Géraudot, Varennes, Morteau ; Savoie, Cluse.
- \*261. Hugardiana**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 216, pl. 313, fig. 5-6. Ervy, Novion, etc. ; Savoie, Cluse.
- \*262. nana**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 210, pl. 311, fig. 8-12. Géraudot, Droyes.
- MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.
- \*263. Albensis**, d'Orb., 1847. Espèce de la série des modioles de Lamarck, lisse, très-large sur la région buccale. Novion ; Cluse.
- \*264. Bella**, d'Orb., 1847. *Modiola bella*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 113, pl. 11, fig. 9. Angl. (Kent), near Hythe.
- LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.
- \*265. Albensis**, d'Orb., 1845, Paléont., Terr. crét., 3, p. 541, pl. 416, fig. 15-16. Ervy, Macheroménil.
- \*266. Rauliniana**, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 542, pl. 417, fig. 3, 4, 5, 6, Grand-Pré.
- \*267. Rhodaniana**, d'Orb., 1845, Paléont. franc., Terr. crét., 3, p. 541, pl. 416, fig. 17-19. France, Perte-du-Rhône, Clar.
- \*268. parallela**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 539, pl. 416, fig. 11-14. Géraudot, Dienville, Varennes ; Savoie, Cluse.
- AVICULA**, Klein, 1753. Voy. t. 1, p. 13.
- \*269. Rauliniana**, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 474, pl. 391, fig. 4-7. Grand-Pré.
- GERVILIA**, DeFrance, 1820. Voy. t. 1, p. 201.
- \*270. difficilis**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 487, pl. 396, fig. 7-8. Macheroménil, Maufaucon, Varennes, Clansayes.
- PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. p. 167, 176.
- \*271. Rauliniana**, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 497, pl. 401, fig. 4, 5. Vauquois, Clar.
- INOCERAMUS**, Parkinson, 1811. Voy. t. 1, p. 237.
- \*271'. concentricus**, Parkinson, 1811 ; d'Orb., Paléont., 3, p. 506, pl. 404. Géraudot, Ervy, Dienville, Wissant, Clar (Var), Vaudray,

Perte-du-Rhône (Ain), Novion (Ardennes), Varennes, Avancourt, Mœlain, Voiray; Angl., Folkstone.

\*272. *Cequandianus*, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 505, pl. 403, fig. 6-8. Clar.

\*273. *sulcatus*, Parkinson, 1811; d'Orb., Pal. 3, p. 504, pl. 403, fig. 3-5. Wissant, Géraudot, Perte-du-Rhône, Aubenton, Varennes; Angl., Folkstone; Savoie, Cluse; Saxe, Koschitz.

\*274. *Salomonii*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*I. concentricus*, mais pourvue d'un sinus au milieu. Novion; Clar, Géraudot, Saint-Florentin.

**PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.

\*275. *Dutemplei*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 596, pl. 433, fig. 10-13. Sainte-Ménéhould, Novion, Dienville, Guilloitière; Savoie, Cluse.

\*276. *Baulinianus*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 595, pl. 433, fig. 6-9. Grand-Pré, Macheroménil, Géraudot.

\*277. *Darius*, d'Orb., 1847. *Pecten orbiculare*, d'Orb. (pars). Espèce propre à l'étage albien, et qui diffère de l'autre par ses côtes plus petites, moins lamelleuses, et par son aspect plus brillant. Novion, Varennes, Géraudot, Dienville.

**JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 2, p. 83.

\*278. *Albensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *J. quinquecostata*, mais ayant entre chacune des côtes saillantes cinq côtes intermédiaires au lieu de quatre; les grosses côtes sont aussi plus petites. Seignelay, Grand-Pré (Meuse), Géraudot, Novion; Savoie, Cluse.

**SPONDYLUS**, Linné, 1753. Voy. t. 2, p. 83.

\*279. *gibbosus*, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 658, pl. 452, fig. 1-6. Novion, Macheroménil, Grand-Pré; Savoie, Cluse.

\*280. *Renauxianus*, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 659, pl. 452, fig. 7-8. Clansayès.

**FLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 202.

\*281. *Radiola*, Lam., 1819; d'Orb., Paléont., 3, p. 683, pl. 463, fig. 1-7. Mœlain, Saint-Dizier, Géraudot, Dienville, Wissant, Clansayès, Morteau, Perte-du-Rhône, Novion, Saint-Paul-de-Fenouillet, Varennes, Grand-Pré (Ardennes).

**OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.

\*282. *Arduennensis*, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 711, pl. 472, fig. 1-4. Grand-Pré, Novion, Morteau, Voiray, Aubenton; Savoie, Cluse.

\*283. *cauliculata*, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 709, pl. 471, fig. 4-8. Neuville, Grand-Pré, Varennes, Géraudot.

\*284. *Milletiana*, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 712, pl. 472, fig. 5-7. Larrivour, Roc-Laroche, Grand-Pré, Saint-Paul-de-Fenouillet, Clar.

\*285. *Bauliniana*, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 708, pl. 471, fig. 1-3. Grand-Pré, Saulce-aux-Bois, Chevière, Valcourt.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**LINGULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 14.

\*286. *Bauliniana*, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 490. Varennes.

**RHYNCHONELLA**, Fischer, 1825. Voy. t. 1, p. 92.

**287. sulcata**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 495, fig. 1-8. Géraudot (Aube), Clar (Var), Marc, Grand-Pré, La Vignette (Marne).

**288. Clementina**, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 495, fig. 8-12. Géraudot, Clar.

**289. Emerici**, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 495, fig. 13-17. Clar.

**290. pecten**, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 495, fig. 18-22. Clar.

**291. polygona**, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 496, fig. 1. Clar.

**\*292. antidichotoma**, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 500. *Terebratula antidichotoma*, Buignier, 1843, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. 2, p. 13, pl. 5, fig. 7; Géol. des Ardennes, p. 533, pl. 4, fig. 8. France, Grand-Pré.

**TEREBRATULINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 85.

**\*294. Martiniana**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 502, fig. 8-12. Gueule-d'Enfer près Martigues, Ravix près de Villard-de-Lans.

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

**295. Dutempleana**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 511, fig. 1-8. Partout, Wissant, Ardennes, Aube, Var; Angl., Castlehill.

**TEREBRATELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 223.

**296. Moreana**, d'Orb., 1847, Paléont., Crétacés, 4, pl. 516, fig. 13-19. France, Nancy, Géraudot (Aube).

**TEREBRIBOSTRA**, d'Orb., 1847. Voy. Paléont., Terr. Crét., t. 4.

**297. Arduennensis**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 519, fig. 6-10. Grand-Pré.

## MOLLUSQUES BRYOZOAIRE.

**ESCHARA**, Lamarck.

**\*298. triangularis**, Michelin, 1841, Icon., p. 5, pl. 1, fig. 6. Grand-Pré.

**ESCHARINA**, Edwards, 1836, édition de Lamarck.

**\*299. Acteon**, d'Orb., 1847. Jolie espèce à cellules peu saillantes. France, Macheroménil.

**DIASTOPORA**, Lamouroux, 1821.

**300. Arduennensis**, d'Orb., 1847. *Diastopora gracilis*, Michelin, 1841, Icon. zooph., p. 5, pl. 1, fig. 9 (non Edwards, 1838). France, Grand-Pré.

**ENTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.

**\*301. gracilis**, d'Orb., 1847. *Cricopora gracilis*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 4, pl. 1, fig. 8 (non Goldfuss, 1830). M. Michelin a vu un individu usé. Grand-Pré.

**302. colliformis**, d'Orb., 1847. *Cricopora colliformis*, Michelin, 1841, Icon., p. 5, pl. 1, fig. 5. Grand-Pré.

**\*303. convexa**, d'Orb., 1847. Jolie espèce à cellules saillantes, rapprochées, irrégulières. Macheroménil (Ardennes).

**RADIOFORA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Defrancia* réunies en groupes polymorphes encroûtants.

**304. Landrioti**, d'Orb., 1847. *Ceripora* id., Michelin, 1841, Icon. zooph., p. 2, pl. 1, fig. 10. Saint-Loup (Ardennes).

**ZONOPORA**, d'Orb., 1847. Ensemble rameux, branches dichotomes, pourvues de cellules rondes, simplement percées, disposées par lignes spirales au milieu d'une surface poreuse.

**205. *laevigata***, d'Orb., 1847. Belle espèce rameuse, à grosses branches; les séries de gros pores sont séparées par des séries de petits pores. Saulce-aux-Bois (Ardenne).

**ECHINOPORA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Osculipores* dont non-seulement les rameaux latéraux sont pourvus de pores en faisceaux à leur extrémité, mais dont l'intervalle est criblé de plus petits pores.

**206. *Raulini***, d'Orb., *Ceripora Raulini*, Michelin, 1844, Icon. zooph., p. 2, pl. 1, fig. 7. Grand-Pré, Macheroménil.

### ÉCHINODERMES.

**COLASTER**, Agassiz.

**200'. *Perrezii***, E. Sism., Mém. Echin. foss. Nizza, p. 11, pl. 1, fig. 1-3. Agass., 1847, Cat., p. 135. Sardaigne, Nice; France, Escagnolles, Saint-Pont (Var), env. de Grenoble.

**207. *laevis***, Agass., 1847, Cat., p. 134; Echin. Suisse, 1, p. 17, pl. 3, fig. 1-3. France, Perte-du-Rhône (Ain), Escagnolles (Var), La fauges, près de Grenoble (Isère); Saint-Aubin (Oise); Fis, env. de Nice, Cluse, Saxonet, Reposoir, en Savoie.

**207'. *transversus***, Agass., 1847, Cat., p. 135, Echin. Suisse, 1, p. 18, pl. 3, fig. 4 et 5. Montagne des Fis.

**FOXASTER**, Agassiz.

**208. *Collegnii***, E. Sism., Mém. Echin. foss. Nizza, p. 21, pl. 1, fig. 9-11; Agass., 1847, Cat., p. 132. Envir. de Nice.

**209. *Nicaeensis***, E. Sism., Mém. Echin. foss. Nizza, p. 19, pl. 1, fig. 6-8. Environs de Nice.

**MICRASTER**, Agassiz.

**210. *polygonus***, Agass., 1847, Cat., p. 130. Perte-du-Rhône.

**211. *oblongus***, Agass., 1847, Cat., p. 131. *Spatangus oblongus*, De-luc. Perte-du-Rhône, Dauphiné, Grande-Chartreuse, Vénasque; Suisse, Appenzell, Saint-Gall.

**212. *trigonalis***, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 130. Escagnolles.

**HEMIASTER**, Agassiz.

**213. *minima***, Desor. *Micraster minimus*, Agass., 1847, Cat., p. 122, Echin. Suisse, 1, p. 26, pl. 3, fig. 16-18. Perte-du-Rhône (Ain), Nozeroy (Jura); Savoie, Reposoir.

**214. *phrynus***, Desor., Agass., 1847, Cat., p. 122. Perte-du-Rhône, Martigues; montagne des Fis.

**PTGURUS**, Agassiz.

**215. *Meyeri***, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 105. Suisse, Appenzell.

**PTCAULUS**, Agassiz.

**216. *ovatus***, Agass., 1847, Cat., p. 101. Perte-du-Rhône (Ain).

**216'. *depressus***, Agass., 1847, Cat., p. 101. *Catopygus depressus*, Ag., Echin. Suisse, 1, p. 50, pl. 8, fig. 4-6. Savoie, montagne des Fis. Reposoir, Entrevernes; France, env. de Grenoble.

**CATOPYGUS**, Agassiz.

\*317. *cylindricus*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 100. Clar; Cluse.

**NUCLEOLITES**, Lamarck.

\*318. *Coreoleti*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 91. Grand-Pré.

**PYRINA**, Agassiz.

\*319. *depressa*, Desml., Agass., 1847, Cat., p. 92. Desor, Monogr. des Galér., p. 28. *Nucleolites depressa*, Brongn., Géol. Paris, p. 400, pl. 9, fig. 17. Savoie; montagnes des Fis et du Reposoir.

**GALERITES**, Lamarck.

\*320. *castanea*, Agass., 1847, Cat., p. 91, Echin. Suisse, 1, p. 77, pl. 12, fig. 7-9. *Galerites rhotomagensis*, Ag., Cat. syst., p. 7. France, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Villard-de-Lans, près de Grenoble; Italie, monte Calvo, Simbola, près Nice.

**DISCOIDEA**, Gray.

\*321. *turrita*, Desor, Monogr. des Galér., p. 57, pl. 12, fig. 1-3; Ag., 1847, Cat. syst., p. 89. France, Perte-du-Rhône (Ain).

\*322. *Rotula*, Agass., 1847, Cat., p. 89, Echin. Suisse, 1, p. 90, pl. 6, fig. 10-12. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Escragnolles (Var); Mëglisalp (Appenzell); Simbola près de Nice (Savoie), Le Reposoir.

\*323. *Favrina*, Desor, Monogr. des Galér., p. 62, pl. 7, fig. 12-14. Agass., 1847, Cat., p. 89. Simbola, près de Nice; Reposoir; Escragnolles, Perte-du-Rhône.

\*324. *conica*, Desor, Monogr. des Galér., p. 62, pl. 7, fig. 15-17. Agass., 1847, Cat., p. 89. Montagne des Fis (Savoie), Simbola près de Nice; Escragnolles (Var), Villars-de-Lans, près de Grenoble.

\*325. *decorata*, Desor, Monogr. des Galér., p. 63, pl. 8, fig. 1-3. Agass., 1847, Cat. syst., p. 89. France, Clansayes (Drôme), Le Theil (Ardèche), Escragnolles (Var).

**HEMIDIADEMA**, Agassiz.

\*326. *rugosum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 47. Grand-Pré.

**DIADEMA**, Gray.

\*327. *variolare*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 46. *Diadema violare*, Brongn. et Ag., Prodr. France, Grand-Pré (Ardennes).

\*328. *Brongniarti*, Agass., 1847, Cat., p. 46, Echin. Suisse, 2, p. 25, pl. 14, fig. 4-6. *Cidaris violaris*, Al. Brongn. in Cuv., Ossi-foss., pl. M, fig. 9. France, Perte-du-Rhône (Ain), Clar, Escragnolles, Berneuil (Oise).

\*329. *Lucæ*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 42; Echin. Suisse, 2, p. 8, pl. 16, fig. 11-15. France, Perte-du-Rhône (Ain); Suisse, Chaux-de-Fonds.

\*330. *Rhodani*, Agass., 1847, Cat., p. 42 Echin. Suisse, 2, p. 9, pl. 16, fig. 16-18. Perte-du-Rhône (Ain).

**SALENIA**, Gray.

\*331. *scutigera*, Gray, Agass., 1847, Cat. syst., p. 37. Angleterre; Kehlheim.

\*332. *Studerii*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 38. France, Perte-du-Rhône (Ain), Clar (Var).

**PENTAGONASTER**, Linck, 1733.

\*333. *Dutempleana*, d'Orb. Grande espèce dont les plaques sont

transverses, en parallélogrammes chagrinés au dehors. Saint-Marc (Ardenne).

**PENTACRINUS**, Miller, 1831.

\*324. *cretaceus*, Leymerie, 1842, Mém. Soc. géol., p. 2, (Fitt., pl. 11, fig. 4). La Goguette (Aube), Grand-Pré (Ardenne).

## ZOOPHYTES.

**AMBLOCYATHUS**, d'Orb., 1849.

\*325. *Bowerbanksii* d'Orb., 1849. *Cyathina Bowerbanksii*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., p. 292. Angl., Folkstone.

**APLOCYATHUS**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 291.

\*326. *conulus*, d'Orb., 1847. *Trochocyathus conulus*, Edwards et Haime, 1838, Ann. des Sc. nat., p. 366. *Turbinolia conulus*, Phillips, 1829, Geol. Yorksh., pl. 2, fig. 1. France, Macheroménil, Novion, Géraudot, Perte-du-Rhône (Ain); Angl., Folkstone.

\*327. *Harveyanus*, d'Orb., 1847. *Trochocyathus Harveyanus*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., p. 374. Angl., Folkstone.

**POLYTREMA**, Risso, 1826.

\*328. *Arduennensis*, d'Orb., 1847. *Ceripora polymorpha*, Michelin, 1841, Zoop., p. 2, pl. 1, fig. 4 (non Goldf., 1830). France, Grand-Pré.

\*329. *spongioïdes*, d'Orb., 1847. *Heteropora idem*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 3, pl. 1, fig. 3. Grand-Pré, Macheroménil.

**CERIOFORA**, Goldfuss, 1826.

\*340. *Constantii*, d'Orb., 1847. *Heteropora dichotoma*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 4, pl. 1, fig. 11 (non Goldf., 1830). France, Grand-Pré.

\*341. *Michelini*, d'Orb., 1847. *Heteropora cryptopora*, Michelin, 1841, Icon. zooph., p. 3, pl. 1, fig. 2 (non Goldf., 1830). Grand-Pré.

## FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**ORBITOLINA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Orbitolites* à côtés inégaux, l'un enroulé, l'autre avec des loges.

\*342. *lenticulata*, d'Orb., 1847. *Orbitolites lenticulata*, Lamarck, 1816; Lamouroux, 1824, pl. 72, fig. 13-16. Perte-du-Rhône (Ain), St-Paul-de-Fenouillet (Aude).

**NOBOSARIA**, Lamarck. Trois espèces (343, 344, 345).

**VAGINULINA**, d'Orb., 1825. Six espèces (346, 347, 348, 349, 350, 351).

**FRONDIULARIA**, d'Orb., 1847. Trois espèces décrites. En Angleterre.

**CRISTELLARIA**, Lamarck. Trois espèces (352, 353, 354).

**ROTALINA**, Lamarck. Deux espèces (355, 356).

**TEXTULARIA**, DeFrance. Une espèce d'Angleterre.

**QUINQUELOCULINA**, d'Orb., 1825. Une espèce d'Angleterre.

## AMORPHOZOAIRE.

**VERTICILLITES**, DeFrance, 1828.

\*357. *digitata*, d'Orb., 1847. Belle espèce formant des tubes sés par segments intérieurement. France, Macheroménil.

**COSCINOPORA**, Goldfuss, 1826.

\*357. *Bicordeana*, d'Orb., 1849. Espèce dont les oscules tubulaires sont creusés en trémie. France, Seignelay (Yonne).

**YEREA**, Lamouroux, 1821.

358. *mutabilis*, Michelin, 1844, Icon. zooph., p. 133, pl. 30. France, Grand-Pré.

**CUPULOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 294.

\*359. *boletiformis*, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, Icon. zoophyt., p. 6, pl. 1, fig. 1. France, Grand-Pré.

---



## VINGTIÈME ÉTAGE : — CÉNOMANIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITELLA**, d'Orb., Paléont. univ., Mollusq. viv. et foss., p. 446.

\*1. **vera**, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pl. 32, fig. 1-6, Terr. crét., Suppl., pl. 2, fig. 1-6. Sainte-Cérotte (Sarthe); Belg., Tournay, Lathinne, Tirlemont; Angl., Hamsey, Heyning; Allem., Plauen, près de Dresde.

**BELEMNITES**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 212.

\*2. **ultimus**, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pl. 75, Terr. crét., Suppl., pl. 10. France, Rouen.

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 52.

\*3. **triangularis**, Montfort, 1802. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 79, pl. 12. *N. Fleuriausianus*, d'Orb. Havre, Rouen, Ile d'Aix, Fourras, Coulonges, La Malle, La Martre.

\*4. **subradiatus**, d'Orb., 1847. *N. radiatus*, Sow., 1822. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 81, pl. 14 (non Fichtell, 1803). France, Rouen.

\*5. **Largillierianus**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 86, pl. 18. Fr., Rouen, Cassis, Mâle, Guilbault (Orne).

\*6. **elegans**, Sow., d'Orb., Paléont., 1, p. 87, pl. 19. Rouen, Guilbault, Orange, Cassis, Escragnolles.

\*7. **Deslongchampsianus**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 90, pl. 20. Rouen.

\*8. **Archiacianus**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 91, pl. 21. Rouen.

\*9. **Matheronianus**, d'Orb., 1841, Revue zoologique, p. 318. Cassis.

**GERATITES**, de Haan, 1825. Voy. t. 1, p. 171.

10. **Vibrayanus**, d'Orb., 1840. *Amm. id.*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 322, pl. 96, fig. 1-3. Vibrayes (Sarthe).

\*11. **Syriacus**, d'Orb., 1847. *Ammonites Syriacus*, de Buch, 1845, Actes de la Société helvétique des Sciences naturelles de Genève. Syrie, mont Liban. Recueilli par le Révérend E. R. Beadle.

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. t. 1, p. 181.

12. **Renauxianus**, d'Orb., 1840, Paléont. franç., 1, p. 113, 359, pl. 27. France, Bedouin, sud du Ventoux, Montblainville.

- \*13. **Mayorianus**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 267, pl. 79. Cassis, Havre.
- \*14. **latidorsatus**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 270, pl. 80. Havre, Cassis.
- \*15. **inflatus**, Sow., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 204, pl. 90. France, Havre, Montblainville, La Fauge.
- \*16. **varians**, Sow., d'Orb., Paléont., 1, p. 311, pl. 92. *Amm. tetrasinuata*, Sow. Rouen, Le Havre, Auxon, cap Blanc-Nex, Vergons, Anglès, Orange, Sénéfontaine; Suisse, Souaillon; Angl.
- \*17. **Largillierianus**, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 320, pl. 95. Rouen, Cassis (Bouches-du-Rhône), La Martre (Var).
- 18. **Geslinianus**, d'Orb., 1847. *Am. catillus*, d'Orb., 1841, Pal., 1, p. 325, pl. 97, fig. 1, 2 (non *catillus*, Sowerby). Vibrayes (Sarthe), Touvois (Loire-Inférieure). M. Bertrand Geslin.
- \*19. **Beaumontianus**, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 328, pl. 98, fig. 1, 2. France, Lamnay, La Malle.
- \*20. **falcatus**, Mantell, d'Orb., Paléont., 1, p. 331, pl. 99. Lamnay (Sarthe), Thorenc, Auxon (Aube), Orange (Vaucluse), Tours, chemin de Poitiers; Angl.
- \*21. **Mantellii**, Sow., d'Orb., Paléont., 1, p. 340, pl. 103, 104. Saint-Calais (Sarthe), Rouen, Le Havre (Seine-Inférieure), Auxon (Aube), Cassis, La Malle, La Martre (Var), Pont-Saint-Esprit, Châtel-Cornay (Ardennes), Tours, route de Poitiers.
- \*22. **Rhotomagensis**, Lam., d'Orb., Paléont., 1, p. 345, pl. 105, 106. Rouen, Thaulanne, La Malle, La Martre, Laubressel, Cassis, Orange, cap Gris-Nez; Angl.
- \*23. **catillus**, Sow., 1827. *A. dispar*, d'Orb., 1840, Paléont., 1, p. 142, pl. 45, fig. 1, 2. Ventoux (Vaucluse), Montblainville (Meuse), Villard-de-Lans (Isère).
- \*24. **navicularis**, Sowerby, 1827, Min. Conch., 6, p. 105, pl. 555. *A. Mantellii*, var., d'Orb., 1841. France, Le Mans; Angl., Guildford.
- \*25. **Cenomanensis**, d'Orb., 1847. Grosse espèce voisine de l'*A. Rhotomagensis*, mais à tours larges, à dos carré, dont les tours ont de larges côtes simples, pourvues de chaque côté de deux gros tubercules saillants en pointe. Le Mans (Sarthe).
- \*26. **Diartianus**, d'Orb., 1847. Petite espèce globuleuse, lisse, à dos rond, pourvue au pourtour de l'ombilic, par tour, de neuf tubercules saillants. Saint-Calais (Sarthe).
- \*27. **Cassisianus**, d'Orb., 1847. Espèce de la série des *Fimbriati*, mais à tours étroits, légèrement échancrés par le retour de la spire, marqués de trois ou quatre côtes transverses et de fines stries. Cassis (Bouches-du-Rhône).
- \*28. **subcomplanatus**, d'Orb., 1847. *A. complanatus*, Mantell, 1822. Sow., Min. Conch., 6, p. 133, pl. 569, fig. 1 (non Bruguière, 1790). Angl., Hamsey.
- 29. **Goodhallii**, Sow., 1836, Min. Conch., 3, p. 100, pl. 255 (peut-être variété de l'*A. inflatus* Sow.). Angl., Blackdown.
- 30. **triseriatis**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 239, pl. 18, fig. 27 (peut-être variété de l'*A. Rhotomagensis*). Angl. (Devonshire), Blackdown.

- \***31. Couloni**, d'Orb., 1847. *A. Mantellii*, var., d'Orb., 1844, Pal. franç., Terr. crét., 1, p. 340, pl. 104. Lamnay (Sarthe); Souaillon, près de Neuchâtel.
- \***32. cinctus**, Sow., Min. Conch., 6, p. 122, pl. 564, fig. 1. Angl., Middleham.
- \***32'. Orbignyanus**, Geinitz, 1839, das Quadersandst., pl. 4, fig. 1. Kreslingswalda.
- SCAPHITES**, Parkinson, 1811. Voy. t. 2, p. 100.
- \***33. obliquus**, Sow., 1813, Min. Conch., 1, p. 53, pl. 18, fig. 1, 2. *S. aequalis*, var., d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 1, p. 518, pl. 129, fig. 3-6. Rouen.
- \***34. aequalis**, Sow., d'Orb., Paléont., 1, p. 518, pl. 129, fig. 3, 7. Le Mans, Rouen, La Malle, Anglès, Liscle, Uchaux (Vaucluse); Anglet., Lewis, Brighton.
- \***35. Rochatianus**, d'Orb., 1847. Charmante petite espèce lisse, à tours de spire à découvert et convexes, le dernier projeté, à longue crosse lisse, creusée d'un sillon en dedans. Env. d'Uchaux (Vaucluse), avec l'espèce précédente. Découverte par M. Alexandre Rochat.
- ANCYLOKERAS**, d'Orb., 1842. Voy. t. 1, p. 262.
- \***36. Moreausianus**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine de l'*A. armatus*, mais avec des côtes plus simples aux côtes tuberculeuses. Montblainville (Meuse).
- \***37. Arduennensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce qui diffère de la précédente par une seule rangée de tubercules de chaque côté, au lieu de deux. Montblainville.
- \***38. armatus**, d'Orb. *Ham. id.*, Sow., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 547, pl. 135. France, Rouen, Laubressel, Cassis.
- 39. ellipticus**, Mantell, 1822, Foss. illust. Geol. of Sussex, p. 122, pl. 23, fig. 9. Angl., Middleham.
- BACULITES**, Lamarck, 1799. Voy. t. 2, p. 66.
- \***40. baculoides**, d'Orb., Paléont., 1, p. 562, pl. 138, fig. 6-11. Rouen, cap Blanc-Nez, Cassis, Berneuil, Uchaux (Vaucluse), Liscle (Basses-Alpes).
- RAMITES**, Parkinson, 1811. Voy. t. 2, p. 126.
- \***41. simplex**, d'Orb., Paléont., 1, p. 550, pl. 134, fig. 12-14. Rouen.
- \***42. dubius**, d'Orb., 1847. Espèce lisse, comprimée, à crosse large. La Malle (Var).
- 43. biplicatus**, Roemer, 1841, Kreid., p. 93, n° 13, pl. 14, fig. 11. Hülse.
- TURRILITES**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 213.
- \***44. Bergeri**, Brongn., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 590, pl. 143. France, Bavet, Auxon.
- \***45. tuberculatus**, Bosc, d'Orb., Paléont., 1, p. 593, pl. 144, fig. 1-2. Rouen, La Malle, Le Havre, cap Blanc-Nez; Angl.
- \***46. Gravesianus**, d'Orb., 1841, Paléont., 1, p. 596, pl. 144, fig. 3-5. La Malle, Sénéfontaine, Berneuil, Guilbaud.
- \***47. costatus**, Lam., d'Orb., Paléont., 1, p. 598, pl. 145. Rouen, La Malle, La Martre, Escagnolles (Var), Thaulanne, Cassis (Bouches-du-Rhône), Guilbaud, St-Sauveur; Angl.

- \*48. *Desnoyersi*, d'Orb., 1841, Paléont., 1, p. 601, pl. 146, fig. 1, 2. France, cap Blanc-Nez, Coulange, Guilbaud.
- \*49. *Scheuchzerianus*, Bosc, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 602, pl. 146, fig. 3, 4. France, Rouen, Guilbaud.
- \*50. *ornatus*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 604, pl. 147, fig. 1, 2. France, cap Blanc-Nez.
- \*51. *bifrons*, d'Orb., 1841, Paléont., 1, p. 606, pl. 147, fig. 5, 6. Rouen.
- \*52. *Alpinus*, d'Orb., 1847. Petite espèce à tours très-étroits, lisses, pourvus de gros tubercules très-espacés. La Malle (Var).
- \*53. *Carcitanensis*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 267, pl. 41, fig. 4. Cassis.
- \*53'. *Essensis*, Geinitz, 1849, das Quadersandst., pl. 4, fig. 1, 2. Westphalie, Essen.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801.

- \*54'. *Guerangeri*, d'Orb., 1843, Pal., Terr. crét., 2, p. 412. Le Mans.
- \*54. *pulchra*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 18, fig. 11. Angl. (Devonshire), Blackdown.
- \*55. *Philippi*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 114, pl. 44, fig. 14. Kreibitz, Tiziblit.

**TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 67.

- \*56. *Guerangeri*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 412. Le Mans.
  - \*57. *Goupilliana*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 412. Le Mans.
  - \*57'. *ornata*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 412. Le Mans.
  - \*58. *Cenomanensis*, d'Orb. Espèce voisine du *Granulata*, plus courte, avec un méplat à la partie antérieure des tours. Le Mans. *Turr. granulata*, Geinitz (non Sowerby); Bohème, Tyssa.
  - \*59. *Alpina*, d'Orb. Espèce pourvue de nombreuses stries inégales, sans méplat supérieur. La Malle (Var).
  - \*60. *granulata*, Sow., 1827, Min. Conch., 6, p. 125, pl. 565, fig. 1 (non d'Orbigny, 1842). Angl., Blackdown.
  - \*61. *costata*, Sow., 1827, id., 6, p. 125, pl. 565, fig. 4. Blackdown.
  - \*62. *Neptuni*, Münster, Goldfuss, 1844, 3, p. 106, pl. 196, fig. 15. Tournay.
  - \*63. *Archiaci*, d'Orb., 1847. *T. Neptuni*, d'Arch., 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 344, pl. 25, fig. 2 (non Goldfuss, 1844). Tournay.
  - \*64. *Geinitzii*, d'Orb., 1847. Espèce à stries inégales, placées en groupe sur le milieu de la spire. Envoyée sous le nom de *T. multi-striata*, Reuss, mais diffère complètement de la figure 17, planche 10, de cet auteur. Bohème, Kreslingswalda.
- CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.
- \*65. *Mosensis*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 71, pl. 156, fig. 2. Montfaucon.

\*66. *Bolia*, d'Orb., 1847. Coquille médiocrement allongée, lisse, à tours peu renflés. Ile d'Aix (Charente-Inférieure).

\*67. *arenosa*, Reuss, 1845, Kreid., p. 51, pl. 10, fig. 7. Bohème, Czencziz.

**NERINEA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 263.

\*68. *Fleuriansa*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 85, pl. 160, fig. 6, 7. Ile d'Aix.

\*69. *Aunisiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 86, pl. 160, fig. 8, 9. Ile d'Aix.

\*70. *regularis*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 87, pl. 160, fig. 10. Ile d'Aix.

\*71. *Bauga*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 91, pl. 162, fig. 1, 2. France, environs de Cognac, d'Angoulême.

\*72. *monilifera*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 95, pl. 163, fig. 4-6. Ile-Madame, Nancras, Cognac, Soulage, Tourtenay.

\*73. *dubia*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 344, pl. 25, fig. 4. Belg., Tournay.

**ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.

\*74. *ovum*, d'Orb., 1842, Paléont., 3, p. 123, pl. 167, fig. 19, 20. Cassis.

\*75. *affinis*, d'Orb., 1847. *Tornatella affinis*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 18, fig. 9 (non d'Orb., 1842). Angl. (Devonshire), Blackdown.

**AVELLANA**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 131.

\*76. *Mailleana*, d'Orb., 1847. *Rhinginella id.*, d'Orb., 1842, Pal., franç., Terr. crét., 2, p. 131. France, Rouen.

\*77. *Cassis*, d'Orb., 1842, Pal. franç., 2, p. 138, pl. 169, fig. 10-13. *Rhingicula incrassata*, Geinitz. France, Rouen, Cassis, La Malle.

\*78. *Bauliniana*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 141. Montblainville.

\*79. *incrassata*, d'Orb., 1847. *Auricula incrassata*, Sowerby, 1817, Min. Conch., 2, p. 143, pl. 163, fig. 1, 2, 3. Angl., Blackdown.

\*80. *Prevosti*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 343, pl. 25, fig. 1. Belg., Tournay.

\*81. *Varusensis*, d'Orb., 1847. Espèce plus courte, plus ronde que l'*A. Cassis*, à spire plus cachée. La Malle (Var).

**GLOBICONCHA**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 143.

\*82. *rotundata*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 143, pl. 169, fig. 17. Le Mans.

**VARIGERA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 68.

\*83. *Guerangeri*, d'Orb., 1847. *Pterodonta id.*, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 320. Le Mans, La Malle (Var).

\*84. *Carantonensis*, d'Orb., 1847. Espèce dont le dernier tour est infiniment plus court que dans l'espèce précédente. Charras (Charente-Inférieure).

**PTERODONTA**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 315.

\*85. *elongata*, d'Orb., 1843, Pal. franç., 2, p. 316, pl. 218, fig. 2. France, Ile-Madame, Angoulême, Cognac.

\*86. *inflata*, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 318, pl. 219. Orange (Vaucluse), Eoux, Bargem, Candilèbre, La Malle (Var), Ile-d'Aix (Charente-Infé-

rieure, Angoulême (Charente), Le Mans (Sarthe), Saumur (Maine-et-Loire), Tourtenay (Deux-Sèvres).

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

\***87. difficilis**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 163, pl. 174, fig. 4. Ile-Madame.

\***87'. Cassisiana**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 166, pl. 175, fig. 1-4. Cassis.

\***88. vulgaris**, Reuss, 1845, Bohem. Kreid., p. 50, pl. 10, fig. 22. Le Mans; Bohême, Tyssa, Kreslingswalda.

\***89. Varusensis**, d'Orb., 1847. Espèce plus courte et plus large que le *N. Requieniana*, mais fortement canaliculée sur la carène. La Malle (Var), Le Mans (Sarthe).

\***90. Hispanica**, d'Orb., 1847. Espèce ayant la forme du *N. bulbiformis*, mais sans canal sur la suture. Espagne, Llama Oscura, près d'Oviedo (M. Paillette).

\***91. tuberculata**, d'Orb., 1847. Coquille singulière, couverte de tubercules irréguliers en dessus, et de lames irrégulières en dessous. Le Mans.

**92. extensa**, d'Orb., 1847. *Vivipara extensa*, Sow., 1813, Min. C., 1, p. 177, pl. 31, fig. 2. Anglet., Blackdown.

**93. Gentii**, d'Orb., 1847. *Helix Gentii*, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 101, pl. 145. Angleterre, Devizes.

**94. subconica**, d'Orb., 1847. *Turbo conicus*, Sow., 1823, Min. C., 5, p. 45, pl. 433, fig. 1 (non Lam., 1804). Angl., Blackdown.

\***95. rotundata**, d'Orb., 1847. *Turbo rotundatus*, Sow., 1823, Min. Conch., 5, p. 45, pl. 433, fig. 2. Le Mans (Sarthe); Angl., Blackdown.

**96. pungens**, d'Orb., 1847. *Littorina pungens*, Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 5. Angl., Blackdown.

**97. Geinitzii**, d'Orb. *N. canaliculata*, Geinitz, Nach., p. 10, pl. 1, fig. 20 (non Mantell, 1822). Silésie, Kreslingswalda; Tyssa.

**NARICA**, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 170.

**98. cretacea**, d'Orb., 1847, Paléont., 2, p. 170, pl. 175, fig. 7-10. Cassis.

**99. carinata**, d'Orb., 1847. *Natica carinata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 8. Angl., Blackdown.

**100. granosa**, d'Orb., 1847. *Natica granosa*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 7. Angl., Blackdown.

**NERITOPSIS**, Sowerby, 1825. Voy. t. 1, p. 172.

\***101. ornata**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 176, pl. 176, fig. 8-10. Rouen.

**102. pulchella**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 177, pl. 177 bis, fig. 1-3. Le Mans.

**PILEOLUS**, Sowerby, 1823.

\***103. cretaceus**, d'Orb., 1847. Espèce lisse de Saint-Calais (Sarthe).

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.

\***104. Requienianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 186, pl. 177, fig. 13, 14. Cassis.

\***105. Guerangeri**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 189, pl. 177 bis, fig. 4, 5. Le Mans.

- \***106. Sarthinus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 189, pl. 177 bis, fig. 6-8. Le Mans.
- 107. Marçaisi**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 190, pl. 186 bis, fig. 19. Le Mans.
- \***108. Basteroti**, Brongniart, 1822, Environs de Paris, pl. 3, fig. 3. *Trochus Roxeti*, d'Arch., 1847, Mém. de la Soc. géol., 2, p. 336, pl. 22, fig. 11. Rouen; Belgique, Tournay.
- \***109. Bathus**, d'Orb., 1847. Coquille conique, canaliculée sur la suture et pourvue de tubercules irréguliers. Montblainville.
- \***110. Buvignieri**, d'Orb., 1847. Petite espèce conique avec trois rangées de tubercules en pointes. Montblainville.
- 111. Hylus**, d'Orb., 1847. *T. Cordieri*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 335, pl. 22, fig. 8 (non d'Orb., 1844). Belgique, Tournay.
- \***112. Banceli**, d'Archiac, 1847, id., p. 335, pl. 22, fig. 9. Tournay.
- 113. Huoti**, d'Archiac, 1847, id., p. 335, pl. 22, fig. 10. Tournay.
- \***114. Duperreyi**, d'Archiac, 1847, Mém. 2, p. 336, pl. 23, fig. 2. Tournay.
- \***115. Leymerici**, d'Archiac, 1847, Mém. 2, p. 337, pl. 23, fig. 1. Tournay.
- 116. Pintevillei**, d'Orb., 1847. *Turbo Pintevillei*, d'Archiac, 1847, Mém., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 341, pl. 23, fig. 11. Belgique, Tournay.
- 117. Voltzi**, d'Orb., 1847. *Turbo Voltzi*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 341, pl. 25, fig. 6. Belg., Tournay.
- \***117'. Monii**, d'Orb., 1849. Espèce petite, à tours anguleux, pourvus de 4 côtes longitudinales, entre lesquelles en sont de plus petites. Tournay.
- FITONELLUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 64.
- \***118. Archiacianus**, d'Orb., 1847. *Rotella id.*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 192, pl. 178, fig. 4-6. Le Mans.
- SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.
- 119. scalare**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 206, pl. 77 bis, fig. 14, 15. France, Le Mans.
- \***120. Thirrianum**, d'Archiac, 1847, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 334, pl. 22, fig. 7. Belgique, Tournay.
- HELICOCRYPTUS**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 8.
- \***121. radiatus**, d'Orb., 1847. *Planorbis radiatus*, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 89, pl. 140, fig. 5. France, Le Mans; Angl., Blackdown.
- SELPHINULA**, Lamarck, 1804. Voy. t. 1, p. 191.
- 122. Bennardi**, d'Archiac, 1847, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 334, pl. 22, fig. 6. Belgique, Tournay.
- STRAPAROLUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 6.
- 123. Guerangeri**, d'Orb., 1847. *Solarium id.*, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. cré., 2, p. 206, pl. 177 bis, fig. 9-12. France, Le Mans.
- \***123'. ammonitesformis**, d'Orb., 1849. *Euomphalus ammonitesformis* (envoyé sous ce nom par M. Le Hon). Tournay.
- PRASIANELLA**, Lamarck, 1802. Voy. t. 1, p. 67.
- 124. pusilla**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 12. Blackdown.

- 125. formosa**, Sow., 1836, in Fitton, id., p. 241, pl. 18, fig. 14. Blackdown.
- 126. Sowerbyi**, d'Orb., 1847. *Phasianella striata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 15 (non *striata*, Min. Conch.). Blackdown.
- \*127. Beadlei**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, à tours ronds dont nous ne connaissons que le moule. Syrie, mont Liban. Envoyé par le révérend M. Beadle.
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.
- \*128. Goupillianus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 222, pl. 185, fig. 7-10. Le Mans.
- \*129. Bhotomagensis**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 223, pl. 185, fig. 11-14. Rouen.
- \*130. Mailleanus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 224, pl. 186, fig. 2, 3. Rouen.
- \*131. Guerangeri**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 226, pl. 186 bis, fig. 1, 2. Le Mans.
- 132. bicultratus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 226, pl. 186 bis, fig. 3, 4. Le Mans.
- 133. Octavius**, d'Orb., 1847. *T. tricoatus*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 227, pl. 186 bis, fig. 5, 6 (non Deshayes, 1824). France, Le Mans.
- 134. cretaceus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 228, pl. 186 bis, fig. 7, 8. Le Mans.
- \*135. Cognacensis**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 229, pl. 186 bis, fig. 9, 10. Cognac.
- \*136. Geslini**, d'Arch. *Tourtia*, pl. 23, fig. 7. *Turbo obtusus*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 230 (non *Turbo obtusus*, Gmelin, 1789). Le Mans; Belgique, Tournay.
- \*137. Lorieri**, d'Orb., 1847. Coquille plus longue que large, à tours renflés, marqués en long de petites stries inégales. Le Mans.
- \*138. umbilicatus**, d'Orb., 1847. Coquille surbaissée, à large ombilic, striée en long. Rouen.
- \*139. Aleyon**, d'Orb., 1847. Coquille lisse, ombiliquée, crénelée au pourtour de son ombilic étroit. Rouen.
- \*140. Cassisianus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine par ses tubercules comprimés du *T. Mailleanus*, mais s'en distinguant par une spire bien plus longue. Cassis.
- 141. moniliferus**, Sow., 1823, Min. Conch., 4, p. 131, pl. 395, fig. 1. Angl., Blackdown.
- 142. Fittoni**, d'Orb., 1847. *Littorina gracilis*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 12 (non *gracilis*, Brocchi, 1814). Blackdown.
- 143. Raulini**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 341, pl. 23, fig. 12. Belg., Tournay.
- 144. Walferdini**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 341, pl. 24, fig. 6. Tournay.
- 145. Angeloti**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 337, pl. 23, fig. 4. Tournay.



- 146. Delafossesi**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 338, pl. 24, fig. 5. Tournay.
- 147. Boblayesi**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 338, pl. 23, fig. 5. Tournay.
- 148. Boissy**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 339, pl. 23, fig. 6. Tournay.
- 149. Boissy**, d'Orb., 1847. *Littorina Roissy*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 337, pl. 23, fig. 3. Belg., Tournay.
- 150. Leblancii**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 339, pl. 23, fig. 8. Tournay.
- 151. Mulleti**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 340, pl. 23, fig. 9. Tournay.
- 152. paludineformis**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 340, pl. 23, fig. 10. Tournay.
- \***152'. Honii**, d'Orb., 1849. Belle espèce voisine du *T. Mailleana*, mais à une seule rangée de pointes à la partie supérieure de la spire. Tournay.
- \***152". Koninckii**, d'Orb., 1849. Espèce voisine pour la forme du *T. Delafossii*, mais moins allongée, à petites côtes transverses, granuleuses, et une série de nodosités. Tournay.
- STOMATIA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 7.
- \***153. aspera**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 237, pl. 188, fig. 4-7. Cognac.
- PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.
- \***154. Lahayesi**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 251, pl. 193, fig. 1-4. Le Mans.
- 155. simplex**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 252, pl. 194. Le Mans.
- \***156. Mailleana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 253, pl. 195. Rouen, La Malle, Escragnolles, Anot, Soulage, Beausset (Var).
- \***157. perspectiva**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 255, pl. 196. France, Rouen, La Malle, Soulage.
- \***158. formosa**, Leymerie, 1842. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 259, pl. 199, fig. 1, 2. Sainte-Parre, Auxon, St-Sauveur.
- \***159. Moreausiana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 260, pl. 199, fig. 3-6. Montblainville.
- \***160. falcata**, d'Orb., 1842, id., 2, p. 263, pl. 200, fig. 9-12. Cassis.
- 161. Matheroniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 264, pl. 201, fig. 1-4. Cassis.
- \***162. Cassisiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 266, pl. 202, fig. 1-4. France, Cassis, La Malle.
- \***163. Brongniartiana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 268, pl. 203, fig. 1-4. Rouen.
- 164. Guérangeri**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 272, pl. 205, fig. 3-6. *P. striato-granulata*, Goldf., 1844, Petref., 3, pl. 186, fig. 10 ? Le Mans; Allem., Postelberg ?
- \***165. Geinitzii**, d'Orb., 1847. *Pleur. gigantea*, Geinitz, 1842, Nach., p. 10, pl. 5, fig. 5 (non Sow., 1836). Allem., Oberau.
- \***166. Neptuni**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *Pl. Lahayesi*, mais à tours bien plus étroits, treillisés et plus largement ombiliqués. Le Mans.

- \***167. *texta***, Münster, Goldf., 1844, 3, p. 75, pl. 187, fig. 7. D'Archiac, Tourtia, pl. 24, fig. 1. Belgique, Tournay.
- \***168. *Nystii***, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 343, pl. 24, fig. 2. Belgique, Tournay.
- 169. *Scarpacensis***, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 343, pl. 24, fig. 4. Tournay.
- \***170. *Dumontii***, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 342, pl. 24, fig. 3. Tournay.
- \***170'. *Honii***, d'Orb., 1849. Belle espèce voisine du *P. perspectita*, mais avec des rides transverses très-prononcées aux tours. Tournay.
- \***170". *bifrons***, d'Orb., 1849. Espèce voisine du *P. Mailleana*, mais avec des côtes arquées, transverses en dessus et en dessous. Tournay.
- VOLUTA**, Linné, 1753. D'Orb., Paléont., Terr. crét., 2, p. 326.
- \***170". *Guerangeri***, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 326, pl. 231, fig. 1. Le Mans.
- 171. *pseudo-ambigua***, d'Orb., 1847. *V. ambigua*, Mantell, 1827, Sussex, p. 108, pl. 18, fig. 8 (non Brandes, 1766). Angl., Middleham.
- MITRA**, Lamarck, 1801. D'Orb., Paléont., Terr. crét., 2, p. 329.
- \***172. *Cassisi***, d'Orb., 1847. *Mitra cancellata*, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 329, pl. 231, fig. 5 (non Sowerby, 1835). Cassis (B.-du-Rhône).
- \***173. *Requieni***, d'Orb., 1847. Coquille petite à larges côtes longitudinales, et pourvue de stries en avant. Orange (Vaucluse).
- STROMBUS**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 132.
- \***174. *inornatus***, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 214, pl. 214. Ile d'Aix, Fourras, Cognac, Le Mans, St-Calais, Saumur, Tourtenay, Escagnolles, La Malle.
- \***175. *incertus***, d'Orb., 1847. *Pterocera incerta*, d'Orb., 1848, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 308, pl. 215. Nous savons maintenant que c'est un *Strombus*. Le Mans, La Malle (Var).
- 176. *nodulosus***, d'Orb., 1847. *Dolium nodulosum*, Sowerby, 1823, Min. Conch., 5, p. 34, pl. 426 et 427. Angl., Sussex.
- PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.
- \***177. *polycera***, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 310, pl. 217, fig. 1. Ile-Madame.
- \***178. *marginata***, d'Orb., 1843, id., 2, p. 310, pl. 217, fig. 2. Rouen, Cassis.
- \***179. *inflata***, d'Orb., 1843, id., 2, p. 311, pl. 218, fig. 1. Rouen.
- 180. *macrostoma***, d'Orb., 1847. *Rostellaria macrostoma*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 18, fig. 23. Anglet, Blackdown.
- 181. *retusa***, d'Orb., 1847. *Rostellaria retusa*, Sow., 1836, in Fitt., Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 18, fig. 22. Angl., Blackdown.
- \***182. *Collegni***, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 345, pl. 25, fig. 8 a. Tournay.
- 182'. *Vernentii***, d'Orb., 1849. Jolie petite espèce à aile large, costée en travers et digitée, l'aile passant jusqu'à l'extrémité de la spire. Le Mans.
- ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 71.

- . **Mailleana**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 295, pl. 210, fig. 2.  
 sn.
- . **inornata**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 296, pl. 210, fig. 4-5.  
 sn.
- . **varicosa**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 297, pl. 210, fig. 6, 7.  
 is.
- . **Alpina**, d'Orb., 1843, Paléont., Terr. crét., 2, p. 283, pl. 206,  
 3. France, Escragnolles, La Malle.
- . **calcarata**, Sow., 1822, Min. Conch., 4, p. 69, pl. 349, fig. 6,  
 on *calcarata*, Leym., d'Orb., pl. 207, fig. 3). Le Mans ; Black-  
 n.
- . **Nereis**, d'Orb., 1847. Belle espèce presque lisse, à aile large,  
 née en arrière. Le Mans.
- . **Aonis**, d'Orb., 1847. Petite espèce voisine du *R. Nereis*, mais  
 née au dernier tour despire. La Malle.
- . **Megara**, d'Orb., 1847. *Rostell. Parkinsoni*, Sow., 1836, in  
 n, Trans. geol. Soc., 4, pl. 18, fig. 24 (non Mantell, 1822). *R.*  
*reisi*, Reuss, pl. 9, fig. 9 b (non *Reussii*, Geinitz, 1842, pl. 18,  
 1). Saxe, Schandau ; Angl., Blackdown.
- . **Reussii**, Geinitz, 1842, Charak. Kreidd., pl. 18, fig. 1, p. 70.  
 ème, Walkmühle près de Pirna, Luschütz, Tyssa.
- . **mucronata**, d'Orb., 1847. *R. calcarata*, Reuss, 1845, Böhm.  
 ideforme, p. 45, pl. 9, fig. 5 a, b (non Sow.). Bohème, Tyssa.
- . **Geinitzii**, d'Orb., 1847. *R. Buchii*, Geinitz, 1842, p. 70, pl. 18,  
 6 (non *Buchii*, Münster, Beitr.). Allem., Tyssa.
- . **Egton**, d'Orb., 1847. *R. Parkinsoni*, Reuss, 1845, Böhm.,  
 6, pl. 9, fig. 7 (non Mantell, 1822). Bohème, Zloseyn, Tyssa.
- . **Bruguère**, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- . **Acteon**, d'Orb., 1847. Coquille très-allongée, à canal très-  
 longé, costulée en travers. Montblainville (Meuse).
- . **quadratus**, Sow., 1823, Min. Conch., 5, p. 7, pl. 410, fig. 1.  
 ns., 4, pl. 18, fig. 19. Le Mans ; Angl., Blackdown.
- . **calcar**, d'Orb., 1847. *Murex calcar*, Sow., 1823, Min. Conch.,  
 7, pl. 410, fig. 2. Angl., Blackdown.
- . **subclathratus**, d'Orb., 1847. *F. clathratus*, Sow., 1836, in  
 on, Trans. geol. Soc., 4, p. 240, pl. 18, fig. 19 (non Lam., 1804).  
 kdown.
- . **rusticus**, Sow., 1836, id., p. 240, pl. 18, fig. 18. Blackdown.
- . **rigidus**, Sow., 1836, id., p. 240, pl. 18, fig. 16. Blackdown.
- . **subvittatus**, d'Orb., 1847. *F. vittatus*, Reuss, 1845, Böhm.  
 ideform., p. 48, pl. 9, fig. 14 (non Quoy, 1832). Czencziz, Trziblit,  
 berschau.
- . **Galathes**, d'Orb., 1847. *Pyrula subcarinata*, d'Archiac, 1847,  
 m. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 345, pl. 25, fig. 7 (non Lam.,  
 4). Tournay.
- . **Brightii**, d'Orb., 1847. *Pyrula Brightii*, Sow., 1836, in Fitt.,  
 ns. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 18, fig. 21. Blackdown.
- . **LULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 71.
- . **depressa**, Sow., 1836, id., p. 242, pl. 18, fig. 20. Blackdown.
- . **ITRUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

- \***206. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 374, pl. 231, fig. 3, 4. France, Le Mans.
- 207. gallicum**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 375, pl. 231, fig. 7, 8. Le Mans.
- 208. Sarthacense**, d'Orb., 1847. *C. limeforme*, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 376, pl. 232, fig. 1-3 (non Roëmer, 1841). France, Le Mans.
- \***209. reflexilabrum**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 382. Ile Madame.
- \***210. Cassisianum**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 382. Cassis.
- \***211. Vindinense**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 382. Le Mans.
- \***212. Cenomanense**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 382. Le Mans.
- \***213. Jason**, d'Orb., 1847. Coquille pourvue de cinq angles sail-lants qui se continuent d'une extrémité à l'autre, tours de spire striés en long. Le Mans.
- \***214. Hector**, d'Orb., 1847. Coquille pourvue d'un tour à l'autre de neuf côtes longitudinales, les tours striés en long. Le Mans.
- 215. Belgium**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 34, pl. 174, fig. 5. D'Archiac, Tourtia, pl. 25, fig. 3. Tournay.
- 216. costellatum**, d'Orb., 1847. *Nassa costellata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 26. Angl., Blackdown.
- 217. productum**, d'Orb., 1847. *Buccinum productum*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform, p. 42, pl. 10, fig. 18. Allem., Laun.
- 218. subelongatum**, d'Orb., 1847. *Rostellaria elongata*, d'Arch., 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 345, pl. 25, fig. 5 (non Roëmer, non Geinitz). Tournay.
- BUCCINUM**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 134.
- 219. pseudo-lineatum**, d'Orb., 1847. *Nassa lineata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 25 (non Gmelin, 1789). Angl., Blackdown.
- COLOMBELLINA**, d'Orb., 1843, Paléont., Terr. crét., 2, p. 346.
- \***220. ornata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 348, pl. 226, fig. 6, 7. Cassis (B.-du-Rhône), Le Mans (Sarthe).
- CAPULUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 31.
- 221. elongatus**, d'Orb., 1847. *Pileopsis elongata*, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 12, pl. 168, fig. 12. Westphalie, Essen.
- EMARGINULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 197.
- \***222. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 393, pl. 234, fig. 9-12. Le Mans (Sarthe), La Malle (Var).
- \***223. pelagica**, Passy, 1832. D'Orb., Paléont., 2, p. 394, pl. 235, fig. 1-3. Rouen.
- \***223'. Santæ-Catharinæ**, Passy, 1832. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 395, pl. 235, fig. 4-6. France, Cassis, Rouen, Saint-Germain près de La Flèche.
- HELICION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.
- \***224. pelagi**, d'Orb., 1847. Coquille lisse très-évasée. Rouen.
- 225. subcentralis**, d'Orb., 1847. *Acmea subcentralis*, d'Archiac, 1847, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 334, pl. 22, fig. 5. Belg., Tournay.
- DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 73.
- \***226. Rhotomagensis**, d'Orb., 1847. Coquille plus droite que le *D. decussatum*. France, Rouen.
- 227. medium**, Sow., 1836, Min. C., 1, pl. 79. Angl., Blackdown.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

- CLAVAGELLA**, Lamarck, 1807. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 299.
- \***228. Cenomaniana**, d'Orb., 1847. Coquille plus allongée que chez le *C. cretacea*. Le Mans.
- TEREDO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.
- \***229. Fleurianus**, d'Orb., 1847. Grosse espèce des lignites de l'île d'Aix et du Mans.
- PANOPÆA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.
- \***230. substriata**, d'Orb., 1847. *P. striata*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 341, pl. 359, fig. 1, 2 (non Münster, 1839). France, Chara, La Malle; Tournay.
- \***231. Astleriana**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 342, pl. 359, fig. 3, 4. France, La Malle, Coudrecieux.
- 232. mandibula**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 344, pl. 366, fig. 3, 4. La Malle; Westphalie; Angl., île de Wight.
- \***233. gurgitis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 345, pl. 361, fig. 1, 2. La Malle.
- \***234. elatior**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 346, pl. 361, fig. 3, 4. Le Mans.
- \***235. læviuscula**, d'Orb., 1847. *Mya læviuscula*, Sow., 1836, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 6. Angl., Blackdown (Devonshire).
- 236. Ringmeriensis**, d'Orb., 1847. *Venus Ringmeriensis*, Mantell, 1822, Sussex, p. 126, pl. 25, fig. 5. Angl., Middleham.
- \***237. ovalis**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 5. Coudrecieux, Le Mans, La Malle (Var); Blackdown.
- 238. Rœmeri**, d'Orb., 1847. *P. elongata*, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 75, pl. 10, fig. 5 (non Rœmer, 1836). Hülse.
- PHOLADOMIA**, Sowerby, 1826. Voy. t. 1, p. 13.
- \***239. Mailleana**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 355, pl. 364, fig. 1, 2. Le Mans, Coudrecieux (Sarthe), Le Havre, Rouen.
- \***240. Ligeriensis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 355, pl. 363, fig. 8, 9. France, Le Mans, Saumur, Soulaige.
- \***241. gigas**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 359, pl. 366. France, Le Mans, La Malle.
- \***242. subdunnensis**, d'Orb., 1847. *Cardium id.*, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 38, pl. 250. Le Mans (Sarthe), La Malle (Var).
- 243. gigantea**, d'Orb., 1847. *Corbula gigantea*, Sow., 1818, Min. Conch., 3, p. 13, pl. 209, fig. 5-7. Angl., Blackdown.
- \***244. Albina**, Reiche, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 75, n° 2, pl. 10, fig. 7. Silésie, Kresl., Schandau.
- 245. biplicata**, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 21, fig. 17, p. 75. Bohème, Tyssa.
- 246. cordiformis**, Desh., Leymerie, 1842, Mém. Soc. géol., p. 3, pl. 3, fig. 3. France, Saint-Parres (Aube).
- LYONSIA**, Turton, 1822. Voy. t. 1, p. 10.

Lyonsia.

**TERRAINS CRÉTACÉS.**

- 17. carinifera**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 385, pl. 373, fig. 1-2. France, La Malle, Rouen.
- 47'. elegans**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 386, pl. 373, fig. 3-5. Saint-Sauveur.
- 147". Kœchlinia**, d'Orb., 1850. Charmante espèce carénée en avant comme les précédentes, mais avec de forts plis sur la région buccale. Rouen.
- PERIPLOMA**, Leach, 1825, d'Orb. Voy. t. 1, p. 216.
- 248. gibbosa**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 388, pl. 374. La Malle.
- 249. elongata**, Roemer, 1841, Kreid., p. 75, n° 2, pl. 10, fig. 2. Hülse.
- PERIPLOMA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- 250. Sapho**, d'Orb., 1847. Belle espèce ovale, très-comprimée, lisse, très-prolongée sur la région buccale, étroite et courte du côté opposé. Le Mans (Sarthe).
- SOLECURTUS**, Blainv., 1824. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 389.
- 251. æqualis**, d'Orb., 1847. Solen id., d'Orb., 1844, Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 321, pl. 350, fig. 5-7. Le Mans; Bohême, Tyssa.
- 252. Guerangeri**, d'Orb., 1847. Solen id., d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 321, pl. 351, fig. 1-2. France, Le Mans.
- 253. radians**, d'Orb., 1847. Solen elegans, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 322, pl. 251, fig. 3-5 (non elegans, Mathéron, 1842). France, Le Mans.
- 254. Pelagi**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *S. Guerangeri*, mais plus mince et sans angle anal. Le Mans.
- 255. Acteon**, d'Orb., 1847. Espèce pourvue de côtes concentriques très-prononcées. Le Mans.
- LEGUMINARIA**, Schumacher, 1817. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 323.
- 256. Moreana**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 324, pl. 350, fig. 8, 9. France, Varennes (Meuse), La Malle (Var).
- 257. Nereis**, d'Orb., 1847. Coquille allongée en rostre en avant et marquée d'une rainure cardinale. Le Mans.
- MACTRA**, Linné. Voy. t. 1, p. 216.
- 258. angulata??** Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 9. Angleterre (Devonshire), Blackdown.
- DONACILLA**, Lamarck, 1812. Voy. t. 2, p. 75.
- 259. compressa**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 402, pl. 376, fig. 3-4. France, Coudrecieux, Le Mans.
- ARCOFAGIA**, Brown, 1827. Voy. t. 2, p. 75.
- 260. Cenomanensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. Numis malis*, mais moins large sur la région anale, plus bombée, etc. I Mans, La Malle.
- 261. radiata**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 412, pl. 378, fig. 11-1. Le Mans.
- 262. inæqualis**, d'Orb., 1847. *Tellina inæqualis*, Sow., 1824, M. n. 456, fig. 2. *Psammobia semicostata*, Roemer, 1841, Kreid. pl. 86, fig. 11-12. Anglet., Blackdown.

- 263. lamellosa**, d'Orb., 1847. *Solen lamellosus*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 16, pl. 86, fig. 5. Bohème, Kreibitz.
- TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.
- \*264. striatula**, Sow., 1824, Min. Conch., 5, p. 79, pl. 456, fig. 1. France, Le Mans; Angleterre, Blackdown.
- 265. gracilis**, d'Orb., 1847. *Psammobia gracilis*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 16, fig. 12. Angl., Blackdown.
- 266. subtenuistriata**, d'Orb., 1847. *Amphidesma tenuistriata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 239, pl. 16, fig. 7 (non Desh., 1824). Blackdown.
- CAPSA**, Brug., 1791. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 423.
- \*267. elegans**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 423, pl. 381, fig. 1-2. Le Mans.
- LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- 268. angulata**, d'Orb., 1847. *Nucula angulata*, Sow., 1824, Min. Conch., 5, p. 118, pl. 476, fig. 5. Angl., Blackdown.
- 269. lineata**, d'Orb., 1847. *Nucula lineata*, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 17, fig. 9. Blackdown.
- 270. porrecta**, d'Orb., 1847. *Nucula porrecta*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 7, pl. 34, fig. 12-13. *N. siliqua*, Goldf., dans Geinitz, p. 77, pl. 20, fig. 28-29. Bohème, Tyssa, Zloseyn, Mühlhausen.
- VENUS**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 15.
- \*271. Cenomanensis**, d'Orb., 1847. *V. fragilis*, d'Orb., Paléont., 3, p. 446, pl. 385 (non *V. Münster*). France, Le Mans, Lamnay (Sarthe).
- \*272. plana**, Sow., 1845. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 447, pl. 386, fig. 1-3. Le Mans; Angleterre, Blackdown.
- \*273. subrotunda**, d'Orb., 1847. *Cytherea id.*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 240, pl. 17, fig. 2. La Malle, Le Mans; Angl., Blackdown; Syrie, mont Liban. M. Beadle.
- 274. ovalis**, Sow., 1827, Min. Conch., 6, p. 129, pl. 567, fig. 1-2. Angl., Blackdown.
- \*275. faba**, Sow., 1827, Min. Conch., 6, p. 129, pl. 567, fig. 3. D'Orb., Paléont. franç., pl. 385, fig. 6-8. Rouen; Angl., Blackdown.
- 276. caperata**, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 31, pl. 518, fig. 1. Anglet., Blackdown.
- 277. lineolata**, Sow., 1813, Min. Conch., 1, p. 57, pl. 20, fig. 1. Angl., Blackdown.
- \*278. immersa**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 17, fig. 6. Le Mans, La Malle; Bohème, Tyssa; Angl., Blackdown.
- 279. sublaevis**, Sow., 1836, id., p. 242, pl. 17, fig. 5. Angleterre, Blackdown.
- 280. subtruncata**, d'Orb., 1847. *V. truncata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 17, fig. 3 (non Lam., 1818). Angl., Blackdown.
- 281. submersa**, Pinhay, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 17, fig. 4. Angl., Blackdown.
- 282. parva**, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 31, pl. 518, fig. 4-6. Angl., Blackdown.
- 283. Astieriana**, Mathéron, 1843, Catal., p. 154, pl. 16, fig. 9-10. La Malle (Var).

- 284. Labadyei**, d'Arch., 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 303, pl. 14, fig. 7 a. Belgique, Tournay.
- THETIS**, Sow., 1826. Voy. t. 1, p. 75.
- \***285. major**, Sow., 1845. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 454, pl. 387, fig. 8-10. France, Rouen.
- CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.
- 286. truncata**, Sowerby, 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, pl. 16, fig. 8 (non d'Orb., 1843). Angl., Blackdown.
- \***287. elegans**, Sowerby, 1827, Min. Conch., 6, p. 139, pl. 572, fig. 1. Angl., Blackdown.
- OPIS**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.
- 288. Coquandiana**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 54, pl. 257, fig. 7-9. Cassis.
- \***289. elegans**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 55, pl. 254, fig. 4-9. France, Le Mans (Sarthe), La Malle (Var).
- \***290. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, pl. 251 bis, fig. 1-4. Le Mans.
- \***291. Ligeriensis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, pl. 257, fig. 6-10. Le Mans.
- 292. Annoniensis**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 305, pl. 14, fig. 10. Belgique, Tournay.
- ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 1, p. 216.
- \***293. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 271, pl. 266 bis, fig. 1-5. Le Mans.
- 294. striata**, Sowerby, 1826, Min. Conch., 6, p. 36, pl. 520, fig. 1. A. Koninckii, d'Archiac, 1847, Tourtia, pl. 14, fig. 4. Angl., Blackdown; Belgique, Tournay.
- 295. concinna**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 239, pl. 16, fig. 15. Angl., Blackdown.
- 296. multistriata**, Sowerby, 1836, id., p. 240, pl. 16, fig. 17. Blackdown.
- 297. formosa**, Sow., 1836, id., p. 239, pl. 16, fig. 16. Blackdown.
- 298. impolita**, Sow., 1836, id., p. 239, pl. 16, fig. 18. Blackdown.
- CRASSATELLA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 77.
- \***299. Galliennel**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 81, pl. 266 bis, fig. 6-8. Coudrecieux (Sarthe).
- \***299'. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 76, pl. 265, fig. 1-2. Le Mans.
- \***300. Ligeriensis**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 77, pl. 265, fig. 3-5. Le Mans.
- \***301. Vendinnensis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 79, pl. 266, fig. 1-3. Le Mans, Rouen.
- 303. subgibbosula**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 301, pl. 14, fig. 2-3. Belg., Mottignies-sur-Roc, Tournay.
- \***304. Neptuni**, d'Orb., 1847. Coquille extrêmement comprimée, presque ronde, à larges ondulations concentriques. Le Mans.
- CARDITA**, Bruguière, 1839. Voy. t. 1, p. 77.
- 305. Cenomanensis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 94, pl. 283 bis, fig. 1-4. Le Mans.



- \***306. dubia**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 92, pl. 270, fig. 1-5. Le Mans; Angl.
- \***307. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 93, pl. 270, fig. 6-10. Le Mans.
- \***308. tricarinata**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 95, pl. 283 bis, fig. 5-7. Le Mans.
- \***309. Cottaldina**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 91, pl. 269, fig. 6-8. *C. tenuicosta*, Reuss (non d'Orb.). France, Rouen, Auxon (Aube); Postelberg (Bohème).
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.
- \***310. oblonga**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 105, pl. 277, fig. 1-4. *Astarte cyprinoides*, d'Archiac, 1847, Tourtia, pl. 14, fig. 5. Le Mans, Coudrecieux (Sarthe); Belgique, Tournay.
- \***311. quadrata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 105, pl. 276. France, Villers, Rouen, Saint-Calais.
- \***312. Ligeriensis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 103, pl. 275 (exclus. fig. 4-5). France, Tourtenay (Deux-Sèvres), Le Mans (Sarthe), La Malle (Var).
- \***313. Neptuni**, d'Orb., [1847. Espèce intermédiaire pour la longueur entre le *C. oblonga* et *elongata*. Ile Madame (Charente-Infér.).
- \***314. cuneata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 240, pl. 16, fig. 19. France, Le Mans (Sarthe); Angl., Blackdown.
- 315. angulata**, Sow., 1814, Min. Conch., 1, p. 143, pl. 65. Angl., Blackdown.
- \***316. rostrata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 240, pl. 17, fig. 1. Angl., Blackdown; Syrie, mont Liban.
- 317. Archiaciana**, d'Orb., 1847. *Crassatella quadrata*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 301, pl. 14, fig. 1 (non *C. quadrata*, d'Orb., 1843). Belgique, Tournay.
- CYPRICARDIA**, Lamarck, 1801.
- \***318. Isocardia**, d'Orb., 1847. Coquille renflée oblongue, à crochets saillants; longue et gibbeuse sur la région anale. Vibrayes (Sarthe).
- \***319. subcarinata**, d'Orb., 1847. Jolie espèce allongée, lisse, carénée sur la région anale. Condrieux (Sarthe).
- TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.
- \***320. Coquandiana**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 149, pl. 294, fig. 1-4. France, Verdon, près Castellanne.
- \***321. crenulata**, Lam., 1819; d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 151, pl. 295. France, Le Mans, Rouen, Gacé.
- \***322. Dadalea**, Parkinson, 1811. D'Orb., Pal., 3, p. 145, pl. 292. *T. quadrata*, Agass., 1840. Le Mans, Orange, La Malle.
- \***323. sinuata**, Park., 1811. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 147, pl. 293. France, Le Mans, Fouras, Ambillon.
- \***324. spinosa**, Parkins., d'Orb., Paléont., 3, p. 154, pl. 297, fig. 1-5. *T. conformis*, Agass., 1840. Le Mans, Sancerre, Rouen, Lamnay.
- \***325. sulcataria**, Lam., 1819. D'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 150, pl. 294, fig. 5-9. Le Mans, Orange, Bedouin.
- \***326. Pyrrha**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. spinosa*, mais avec des côtes et des tubercules bien plus gros. Le Mans.

- \***327. Nereis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. sulcataria*, n<sup>o</sup> 1, lisse au milieu. Le Mans.
- 328. excentrica**, Sowerby, 1818, Min., 3, p. 11, pl. 208, fig. 14. Blackdown.
- 329. quadrata**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 240, pl. 17, fig. 12 (non *quadrata*, Agass., 1840). Angl., Blackdown.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.
- \***330. Turonensis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 123, pl. 283, fig. 11, 12. France, Le Mans, Coudrecieux, Rouen.
- \***331. Nereis**, d'Orb., 1847. Coquille comprimée, ronde, pourvue de côtes concentriques. Le Mans.
- 332. orbicularis**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 13. *Venus parva*, Reuss, 1846, pl. 41, fig. 16-17. Angl., Blackdown; Bohême, Tyssa, Kreibitz.
- 333. pisum**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 14. Angl., Blackdown.
- 334. circularis**, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 20, fig. 4, p. 76. Bohême, Tyssa, B. Postelberg.
- 335. Reichii**, Römer, 1841, Kreid., p. 73, n<sup>o</sup> 2, pl. 9, fig. 15. Allem., Tyssa, Freienwalde.
- CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.
- \***336. rotundata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 113, pl. 280. Le Mans, Rouen, Montignac, La Malle, Eoux.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- \***338. Carolinum**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 29, pl. 245. France, Fouras, île d'Aix.
- \***339. Cenomanense**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 37, pl. 249, fig. 5-9. Le Mans; Syrie, mont Liban (M. Beadle).
- \***340. Guerangeri**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 35, pl. 249, fig. 1-4. France, Le Mans, Ile-Madame; Syrie, mont Liban (M. Beadle).
- \***341. Hillanum**, Sow., d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 27, pl. 241. La Malle, Lamnay, Le Mans; Angl., Blackdown; Bohême, Tyssa.
- \***342. Mailleanum**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 40, pl. 254. Rouen.
- \***343. Montonianum**, d'Orb., 1843, Paléontol., 3, p. 35, pl. 244. France, La Malle, Lamnay, Rouen; Angl., Devises.
- \***344. productum**, Sow., 1831. D'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 31, pl. 247. Saumur, Le Mans, Tourtenay, Soulage.
- \***345. Pelagi**, d'Orb., 1847. Coquille triangulaire, lisse, très-comprimée, ayant l'aspect d'une *Lima*. Le Mans.
- 346. Umbonatum**, Sow., 1817, Min. Conch., 2, p. 127, pl. 156, fig. 2, 3, 4. Angl., Blackdown.
- 347. pustulosum**, V. Münt., Goldf., Petref., 2, p. 221, pl. 144, fig. 6; Reuss, 1846, Böhm. Kreideforme, p. 1. Bohême, Laun, Malnitz, Czencziz et Drahomischel, Hollubitz, Tyssa.
- 348. hypericum**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., 2, p. 304, pl. 14, fig. 9. Belgique, Tournay.
- 349. Michellini**, d'Archiac, 1847, Mém., 2, p. 304, pl. 14, fig. 8. Tournay.

- '350. Vendinnense**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 38, pl. 249, fig. 10-14. Le Mans.
- '351. subventricosum**, d'Orb., 1847. *C. ventricosum*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 44, pl. 257, fig. 1-3 (non Brug., 1791). Rouen.
- '352. canaliculatum**, d'Orb., 1847. *Petricola canaliculata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 11. Anglet., Blackdown.
- '353. nuciforme**, d'Orb., 1847. *Petricola nuciformis*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 16, fig. 10. Blackdown.
- UNICARDIUM**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 218.
- '354. lævigatum**, d'Orb., 1847. *Corbula lævigata*, Sow., 1818, Min. Conch., 3, p. 13, pl. 209, fig. 1-2. Angl., Blackdown.
- ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. t. 1, p. 132.
- '355. cryptoceras**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 49, pl. 252, fig. 5-7. Montblainville.
- '356. obliqua**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*I. Neocomiensis*, mais bien plus oblique. France, La Malle (Var).
- '357. similis**, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 27, pl. 516, fig. 1. Angleterre, Sandgate, près de Margate.
- '358. semiradiata**, d'Orb., 1847. Magnifique espèce, très-renflée, lisse, pourvue de côtes rayonnantes seulement sur la région buccale. La Malle.
- ISOARCA**, Münster, 1843.
- '359. obesa**, d'Orb., 1847. *Nucula obesa*, d'Orb., 1843, Pal., Terr. crét., 3, p. 180, pl. 304, fig. 10-14. *Isocardia Orbignyana*, d'Arch., 1847, Tourtia, pl. 15, fig. 1. Rouen; Belgique, Tournay.
- NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 12.
- '360. impressa**, Sow., 1824, Min. Conch., 5, p. 117, pl. 475, fig. 3. *N. Renauxiana*, d'Orb., 1847, Paléont., Terr. crét., 3, p. 179, pl. 304, fig. 7-8. France, Le Mans (Sarthe); Angl., Blackdown.
- '361. antiquata**, Sowerby, 1824, Min. Conch., 5, p. 117, pl. 475, fig. 4. Angl., Blackdown.
- '362. obtusa**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 17, fig. 11. Angl., Blackdown.
- '363. apiculata**, Sow., 1836, id., p. 241, pl. 17, fig. 10. Blackdown.
- LDIOPSIS**, Sassi, 1835. Voy. t. 1, p. 280.
- '364. Guerangeri**, d'Orb., 1847. *Pectunculina id.*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 183, pl. 305, fig. 1-4. Le Mans.
- '365. complanata**, d'Orb., 1847. *Pectunculina id.*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 184, pl. 305, fig. 5-8. Le Mans.
- PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 80.
- '366. subconcentricus**, Lam., 1819. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 189, pl. 306, fig. 12-19. France, Le Mans.
- '367. sublaevis**, Sow., 1824, Min. Conch., 5, p. 112, pl. 472, fig. 4. *P. obsoletus*, Goldf., pl. 126, fig. 4. Angl., Blackdown; France, Fournas; Saxe, Coschütz; Bohême, Czencziz; Dresde, Kutschlin.
- '368. ventruosus**, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 20, fig. 20, p. 77; Reuss, pl. 35, fig. 18. Bohême, Tyssa B., O. Kreibitz, Lobkowitz, *Drahomischel*.

- 369. *spinescens***, Reuss, 1846, Böhm., p. 9, pl. 35, fig. 6. Bohème, Zloseyn, près de Weltus.
- 370. *Reussii***, d'Orb., 1847. *P. brevirostris*, Reuss, 1846, Böhm., p. 9, pl. 35, fig. 12 (non Sow. Espèce des terr. tertiaires). Bohème, Czencziz et Neuschloss.
- 371. *subpulvinatus***, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. g<sup>éol.</sup>, 2<sup>e</sup> série, 2, p. 306, pl. 15, fig. 2. Belgique, Tournay.
- ABCA***, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.
- \*372. *carinata***, Sow., 1813. D'Orb., 184, Pal., 3, p. 214, pl. 313. France, La Malle, Lamnay; Angleterre, Blackdown.
- \*373. *Galliennei***, d'Orb., 1843, Paléont. franc., Terr. crét., 3, p. 218, pl. 314. France, Le Mans, Coudrecieux, Rouen.
- \*374. *pholadiformis***, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 219, pl. 315, fig. 1-3. Le Mans.
- \*375. *Vendinnensis***, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 220, pl. 315, fig. 4-7. Le Mans.
- 376. *Sarthacensis***, d'Orb., 1847. *A. elegans*, d'Orb., 1843, Pal., Terr. crét., 3, p. 221, pl. 315, fig. 10 (non Roemer, 1836). Le Mans.
- 377. *echinata***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 222, pl. 315, fig. 11-13. Le Mans.
- 378. *Cenomanensis***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 223, pl. 316, fig. 1-4. Le Mans.
- 379. *Albertina***, d'Orb., 1847. *A. gibbosa*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 224, pl. 316, fig. 5-8 (non Reeve, 1844). Le Mans.
- \*380. *subdinnensis***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 225, pl. 316, fig. 9-12. Le Mans.
- 381. *serrata***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 226, pl. 316, fig. 13-16. Le Mans.
- 382. *Guerangeri***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 228, pl. 318, fig. 1-2. Le Mans, Saumur.
- \*383. *Mailleana***, d'Orb., 1844, Paléontol. franç., Terr. crét., 3, p. 229, pl. 318, fig. 3-6. France, Rouen; Harz, Quedlimbourg?
- 384. *Marceana***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 232, pl. 319, fig. 3-5. Le Mans.
- \*385. *Tailleburgensis***, d'Orb., 1844, Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 233, pl. 320. Port-des-Barques, Charas, La Malle, Le Mans.
- \*386. *Moutoniana***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 234, pl. 321. France, La Malle (Var), Soulage (Aude), Touvois (Loire-Inférieure).
- \*387. *Passyana***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 241, pl. 327, fig. 1-2. *Arca glabra*, Reuss, pl. 34, fig. 44 (non Sow.). Rouen; Bohème, Tyssa, Laun, Semich, Malnitz, Neuschlotts.
- \*388. *Ligeriensis***, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 327, pl. 317, fig. 1-3 (exclus., fig. 4-5). France, Le Mans.
- 389. *subformosa***, d'Orb., 1847. *Cucullæa formosa*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 240, pl. 17, fig. 7 (non *formosa*, Sow., 1833). Blackdown.
- 390. *rotundata***, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 239, pl. 17, fig. 8. Angl., Blackdown.
- 391. *subconcentrica***, d'Orb., 1847. *Cucullæa concentrica*, Roemer,

- 1845, Nordd. Kreid., p. 70, n° 2, pl. 9, fig. 1 (non *concentrica*, Münster, 1840). Allem., Haltern.
- 392. trapezoidea**, d'Orb., 1847. *Cucullæa trapezoidea*, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 20, fig. 10, 11 ? p. 78. Postelberg, Luschütz ?
- PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 176.
- \*393. bicarinata**, Mathéron, 1843, Catal., p. 180, pl. 27, fig. 6-8. *P. Renauxiana*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 252, pl. 336, fig. 4-6. Bedouin, Orange (Vaucluse).
- 394. Moreana**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 255, pl. 332. Montblainville.
- \*395. Neptuni**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 255, pl. 333, fig. 1-3. Montblainville.
- \*396. Galliennet**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 253, pl. 231. France, Ste-Cérotte (Sarthe), Villers (Calvados).
- 397. subtetragona**, d'Orb., 1847. *P. tetragona*, Sow., 1821, Min. Conch., 4, p. 9, pl. 313, fig. 1 (non Brocchi, 1814). Angl., Devizes.
- 398. compressa**, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 167, pl. 128, fig. 4. Bohème, Pirna.
- 399. decussata**, Goldfuss, 1838, pl. 128, fig. 1, 2. Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 65, n° 2. *Pinna depressa*, Goldfuss, fig. 3. Haltern, Schandau, Pirna, Bannewitz.
- MYOCONCHA**, Sow., 1824. Voy. t. 1, p. 165.
- \*400. cretacea**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 260, pl. 335. Ile Madame, Angoulême, Coudrecieux, Rouen.
- \*401. angulata**, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 261, pl. 336. Le Mans.
- MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.
- \*402. peregrinus**, d'Orb., 1847. *M. lineatus*, d'Orb., 1844, Paléont., franç., Terr. crét., 3, p. 266. Fr., La Malle, Coudrecieux, Tournay.
- \*403. Chauvinianus**, d'Orb., 1847. *M. semi-striatus*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 271, pl. 338, fig. 7-10. Fr., Le Mans.
- \*404. pileopsis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 272, pl. 338, fig. 11-13. Le Mans.
- \*405. Galliennet**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 273, pl. 339, fig. 1, 2. *M. tornacensis*, d'Archiac, 1847, Tourtia, pl. 15, fig. 3. Coudrecieux ; Bohème, Tyssa ; Belgique, Tournay.
- \*406. siliqua**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 274, pl. 339, fig. 34. *Modiola siliqua*, Math. France, Orange, Le Mans.
- \*407. Ligeriensis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 274, pl. 340, fig. 1, 2. *M. striatus*, Grouet, 1825 (non Montagu, 1803). Saumur, Le Mans, Ile-Madame.
- \*408. reversus**, d'Orb., 1847. *M. semi-radiatus*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 277, pl. 341, fig. 1, 2. *Modiola reversa*, Sow., 1836, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 17, fig. 13. *M. lævigata*, Geinitz, pl. 20, fig. 35. France, Le Mans.
- 409. inornatus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 277, pl. 341, fig. 3-5. Le Mans.
- 410. interruptus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 278, pl. 341, fig. 6-8. Le Mans.
- \*411. semi-ornatus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 279, pl. 341, fig. 9, 10. Le Mans.

- 412. subfalcatus**, d'Orb., 1847. *M. falcatus*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 280, pl. 341, fig. 11-13 (non *falcatus*, Goldf.), France, Le Mans.
- \***413. dilatatus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 280, pl. 342, fig. 1-3. Le Mans.
- \***414. striato-costatus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 281, pl. 342, fig. 4-6. Le Mans.
- \***415. Guerangeri**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 282, pl. 342, fig. 7-9. Le Mans.
- 416. ornatissimus**, d'Orb., 1847. *M. ornatus*, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 282, pl. 342, fig. 10-12. France, Le Mans.
- 417. alternatus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 284, pl. 342, fig. 13-15. Le Mans.
- \***418. orbiculatus**, d'Orb., 1847. Coquille ronde et voisine de forme du *M. pileopsis*, mais à crochet moins saillant; également striée. France, Le Mans.
- 419. lanceolatus**, Sow., 1823, Min. Conch., 5, p. 55, pl. 439, fig. 2. *M. edentulus*, Sow., 1823, pl. 439, fig. 1. *M. tridens* et *M. prælongus*, Sow., 1836, Trans. geol. Soc., 4, pl. 17, fig. 15, 14. Angleterre, Blackdown.
- 420. subarcuatus**, d'Orb., 1847. *Modiola arcuata*, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 20, fig. 34, p. 78 (non DeFrance, 1824). Bohême, Postelberg.
- 421. clathratus**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 306, pl. 15, fig. 4. Belgique, Tournay.
- LITHODOMUS**, Cuvier, 1817.
- \***422. rostratus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 292, pl. 344, fig. 16, 17. La Malle.
- \***423. Carantonensis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 293, pl. 345, fig. 1-3. Ile-d'Aix.
- \***424. suborbicularis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 293, pl. 345, fig. 4-8. Ile-d'Aix.
- \***425. rugosus**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 294, pl. 346, fig. 1-3. Le Mans.
- 426. æqualis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 295, pl. 346, fig. 4-6. Le Mans.
- 427. pyriformis**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 307, pl. 15, fig. 5 a. Belgique, Tournay.
- LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.
- \***428. clypeiformis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 543, pl. 417, fig. 9, 10. Le Mans, La Caille, La Malle, Caix.
- \***429. Reichembachii**, Geinitz, 1840. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 544, pl. 418, fig. 1-4. France, Coudrecieux, Saumur.
- \***430. simplex**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 545, pl. 418, fig. 5, 6. France, Le Mans, Villers.
- \***431. rapa**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 546, pl. 419, fig. 1-4. France, Le Mans, Coudrecieux.
- \***432. tecta**, Goldf., 1836. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 547, pl. 419, fig. 5-8. France, Le Mans, La Malle.
- \***433. Gallienniana**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 548, pl. 420, fig. 1-3. Coudrecieux.

- \*434. *Astieriana*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 549, pl. 420, fig. 4-7. France, La Malle, Lamnay, St-Sauveur, Auxon.
- \*435. *intermedia*, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 550, pl. 421, fig. 1-5. France, Le Mans, La Malle.
- \*436. *ornata*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 551, pl. 421, fig. 6-10. Le Mans.
- \*437. *Cenomanensis*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 552, pl. 421, fig. 11-15. Le Mans.
- \*438. *semi-ornata*, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 555, pl. 423, fig. 1-3. France, Le Mans, La Malle.
- \*439. *subconsobrina*, d'Orb., 1847. *P. consobrina*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 556, pl. 422, fig. 4-7. France, Le Mans.
- \*440. *subaequilateralis*, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 558, pl. 423, fig. 1-5. *Lima semi-sulcata*, Geinitz. France, Le Mans; Silésie, Kreslingswalda.
- \*441. *subabrupta*, d'Orb., 1847. *Lima abrupta*, d'Orb., Pal., 3, p. 559, pl. 423, fig. 6-9 (non Goldf., 1836). France, Le Mans.
- \*442. *Varusensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. proboscidea*, mais avec 14 grosses côtes non lamelleuses. La Malle (Var), Coudrecieux (Sarthe), Nancras (Charente-Inférieure).
- \*444. *Moutoniana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. Reichembachii*, mais à 10 côtes lisses moins larges que leurs sillons. La Malle.
- \*445. *Eolis*, d'Orb., 1847. Coquille voisine du *L. Marroliana*, mais avec des côtes plus nombreuses et bien plus étroites. Le Mans.
- \*446. *Calypso*, d'Orb., 1847. Coquille voisine du *Lima Hoperi*, mais avec des sillons ponctués plus nombreux. Rouen.
- 447. *semi-sulcata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 11, fig. 10. Angleterre, Blackdown.
- 448. *subovalis*, Sow., 1836, id., p. 241, pl. 17, fig. 21. Blackdown.
- 449. *canalifera*, Goldfuss, pl. 104, fig. 1. Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 56, n° 10. Bohême, Schandau.
- 450. *carinata*, var., Münster, Goldf., pl. 104, fig. 2. Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 56, n° 6. Westph., Essen.
- 451. *Benauxiana*, Mathéron, 1843, Catal., p. 183, pl. 29, fig. 6, 7. France, Orange (Vaucluse).
- 452. *pseudocardium*, Reuss, 1846. Böhm. Kreideform., p. 33, pl. 38, fig. 2, 3. Tyssa, Meronitz, Hradek, Malnitz, Neuschloss.
- 453. *pennata*, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 307, pl. 15, fig. 6 a, b. Belgique, Tournay.
- 454. *rectangularis*, d'Archiac, 1847, id., p. 308, pl. 15, fig. 7 a. Tournay.
- 455. *resecta*, d'Archiac, 1847, id., p. 308, pl. 15, fig. 8. Tournay.
- AVIOULA, Klein, 1753. Voy. t. 1, p. 13.
- \*456. *subplicata*, d'Orb., 1845, Paléont. franç., 3, p. 476, pl. 391, fig. 8-10 (non Sow., 1827). Fr., Le Mans.
- \*456'. *Cenomanensis*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 476, pl. 391, fig. 11-13. Le Mans.
- \*457. *interrupta*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 477, pl. 391, fig. 14-18. Le Mans.
- \*458. *anomala*, Sowerby, 1836. D'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 478,

- pl. 392. France, Le Mans, Bessé (Sarthe), Charas; Angleterre, Blackdown; Bohême, Tyssa, Laun, Kradek, Trzibnitz, Zilloch, Opolschav.
- \*459. *Moutoniana*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 479, pl. 399. La Malle.
- \*460. *Eolis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. anomala*, mais plus allongée et à côtes moins granuleuses, presque simples. La Malle.
- 460'. *Gryphœoides*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 156, pl. 11, fig. 3. Angleterre, Petersfield.
461. *Roxelana*, d'Orb., 1847. *A. radiata*, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 10, fig. 6, pl. 20, fig. 47, p. 56 (non Leach, 1814). Bohême, Goppeln, Bannewitz.
462. *semi-plicata*, Geinitz, 1842, id., pl. 20, fig. 31, p. 79. Pötelberg.
463. *semi-radiata*, Reuss, 1846. Böhm. Kreideform., p. 23, pl. 23, fig. 7. Bohême, Zloseyn.
464. *Reichii*, d'Orb., 1847. *Gervilia Reichii*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 64, n° 3, pl. 8, fig. 14. Tyssa, Coschütz.
- GERVILIA, DeFrance, 1820. Voy. t. 1, p. 201.
- \*465. *enigma*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 488, pl. 396, fig. 9-11. Le Mans.
- \*466. *aviculoides*, DeFrance, 1820. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 489, pl. 397. France, Le Mans.
- PERNA, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 176.
- \*467. *lanceolata*, Geinitz, 1843. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 498, pl. 402, fig. 1-3. Fr., Coudrecieux; Bohême, Tyssa.
468. *rostrata*, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 17, fig. 17. Angleterre (Devonshire), Blackdown.
469. *cretacea*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 24, pl. 32, fig. 18, 19, 20, pl. 33, fig. 1. Bohême, Tyssa, Trzibnitz, Czencziz, Laun, Neuschloss, Malnitz.
470. *subspatulata*, Reuss, 1846, id., p. 24, pl. 32, fig. 16, 17. Malnitz.
- INOCERAMUS, Parkinson, 1811. Voy. t. 1, p. 237.
- \*471. *striatus*, Mantell, 1822. D'Orb., Paléont., 3, p. 508, pl. 405. *In. pernoides*, Mathéron. *In. concentricus*, Geinitz (non Parkinson) Orange (Vaucluse), Le Mans (Sarthe), La Malle (Var), Villers (Calvados); Saxe, Pirna.
- \*472. *angulatus*, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 515, pl. 408, fig. 3, 4. France, Sainte-Cerotte (Sarthe).
473. *cardissioides*, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 112, pl. 110, fig. 2. Quedlinburg.
474. *Decheni*, Roem., 1841, Kreid., p. 60, n° 1, pl. 8, fig. 10. Essen.
- PEOTEN, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.
- \*475. *asper*, Lam., 1819. D'Orb., Paléont., 3, p. 599, pl. 434, fig. 1-6. France, Lassigny, Villers, Honfleur, Havre, Rouen, St-Sauveur, Cornes, La Malle; Silésie, Friedland.
- \*476. *virgatus*, Nilsson, 1827. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 602, p. 434, fig. 7-10. France, Le Mans, Ste-Cerotte.
- \*477. *Cenomanensis*, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 603, pl. 434, fig. 11-14. France, Le Mans, Tourtenay.



- \***478. obliquus**, d'Orb., 1846, Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 604, pl. 435, fig. 1-4. France, Coudrecieux, Le Mans.
- \***479. subacutus**, Lam., 1846, D'Orb., Pal., 3, p. 605, pl. 435, fig. 5-10. *P. Brongniartii*, d'Archiac, Tourt., pl. 16, fig. 4, 5. Le Mans, La Malle, Port-des-Barques; Belgique, Tournay.
- \***480. elongatus**, Lam., 1819, D'Orb., Paléont., 3, p. 607, pl. 436, fig. 1-4. *P. comans*, Roëmer, 1841, p. 51, pl. 8, fig. 6. Le Mans, Rouen, Neuville, Sancerre; Westphalie, Essen.
- \***481. Galliennet**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 608, pl. 436, fig. 5-8. France, Coudrecieux, Villers.
- \***482. orbicularis**, Sow., 1827, D'Orb., Pal., 3, p. 597, pl. 433, fig. 14-16. Havre, Sasseigny, Lamnay, Eoux, St-Sauveur, Vitry-le-Français, Neuville.
- 483. Neptuni**, d'Orb., 1847. Coquille déprimée, aussi longue que large, lisse, avec de légères côtes concentriques, à larges oreilles. Le Mans.
- \***484. Calypso**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. orbicularis*, mais entièrement lisse et sans lamelles. Le Mans.
- \***485. Beaveri**, Mantell, 1822, Foss. illust. geol. of Sussex, p. 127, pl. 25, fig. 11. Angl., Southerham, Beachy-head, Hamsey, Ringmer.
- 486. Stutchburliensis**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 241, pl. 18, fig. 1. Angleterre, Blackdown.
- 487. compositus**, Sow., 1836, id., p. 241, pl. 17, fig. 20. Blackdown.
- 488. Millerii**, Sow., 1836, id., p. 241, pl. 17, fig. 19. Blackdown.
- 489. crispus**, Roëm., 1841, p. 51. *P. cretosus*, Goldf., 1836, Petr., 2, p. 58, pl. 94, fig. 2 (non Defrance). Westphalie, Essen.
- 490. hispidus**, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 59, pl. 94, fig. 4. Westphalie, Essen, Ruhr, Lemförde.
- 492. squammifer**, Geinitz, 1842, Carak. Kreid., pl. 21, fig. 5, p. 83. Bohême, Postelberg.
- 493. serratus**, Nilss., Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 30, pl. 39, fig. 19. Bohême, Tyssa, Priesen, Laun, Kosstitz.
- \***494. Passyi**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 309, pl. 15, fig. 9 a. Belgique, Tournay.
- \***495. Bhotomagensis**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 609, pl. 436, fig. 9-11. *Pecten subinterstriatus*, d'Archiac, 1847, Tourtia, pl. 25, fig. 10. France, Rouen; Belgique, Tournay.
- 496. subdepressus**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 310, pl. 16, fig. 1, 2. Belgique, Tournay.
- 497. decemcostatus**, v. Münster, Goldf., pl. 92, fig. 2. Roëmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 54, n° 29. Schandau.
- JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 2, p. 83.
- \***498. Fleuriensis**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 631, pl. 443. Ile-d'Aix, Ile-Madame, Saint-Trojan, Angoulême.
- \***499. quinquecostata**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 632, pl. 444, fig. 1-5. Villers, Fourras, La Malle, Rouen, Martigues, Le Mans, Aubenton.
- \***500. phascola**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 635, pl. 444, fig. 6-10. *Pecten tumidus*, Dujardin, 1837, Mém. de la Soc. géol., 2, pl. 16,

fig. 13. Le Mans, Sarlat, Châtellerault (Vienne), Touvois (Loire-Inférieure).

\***501. æquicostata**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 637, pl. 445, fig. 1-4. Le Mans, Villers, La Malle, Escragnolles, Bannewitz (M. Geinitz); Saxe, Schandau.

\***502. dilatata**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 638, pl. 445, fig. 5-8. Le Mans.

\***503. longicauda**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 639, pl. 445, fig. 9-11. Le Mans.

\***504. cometa**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét.; 3, p. 640, pl. 445, fig. 15-19. France, Villers, Le Havre.

\***505. digitalis**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 642, pl. 446, fig. 1-3. Le Mans.

\***506. Alpina**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 643, pl. 446, fig. 4-8. France, La Malle, Escragnolles.

\***507. Hispanica**, d'Orb. Espèce à vingt côtes larges, à peine séparées par un sillon. Espagne, Llama Oscura, près d'Oviedo.

**508. striato-costata**, d'Orb., 1847. *Pecten id.*, Goldf., 2, p. 55, pl. 93, fig. 2. Westphalie, Koesfeld, Lemford.

**508'. notabilis**, d'Orb., 1847. *Pecten notabilis*, v. Münster, Goldf., pl. 93, fig. 3. Rœmer, 1841, Kreid., p. 55, n° 38. Westph., Essen.

\***509. Carantonensis**, d'Orb., 1847. Jolie espèce avec sept côtes intermédiaires très-inégales entre chaque grosse côte, et striées en travers. Charas (Charente-Inférieure).

**SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 83.

\***510. striatus**, Goldf., 1832. D'Orb., Paléont., 3, p. 660, pl. 453. *S. capillatus*, d'Arch., Tourt., pl. 17, fig. 1. Havre, Villers; Anglet, Chute-Farm; Westphalie, Essen; Belgique, Tournay.

\***511. hystrix**, Goldf., 1832. D'Orb., Paléont., 3, p. 661, pl. 454. *S. radiatus*, Goldf., pl. 106, fig. 6. *S. Omaliis*, d'Arch. ? Tourtia, pl. 15, fig. 4. Le Mans, Port-des-Barques; Westphalie, Essen.

**CHAMA**, Linné, 1758. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 688.

**512. cretacea**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 689, pl. 464, fig. 1, 2. France, Aubenton (Aisne).

\***513. cornucopiae**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 689, pl. 464, fig. 3-7. Rouen.

**514. costata**, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 67, n° 1, pl. 8, fig. 20. Haltern.

**OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.

\***515. canaliculata**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 709, pl. 471, fig. 4-8. France, Le Havre, Rouen; Tournay.

\***516. Carantonensis**, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 713, pl. 478. Ile-Madame.

\***517. carinata**, Lam., 1847. D'Orb., Paléont., 3, p. 714, pl. 474. Ile d'Aix, Villers, Havre, Source-Salée, Le Mans, St-Sauveur, La Malle, Eaulx (B.-Alpes); Bohême, Tyssa, Bannewitz, Naundorf, près Freiberg.

\***518. Isabella**, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 717, pl. 475. Ile d'Aix,

**Charas, Le Mans, La Flèche, Mareuil, Milhac, Nontron, Touvois,**

Source-Salée, près du Beausset; Espagne, Llama-Oscura, près d'Oviedo; Syrie, mont Liban.

\*519. *biauriculata*, Lam., 1819. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 719, pl. 476. France, partout avec la *Flabella*.

\*520. *columba*, Desh., 1830. D'Orb., Paléont., 3, p. 721, pl. 477. Partout, Touvois (Loire-Inférieure); Espagne, Llama-Oscura, près d'Oviedo; Turben (Var); Dresde; Bohême, Postelberg; Saxe, Schandau.

\*521. *diluviana*, Linné, 1767. D'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 3, p. 728, pl. 480. France, Le Mans, Tourtenay.

\*522. *haliotidea*, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 724, pl. 478, fig. 1-4. Villers, Ile Madame, Le Havre, Le Mans, La Malle; Belgique, Tournay.

\*523. *Lesueurii*, d'Orb., 1847. *O. hippopodium*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 731, pl. 481, fig. 4-6 (exclus., pl. 482). France, Ile Madame, Nancras, Le Havre.

\*524. *conica*, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 726, pl. 478, fig. 5-8. Rouen, Le Havre, Villers, La Malle, Nontron; Espagne, Llama Oscura.

\*524'. *Bicordeana*, d'Orb., 1849. Espèce très-voisine de forme de l'*O. carinata*, mais plus large, plus courte, à côtes du double plus grosses. France, St-Florentin, Seignelay, St-Sauveur (Yonne).

**ANOMYA**, Linné, 1758.

\*525. *papyracea*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 755, pl. 489. France, Pas-de-Jeux (Deux-Sèvres).

526. *subtruncata*, d'Orb., 1847. *A. truncata*, Geinitz, 1842, Carak. Kreid., pl. 19, fig. 4, 5, p. 87 (non Linné, 1767). Bohême, Postelberg, St-Kreibitz B.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**RYNCHONELLA**, Fischer. Voy. t. 1, p. 92.

\*527. *Lamarckiana*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 496, fig. 5-13. *Terebratula dubia*, d'Archiac, *T. Dufresnoyi*, d'Archiac (jeune); *T. latissima*, d'Archiac, *T. rostrata*, d'Archiac, *T. scaldinensis*, d'Archiac, 1847, Tourtia, pl. 21, fig. 7-11; pl. 22, fig. 1-3. Différents états de la même espèce. Le Mans, Port-des-Barques; Belgique, Gussignies, Tournay.

\*528. *contorta*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 496, fig. 14-17. France, Port-des-Barques; Belgique.

\*529. *compressa*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 497, fig. 1-6. *T. alata*, Geinitz. Rouen, Le Havre, Villers, Le Mans, Ile d'Aix; Bannewitz; Silésie, Kreslingswalda, Postelberg.

\*530. *Grasiana*, d'Orb., 1847, Paléont., Terr. crét., 4, pl. 497, fig. 7-11. Villard-de-Lans, Cadière, cap Blanc-Nez.

\*531. *Cuvieri*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 497, fig. 11-16. Villard-de-Lans, Le Havre.

\*532. *pisum*, d'Orb., *Terebratula pisum*, Sow., Min. Conch., pl. 536, fig. 10-12. *Angl.*, *Hamsey* (Sussex).

- \***533. Desnoyersi**, d'Orb., 1847. *Terebratula Desnoyersi*, d'Archiac, 1847, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 332, pl. 22, fig. 2. Belg., Tournay.
- 534. paucicosta**, d'Orb., 1847. *Terebratula paucicosta*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 38, n° 8, pl. 7, fig. 6. Westph., Essen.
- \***535. dichotoma**, d'Orb., 1847. Jolie espèce large, à côtes bifurquées et dichotomes. France, Le Havre (Seine-Inférieure).
- 536. Bertheloti**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *R. Grasiana*, mais avec un pli de chaque côté du sinus. La Malle (Var).

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

- \***536'. biplicata**, DeFrance, 1823. D'Orb., Pal., 4, pl. 511, fig. 9. Il faut y réunir les *Terebratula Tornacensis*, *Bouei*, *Römeri*, *crassa*, *Robertoni*, *crassificata*, *rustica*, *Boubei*, *Roissyi*, *Virleti*, *revoluta*, *subpectoralis* *Keiserlingi*, *Tchiatcheffii*, de M. d'Archiac, dans son travail sur la Tourtia, qui ne sont que des différents états d'âge, de déformation et d'usure extérieure de la même espèce. France, La Flèche, Le Mans, Villers, Le Havre, Vierzon, Port-des-Barques, La Malle; Belgique, Tournay.
- \***537. lima**, DeFrance, 1847, Paléont., 4, pl. 512, fig. 1-5. Le Havre.
- \***538. lacrymosa**, d'Orb., 1847. *T. lacryma*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 512, fig. 6-11 (non Morton). France, Le Havre.
- \***539. depressa**, Lamarck, 1819, An. sans vert., 6, p. 249. Il faut réunir à cette espèce les *Terebratula Nerviensis*, *Viquesneli*, *capillata*, de M. d'Archiac, Tourtia, pl. 17 et 18, qui ne sont que de différents âges et degrés d'usure extérieure de la même espèce. Belg., Tournay, Montignies, Gussignies.
- \***540. disparilis**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 512, fig. 12-19. *T. regulosa*, Morris, 1847, Ann. Mag., p. 253, pl. 18, fig. 5. *T. spinulosa* id., pl. 18, fig. 5. Rouen.
- 541. megastrema**, Sow., 1836, in Fitton, Trans. geol. Soc., 4, p. 242, pl. 18, fig. 3. Angl., Blackdown.
- \***542. arenosa**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 324, pl. 21, fig. 1-3. Id., *T. subarenosa*, d'Archiac, fig. 4, 5. Tournay, Gussignies.
- 543. Verneulli**, d'Arch., 1847, id., p. 326, pl. 20, fig. 4. Tournay.
- \***544. Beaumonti**, d'Archiac, 1847, id., p. 331, pl. 21, fig. 12-14. Tournay, Gussignies.
- \***545. parva**, d'Archiac, 1847, id., p. 322, pl. 19, fig. 7. *T. parvula*, d'Archiac, pl. 19, fig. 8. Belg., Tournay.
- NOTA. Les *T. Gussigeriensis*, *subconvexa*, *Murchisoni*, *Gravesii*, *Leveillei* et *Deshayesii*, de M. d'Archiac, dans son travail sur la Tourtia de Belgique (Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2), sont des jeunes indéterminables probablement des espèces précédentes.
- 546. squamosa**, Mantell, Davidson, 1847, Ann. Mag. nat. hist. p. 254, pl. 18, fig. 8 a, b. Angl., Hamsey, Dover.
- 547. sulcifera**, Morris, Davids., 1847, id., p. 254, pl. 18, fig. 7, 7 a, b. Cambridge.

**TEREBRATELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 222.

- \***548. Menardi**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 517, fig. 1-15. Le Mans, Fouras, Ile d'Aix.

\*549. *pectita*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 517, fig. 16-20. France, Le Havre; Angl., Swanage-Bay, Warminster.

\*550. *Carantonensis*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 518, fig. 1-4. France, Port-des-Barques, Eoux.

551. *canaliculata*, d'Orb., 1847. *Terebratula canaliculata*, Römer, 1840, Kreid., p. 41, n<sup>o</sup> 30, pl. 7, fig. 12. Westph., Essen.

552. *decemcostata*, d'Orb., 1847. *Terebratula decemcostata*, Römer, 1840, Kreid., p. 41, n<sup>o</sup> 32, pl. 7, fig. 13. Westph., Essen.

553. *orthiformis*, d'Orb., 1847. *Terebratula orthiformis*, d'Archiac, 1847, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 333, pl. 22, fig. 4. Belg., Gussignies.

**TEREBRIOSTRA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 85.

\*554. *lyra*, d'Orb., 1847, Paléont., franç., Terr. crét., 4, pl. 519, fig. 11-19. France, Le Havre; Angl., Chute-Farm.

\*555. *canaliculata*, d'Orb., 1847. *Terebratula canaliculata*, d'Archiac, 1847, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 331, pl. 21, fig. 15. Belgique, Tournay.

**TEREBRATULINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 85.

\*556. *auriculata*, d'Orb., 1847. *Terebratula auriculata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 39, n<sup>o</sup> 19, pl. 7, fig. 9. Westph., Essen; Belgique, Tournay.

**CRANIA**, Retzius, 1781. Voy. t. 1, p. 21.

\*557. *Cenomanensis*, d'Orb., 1847, Paléont., pl. 524, fig. 1-4. Le Mans.

\*558. *Rhotomagensis*, d'Orb., 1847, Paléont., pl. 524, fig. 5-7. Rouen.

559. *gracilis*, Münster, Goldf., 1841, Petref., 2, p. 296, pl. 163, fig. 2. Essen (Westph.).

**THECIDEA**, DeFrance, 1828. Voy. t. 1, p. 328.

\*560. *rugosa*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., pl. 522, fig. 7-14. France, Cechaigues, Le Mans.

561. *digitata*, Sow., Goldf., 1841, Petref., 2, p. 290, pl. 161, fig. 6. Essen.

562. *Essensis*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 36, n<sup>o</sup> 2, Bronn. Leth., pl. 30, fig. 4. Westph., Essen.

**CAPRINA**, d'Orb., 1823, Pal. fr., Terr. crét., 4, p. 179.

\*563. *adversa*, d'Orb. (père), 1823. D'Orb., Paléont., 4, pl. 536, 537. France, île d'Aix, île Madame (Charente-Inférieure), St-Trojan, Angoulême (Charente).

**CAPRINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 108.

\*564. *triangularis*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 542. *Ichthyosarcoclitus id.*, Desmarests. Ile d'Aix, Charras, Fouras, île Madame (Charente-Inférieure), St-Trojan, près de Cognac (Charente), Saumur (Maine-et-Loire), Tourtenay (Deux-Sèvres), Martigues (Bouches-du-Rhône).

**RADIOLITES**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 108.

\*565. *agariciformis*, d'Orb., 1847. *Sphaerulites id.*, Delamétrie, 1805. *S. foliacea*, Lam., 1819. *Hippurites agariciformis*, Goldf., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 543, 544. St-Trojan, île d'Aix, île Madame, Angoulême.

- \*566. *triangularis*, d'Orb., 1842, Pal. franç., 4, pl. 546. France, île Madame, Nancras, île d'Aix, St-Trojan.
- \*567. *polyconillites*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 547. France, île Madame, Nancras, Angoulême.
- \*568. *Fleurianus*, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 548. *Radiolites lamellosa*, d'Orb., 1842. France, île Madame, île d'Aix (Charente-Inférieure), Le Mans.
- \*569. *Saxonis*, d'Orb., 1847. *Hippurites Saxonia*, Römer, 1840, Kreid., p. 35, pl. 7, fig. 1. Saxe, Dippoldiswalda, Tharand.
- CAPROTINA**, d'Orb., 1839, t. 2, p. 109.
- \*570. *quadripartita*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 581, 582. *Caprina id.*, d'Orb., 1839, Revue Cuv., p. 169. France, Nancras, île Madame.
- \*571. *semistriata*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 583. *Caprina id.*, d'Orb., 1839, Revue Cuv., p. 169. France, île d'Aix.
- \*572. *costata*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 583. *Caprina id.*, d'Orb., 1839, Revue Cuv., p. 169. France, île d'Aix.
- \*573. *striata*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 584. *Caprina id.*, d'Orb., 1839, Revue Cuv., p. 169. France, île d'Aix.
- \*574. *rugosa*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, p. 584. France, île Madame.
- \*575. *navis*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 585. France, île Madame, Angoulême.
- \*576. *laevigata*, d'Orb., 1842, Paléont., Terr. crét., 4, pl. 586. île Madame, Nancras, St-Trojan, Angoulême.
- \*577. *carinata*, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 587. France, Source-Salée, près des Bains de Rennes (Aude).
- \*577". *Delarueana*, d'Orb., 1849, Pal., pl. 589. Angoulême.
- \*577". *Carantonensis*, d'Orb., 1849, Pal., pl. 592. île Madame.
- \*577". *Cenomanensis*, d'Orb., 1849, Pal., pl. 595. Le Mans.

## BRYOZOAIRE.

**VINCULARIA**, DeFrance, 1828.

- \*578. *Cenomana*, d'Orb., 1847. Petite espèce à rameaux très-grêles, ornés de huit rangées de cellules. Le Mans (Sarthe).
- \*579. *Lorieri*, d'Orb., 1847. Charmante espèce dont les cellules sont par lignes transverses, très-prononcées, et toutes mi-closes. Le Mans.

**MEMBRANIPORA**, Blainville, 1834.

- \*580. *Cenomana*, d'Orb., 1847. Cellules presque rondes aussi larges que longues, anguleuses. Le Mans (Sarthe).
- \*581. *Vendinnensis*, d'Orb., 1847. Cellules allongées, hexagones, beaucoup plus longues que larges. Le Mans, Le Havre (Seine-Infér.).
- \*582. *megapora*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont d'un tiers plus grandes que chez les deux précédentes. Le Mans.

**MARGINARIA**, Römer, 1841.

583. *denticulata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 13, n° 7, pl. 5, fig. 3. Westph., Essen.

**ESCHARINA**, Edwards, 1836.

\*584. *Sarthacensis*, d'Orb., 1847. *Eschara pyriformis*, Michelin, 1845, p. 214, pl. 53, fig. 16 (non *E. pyriformis*, Goldf., pl. 8, fig. 10). Les loges ont une autre forme. Le Mans.

\*585. *Michaudiana*, d'Orb., 1847. Espèce plane, à cellules non saillantes, bordées tout autour. Le Havre.

586. *inflata*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 14, n° 4, pl. 5, fig. 5. Westphalie, Essen.

**ESCHARA**, Lamarck.

\*587. *Cenomana*, d'Orb., 1847. *E. dichotoma*, Mich., 1845, p. 213, pl. 53, fig. 15 (non Goldf., pl. 8, fig. 15). Le Mans. Les cellules sont tout à fait différentes.

588. *Neustriaca*, Michelin, 1844, id., p. 125, pl. 32, fig. 3. Villers, St-Jean-La-Forêt.

**CELLULIPORA**, d'Orb., 1847. Cellules déprimées, distinctes, par couches concentriques les unes sur les autres, mais formant toujours des compartiments plus ou moins réguliers, séparés par des dépressions profondes comme des routes entre les groupes de cellules.

\*589. *ornata*, d'Orb., 1847. Charmante espèce à cellules oblongues, séparées par des bordures ponctuées. Le Havre.

**ALEOTO**, Lamouroux, 1821.

\*590. *reticulata*, d'Orb., 1847. *A. granulata*, Michelin, 1845, p. 202, pl. 52, fig. 4 (non *Granulata*, Edwards). Le Mans, La Flèche (Sarthe), Ile Madame (Charente-Inférieure).

\*591. *divaricata*, d'Orb., 1847. *Aulopora divaricata*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 18. Oolith., pl. 17, fig. 3. Westph., Essen.

**CRISISINA**, d'Orb., 1847. C'est une *Idmonea*, dont les branches sont libres au lieu d'être fixes.

\*592. *pinnata*, d'Orb., 1847. *Idmonea pinnata*, Roemer, 1840, pl. 5, fig. 28. Michelin, 1845, Icon. zooph., p. 213, pl. 52, fig. 9. France, Le Mans; Westph., Essen et Ruhr.

\*593. *Cenomana*, d'Orb., 1847. *I. disticha*, Michelin, 1845, Icon. zooph., p. 204, pl. 52, fig. 18 (non Goldf., pl. 9, fig. 15). Le Mans.

**IDMONEA**, Lamouroux, 1821.

\*594. *ramosa*, d'Orb., 1845. *Diastopora id.*, Michelin, 1845, p. 203, pl. 52, fig. 3. France, Le Mans.

\*595. *divergens*, d'Orb., 1847. Espèce à cellules peu nombreuses, irrégulièrement placées sur les branches. Westph., Essen.

**DEFRANCIA**, Roemer, 1840.

\*596. *elegans*, d'Orb., 1847. *Tubulipora elegans*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 123, pl. 32, fig. 6. France, St-Jean-la-Forêt (Orne).

\*597. *Cenomana*, d'Orb., 1847. *Lichenopora cenomana*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 204, pl. 52, fig. 14. Le Mans.

**PELAGIA**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 317.

\*598. *Eudesii*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 123, pl. 32, fig. 5. France, Villers-sur-mer (Calvados), Le Mans.

\*599. *infundibulum*, Michelin, 1845, p. 205, pl. 52, fig. 1. France, Le Mans.

600. *insignis*, Michelin, 1845, p. 205, pl. 52, fig. 2. Fr., Le Mans. Peut-être la même que l'*Eudesii* usée.

**DIASTOPORA**, Lamouroux, 1821.

\***601. escharoides**, Michelin, 1845, Icon., p. 218, pl. 53, f. Le Mans.

\***602. spongiosa**, d'Orb., 1847. *Ceriopora spongiosa*, Rœmer Ool., pl. 17, fig. 10. Jolie espèce formant des plaques arrondies lules saillantes irrégulières. Le Havre; Westphalie, Essen.

\***603. Oceanii**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont les plus grosses que chez le *D. Normaniana*. Le Havre.

\***604. glomerata**, d'Orb., 1847. Espèce formée de plusieurs couches de petites cellules en plaques circulaires plus épaisses au centre. Le Havre.

**ENTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.

\***605. Cenomana**, d'Orb., 1847. *Pustulopora pustulosa*, Michelin, p. 211, pl. 53, fig. 4 (non *Ceriop. pustulosa*, Goldfuss, pl. 11, f. Le Mans, Le Havre).

\***606. Vendinnensis**, d'Orb., 1847. *Pustulopora echinata*, Michelin, p. 211, pl. 53, fig. 5 (non Rœmer, 1840?). Le Mans.

\***607. pavonina**, d'Orb., 1847. *Diastopora pavonina*, Michelin, Icon. zoophyt., p. 218, pl. 53, fig. 17. France, Le Mans.

\***608. compressa**, d'Orb., 1847. Espèce comprimée, à tiges simples et dichotomes. France, Le Mans.

\***609. ramosissima**, d'Orb. Espèce en gros buissons, à cellules saillantes, éparses sans ordre. Le Havre, Villers.

\***610. semi-clausa**, d'Orb. *Pustulopora id.*, Michelin, 1845, p. pl. 93, fig. 3. France, Le Mans.

**SPIROPORA**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 318.

\***611. Cenomana**, d'Orb., 1847. *Cricopora verticillata*, Michelin, 1845, p. 212, pl. 53, fig. 7 (non Goldfuss, pl. 11, fig. 1). Fr., Le Mans.

\***612. glomerata**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont trois de front en lignes obliques. Le Mans.

**RADIOFORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 140.

\***613. formosa**, d'Orb., 1847. *Ceriopora formosa*, Michelin; p. 206, pl. 52, fig. 6 et 7. *Ceriopora Huotiana*, Michelin. Le Mans.

\***615. pustulosa**, d'Orb., 1847. Espèce en grosses masses étalées sur surfaces presque planes. France, Le Havre.

\***616. tuberculata**, d'Orb., 1847. Espèce boursouflée en gros tubercules irréguliers à la surface d'une masse informe. Le Havre.

\***617. substellata**, d'Orb., 1847. *Ceriopora stellata*, Goldf., p. fig. 1. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 23, n° 1. Westph., Essen.

**DOMOPORA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Defrancia* qui, par le grand nombre de couches qui se succèdent, forment un dôme ou une massue.

\***617'. clavula**, d'Orb., 1847. Espèce formant une massue. France, Le Mans.

**CHRYSAORA**, Lamouroux, 1821.

\***618. trigona**, d'Orb., 1847. *Ceriopora trigona*, Goldf., pl. 11, f. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 24, n° 2. Westph., Essen.

\***619. venosa**, d'Orb., 1847. *Ceriopora venosa*, Goldf., pl. 31, f. *Chrysaora pustulosa*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 24; Ool., pl. fig. 18. Westph., Essen.



- 620. polymorpha**, d'Orb., 1847. *Ceriopora polymorpha*, Goldf., pl. 30, fig. 11. Westphalie, Essen et Ruhr.
- OSCULIPORA**, d'Orb., 1847. Cellules à ouvertures rondes, réunies par groupes ou par faisceaux saillants, disposés latéralement, et d'un seul côté, sur des branches rameuses.
- \*621. aculeata**, d'Orb., 1847. *Idmonea aculeata*, Michelin, 1845, p. 203, pl. 52, fig. 90. *Idmonea tetragona*, Michelin, p. 219, pl. 53, fig. 19. Échantillon roulé, usé. Le Mans.
- \*622. lateralis**, d'Orb., 1847. Jolie espèce dont la surface est lisse entre les faisceaux de pores. Le Mans.
- FASCIICULIPORA**, d'Orb., 1839, Voy. dans l'Amér. mér. *Corymbosa*, Michelin, 1845.
- \*623. Menardi**, d'Orb., 1847. *Corymbosa id.*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 313, pl. 53, fig. 10. Le Mans.
- ZONOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 87.
- \*624. pseudo-spiralis**, d'Orb., 1847. *Pustulopora id.*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 212, pl. 53, fig. 6. France, Le Mans.
- ACANTHOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 318.
- 625. mitra**, d'Orb., 1847. *Ceriopora mitra*, Goldf., pl. 30, fig. 13. *Chrysaora mitra*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 24, n° 3, Bronn, Lethæa, pl. 29, fig. 7. Westph., Essen.

## ÉCHINODERMES.

**DYSASTER**, Agassiz.

- 626. excentricus**, Desor, Monogr. des Dysaster, p. 13, pl. 4, fig. 3. Agass., 1847, Cat., p. 138. Essen sur la Rœhr.

**HOLASTER**, Agassiz.

- 627. Sandoz**, Dub., Voy. au Cauc., pl. 1, fig. 11-13. Agass., 1847, Cat., p. 134. Suisse, Souaillon, Neuchâtel; Sardaigne, env. de Nice.
- 628. nasutus**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 134. France, vallon de la Fauge, près Villard-de-Lans (Isère).
- \*629. marginalis**, Agass., 1847, Cat., p. 134. Clansayes (Drôme), Bedouin (Vaucluse), Le Havre, Fauges (près Grenoble).
- \*630. suborbicularis**, Agass., 1847, Cat., p. 133. *Spatangus nodulosus*, Goldf., Petref., p. 149, pl. 45, fig. 6. Saint-Florentin (Yonne), Villers-sur-mer, Rouen; Angl., Lewes.
- \*631. latissimus**, Agass., 1847, Cat., p. 133. France, Le Havre (Seine-Inférieure).
- \*632. bicarinatus**, Agass., 1847, Cat., p. 135. Le Havre; Belgique.
- MICRASTER**, Agassiz.
- \*633. acutus**, Agass., 1847, Cat., p. 129. *Spatangus acutus*, Desh., Coq. caract. du terr., p. 255, pl. 11, fig. 5 et 6. Villers-sur-mer, Gacé, Mortagne, Sainte-Maure-sur-Loire.
- \*634. distinctus**, Agassiz, 1847, Cat., p. 129. *Spatangus crassissimus*, Defr. France, Villers-sur-mer.
- \*635. undulatus**, Agass., 1847, Cat., p. 130. Ile-d'Aix (Charente-Inférieure), Saint-Aignant (Indre-et-Loire), Lamnay (Sarthe), Tourtenay (Deux-Sèvres).
- HEMIASTER**, Agassiz.

- \***636. pisum**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 122. Le Mans.
- 637. elatus**, Des., Agass., 1847, Cat., p. 123. *Spatangus elatus* Tabl. syn., p. 406. Le Mans, Fouras (Charente-Inférieure), F
- \***638. bufo**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 122. *Spatangus* Brong., Géol. par., p. 84 et 389, pl. 5, fig. 4. Villers, Le Havre Ste-Maure-sur-Loire, Le Beausset, La Malle (Var), Martigues-du-Rhône).
- 638<sup>b</sup>. Bucklandi**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 123. *S. Bucklandi*, Goldf., Petref., p. 154, pl. 47, fig. 6. Essen-sur-la
- PYGURUS**, Agassiz.
- \***639. trilobus**, Agass., 1847, Cat., p. 103. *Clypeaster dubi* France. France, Le Mans (Sarthe).
- PYGAULUS**, Agassiz.
- 640. pulvinatus**, Agass., 1847, Cat., p. 101. *Pygurus pul* d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., vol. 2, 2<sup>e</sup> série, pl. 18, fig. 5. B Tournay.
- \***641. macropygus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 101. Fram ras (Charente-Inférieure).
- \***642. affinis**, Agass., 1847, Cat., p. 101. *Catopygus sub* Ag., Cat. syst., p. 4. France, Ile d'Aix (Charente-Inférieure).
- ARCHIACIA**, Agassiz.
- \***643. sandalina**, Agass., 1847, Cat., p. 101. *Clypeaster san* d'Arch. France, Fouras (Charente-Inférieure).
- CATOPYGUS**, Agassiz.
- \***644. carinatus**, Agass., 1847, Cat., p. 99. *Nucleolites ca* Goldf., Petref., p. 142, pl. 43, fig. 11. France, Le Mans, Roua drecieux, Gacé, Fouras, La Flèche, Villers; Angleterre, San Allem., Essen-sur-la-Rœhr.
- \***645. columbarius**, Agass., 1847, Cat., p. 100. France laines, Le Mans (Sarthe), Fouras (Charente-Inférieure); Be Tournay.
- CARATOMUS**, Agassiz.
- \***646. orbicularis**, Agass., 1847, Cat., p. 93; Desor, Monog Galér., p. 38, pl. 5, fig. 5-7. France, Villers-sur-mer (Calvado
- 647. rostratus**, Agass., 1847, Cat., p. 93; Desor, Monog Galér., p. 38, pl. 5, fig. 1-4. France, Havre (Seine-Inférieure).
- 648. latirostris**, Desor. Agass., 1847, Cat., p. 93. Fouras.
- \***649. trigonopygus**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 93. Frai Mans (Sarthe), Fouras (Charente-Inférieure).
- 650. faba**, Agass., 1847, Cat., p. 93; Desor, Monogr. des p. 37, pl. 5, fig. 8-10. France, Bonneville (Manche), Ile d'Aix (Ch Inférieure).
- PYRINA**, Agassiz.
- 651. Desmoulinii**, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2, 2<sup>e</sup> pl. 13, fig. 4; Agass., 1847, Cat., p. 92. Belgique, Tournay.
- GALERITES**, Lamarck.
- \***652. subspheroidalis**, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2, 2 pl. 13, fig. 2; Agass., 1847, Cat., p. 91. Belgique, Tournay.
- DISCOIDEA**, Gray.
- 653. cylindrica**, Agass., Cat., p. 89, et Echin. Suisse, 1

lg. 13-15. Villard-de-Lans (Isère), Saint-Sauveur (Yonne); Rethen, près Hildesheim, Paderborn; Meglisalpe (St-Gall). *umbuculus*, Leske, Agass., 1847, Cat., p. 88; Desor, Monogr. ér., p. 54, pl. 7, fig. 5-7. France, Le Havre, Villers, Apprigny; Angleterre; Allemagne.

**FEB**, Agassiz.

*costellatus*, Agass., 1847, Cat., p. 86; Desor, Monogr. des p. 81, pl. 11, fig. 1-4. France, Ile d'Aix, Fouras (Charente-Inférieure).

*truncatus*, Agass., 1847, Cat., p. 86; Desor, Monogr. des p. 81, pl. 11, fig. 8-10. Ile d'Aix, Fouras, La Malle, Le Beausset; Martin (Var).

**PAIS**, Agassiz.

*Doma*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 53. *Echinus Doma*, Desmar., Dict. Sc. nat., 3, p. 101. Belgique, Tournay; France, Le Coudrecieux (Sarthe).

**HA**, Gray.

*granulosus*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 52. *Echinus granulosus*, Goldf., Petref., p. 125, pl. 49, fig. 5. Ile d'Aix, Le Mans; Chute-Farm; Kehlheim, sur le Danube.

*canonica*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 52. Villers (Calvados).

**HA**, Gray.

*ornatum*, Agass., 1847, Cat., p. 43. *Diadema indifferens*, France, Villers-sur-mer, Longleat; Essen-sur-la-Roëhr.

**Michellini**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 43. Villers-sur-mer.

*tenue*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 43. Villers-sur-mer.

*annulare*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 44. Le Mans.

*granulare*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 46. Le Mans.

*subnudum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 46. Le Havre.

**FIGUS**, Agassiz.

*Menardi*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 40; Mon. des Salén., pl. 23, fig. 29-36. Ile d'Aix (Charente-Inférieure), Le Mans.

*major*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 40; Mon. des Salén., p. 25, fig. 17-22. Du Port-des-Barques (Charente-Inférieure).

**PHORUS**, Agassiz.

*lunulatus*, Agass., 1847, Cat., p. 39; Mon. des Salén., p. 30, fig. 17-24. France, cap la Hère.

*apiculatus*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 39; Monogr. des p. 32, pl. 5, fig. 25-32. France, Le Havre (Seine-Inférieure).

**LOTES**, Agassiz.

*acanthodes*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 38. *Peltastes pul-*, Agass., Monogr. des Salén., p. 27, pl. 5, fig. 1-8. France, gnolles.

*marginalis*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 38; Mon. des Salén., pl. 5, fig. 9-16. Caussols (Var).

**HA**, Gray.

*personata*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 37. *Salemia petalifera*, Le Mans, Le Havre, Longleat, Talmont (Charente-Inférieure), Oise).

- 673. gibba**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 37. Ile d'Aix.  
**674. rugosa**, d'Archiac, 1847, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> p. 299, pl. 13, fig. 6; Agass., Cat., p. 38. Belgique, Tournai.  
**CIDARIS**, Lamarck.  
**675. vesiculosa**, Goldf., Petref., p. 120, pl. 40, fig. 2; Agass., 1847, p. 24. Villers, Havre; Westph., Essen-sur-Rœhr.  
**676. spinulosa**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 26. Le Mans.  
**PENTETAGONASTER**, Linck, 1733.  
**677. Schulzii**, d'Orb., 1847. *Asterias Schulzii*, Cotta, Rœm Nordd., Kreid., p. 28, n° 3, pl. 6, fig. 21. Saxe, Tharand.  
**COMPTONIA**, Gray.  
**677'. elegans**, Gray, Ann. of nat. Hist., t. 6, p. 278. An. Blackdown.  
**COMATULA**, Lamarck.  
**678. paradoxa**, d'Orb., 1847. *Glenotremites paradoxus*, 1832; Petref., 1, p. 159, pl. 51, fig. 1. Allem., Speldorf, Di Mülheim-en-Ruhr.  
**LEIOCRINUS**, d'Orb., 1847.  
**679. Essensis**, d'Orb., 1847. *Eugeniocrinus Essensis*, Rœm Nordd. Kreid., p. 26, n° 1, pl. 6, fig. 5. Westph., Essen.  
**PENTACRINUS**, Miller, 1821,  
**\*680. Cenomanensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les artic sont carénées et granuleuses sur les côtés. Le Mans.  
**\*681. sublevigatus**, d'Orb., 1847. Espèce dont les artic sont lisses extérieurement. Le Havre.

## RAYONNÉS ZOOPHYTES.

- BATHYCYATHUS**, Edwards et Haime, 1848.  
**682. Sowerbyi**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat. Angl., Kidge (Wiltshire).  
**TROCHOCYATHUS**, Edwards et Haime, 1848.  
**\*683. gracilis**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., France, Le Mans (Sarthe).  
**683'. Koninckii**, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 305. C près de Mons.  
**PLACOCYATHUS**, Edwards et Haime, 1848.  
**\*683'. Nystii**, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., 10, p. 328. Mons.  
**ACTINOSERIS**, d'Orb., 1849. C'est un *Cycloseris*, à columelle trale, non allongée.  
**\*684. Cenomanensis**, d'Orb., 1848. Espèce très-déprimée, sons très-nombreuses, dessous excavé. Le Mans.  
**DISCOPSAMMIA**, d'Orb., 1849. Ce sont des *Stephanophyllia* fossettes calicinales, à columelle rudimentaire.  
**1884. Bowerbanksii**, d'Orb., 1849. *Stephanophyllia id.*, E et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 94. Angl., Douvres.  
**STYLOCYATHUS**, d'Orb., 1849. Polypier trochiforme, ou rep tant une corne arquée, libre; une épithèque jusqu'à la moitié, *ovale*, columelle styloforme en lame transverse; une série de p

\*685. *dentalina*, d'Orb., 1849. Espèce arquée, en corne, striée en dehors jusqu'à la moitié, pourvue de cloisons alternes inégales. Le Mans.

**ACTINOSMILIA**, d'Orb., 1849.

\*686. *Cenomana*, d'Orb., 1849. *Lophosmilia id.*, Edwards et Haime, 1849 *Caryophyllia id.*, Michelin, 1845, p. 198, pl. 50, fig. 8. Lisse en dehors, les cloisons plus grosses de quatre en quatre. Le Mans.

**ELLIPSOSMILIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 36.

\*687. *cornucopiae*, d'Orb., 1849. *Montlivaltia cornucopiae*, Edwards et Haime, 1848, Loc. cit., p. 258. A cloisons très-inégales, épaissies près de l'ombilic. Ile d'Aix.

\*688. *humilis*, d'Orb., 1847. Petite espèce à cloisons presque égales, oblique. Ile d'Aix.

\*689. *inequalis*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum id.*, Michelin, 1845, pl. 50, fig. 4. France, Le Mans.

**LASMOPHYLLIA**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 208.

\*690. *pateriforme*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum id.*, Michelin, 1845, pl. 50, fig. 3. France, Le Mans, Ile d'Aix.

\*690'. *dispar*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum dispar*, Michelin, pl. 50, fig. 6. Le Mans.

**LASMOSMILIA**, d'Orb., 1849. Voy. vol. 1, p. 291.

\*691. *meandra*, d'Orb., 1847. Grande espèce à cellules allongées souvent confluentes. Ile d'Aix.

**MONTLIVALTIA**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 207.

\*692'. *Guerangeri*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 258. Le Mans.

\*692". *striatulata*, Edwards et Haime, 1848? *Caryophyllia id.*, Michelin, 1845, p. 198, pl. 50, fig. 9. France, Le Mans.

**POLYPHYLLIA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 93.

\*692". *patellata*, d'Orb., 1847. *Turbinolia id.*, Lamarck, 1816. *Anthophyllum patellatum*, Michelin, pl. 50, fig. 2. *Thecophyllia patellata*, Edw. et Haime, 1849, 11, p. 241. France, Le Mans.

**COELOSMLIA**, Edwards et Haime, 1849.

\*693. *sulcata*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum id.*, Michelin, 1845, pl. 50, fig. 5. Le Mans, Fouras, Ile d'Aix.

**MICROBACIA**, Edwards et Haime, 1849.

\*695. *coronula*, d'Orb., 1847. *Fungia coronula*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 50, pl. 14, fig. 10. Le Mans; Wesph., Essen.

**FUNGINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 2, p. 91.

\*696. *semiglobosa*, d'Orb., 1847. *Cyclolites semiglobosa*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 195, pl. 50, fig. 1. France, Le Mans.

\*697. *elegans*, d'Orb., 1847. Grande espèce à cloisons très-inégales, dont dix seulement atteignent l'ombilic. Ile d'Aix.

**ACROSMLIA**, d'Orb., 1847. Voy. vol. 1, p. 207.

\*698. *Varusensis*, d'Orb., 1847. Grande espèce, presque à facettes et à petites granulations. La Malle (Var).

\*699. *Cenomana*, d'Orb. Jolie espèce à cellule évasée, fixe sur un large pédoncule. France, Le Mans.

**AMELOPHYLLIA**, d'Orb., 1849. Voy. vol. 2, p. 80.

**699'. cretacea**, d'Orb., 1849. Espèce trochoïde, très-massive, à deux calices. Ile d'Aix.

**DACTYLOSMILIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Barysmilia* à multiplication par bourgeonnement, dendroïde, une épithèque presque lisse ; calices elliptiques ; columelle saillante, longue, divisée en segments ; peut-être des palis.

**\*700. Cenomana**, d'Orb., 1847. Jolie espèce dont les cellules sont peu élevées, cylindriques. France, Le Mans.

**\*701. Carantonensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les branches sont dichotomes, assez allongées. France, Ile d'Aix.

**BARYSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

**701'. Cordieri**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 273, pl. 5, fig. 4. France, Le Mans.

**701". confusa**, d'Orb., 1849. Espèce voisine de la précédente, dont les calices sont moins distincts. Ile d'Aix.

**CYCLOCœNIA**, d'Orb., 1847. C'est une *Phyllocœnia*, à calice rond.

**\*702. rustica**, d'Orb., 1847. Grande espèce à calices de 6 millim. de diamètre, saillants, à très-grosses lames. Ile d'Aix.

**\*702'. explanata?** d'Orb., 1847. *Oculina id.*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., n. 201, pl. 51, fig. 3. France, Le Mans.

**CRYPTOCœNIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 322.

**\*703. Carantoniana**, d'Orb., 1847. Espèces à calices, de la taille de 1 A. *Desportesiana*, mais à intervalle sillonné. Nancras, Ile d'Aix, Ile Madam (Charente-Inférieure).

**\*704. Fleurbausa**, d'Orb., 1847. Espèce à calices d'un tiers plus grands que chez l'espèce précédente. Ile d'Aix, Le Mans.

**\*705. rustica**, d'Orb., 1847. Espèce à très-larges calices circonscrits et costulés en dehors. France, Nancras.

**STEPHANOCœNIA**, Edwards et Haime, 1848.

**\*706. Coniacensis**, d'Orb., 1849. Espèce à cellules larges de 7 à 8 millim., très-profondes. Cognac (Charente).

**\*707. grandipora**, d'Orb., 1849. Espèce voisine du *S. cribraria*, mais à cellules bien plus finement striées. Ile d'Aix.

**\*708. Desportesiana**, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 301. *Astræa Desportesiana*, Michelin, 1845, Iconog., p. 201, pl. 50, fig. 11. Le Mans.

**\*709. Carantonensis**, d'Orb., 1849. Espèce dont les cellules sont d'un tiers plus petites que la précédente. France, Ile d'Aix.

**710. littoralis**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules des deux tiers plus petites que chez le *S. pinnata*. France, le Mans, Ile d'Aix.

**\*711. Fleurbausa**, d'Orb., 1849. Espèce tubéreuse, à grands calices profonds. Ile d'Aix.

**PRIONASTREA**, Edwards et Haime, 1848.

**\*713. ambigua**, d'Orb., 1849. *Meandrina id.*, Michelin, 1845, p. 198, pl. 51, fig. 1. Le Mans.

**ASTROCœNIA**, Edwards et Haime, 1848.

**\*714. Carantonensis**, d'Orb., 1847. Espèce à grandes et profondes cellules. France, Saint-Trojan, près de Cognac (Charente).

**SYNASTREA**, Edwards et Haime, 1848.

**\*715. pinnata**, d'Orb., 1847. Belle espèce en forme de cône, dont

les cellules ont de 5 à 6 millim. de diamètre. France, Ile Madame (Charente-Inférieure).

\*715'. *conferta*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 12, p. 150. Montugnies-sur-Roc (Belgique).

\*716. *tenuissima*, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 151.

\*717. *magna*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont le double plus larges que chez l'espèce précédente. France, Le Mans.

\*718. *decipiens*? Edwards et Haime, 1849; Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 200, pl. 50, fig. 13. France, Le Mans.

\*719'. *superposita*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 12, p. 151. *Astrea id.*, Michelin, 1845, Icon. zooph., p. 200, pl. 51, fig. 4. Le Mans.

**CENTRASTREA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 209.

\*719. *Cenomana*, d'Orb., 1847. *Astrea agaricites*, Michelin, 1845, p. 199, pl. 50, fig. 12 (non *A. agaricites*, Michelin, 1841, pl. 4, fig. 10). Le Mans (Sarthe), Ile Madame (Charente-Inférieure).

\*720. *Micheliniana*, d'Orb., 1847. *Astrea micrasona*, Michelin, 1845, p. 200, pl. 50, fig. 10 (non *A. micrasona*, Michelin, 1841, pl. 4, fig. 11). Le Mans, Ile Madame, Fouras.

**MORPHASTREA**, d'Orb., 1849. C'est un *Dimorphastrea* à columelle styliforme.

\*721. *Ludoviciana*, d'Orb., 1849. *Agaricia id.*, Michelin, 1845, p. 199, pl. 51, fig. 2. France, Le Mans.

**STELLORIA**, d'Orb., 1849. Centres caliciaux en étoiles, à cinq ou six branches qui forment autant de vallons très-profonds, séparés par une colline. De ces vallons, les uns courts, les autres longs, un ou deux vont communiquer à d'autres centres et forment un méandre.

\*721'. *rustica*, d'Orb., 1847. Espèce à profondes cellules, garnies de très-gros cloisons irrégulières. Ile d'Aix.

\*722. *elegans*, d'Orb., 1847. Espèce à centres caliciaux très-petits, bien distincte de la précédente. Ile d'Aix.

**PLEUROCORA**, Edwards et Haime, 1848.

\*722". *explanata*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 11, p. 311. Belgique, Obourg, près de Mons.

\*722'''. *alternans*, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 312. Obourg.

\*722'''''. *Moninckii*, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 312. Obourg.

**POLYTREMACEIS**, d'Orb., 1849. C'est un *stylophora* sans saillie aux calices, ceux-ci simplement creusés; intervalle d'un tissu poreux, granuleux en dessus, ensemble amorphe.

\*723. *bulbosa*, d'Orb., 1847. Espèce globuleuse, arrondie, à calices assez grands. Ile d'Aix.

**DACTYLACIS**. C'est un *Polytremacis* rameux, dendroïde.

\*724. *ramosa*, d'Orb., 1847. Espèce rameuse à rameaux dichotomes. Ile d'Aix.

**POLYTREMA**, Risso, 1826. Voy. t. 1, p. 323.

\*725. *spongites*, d'Orb., 1847. *Ceriopora spongites*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 35, pl. 10, fig. 14. Westph., Essen.

\*726. *clavula*, d'Orb., 1847. *Ceriopora clavula*, Michelin, Icon. zoophyt., pl. 52, fig. 8. France, Le Mans.

- \***727. lobata**, d'Orb., 1847. *Chætetes id.*, Michelin, Icon. zo. p. 201, pl. 51, fig. 6. France, Le Mans.
- \***728. escharoides**, d'Orb., 1847. *Ceriopora escharoides*, Gc pl. 12, fig. 3. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 15, n° 1. Westph., Essen.
- \***729. truncata**, d'Orb., 1847. *Ceriopora truncata*, Michelin Icon. zoophyt., p. 206, pl. 51, fig. 7. *id.* France, Le Mans.
- \***730. avellana**, d'Orb., 1847. *Ceriopora id.*, Michelin, 1845, pl. 52, fig. 13. France, Le Mans.
- \***731. pseudo-tuberosa**, d'Orb., 1847. *Ceriopora id.*, Mi 1845, p. 208, pl. 53, fig. 1 (non Rœmer, 1841). Le Mans.
- \***731'. licheniformis**, d'Orb., 1847. *Ceriopora licheniformis*, Michelin, 1847, Icon., p. 205, pl. 52, fig. 5. France, Le Mans.
- \***732. polymorpha**, d'Orb., 1847. *Ceriopora polymorpha*, Gc pl. 10, fig. 7. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 25, n° 1. *Millepata*, Rœmer, Oolith., pl. 17, fig. 12. Westph., Essen.
- CERIOFORA**, Goldfuss, 1826.
- \***733. ramulosa**, d'Orb. *Chætetes ramulosa*, Michelin, 1845, pl. 51, fig. 5. France, Le Mans, Mazorques (Var).
- \***734. papularia**, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 124, fig. 7. Villers, Honfleur, St-Jean-la-Forêt, Coulange, Le Mans.
- \***735. heteropora**, d'Orb., 1847. Espèce à rameaux grêles, driques. Le Mans.
- \***736. surculacea**, d'Orb. *Heteropora id.*, Michelin, 1845, pl. 51, fig. 8. France, Le Mans, Grand-Pré (Ardennes).
- \***737. gracilis**, Goldf., pl. 10, fig. 11. *Meloceratites id.*, R 1840, Nordd. Kreid., p. 18, n° 1, pl. 5, fig. 13. France, Le Mans, Westph., Essen.
- \***738. Cenomana**, d'Orb. *Ceriopora gracilis*, Michelin, pl. 53, (non Goldf., 1830, Petref. germ., pl. 10, fig. 11). Le Mans.
- MONTICULIPORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 25.
- \***739. cribrosa**, d'Orb., 1847. *Ceriopora cribrosa*, Goldf., p. fig. 16. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 21, n° 1. Westph., Essen.
- \***740. muricata**, d'Orb., 1847. *Achilleum muricatum*, Goldf., 2, pl. 31, fig. 3. Westphalie, Essen.
- LEPTOPORA**, d'Orb. C'est un *Polytrema* rampant, formant branches dichotomes fixes sur lesquelles sont percés les pores.
- \***741. elegans**, d'Orb., 1847. Jolie espèce à rameaux larges, têtes, très-aplaties. Le Mans (Sarthe).

## FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**CYCLOLINA**, d'Orb., 1842, Foraminifères de Vienne.

\***742. cretacea**, d'Orb., 1846, Foraminifères de Vienne, p. pl. 21, fig. 22-25. France, île Madame (Charente-Inférieure).

**ORBITOLINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 118.

\***743. plana**, d'Archiac, 1837, Mém. Soc. géol. de France, p. 178. France, Fouras, La Malle (Var).

\***744. mamillata**, d'Archiac, 1837, *id.*, t. 2, p. 178. Fouras.



\*745. *concava*, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, Michelin, 1842, Icon. zoophyt., p. 28, pl. 7, fig. 9 (mala). *Orbitolina conica*, d'Archiac. France, Ballon, St-Paul t, près le Pont-St-Esprit, Fouras.

**DENTALINA**, d'Orb., 1825. Voy. t. 1, p. 242.

\*746. *rustica*, d'Orb., 1847. Grosse espèce rugueuse, irrégulière. Ile Madame.

\*747. *Cenomana*, d'Orb., 1847. Espèce striée obliquement aux loges inférieures, la dernière lisse. Le Mans.

\*748. *Sarthacensis*, d'Orb., 1847. Espèce comprimée, lisse, peu arquée, sans saillie à la dernière loge. Le Mans.

**FRONDICULARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 241.

\*749. *caudata*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, très-comprimée, striée en long. France, Le Mans.

**VAGINULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne, p. 179.

\*750. *citharina*, d'Orb., 1847. Espèce large, triangulaire, comprimée, arquée, striée en long entre les séparations des loges. Le Mans.

\*751. *striato-costata*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, grêle, commençant par une boule striée, lisse partout excepté sur les côtes des loges. Le Mans.

**CRISTELLARIA**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 242.

\*752. *Carantina*, d'Orb., 1847. Petite espèce lisse, sans côtes saillantes. France, Ile Madame.

**FLABELLINA**, d'Orb., 1846. Foraminifères de Vienne, p. 92.

\*753. *Cenomana*, d'Orb., 1847. Espèce triangulaire, lisse aux dernières loges, renflée aux premières. Le Mans.

\*754. *ovalis*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, lisse, comprimée, renflée aux premières loges. Le Mans.

**LITUOLA**, Lamarck, d'Orb. Foraminifères de Vienne, p. 138.

\*755. *rugosa*, d'Orb., 1847. Grosse espèce de 7 millimètres, rugueuse, à cellules convexes. Port-des-Barques (Charente-Inférieure).

**ALVEOLINA**, Bosc, d'Orb. Foraminifères de Vienne, p. 143.

\*756. *cretacea*, d'Archiac. Espèce allongée. France, Ile Madame (Charente-Inférieure), Cognac (Charente).

\*757. *ovum*, d'Orb., 1847. Petite espèce ovale, à cellules convexes. France, Ile Madame.

**FLACOPILINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 259.

\*758. *Cenomana*, d'Orb., 1847. Espèce contournée en crosse adhérente aux corps. Le Mans (Sarthe).

**BULIMINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne, p. 183.

\*759. *Cenomana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *B. Protea*, mais plus courte et plus rugueuse. Le Mans.

\*760. *Sarthacensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *B. rugosa*, mais plus large et plus pupoïde. Le Mans.

**CHRYSLIDINA**, d'Orb., 1846. Foraminifères de Vienne, p. 194.

\*761. *gradata*, d'Orb., 1846. Foraminifères de Vienne, p. 194, pl. 41, fig. 32, 33. France, Ile Madame.

**POLYMORPHINA**, d'Orb., 1825. Foraminifères de Vienne, p. 231.

\*761'. *Cenomanaensis*, d'Orb., 1847. Espèce ovale, lisse, à côtes très-irrégulières. Le Mans.

- CUNEOLINA**, d'Orb., 1846. Voy. Foraminifères de Vienne, I  
 \*762. *pavonia*, d'Orb., 1846, Foraminifères de Vienne, p  
 pl. 21, fig. 50-52. France, Ile Madame.  
 \*762'. *conica*, d'Orb., 1847. Espèce plus étroite que la précédente  
 France, Ile Madame.  
 \*763. *Fleurbaeya*, d'Orb., 1847. Espèce encore plus étroite,  
 que linéaire. France, Ile Madame.

## AMORPHOZOAIRES.

**COSCINOPORA**, Goldfuss, 1830.

- \*763'. *Meandrina*, d'Orb., 1847. Espèce dont les lames se  
 tournent comme une méandrine. St-Pot (Pas-de-Calais).  
 764. *crassa*, d'Orb., 1847. *Retepora crassa*, Michelin, 1844  
 zoophyt., p. 146, pl. 40, fig. 4. France, Coulanges.  
 \*764'. *cylindrica*, d'Orb., 1847. *Retepora cylindrica*, Mi  
 1844, p. 146, pl. 36, fig. 6. France, Le Havre.

**OCELLARIA**, Lamarck, 1816. *Ventriculites*, Mantell, 1822.

- \*765. *ramosa*, d'Orb., 1847. Espèce rameuse dont les pores  
 rieurs sont par lignes irrégulières. France, Honfleur (Calvados).  
**EUDEA**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 209.  
 766. *foraminosa*, d'Orb., 1847. *Scyphia foraminosa*, Goldf.,  
 fig. 4. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n° 6. Westph., Essen.  
 767. *cylindrica*, d'Orb., 1847. *Chenendopora id.*, Michelin  
 p. 214, pl. 52, fig. 17. France, Le Mans.

**VERTICILLITES**, DeFrance, 1828.

- \*768. *incrassata*, d'Orb., 1847. Espèce dont les tiges gros  
 de la base au sommet, au lieu d'être cylindriques. Le Havre.

**CHNEMIDIUM**, Goldfuss, 1830.

769. *Boissyi*, d'Orb., 1847. *Hippalimus id.*, Michelin, 1844,  
 zoophyt., p. 126, pl. 36, fig. 1. France, Villers.  
 770. *coniformis?* d'Orb., 1847. *Ventriculites Benettii*, Mic  
 1844, p. 144, pl. 38, fig. 3 (non Mantell, 1822). Villers, Le 1  
 Rouen.

**SIPHONIA**, Parkinson, 1811. *Hallirhœa*, Lamouroux, 1821.

- \*771. *costata*, d'Orb. *Hallirœa id.*, Lamouroux, 1821, Expos  
 polyt., p. 72, pl. 78, fig. 1. *H. Tessonis*, Michelin, pl. 34, fig. 1. V  
 Honfleur, Remalard (Orne), Le Havre.

- \*772. *acaulis*, Michelin, 1844, p. 139, pl. 38, fig. 2. Le 1  
 Villers.

773. *ficus*, Goldf., 1833, Petref. Germaniæ, pl. 65, fig. 14. *S.*  
*formis*, Sow., 1836, in Fitton, pl. 15 (non Goldf., 1830, non *F*  
 Michelin, pl. 29, fig. 6). Angl., Blackdown; Allem., Que  
 bourg.

**HIPPALIMUS**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 2, p. 209.

774. *tetragonus*, d'Orb., 1847. *Scyphia tetragona*, Goldf.,  
 fig. 2. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n° 5. *Scyphia mami*  
 Goldf., 1, p. 4, pl. 2, fig. 1. Westph., Essen.

- \*775. *fungioides*, Lamouroux, 1821, Exposit. méth. des r

Michelin, pl. 36, fig. 2. Villers (Calvados), Ile Madame (Charente-Inférieure).

**776. multidigitata**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1845, p. 217, pl. 51, fig. 9. France, Le Mans.

**776'. Normaniana**, espèce grosse et courte avec une racine compliquée. France, Villers (Calvados).

**777. infundibuliformis**, d'Orb., 1847. *Scyphia id.*, Goldf., pl. 5, fig. 2. Rœmer, 1840, Nordd. Kreidd., p. 7, n<sup>o</sup> 12. France, Villers; Westph., Essen.

**778. furcata**, d'Orb., 1847. *Scyphia furcata*, Goldf., pl. 2, fig. 6. Rœmer, 1840, Kreid., p. 5, n<sup>o</sup> 1. *Scyphia micropora*, Michelin, 1846, Zooph., pl. 53, fig. 14. Le Mans; Westph., Essen.

**TREMOSPONGIA**, d'Orb., 1847. C'est un *Sparsispongia*, dont le dessous est encroûté comme chez les *Lymnorea*.

**779. sphaerica**, d'Orb., 1847. *Lymnorea sphaerica*, Michelin, 1845, Icon., p. 216, pl. 52, fig. 16. France, Le Mans.

**CHEWENDOPORA**, Lamouroux, 1821.

**780. fungiformis**, Lamouroux, 1821, Exposit. des polyp., pl. 75, fig. 9. Villers (Calvados), Le Havre, Lamnay (Sarthe).

**781. undulata**, Michelin, 1844, *id.*, p. 131, pl. 34, fig. 3. France, Villers, Coulanges.

**782. subplena**, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 132, pl. 41, fig. 1. France, Bellesme (Orne), Dives (Calvados).

**783. pateriformis**, Michelin, 1844, *id.*, p. 130, pl. 37, fig. 2. France, Le Havre, Villers, Coulanges, Remalard.

**POROSPONGIA**, d'Orb., 1847. C'est un *Chenendopora* pourvu de pores en dedans et en dehors.

**784. Sackii**, d'Orb., 1847. *Scyphia Sackii*, Goldf., pl. 31, fig. 7. Rœmer, 1840, Kreid., p. 9, n<sup>o</sup> 35. Westph., Essen.

**IREEA**, Lamouroux, 1821.

**785. punctata**, d'Orb., 1847. *Siphonia punctata*, Münst., Goldf., 1833, Petref., 1, p. 221, pl. 65, fig. 13. All.-m., Goslar.

**786. pyriformis**, Lamouroux, 1821, Exposit. méth. des polyp., p. 79, pl. 78, fig. 3. *Sip. elongata*, Rœmer, 1841. *Ierea elongata*, Michelin, pl. 39, fig. 4. Villers, Coulanges, Remalard (Orne).

**787. Demoyersi**, *Ierea tuberosa*, Michelin, 1844, p. 135, pl. 39, fig. 1-3. France, Coulanges, Remalard, Le Havre.

**MARGINOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Contexture finement et irrégulièrement spongieuse; oscules ronds, épars, placés seulement au bord supérieur d'un ensemble cupuliforme, porté sur une tige et une racine.

**788. infundibulum**, d'Orb., 1847. *Alcyonium infundibulum*, Lamouroux, 1830. *Chenendopora Parkinsoni*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 131, pl. 31, fig. 1. Villers, Le Havre.

**SPARSISPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 109.

**789. rugosa**, d'Orb., 1847. *Tragos rugosum*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 12, pl. 5, fig. 4. Westph., Essen.

**790. pulvinaria**, d'Orb., 1847. *Manon pulvinarium*, Goldf., pl. 29, fig. 7. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 3, n<sup>o</sup> 3, pl. 1, fig. 9. Essen.

**STELLISPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.

- \***791. microstella**, d'Orb., 1847. Espèce encroûtante, à étoile distinctes. France, Ile Madame.
- \***792. substellata**, d'Orb., 1847. *Tragos stellatum*, Goldf., Petref., t. n. 14, pl. 30, fig. 2 (non Lamour., 1821). Westph.,
- CUPULOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.
- \***793. Normaniana**, d'Orb., 1847. *Spongia Pexiza*, Michelin p. 143, pl. 36, fig. 5 (non *Pexiza*, Goldfuss, 1830). Villers (Cal Le Mans, Le Havre).
- \***794. consobrina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente mais avec des pores le double plus petits. Le Havre.
- \***795. Trigeris**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1845, pl. 53, fig. 12. France, Le Mans; Westph., Essen (sous le n *Pexiza*, Römer).
- \***796. microtrema**, d'Orb., 1847. Espèce dont les pores double plus petits que chez l'espèce précédente. Villers.
- FLOCOSCPHYA**, Reuss, 1846, p. 77.
- \***797. meandrinoides**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Leymer. Mém. Soc. géol., p. 1, pl. 1, fig. 2. St-Parres (Aube), Villers (dos), Le Havre.
- \***798. Morchella**, d'Orb., 1847. *Achilleum Morchella*, Goldf. Petref., t. p. 1, pl. 29, fig. 6. Le Havre, Villers; Westph., F
- \***799. Michelini**, d'Orb., 1847. *Eschara labyrinthicus*, M. 1844, I. on. zoophyl., p. 124, pl. 32, fig. 2 (non Mantell, 1823). F Le Havre, Honfleur, Villers. Il est probable qu'une *Escharina* p a été confondue avec l'espèce.
- AMORPHOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 178.
- \***800. informis**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1845, 1 pl. 52, fig. 15. France, Le Mans.
- \***801. pisiformis**, d'Orb., 1847. *Cnemidium pisiforme*, Goldf. fig. 5. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 4, n° 1. Westph., Esser
- \***802. cervicornis**, d'Orb., 1847. *Siphonia cervicornis*, Goldf., Petref., t. p. 97, pl. 35, fig. 41. Westph., Haldern.
- 803. deformis**, d'Orb., 1847. *Tragos deforme*, Goldf., 1830, P 4, p. 12, pl. 5, fig. 3. Westph., Essen.
- \***804. Carantonensis**, d'Orb., 1847. Belle espèce polymorphe généralement en gros rognons. Ile Madame, Nancras, Ile d'Aix.
- \***805. digitata**, d'Orb., 1847. Espèce formée de digitations cales, subcylindriques et groupées sur une large base. Ile Ma
- \***806. dumosa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente mais dont les branches forment un ensemble porté sur un pied ( La Malle.
- \***807. capulus**, d'Orb., 1847. Petite espèce formant un petit obtus de quelques millimètres de diamètre. France, Le Havre.
- \***808. echinata**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, couverte d'écailles presque échinulées. France, Le Havre.
- \***809. Gaudryna**, d'Orb., 1847. Espèce globuleuse, voisine de l'*A informis*, mais d'un tissu plus poreux et plus labyrinthiforme d'Aix.

## VINGT-UNIÈME ÉTAGE : — TURONIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**NAUTILUS**, Breynius. Voy. t. 1, p. 52.

\*1. **Sowerbyanus**, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. crét., 1, p. 83, pl. 16. France, Montrichard (Loire-et-Cher), Poncé (Sarthe), Tourtenay (Deux-Sèvres).

\*2. **sublævigatus**, d'Orb., 1847. *N. lævigatus*, d'Orb., 1840, Pal., 1, pl. 17 (non Montagu, 1803). Rochefort (Charente-Inférieure), Montrichard, Uchaux (Vaucluse).

**AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. t. 1, p. 181.

\*3. **Bravaisianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 308, pl. 91, fig. 3, 4. Uchaux.

\*4. **Woolgarii**, Mantell, 1822. *A. Carolinus*, d'Orb., Paléont., 1, p. 310, pl. 91, fig. 5, 6 (non *Woolgarii*, d'Orb.). Martrous, près de Rochefort (Charente-Inférieure), Sainte-Maure (Indre-et-Loire), Tourtenay, Saumur (Maine-et-Loire), Montrichard; Angl., près de Lewes.

\*5. **Requienianus**, d'Orb., 1841, Pal., 1, p. 315, pl. 93. Uchaux.

\*6. **Goupillianus**, d'Orb., 1841, Paléont., Terr. crét., 1, p. 317, pl. 91, fig. 1-3. France, Saumur, Uchaux.

\*7. **peramplus**, Mantell, d'Orb., Paléont., 1, p. 333, pl. 100, fig. 1, 2. Uchaux, Montrichard, Tourtenay, Saumur; Angleterre, près de Lewes et de Eastbourne.

\*8. **Prosperianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 335, pl. 100, fig. 3, 4. Uchaux.

\*9. **Lewesiensis**, Sowerby, 1822, Min. Conch., 4, p. 80, pl. 358 (non d'Orb., Paléont., 1, p. 336, pl. 101, pl. 102, fig. 1, 2). Montrichard, Tourtenay, Rouen, cap Blanc-Nez, La Malle, La Martre (Var); Angleterre, Folkstone, près de Lewes.

\*10. **Fleurianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 350, pl. 107. France, Martrous (Charente-Inférieure), Gourdon (Loi), Saumur.

\*11. **Vielbancii**, d'Orb., Paléont., 1, p. 352, pl. 108, fig. 1-3. Sous le faux nom de *Woolgarii*, Mantell. Martrous, Saumur, Tourtenay.

\*12. **papalis**, d'Orb., Paléont., Terr. crét., 1, p. 354, pl. 109, fig. 1-3. Uchaux, Montrichard, Poncé, Tourtenay.

\*13. **Deverianus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 356, pl. 110. France, Uchaux, Montrichard, Poncé, Tourtenay.

- \*14. rusticus**, Sow., d'Orb., Paléont., 1, p. 358, pl. 111, fig. 1. *A. catinus*, Mantell? pl. 22, fig. 10. Rouen, au-dessus de la ca. *A. Rhomagensis*; Angl., Lewes.
- \*15. Galliennesi**, d'Orb., 1847. Espèce singulière, lisse, com. à tours embrassants, pourvue de deux sillons sur la région (qui est obtuse). Ponce (Sartre).
- \*16. Turoniensis**, d'Orb., 1847. Belle espèce à tours étroitement serrés sur le dos et pourvus aux côtés, sur des côtes transverses, de trois tubercules, dont le plus externe est saillant. Tourtenay (Sèvres), Saumur.
- \*17. Talavignesi**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. catinus*, mais à tours plus ronds, pourvus de côtes plus saillamment espacées. Au-dessous des Hippurites aux Bains-de-l'Aude).
- CERATITES**, Hann, 1825. Voy. t. 1, p. 171.
- 18. Robini**, d'Orb., 1848. *Ammonites Robini*, Thiollière, N. une nouvelle espèce d'Amm., pl. 1. (C'est peut-être un exempl. de l'*A. Requienianus*, dont les cloisons sont usées extérieurement, toujours, arrondit les lobes). France, Dieu-le-Fit (Drôme).
- \*19. Ewaldi**, d'Orb., 1848. *Ammonites Ewaldi*, de Buch, U. ratiten, etc., pl. 6, fig. 6, 7. Uchaux (Vaucluse).
- HAMITES**, Parkinson, 1811. Voy. t. 2, p. 126.
- 20. gracilis**, d'Orb. *Toxoceras id.*, d'Orb., Paléont., 1, pl. 120, fig. 10 12. Uchaux.
- BACULITES**, Lamarck, 1799. Voy. t. 2, p. 66.
- \*21. undulatus**, d'Orb., 1847. Espèce ovale comme le *B. b.* des, mais sans sillons, et ondulée obliquement. Uchaux (Vaucluse).

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

- TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 67.
- \*22. difficilis**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 39, pl. 151, fig. 1. France, Uchaux, Martigues (Bouches-du-Rhône).
- \*23. Uchauxiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. cr. p. 40, pl. 151, fig. 21-24. France, Uchaux, Montrichard (Loir-et-Cher).
- \*24. Requieniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 43, pl. 152, fig. 6. Uchaux.
- \*25. granulatoïdes**, d'Orb., 1847. *T. granulata*, d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 46, pl. 153, fig. 5, 7 (non Sow., 1827). Uchaux.
- \*26. Verneuiliana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 47, pl. 153, fig. 9. Uchaux.
- \*27. Renauxiana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 41, pl. 152, fig. 4. Uchaux.
- CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.
- \*28. inflata**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 71, pl. 156, fig. 2. Uchaux.
- EULIMA**, Risso, 1825. Voy. t. 1, p. 116.
- \*29. amphora**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 66, pl. 156, fig. 1. Uchaux.
- \*30. Requieniana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 67, pl. 155, fig. 1. Uchaux.

**NERINEA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 263.

\*31. *Pailletteana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 88, pl. 161, fig. 1-3. Bains-de-Rennes (Aude), Bagnolle, Martigues (Bouches-du-Rhône), Mondragon, Piolen (Vaucluse).

\*32. *pauperata*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 90, pl. 161, fig. 6, 7. Martigues.

\*33. *brevis*, d'Hombres, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 92, pl. 162, fig. 3, 4. France, Soulage (Aude), Beausset (Var).

\*34. *subaequalis*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 93, pl. 162, fig. 5, 6. France, Pons, Saintes (Charente-Inférieure).

\*35. *Requieniana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 94, pl. 163, fig. 1-3. Pons, Bains-de-Rennes, Sainte-Baume, Piolen, Beausset, Martigues; Égypte.

\*36. *Uchauxiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 98, pl. 164, fig. 1. Uchaux.

\*37. *longissima*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 114, pl. 44, fig. 1-4. Bohême, H. Koriczan, Zloseyn.

\*38. *cecticulosus*, d'Orb., 1847. *Turritella cesticulosa*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 246, pl. 39, fig. 17. France, Figuières, près de Marseille.

**PYRAMIDELLA**, Lamarck, 1796. D'Orb., Paléont. franç.; Terr. crét., 2, p. 103.

\*40. *canaliculata*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 104, pl. 164, fig. 3-6. France, Uchaux, environs d'Alais.

\*41. *subcarinata*, d'Orb., 1847. *P. carinata*, Reuss, 1846. Böhm. Kreid., p. 113, pl. 44, fig. 6, 7 (non Risso, 1826). Bohême, Koriczan.

**ACTEONELLA**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 107.

\*42. *Benauxiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 108, pl. 164, fig. 7. Uchaux.

\*43. *Lefebvreana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 108. Espèce à tours très-rapprochés les uns des autres. Égypte, avec les Radiolites.

\*44. *laevis*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 110, pl. 165, fig. 2, 3. Uchaux, Soulage (Aude), Angoulême; Autriche, Gosau; Bohême, Kutschlin.

\*45. *crassus*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 111, pl. 166. Beausset (Var), Candelon, Brignolles, Martigues (Bouches-du-Rhône), Soulage (Aude), Cognac, Pons (Charente-Inférieure), Saint-Georges, Rochecorbon (Indre-et-Loire), Villedieu (Loir-et-Cher).

\*46. *Toucasiana*, d'Orb., 1847. Espèce plus grande que l'*A. gigantea*, à spire plus allongée, plus étroite en avant. Le Beausset (Var).

**PTERODONTA**, d'Orb., 1843. Voy. t. 2, p. 149.

\*47. *naticoides*, d'Orb., 1847. Espèce courte comme une Natica, à bouche très-étroite. Uchaux.

\*48. *gracilis*, d'Orb., 1847. *Pterocera gracilis*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 46, pl. 11, fig. 21. Bohême, Kutschlin.

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

\*49. *lyrata*, Sow., 1836. D'Orb., Paléont., Terr. crét., 2, p. 161, pl. 172, fig. 5. France, Uchaux; Autriche, Gozau.

\*50. *Requieniana*, d'Orb., 1842, Paléont., Terr. crét., 2, p. 161, pl. 174, fig. 2. France, Uchaux (Vaucluse), Soulage.

\*51. *subbulbiformis*, d'Orb., 1847. *N. bulbiformis*, d'Orb., Pal.,

- 2, p. 162, pl. 174, fig. 3. Uchaux, Martigues, Montrichard (I Cher) : Bohême, Kreslingswalda.
- \*52. *Martinii*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 164, pl. 174, Martigues.
- \*53. *Toucasiana*, d'Orb., 1847. Coquille voisine des *N. subformis*, mais sans canal sur la suture, à spire plus étroite qu'*vulgaris*. Bourré (Loir-et-Cher), Le Beausset (Var), Bains-de-Aude); Bohême.
54. *notata*, Reuss, 1846. Böhm., Kreideform., p. 118, pl. 44, Bohême, Koriczan.
- NERITOPSIS**, Sowerby, 1825. Voy. t. 1, p. 263.
55. *Renauxiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 175, pl. 176, 7. Uchaux.
- NERITA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 214.
- \*56. *ornatissima*, d'Orb., 1847. Belle espèce couverte, très spire, de fortes rides transverses, le reste orné de gros tubercules longitudinaux. Espèce voisine des *N. nodoso-costata*. Les Martigues.
- \*57. *Bourgeoisiana*, d'Orb., 1847. Jolie espèce ridée en 1 des spires; les stries interrompues par de légères côtes longitudinales. Les Essards (Loir-et-Cher).
- \*58. *nodoso-costata*, d'Orb., 1847. *Natica nodoso-costata*, 1846, Böhm., Kreideform., p. 113, pl. 44, fig. 21. Bohême, Koriczan.
59. *plebeia*, Reuss, 1846, id., p. 112, pl. 44, fig. 18. Koriczan.
- TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.
60. *Gelnitzii*, Reuss, 1846. Böhm., p. 112, pl. 44, fig. 24. Koriczan.
61. *pseudo-helix*, Reuss, 1846. Böhm., p. 112, pl. 44, 1 Koriczan.
- 61'. *canaliculatus*, Reuss, 1846. Böhm., p. 112, pl. 44, 1 Koriczan.
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.
- \*62. *Renauxianus*, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 225, pl. 186, 8 Uchaux.
63. *Reussianus*, d'Orb., 1847. *Turbo Astierianus*, Reuss, Böhm., p. 112, pl. 44, fig. 22 (non *T. Astierianus*, d'Orb., 1847, Koriczan).
- \*64. *Dutemplei*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente mais avec sept rangées de côtes, au lieu de cinq. Valmy (Marne).
- PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.
- \*65. *Galliennel*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 256, pl. 197, 8 Saumur (Maine-et-Loire), Tourtenay (Deux-Sèvres), Ponce (Sarthe), Cotenin (Manche), Cadière, Caussols (Var).
- \*66. *Requieniana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 262, pl. 200, 8 Uchaux.
- \*68. *Uchauxiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 273. Uchaux.
- OVULA**, Bruguière, 1791.
69. *ventricosa?* d'Orb., 1847. *Strombus ventricosus*, Reuss, Böhm., p. 46, pl. 9, fig. 11. Bohême, Kutschlin.
- VOLUTA**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 154.



- \*70. *elongata*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 323, pl. 220, fig. 2.  
*Fasciolaria idem*, Sow., 1835. Uchaux ; Autriche, Gozau.
- \*71. *Requieniana*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 324, pl. 220, fig. 4.  
Uchaux.
- \*72. *Gasparini*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 325, pl. 220, fig. 6.  
Uchaux.
- \*73. *Renauxiana*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 327, pl. 221, fig. 4.  
Uchaux.
- \*74. *conoides* ? Mathéron, 1843, Catalogue, p. 253, pl. 40, fig. 19,  
20. France, Figuières, près de Marseille.
- ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 71.
- \*75. *simplex*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 290, pl. 208, fig. 6, 7.  
Uchaux.
- \*76. *ornata*, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 291, pl. 209, fig. 1, 2. Uchaux.
- \*77. *Requieniana*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 293, pl. 209,  
fig. 3, 4. Uchaux.
- \*78. *pauperata*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 294, pl. 210, fig. 1.  
Uchaux.
- \*79. *Novelliana*, d'Orb., 1847. Grande espèce tuberculeuse à aile  
très-longue et très-étroite. Montrichard (Loir-et-Cher).
- \*80. *anserina*, Nilson, 1827, Petref. Suec., pl. 3, fig. 6? Rømer,  
Kreidl., p. 78, pl. 11, fig. 7. Kreslingswalde.
- FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- \*81. *Renauxianus*, d'Orb., 1847, Paléont., 2, p. 339, pl. 223,  
fig. 10. Uchaux.
- \*82. *Requienianus*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 343, pl. 225,  
fig. 3. Uchaux.
- CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.
- \*83. *Ataxense*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 372,  
pl. 231, fig. 1. France, montagne des Cornes (Aude).
- \*84. *peregrinum*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. cré., 2,  
p. 373, pl. 231, fig. 3, 4. France, Uchaux (Vaucluse), Martigues ;  
Autriche, Gozau.
- \*85. *Requienianum*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 377, pl. 232,  
fig. 4, 5. Uchaux.
- \*86. *Prosperianum*, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 378, pl. 232, fig. 6.  
Uchaux.
- \*87. *Matheronii*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 379,  
pl. 232, fig. 7. France, Allauch (Bouches-du-Rhône).
- \*88. *Provenciale*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. cré., 2,  
p. 380, pl. 233, fig. 3. France, Beausset.
- \*89. *Ponsianum*, d'Orb., 1847. Espèce, pour la grosseur et l'angle  
spiral, voisine du *Cerithium Toucasianum*, mais sans côtes obliques.  
Pons (Charente-Inférieure).
- HELCION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.
- \*91. *campanulata*, d'Orb., 1847. *Patella campanulata*, Reuss,  
1846, Belemn., p. 110, pl. 44, fig. 9. Koriczan.
- \*92. *subtenuicosta*, d'Orb., 1847. *Patella tenuicosta*, Reuss, 1846,  
Behm., p. 110, pl. 44, fig. 10. Koriczan. (Michelien, 1836).

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**TEREDO**, Linné, 1758. D'Orb., Paléont., 3, p. 301.

\***93. Requienianus**, Mathér., 1843. D'Orb., Pal., 3, p. 308, fig. 3-6. Uchaux.

**PANOPEA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.

\***94. regularis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, pl. 360. France, Ponce (Sarthe), Montrichard (Loir-et-Cher).

**195. Ewaldi**, Reuss, 1846. Böhm., Kreideform., p. 17, pl. 34 Bohême, Malnitz, Sczerezcz, près de Lemberg (Galicie).

**PHOLADOMYA**, Sowerby, 1826, Voy. t. 1, p. 73.

\***96. Archiaciana**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. c. p. 356, pl. 364, fig. 3, 4. France, Sainte-Maure.

\***97. Nouelliana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. Ma-* mais bien plus allongée. France, Montrichard (Loir-et-Cher).

\***98. Geinitzii**, d'Orb., 1847. *Photadomya designata*, Geinl Goldf.). Espèce bien plus large et plus courte que le *design* Goldf. Silésie, Kreslingswalde.

**ANATINA**, Lamarck, 1809. Voy. t. 1, p. 74.

\***99. Royana**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, pl. 371, fig. 5, 6. France, Montrichard, Sainte-Maure.

**100. elongata**, d'Orb., 1847. *Lyonsia elongata*, Reuss, 1846. B. p. 18, pl. 36, fig. 9. Bohême, Kutschlin.

**GASTROCHENA**, Spingler, 1783. Voy. t. 1, p. 275.

\***102. Marticensis**, d'Orb., 1847. *Fistulana Marticensis*, Mat 1842, Catalogue, p. 132, pl. 10, fig. 4. *G. dilatata*, Reuss, pl. 37, (non d'Orbigny, 1843). Martigues; Bohême, Koriczan.

**SOLECURTUS**, Blainville, 1824. Voy. t. 2, p. 75.

**103. elegans**, d'Orb., 1847. *Solen elegans*, Mathéron, 1842, (gue, p. 134, pl. 11, fig. 3 (non *elegans*, d'Orb., 1844). Martigue

**ARCOPAGIA**, Brown, 1827. Voy. t. 2, p. 75.

\***104. semiradiata**, d'Orb., 1847. *A. radiata*, id., Paléont., 3, p. 412, pl. 378, fig. 11-13. *Venus semiradiata*, Mathéron, Uchaux.

\***105. numismalis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 415, pl. 379. 5. Bourré, près de Montrichard (Loir-et-Cher), Uchaux (Vau Sainte-Maure, Ambillon (Indre-et-Loire).

**TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.

\***106. Renauxii**, Mathéron, 1843. D'Orb., 1844, Paléont. 1 Terr. crét., 3, p. 421, pl. 380, fig. 6-8. France, Uchaux.

**CAPSA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 2, p. 159.

\***107. discrepans**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét. p. 424, pl. 381, fig. 3-5. Gourdon, Ambillon, Doué.

**VENUS**, Linné, 1758. Voy. vol. 2, p. 15.

\***108. Renauxiana**, d'Orb., 1847. *V. plana*, d'Orb. (pars); P. p. 447 (non *plana*, Sow.). Espèce plus large et plus comprimée. U Sainte-Maure, Gourdon, Beaumont.

\***109. Rothomagensis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. 3, p. 443, pl. 385, fig. 1-5. France, Uchaux, Rouen.

- \***110. Nouelliana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *V. plana*, mais bien plus épaisse. Poncé (Sarthe), Montrichard (Loir-et-Cher).
- 111. Martiniana**, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 154, pl. 16, fig. 7, 8. France, Martigues (Bouches-du-Rhône).
- CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 275.
- \***112. Goldfussiana**, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 143, pl. 13, fig. 9-10 (*mala*). *C. truncata*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 461, pl. 388, fig. 18-20 (non *truncata*, Sow., 1836). Uchaux, Mondragon.
- ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 1, p. 216.
- 113. granum**, d'Orb., 1847. *Venus granum*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 158, pl. 15, fig. 7. Martigues (Bouches-du-Rhône).
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 1, p. 173.
- \***114. consobrina**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 107, pl. 278, fig. 3-6. Uchaux.
- \***115. intermedia**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 107, pl. 278, fig. 1-2. France, Doué, Hourdot, Roche-Beaucourt.
- \***116. Nouelliana**, d'Orb., 1847. *Cyprina Ligeriensis* (pars), d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 103, pl. 275, fig. 4, 5 (exclus., fig. 1, 2). Saumur, Tourtenay, Saint-Christophe (Indre-et-Loire), Pons.
- TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. v. 1, p. 198.
- \***117. scabra**, Lam., 1819; d'Orb., Paléont., 3, p. 153, pl. 296. *T. alæformis*, Geinitz, 1841 (non Sow.). Uchaux, Rouen, Le Martrou, Saintes, Montrichard; Silésie, Kreslingswalde.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, page 76.
- \***118. Campaniensis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 123, pl. 283, fig. 11, 12. *Lucina discus*, Mathéron, 1843, Catal., pl. 13, fig. 12. France, Uchaux, Mondragon (Vaucluse), Martigues (Bouches-du-Rhône).
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 33.
- \***120. subalternatum**, d'Orb., 1847. *C. alternatum*, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 30, pl. 246 (non Sow., 1840). Sainte-Maure, Uchaux, Montrichard.
- \***121. Bequienianum**, Mathéron, 1843, Cat., p. 157, pl. 18, fig. 6. *C. Hillanum* (pars), d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 27. *C. alternans*, Reuss, 1846, Bohême, p. 1, pl. 35, fig. 15, 16. *Protocardia hillana*, Beyr. (pars). Uchaux; Bohême, Kutschlin; Silésie, Kreslingswalde.
- \***122. guttiferum**, Mathéron, 1843, Catal., p. 156, pl. 18, fig. 1, 2. Uchaux, Angoulême (Charente), Montrichard (Loir-et-Cher).
- \***123. hispinosum**, Dujar., 1837. Espèce confondue avec le *C. productum* de Sow., mais plus courte et plus ronde. Saumur; Montrichard (Loir-et-Cher).
- \***124. Toucasianum**, d'Orb., 1847. Belle espèce presque circulaire, globuleuse, inéquilaérale. France, Le Beausset.
- \***125. ollonis**, Geinitz, 1843, Char. Kreid., pl. 14, p. 1, fig. 31. Kreslingswalde.
- \***126. Cordierianum**, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 159, pl. 17, fig. 7, 8. France, Martigues (Bouches-du-Rhône).
- ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. vol. 1, p. 132.
- \***127. Carantonensis**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 48, pl. 252, fig. 1-4. Martrou, près de Rochefort.

\*128. *Benauxiana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*I. A.* mais plus courte et plus ovale. Uchaux.

**NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 1, p. 12.

\*129. *Benauxiana*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 179, pl. 304, Uchaux.

**PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 2, p. 80.

\*130. *Requienianus*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 190, pl. 307, Uchaux.

\*130'. *Benauxianus*, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 191, pl. 307, Uchaux.

\*131. *Bourgeoisianus*, d'Orb., 1847. Espèce à fines stries nantes. France, Bourré (Loir-et-Cher).

\*132. *Geinitzii*, d'Orb., 1847. *P. lævis*, Geinitz (non Sowerby), Silésie, Kreslingswalde.

**ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 4, p. 13.

\*133. *Nouelliana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. Lig.* mais moins étendue. Poncé, Saumur, Gourdon, Gacé, Mareuil.

\*135. *Beaumontii*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 237, pl. 224. Tournais, Martrou, Cognac, Mareuil.

\*136. *Matheroniana*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 238, *A. glabra*, Geinitz (non Sowerby). Uchaux, Saint-Christophe (In Loir); Silésie, Kreslingswalde.

\*137. *Raspailii*, d'Orb., 1847. *A. Requieniana*, d'Orb., Paléont., 3, p. 239, pl. 326, fig. 1-3. *Cucullæa irregularis*, Mathéron, 1843 (non *irregularis*, Deshayes). Uchaux.

\*139. *Requieniana*, d'Orb., 1847. *A. irregularis*, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 240, pl. 326, fig. 4-5 (non *laris*, Deshayes). *Cucullæa Requieniana*, Mathéron, 1843. Uchaux.

140. *semisulcata*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 163, fig. 5-6. France, Uchaux (Vaucluse).

141. *Benauxiana*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 164, fig. 7-9. France, Uchaux (Vaucluse).

142. *inclinata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 12, pl. 35, fig. 1. Riczan.

**PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.

\*143. *quadrangularis*, Goldf., 1836. D'Orb., 1844, Pal. Terr. crét., 3, p. 256, pl. 333, fig. 4-5. Uchaux (Vaucluse), Mouchard (Loir-et-Cher).

\*144. *Ligeriensis*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 257, pl. 334.

**MYOCONCHA**, Sowerby, 1824. Voy. t. 1, p. 165.

\*145. *Requieniana*, d'Orb., 1847. *Modiola Requieniana*, Mathéron, 1843, Catal., p. 177, pl. 28, fig. 3, 4. France, Uchaux (Vaucluse).

**LITHODOMUS**, Cuvier, 1817.

\*146. *Toucasianus*, d'Orb., 1847. Espèce allongée, lisse, unanguleuse sur la région anale. Le Beausset (Var).

147. *pistilliformis*, d'Orb., 1847. *Fistulana pistilliformis*, 1846, Böhm. Kreideform., p. 20, pl. 37, fig. 7, 8. Bohême.

**LIMA**, Brugnière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.

\*148. *Rhotomagensis*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 557, pl. fig. 8-11. Rouen.

\***149. plicatilis**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 216, pl. 16, fig. 9. Bourré (Loir-et-Cher), vallée de Rochecorbon (Indre-et-Loire).

**150. subplana**, d'Orb., 1847. *L. plana*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 35, pl. 38, fig. 20 (non Rœmer, 1811). Bohême, Koriczan.

\***151. lævissima**, Reuss, 1846, Bœhm. Kreideform., p. 35, pl. 38, fig. 14. Bohême, Drahomischel, Kutschlin, Czencziz; Silésie, Kreslingswalde.

**152. amygdaloides**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 33, pl. 38, fig. 16. Koriczan.

**AVICULA**, Klein, 1753. Voy. vol. 1, p. 13.

\***155'. Nysa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de *P. anomala*, mais plus déprimée, moins anguleuse, et pourvue de côtes régulières. Montrichard.

**155. subpectinoides**, d'Orb., 1847. *A. pectinoides*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 23, pl. 32, fig. 8, 9 (non Sow., 1838). Lusnitz, Priesen, Wollenitz, Raunay, Koriczan.

**PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 176.

**156. Marticensis**, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 176, pl. 27, fig. 1, 2. France, Martigues (Bouches-du-Rhône).

**INO CERANUS**, Parkinson, 1811. Voy. t. 1, p. 237.

\***157. problematicus**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 510, pl. 406. Tourtenay, Chmon, Rouen, Fécamp, Cambrai, Douchy; Allemagne, Quedlimbourg; Bohême, Hundorf, Kutschlin.

\***158. cuneiformis**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 512, pl. 407. France, Rouen.

\***159. latus**, Mantell, 1822; d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 513, pl. 408, fig. 1, 2. France, Sainte-Cerotte, Rouen.

**PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.]

\***160. Puzosianus**, Mathéron, 1842; d'Orb., Paléont., 3, p. 610, pl. 437, fig. 1-4. Uchaux (Vaucluse), Martigues (Bouches-du-Rhône), Cadière (Var).

\***161. curvatus**, Geinitz, 1843, Char. Kreid. Nach., p. 16, pl. 3, fig. 13. Espèce voisine des *P. Nilsoni*, mais moins large, également lisse. *P. pulchellus*, Mathéron (pars), 1813, Catal., p. 186, pl. 30, fig. 6 (exclus. fig. 4, 5). Montrichard (Loir-et-Cher), Uchaux (Vaucluse); Silésie, Kreslingswalde.

**162. decipiens**, Reuss, 1816, Bœhm. Kreideform., p. 31, pl. 45, fig. 3. Bohême, Hollubitz, Koriczan.

**SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 83.

**164. Coquandianus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 663, pl. 452, fig. 9-11. France, Martigues.

\***165. hippuritarum**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 664, pl. 455. Cadière, Le Bausset, Bains-de-Rennes, Uchaux.

\***166. alternatus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 665, pl. 456, fig. 1-5. France, Cadière, Le Bausset.

**JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 2, p. 83.

\***167. Geinitzii**, d'Orb. *Pecten quadriristatus*, Geinitz (non Sowerby). Cette espèce diffère du *Quadriristatus* par ses trois côtes inégales, au lieu d'être égales. Silésie, Kreslingswalde; France, Martigues.

**OSTREA.**

- \*169. *diluviana*, Linné, 1767; d'Orb., Paléont. franç., 1 crét., 3, p. 728, pl. 480. France, Uchaux, Beausset.

**MOLLUSQUES BRACHIOPODES.**

**RYNCHONELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 92.

- \*170. *deformis*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 498, fig. Beausset, Cadière (Var), Bains-de-Rennes (Aude), Martigues chers-du-Rhône), près d'Angoulême (Charente).

- \*171. *Cuvieri*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 497, fig. 12-1 camp (Seine-Inférieure), cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), La (Sarthe), Valmy, Dammartin, La Planchette, Gizaucourt (Ma

- \*172. *Mantelliana*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 498, fig. Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais), Cadière (Var); Angleterre, Ha Belgique, Tournay.

**TEREBRATULINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 85.

- \*173. *Campaniensis*, d'Orb., 1847. Paléont., 4, pl. 502, 18. France, Valmy, Ecomoy; Belgique, près de Tournay.

- \*174. *gracilis*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, fig. 1-6. France, Valmy (Marne).

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

- \*175. *disparilis*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 512, fig. Rouen.

- \*176. *obesa*, Sow., 1823; d'Orb., Paléont., 4, pl. 513, fig. Rouen, Saint-Parres, Périgueux, Vitry, Valmy; Angl., Norto

**HIPPURITES**, Lamarck, 1801; d'Orb., Paléont., Terr. crét.,

- \*177. *cornu-vaccinum*, Bronn, Jahrb., 1832, p. 171; d'Orb. franç., Terr. crét., pl. 526-527. *H. gigantea*, d'Hombres-Firmas. *H. Moulinsii*, d'Hombres-Firmas. *H. lata* et *Galloprovincialis* Théron. Autriche, Salzburgerischen; France, Bains-de-Rennes (Martigues (Bouches-du-Rhône), Beausset (Var), Alais (Gard); gne, à Santa-Clara, ville d'Oviedo, M. Paillette.

- \*178. *organisans*, Montfort, 1808; d'Orb., Paléontol., 4, p. *H. resecta*, DeFrance. *H. fistula* id., DeFrance. Corbières, Be Alais, Piolen, Martigues; mont Sinaï (Syrie).

- \*179. *bioculata*, Lamarck, 1801; d'Orb., Paléont., franç., crét., 4, pl. 529. *H. cornucopia*. DeFrance. France, Corbières.

- \*180. *sulcata*, DeFrance, 1821; d'Orb., Pal., 4, pl. 531. *H. s* DeFrance. Corbières (Aude), Beausset Alais, Piolen, Martigues

- \*181. *canaliculata*, Rolland, 1841; d'Orb., Paléont., 4, pl. Peut-être est-elle une variété de l'*H. sulcata*. France, Cort Beausset, Martigues.

- \*182. *dilatata*, DeFrance, 1821, Dict., t. 21, p. 197; d'Orb., P. pl. 128. *H. turgida*, Roquant, 1841. France, Bains-de-Rennes (A Le Beausset, Cadière (Var), Alais (Gard).

- \*183. *Toucasiana*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét. pl. 532. France, Le Beausset, Martigues, Piolen.

- \*184. *Bequieniana*, Mathéron, 1843 ; d'Orb., Pal. franç., Terr. crét., 4, pl. 534. France, Martigues, Uchaux, Beausset.
- \*184'. *insequicostata*, Münst., Goldf., 1841, Petref., 2, p. 303, pl. 165, fig. 4. Autriche, Salzburg, Gozau.
- \*185. *falcata* ? Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 53, pl. 45, fig. 16. Bohême, Koriczan.
- CAPRINA**, d'Orb., 1823. Voy. t. 2, p. 173.
- \*186. *Aguilloni*, d'Orb., 1839, Paléont., 4, pl. 538. *Plagiopiticus paradoxus*, Mathéron, 1842. *Caprina Partchii*, Hauer, 1847, Not. Abh., p. 109. Bains-de-Rennes (Aude), Martigues, Uchaux (Vaucluse), La Cadière, Le Beausset (Var) ; Autriche, Gozau.
- \*187. *Coquandiana*, d'Orb., 1839, Paléont., pl. 539. *Plagiopiticus Toucarianus*, Mathéron, 1842. Le Beausset, La Cadière (Var).
- \*188. *laminea* ? Geinitz, Reuss, 1846, Böhm., p. 53, pl. 45, fig. 6. Koriczan.
- CAPRINULA**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4.
- \*189. *Boissii*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, p. 540, *Caprina id.*, d'Orb., 1839, Revue Cuv., p. 184. France, Fourtou (Aude).
- RADIOLITES**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 108.
- \*190. *Ponsiana*, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 552. *Sphærolites id.*, d'Arch., 1835. Pons (Charente-Inférieure), entre Sainte-Cerotte et Evailé (Sarthe).
- \*191. *lumbricalis*, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 555, fig. 4-7. Angoulême (Charente), Périgueux (Dordogne).
- \*192. *radiosa*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 554. Pons, Angoulême (Charente), Beausset (Var), Alais (Gard).
- \*193. *Martiniana*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 559. France, Angoulême, Martigues.
- \*194. *angelodes*, Lamarck, 1801 ; d'Orb., Paléontol., 4, pl. 549. *Radiolites Galloprovincialis*, R. Lamarckii, Math. *Sphærolites rotularis*, *entricosa* et *turbinata*, Lam., 1819. Bains-de-Rennes (Aude), Martigues, Beausset.
- \*195. *Pailletteana*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 558. France, Source-Salée (Aude).
- \*196. *acuticostata*, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 550. R. *horrida*, d'Orb., 1842. France, Martigues, Beausset ; mont Sinai.
- \*197. *excavata*, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 4, pl. 556. France, Martigues, Beausset, Pons.
- \*198. *squamosa*, d'Orb., 1842, Pal., 4, pl. 561. Martigues.
- \*199. *mamillaris*, Mathéron, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 560. France, Martigues.
- \*200. *Sauvagesii*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., 4, pl. 553. *Sphærolites Sauvagesii*, d'Hombres-Firmas, 1837, Mémoires, p. 193, pl. 2. Alais, Pons, Uchaux.
- \*200'. *angulosa*, d'Orb., 1842, Paléont., pl. 562, fig. 1-4. Pons.
- \*201. *Desmouliniana*, Mathéron, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 551. Pons, Uchaux, Beausset, Martigues, Angoulême.
- \*202. *socialis*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 553, fig. 1-3. France, Angoulême, Alais.
- \*203. *irregularis*, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 562, fig. 1-7. Pons.

- \*204. *Toucasiana*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, p. 557. France, Beausset, Martigues.
- \*205. *undulata*, d'Orb., 1847. *Sphærolites undulatus*, Gein., 1842, Charak. Kreid., pl. 19, fig. 6-10, p. 87. Bohême, Kutschlin.
- \*206. *subdilata*, d'Orb., *Hippurites id.*, Geinitz, 1842, pl. 19, fig. 11-12; Reuss, pl. 45, fig. 13-14. Kutschlin (Bohême).
- \*207. *elliptica?* d'Orb., 1847. *Hippurites ellipticus*, Geinitz, 1842, Char. Kreid., p. 19, fig. 13-14. Bohême, Kutschlin.
- \*208. *Germani*, d'Orb., 1847. *Hippurites Germani*, Geinitz, 1842, pl. 14, fig. 3-5; Reuss, pl. 45, fig. 15. Bohême, Kutschlin.
- BIRADIOLITES**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4.
- \*209. *cornupastoris*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 573. *Hippurites id.*, Desmoulins. Périgueux, Martigues, Uchaux (Vaucluse), Angoulême (Charente), Les Piles, près de Périgueux, Troyes (Aube), Ste-Cerotte, La Flèche (Sarthe).
- \*210. *canaliculata*, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 572. Martigues.
- \*211. *quadrata*, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 574, fig. 1-5. Pons.
- \*212. *angulosa*, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 4, pl. 574, fig. 7-11. France, Pons, Le Beausset.
- CAPROTINA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 2, p. 109.
- \*213. *Archiaciana*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 588. Pons, Angoulême, Beausset, Martigues.
- \*215. *subæqualis*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., 4, pl. 590. France, Cadix (Var), Martigues (Bouches-du-Rhône).
- \*216. *Toucasiana*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 591. France, Beausset (Var), Piolen (Vaucluse).

## MOLLUSQUES BRYOZOAIRE.

**ESCHARINA**, Edwards, 1836.

- \*217. *Vieilbanci*, d'Orb., 1847. Espèce à cellules saillantes simples, distinctes, et taches encroûtantes. France, Tourtenay (Deux-Sèvres).

**ENTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.

- \*218. *Vieilbanci*, d'Orb., 1847. Belle espèce rameuse, bien plus grosse que les espèces de l'étage précédent. France, Tourtenay.

**IDMONEA**, Lamouroux, 1821.

- \*218'. *Radiolitum*, d'Orb., 1839. Espèce à branches irrégulières, avec beaucoup de cellules de front par ligne. France, Pons; sur une *Radiolites angulosa*.

## ÉCHINODERMES.

**HOLASTER**, Agassiz.

- \*219. *pillula*, Agassiz, 1847, Cat., p. 135. *Holaster rostratus*, Desh. France, Beauvais; Peine et Yseburg, en Hanovre.

\*220. *integer*, Agassiz, 1847, Cat., p. 134. Bains-de-Rennes (Aude).

- \*221. *subglobosus*, Agassiz, Cat., p. 133. *Spatangus subglobosus*, Goldfuss, pl. 45, fig. 4 (non Lam.). Rouen, Fécamp, Sancerre, Saint-Parres, etc.



**MICRASTER**, Agassiz.

\*221'. *brevia*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 130. *Micraster latus*, E. Sismond, Mém. Echin. foss. Nizza, p. 29, pl. 1, fig. 13. Bains-de-Rennes (Aude), Rouen, Alot, Saint-Remy; Westphalie; Nice.

\*222. *Matheroni*, Desh., Agass., 1847, Cat., p. 130. Corbières.

223. *Benauxii*, Desh., Expl. Alg. Agass., 1847, Cat., p. 129. Afrique française, Chataba, province de Constantine.

**HEMIASTER**, Agassiz.

224. *Fournelli*, Desh., Agass., 1847, Cat., p. 123. Afrique française, Biskara (Algérie); Portugal, Alcantara; Espagne, Burgos; Egypte.

\*225. *Verneuili*, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 123. Sainte-Maure.

226. *cubicus*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 123. D'Égypte.

**ARCHIACIA**, Agassiz.

227. *cornuta*, Agass., 1847, Cat., p. 101. Égypte, Sinaï.

**NUCLEOLITES**, Lamarck.

228. *Requeni*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 96. Martigues.

**DISCOIDEA**, Gray.

229. *pulvinata*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 89. Égypte.

**MOLECTYPUS**, Agassiz.

230. *serialis*, Desh., Exp. Alg. Agass., 1847, Cat. syst., p. 88. Afrique française, Biskara et Alcantara (Algérie).

**FEDINA**, Agassiz.

231. *Sinaïca*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 67. Sinaï.

**CYPHOSOMA**, Agassiz.

232. *Delamarrei*, Desh., Exp. Alg. Agassiz, 1847, Cat. syst., p. 48. Algérie, Biskara, entre Batna et Alcantara (province de Constantine).

**DIADEMA**, Gray.

\*233. *Malbosii*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 46. Souladge.

\*234. *Roissyi*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 46. Gacé.

**HEMICIPARIS**, Agassiz.

\*235. *Libyca*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 34. Martigues.

## ZOOPHYTES.

**CYCLOLITES**, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 232.

\*236. *elliptica*, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 232; Guettard, Mém., 3, tab. 21, fig. 17-18. *Fungia polymorpha*, Goldf., pl. 14, fig. 6. Bains-de-Rennes, Martigues, Figuières (Bouches-du-Rhône), Beausset (Var). Périgieux.

\*237. *undulata*, Michelin, Goldfuss, 1830, Petref. Germ., pl. 14, fig. 7; Michelin, pl. 64, fig. 3. Bains-de-Rennes, Martigues, Mazanges, Beausset (Var); Espagne, Pyrénées catalanes; Autriche, G. zau.

\*238. *variolata*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *C. elliptica*, mais couverte de dépressions éparées en dessus. Soulage.

239. *discoidea*, Blainville, 1834. Michelin, Icon. zoophyt., pl. 4, fig. 1. France, Soulage.

\*240. *gigantea*, d'Orb., 1839. Espèce très-déprimée, dont le diamètre est de 10 centimètres. France, Le Beausset.

**FUNGINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 91.

\*240. *hemisphærica*, d'Orb., 1847. *Cyclolites id.*, Lamarck, (Anim. sans vert., 2. Michelin, pl. 64, fig. 2. *Fungia polyma* pl. 14, fig. 6 e, f, et fig. 9. *Cyclolites Corbieriaca*, Michelin, pl. fig. 5 (jeune). Bains-de-Rennes, Allauch, Martigues, Uchaux; triche, Gozau.

\*241. *Haueriana*, d'Orb., 1847. *Cyclolites Haueriana*, Mich 1846, Icon. zoophyt., p. 284, pl. 64, fig. 4. France, Bains-de-Ren Martigues.

\*242. *discoidea*, d'Orb., 1847. *Fungia discoidea*, Goldf., 1830, tref., 1, p. 50, pl. 14, fig. 9. Autriche, Salzburgischen.

\*243. *Martiniana*, d'Orb., 1847. Espèce très-aplatie comme monnaie. France, Martigues.

**ELLIPSOSMILIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 36.

\*243'. *Salzburgiana*, d'Orb., 1849. *Trochosmilium Salzburgiana*, wards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 237. Gozau triche).

\*243 a. *cuneolus*, d'Orb., 1849. *Trochosmilium cuneolus*, Edwards Haime, 1848, id., p. 327. *Turbinolia conulus*, Michelin, pl. 66, fig. Martigues (Bouches-du-Rhône), Brignoles (Var).

\*243 b. *uricornis*, d'Orb., 1847. *Turbinolia id.*, Michelin, 1 Icon. zoophyt., p. 287, pl. 65, fig. 2. Espagne, Pyrénées méridion Catalogne.

\*244. *Boissayana*, d'Orb., 1847. *Turbinolia id.*, Michelin, 1846, 1 zooph., p. 286, pl. 65, fig. 1. France, Montferrand (Aude).

\*244'. *Carantonensis*, d'Orb., 1847. Espèce dont nous ne naissons que l'empreinte du dessus, remarquable par l'inégalité gulière des cloisons. France, Martrou, Pons (Charente-Inférieure).

\*244". *subrudis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. rudis*, Michelin, mais moins comprimée. Uchaux.

**PLACOSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*245. *rudis*, d'Orb., 1847. *Turbinolia rudis*, Michelin, Zooph. pl. 4, fig. 3. (exclus. syn.) *P. Parkinsoni*, Edw. France, Uchaux (1 cluse), La Cadière (Var).

\*245'. *cuneiformis*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. 10, p. 234. Corbières (Aude), Martigues.

\*245". *cymbula*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 234. *Turbinolia cymbula*, Michelin, p. 288, pl. 67, fig. 1. Soulaye (Aude).

\*245""'. *elongata*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 235. Mo

\*245""". *arcuata*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 235. Ba de-Rennes (Aude), Martigues.

**TROCHOSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*246. *compressa*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 1 *Turbinolia id.*, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 231, n° 4. mouroux, Polypiers, pl. 74, fig. 22-23. France, Uchaux, Bains-Rennes, Martigues.

\*247. *complanata*, Edwards et Haime, 1848, id., p. 238. *Turbinolia complanata*, Goldf., 1830, p. 53, pl. 15, fig. 10. Michelin, pl. fig. 1. France, Bains-de-Rennes (Aude), Mazangue, Cadière.

\*247'. *Basocheii*, Edwards et Haime, 1848, id., p. 239. *Turbinolia*

*lia id.*, 1836. *Turbinolia alata*, Michelin, pl. 65, fig. 3. France, Martigues; montagne des Cornes.

**PERISMILIA**, d'Orb., 1847. C'est une *Montlivaltia* ovale, à columelle creuse linéaire.

\*249. **Hippuritiformis**, d'Orb., 1847. *Turbinolia id.*, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 287, pl. 65, fig. 7. France, Bains-de-Rennes.

\*249'. **Martiniana**, d'Orb., 1847. Belle espèce comprimée, large, munie d'une forte épithèque. France, Bains-de-Rennes.

\*249". **elongata**, d'Orb., 1849. Espèce très-allongée, irrégulière. Figuières.

**RHYPIDOGYRA**, Edwards et Haime, 1848.

\*250. **Martiniana**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 282. *Lobophyllia Martiniana*, Michelin, zoophyt., pl. 66, fig. 4. Soulage, Figuières.

**DIPLOCTENIUM**, Goldfuss, 1826.

\*251. **Matheronii**, Michelin, Icon. Zoophyt., pl. 68, fig. 1. France, Figuières.

**ACTINOSERIS**, d'Orb., 1849. Voy. p. 180.

\*252. **provincialis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. coronula*, mais plus grande, plus épaisse et plus régulière.

**ACROSMILIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 207.

\*253. **cernua**, d'Orb., 1847. *Turbinolia cernua*, Michelin, pl. 66, fig. 1 (non *Turbinolia cernua*, Goldfuss). Soulage (Aude).

\*254. **conica**, d'Orb., 1847. Espèce avec des granulations externes moins marquées, sans angles sur le bord. Soulage.

**LASMOSMILIA**, d'Orb., 1849. Voy. t. 1, p. 291.

\*255. **gracilis**, d'Orb., 1849. Belle espèce à tiges étroites et grêles. Figuières.

\*256. **lobata**, d'Orb., 1849. *Lobophyllia lobata*, Blainville, 1834. Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 291, pl. 67, fig. 3. *Thecosmilie lobata*, Edwards, 1848. France, montagne des Cornes.

**LASMOGYRA**, d'Orb., 1849. C'est un *Rhytidogyra* avec columelle et sans épithèque.

\*257. **Occitanica**, d'Orb., 1847. *Lobophyllia Occitanica*, Michelin, 1847, Icon. zooph., p. 291, pl. 67, fig. 2. France, Soulage.

**THECOSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*258. **rudis**, d'Orb., 1847. *Cyathophyllum rude*, Sow., 1836, Trans. geol. Soc., 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 37, fig. 2. *Caryophyllia globosa* ? Michelin, pl. 4, fig. 4. Cadière (Var), Uchaux, Bains-de-Rennes (Aude); Autriche, Gozan; Espagne, frontière de France en Catalogne.

**LASMOPHYLLIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 208.

\*259. **patula**, d'Orb., 1847. *Turbinolia id.*, Michelin, 1846, Iconog. zoophyt., pl. 65, fig. 3. France, Martigues, Soulage.

**BARYSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*260. **brevicaulis**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., x, p. 274. *Dendrophyllia brevicaulis*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 17, pl. 4, fig. 5. Uchaux.

\*262. **compressa**, d'Orb., 1847. Espèce à très-grand calice, comprimé, porté sur une base cylindrique. Uchaux.

\*262'. *corbarica*, d'Orb., 1847. Espèce rameuse, à grosses ches granuleuses sur les stries. Soulage.

**CLADOCORA**, Ehrenberg, 1834.

\*264. *humilis*, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 308. *Lithod. humile*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 27, pl. 6, fig. 9. U Montagne-des-Cornes, Figuières, près de Marseille, Martigues

**CALAMOPHYLLIA**, Blainville, 1830.

\*265. *gracilis*, d'Orb. Jolie espèce à tige grêle dans laquelle on remarque à peine des bifurcations. Soulage.

\*265. *Martiniana*, d'Orb., 1849. Espèce à double plus que l'espèce précédente. Martigues.

**PLEUROCORA**, Edwards et Haime, 1848.

266. *ramulosa*, Edwards et Haime, 1849, loc. cit., p. 31 *lithodendron id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 304, pl. 73, Bains-de-Rennes.

\*267. *Pailletteana*, d'Orb. Jolie espèce rameuse, à cellules. Source-Salée (Aude).

268. *gemmans*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat. p. 310 *Lithodendron gemmans*, Michelin, 1847, Iconogr. zoo p. 305, pl. 72, fig. 6. France. Soulage.

269. *Haueri*, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 312. Gozan.

**CYCLOCENIA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 182.

\*270. *monticularia*, d'Orb., 1847. Espèce curieuse par ses lobes en cônes, striés mégalement en dehors. Martigues.

**PHYLLOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*271. *intermedia*, Espèce intermédiaire pour le diamètre des cellules, entre l'*A. pediculata* et le *compressa*. Uchaux, Soulage

\*272. *Vallisclausæ*, d'Orb., 1847. *Astrea Vallisclausæ*, Michelin, 1841, Iconogr. zoophyt., p. 22, pl. 5, fig. 7. *Sarcinula favosa*, Michelin, pl. 6, fig. 6. Uchaux.

\*273. *pediculata*, Edwards et Haime, 1848; d'Orb., 1847. *id.*, Deshayes. Michelin, pl. 70, fig. 1. Martigues, Allauch (Bou du-Rhône), Bains-de-Rennes.

\*274. *variolaris*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, Icon. zoophyt., p. 301, pl. 71, fig. 7. Bains-de-Rennes.

\*275. *Marticensis*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont bien plus grandes et plus élevées que chez les autres espèces. Martigues.

**PRIONASTREA**, Edwards et Haime, 1848.

\*276. *lamellosissima*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, Iconogr. zoophyt., p. 23, pl. 6, fig. 1. France, Uchaux.

\*277. *grandiflora*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont encore plus grandes que chez le *S. lamellosissima*. Soulage.

\*278. *infundibulum*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules ont 10 millim., finement striées en dedans, à bords à facettes relevées tranchantes. Soulage.

279? *vesparia*, d'Orb., 1847. *Astrea vesparia*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 22, pl. 5, fig. 5. Uchaux.

**GONIASTREA**, Edwards et Haime, 1848.

**279<sup>e</sup>. formosissima**, d'Orb., 1849. *Astrea formosissima*, Michelin, pl. 6, fig. 4. Uchaux.

**STYLOCÆNIA**, Edwards et Haime, 1848.

**281<sup>e</sup>. Lapeyrouisiana**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., x, p. 295. *Astrea id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 298, pl. 70, fig. 5. France, Soulage (Aude).

**ASTROCÆNIA**, Edwards et Haime, 1848.

**\*282. formosa**, d'Orb., 1849. *A. Koninckii*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., x, p. 292. *Astrea formosa*, Michelin, Iconogr., p. 300, pl. 71, fig. 5. Corbières; G. zau.

**\*282<sup>e</sup>. formosissima**, d'Orb., 1849. *Astrea formosissima*, Michelin, Icon., pl. 72, fig. 5. *Astrocœnia Orbignyana*, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 297. Autriche, Gozau.

**282<sup>e</sup>. reticulata**, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 297. *Astrea reticulata*, Goldf., 1830, Petref. Germ., pl. 38, fig. 10, *b, c* (non Michelin, 1841). *A. ramosa*, Michelin, pl. 72, fig. 2. Autriche, Gozau.

**\*283. decaphylla**, Edwards et Haime, *id.*, p. 298. *Astrea id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 302, pl. 72, fig. 1. *Astrea reticulata*, Goldf., pl. 38, fig. 4 *a d.* Bains-de-Rennes.

**ENALLOCÆNIA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 35.

**\*284. ramosa**, d'Orb., 1849. *Astrea ramosa*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc., 3, pl. 37, fig. 9. *Astrocœnia id.*, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 298. Le Beausset (Var), Soulage, Figuières; Gozau.

**ASTREA**, Lamarck.

**\*284. Delcrosiana ?** Michelin, 1841, Iconogr. zoophyt., p. 23, pl. 6, fig. 2. *Sarcinula quincuncialis*, Michelin, pl. 6, fig. 7. Uchaux.

**\*284<sup>e</sup>. sulcato-lamellosa**, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 22, pl. 5, fig. 6. *Stylina Renauxii*, Michelin, 1841, *id.*, fig. 9. Uchaux.

**STEPHANOCÆNIA**, Edwards et Haime, 1848.

**\*285. irregularis**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules plus larges que chez le *G. decaphylla*. Soulage.

**\*286. excavata**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont très-profondes, à parois très-saillantes. Uchaux.

**\*286<sup>e</sup>. formosa**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., x, p. 301. *Astrea formosa*, Goldf., 1830, Petref. Germ., pl. 38, fig. 9. *Astrea concinna*, Goldf., pl. 22, fig. 1 *b, c*. *Astrea formosissima*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc., 3, pl. 37, fig. 6. *Porites aculeata*, Michelotti, pl. 6, fig. 1. *Astrea reticulata*, Michelin, pl. 5, fig. 1. Uchaux, Soulage; Autriche, Gozau.

**CRYPTOCÆNIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 322.

**287. terminaria**, d'Orb., 1847. *Astrea terminaria*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 21, pl. 5, fig. 2. France, Uchaux.

**\*289. putealis**, d'Orb., 1847. *Astrea putealis*, Michelin, 1841, pl. 5, fig. 3. *Sarcinula favosa*, Michelin, pl. 6, fig. 6. Martigues, Uchaux.

**\*289<sup>e</sup>. sparsa**, d'Orb., 1847. *Astrea sparsa*, Michelin, pl. 71, fig. 1. *Phyllocœnia sculpta*, Ed. et Haime. Uchaux.

**\*289<sup>e</sup>. Renauxiana**, d'Orb., 1849. Espèce à très-petits calices. Uchaux.

**COLUMELLASTREA**, d'Orb., 1847. C'est une *Columnastræa*, dont la columelle est styloforme; six palis autour.

- \***291. striata**, d'Orb., 1847. *Astrea striata*, Goldf., 1830, pl. fig. 11. Michelin, Icon. zoophyt., p. 301, pl. 71, fig. 6. *A. variolq* Michelin, pl. 71, fig. 7. Figuières (Bouches-du-Rhône), Le Beau (Var); Autriche Gozau.
- PHYLLOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.
- \***291'. varians**, d'Orb., 1847. *Astrea varians*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 23, pl. 5, fig. 8. *Astrea perforata*, Michelin, pl. 72, fig. Martigues, Uchaux.
- 292. Doublieri**, d'Orb., 1847. *Astrea Doublieri*. Michelin, p. 2 pl. 71, fig. 2. Martigues.
- 294'. grandis?** d'Orb., 1847. *Astrea grandis*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., pl. 6, fig. 3. Uchaux.
- \***293. striata?** d'Orb., 1847. *Stylina striata*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., pl. 6, fig. 5. *Astrea stylinoides*, Edwards et Haime, 1848 p. 412. Uchaux.
- \***295. cribraria**, d'Orb., 1847. *Astrea cribraria*, Michelin, 1841, Icon. zoophyt., p. 21, pl. 5, fig. 4. France, Uchaux.
- \***296. regularis**, d'Orb., 1847. Belle espèce à cellules d'un tiers plus petites que chez le *P. cribraria*. Soulage.
- \***297. Corbarica**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont plus petites et plus serrées que chez le *P. striata*. Soulage.
- \***298. glomerata**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules très-rapprochées bien plus que chez le *P. Corbarica*, qui est la plus voisine. Soulage.
- 299. sculpta**, Edwards et Haime, 1848. *Astrea sculpta*, Michelin 1847, Icon. zoophyt., p. 300, pl. 71, fig. 3. Martigues.
- SYNASTREA**, Edwards et Haime, 1848.
- \***300. subexcavata**, d'Orb. Espèce à cellules très-profondes, à cloisons crénelées. Uchaux.
- \***301. composita**, Edwards et Haime, 1849. *Cyathophyllum compositum*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc., 2<sup>e</sup> série, 3<sup>e</sup> vol, pl. 37, fig. Le Beausset (Var); Autriche, Gozau.
- \***302. agaricites**, Edwards et Haime, 1849. *Astrea media*, Sow 1831, Trans. geol. Soc., 3, pl. 37, fig. 5. *A. agaricites*, Goldf., 1830 Petref. Germ., pl. 22, fig. 9. *Astrea composita*, Michelin, pl. 70, fig. Uchaux, Bains-de-Rennes; Autriche, Gozau.
- \***303. Firmasiana**, Edwards et Haime, 1849. *Astrea id.*, Michelin 1847, Icon. zooph., p. 295, pl. 68, fig. 4. Soulage.
- \***304. Teissieriana**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1847 Icon. zooph., p. 300, pl. 71, fig. 4. Martigues.
- \***305. Corbarica**, d'Orb., 1847. *Astrea media*, Michel., 1847, pl. 70 fig. 4 (non *media*, Sow., 1831). France, Soulage, Bains-de-Rennes.
- \***306. cistela**, Edwards et Haime, 1849. *Astrea cistela*, DeFrance 1826, Dict., 42, p. 388. *Thamnastrea laganum*, Blainville, Dict., 60 p. 337. *Astrea laganum*, Michelin, 1841, Icon. zooph., pl. 4, fig. 9. *Astrea agaricites*, Michelin, pl. 4, fig. 10. *Astrea micrazona*, Michelin, pl. 4, fig. 11. Uchaux, Soulage, Le Beausset.
- \***307. lamellistria**, Edwards et Haime, 1849. *Astrea lamellistria* Michelin, 1841, Icon. zooph., pl. 4, fig. 8. France, Uchaux.
- \***308. Benauxiana**, d'Orb., 1847. Jolie espèce à cellules de 8 millimètres de diamètre, à seize cloisons au pourtour. Uchaux.

**309. Ataxensis**, d'Orb., 1847. Grande et belle espèce à cellules presque circonscrites par leurs bords saillants, à cloisons bifurquées. Soulage.

**media**, Edwards et Haime, 1849. *Astrea media*, Sowerby, Geol. Trans., 3, pl. 27, fig. 5. Gozau.

**Requieni**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1847, Icon., p. 302, pl. 71, fig. 8. France, Bains-de-Rennes.

**PHYLLASTREA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 37.

**310. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Grande et belle espèce à cellules médiocres, pourvues d'un grand nombre de cloisons serrées et fines. Le Beausset, Figuières.

**310'. Provencialis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine d'aspect de la précédente, mais avec des cellules d'un tiers plus petites. Le Beausset, Figuières.

**CENTRASTREA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 209.

**312. radiata**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules plus superficielles et plus saillantes au pourtour que chez l'espèce suivante. Soulage (Aude).

**313. irregularis**, d'Orb., 1847. Espèce à cellules peu distinctes, dont les lames sont confuses. Uchaux (Vaucluse).

**ACTINOCÆNIA**, d'Orb., 1848. C'est un *Phyllocœnia* à columelle styliforme.

**315. compressa**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 297, pl. 70, fig. 2. Soulage.

**315'. Dumasiana**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1847, Icon., p. 292, pl. 70, fig. 3. *Phyllocœnia pediculata*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 304. Corbières.

**ETEROCÆNIA**, Edwards et Haime, 1848.

**316. crasso-lamella**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 309. *Stylina idem*, Michelin, 1842, Icon. zoophyt., p. 25, pl. 7, fig. 7. Uchaux.

**317. provincialis**, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 309. *Stylina provincialis*, Michelin, 1842, Icon. zoophyt., p. 26, pl. 7, fig. 8. Uchaux.

**318. minima**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont la moitié de celles de l'espèce précédente. Le Beausset.

**318'. exigua**, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 308. *Lithodendron id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 305, pl. 72, fig. 7. Martigues.

**318". humilis**, d'Orb., 1849. *H. conferta*, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 308. *Lithodendron humile* (pars), Michelin, p. 291.

**HYDROPHORA**, Fischer, 1810. *Monticularia*, Lamarck.

**319. Styriana**, Edwards et Haime, 1849, *id.*, p. 304. *Monticularia id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 295, pl. 68, fig. 2. Gozau.

**320. Ataciana**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont la moitié moindres de celles de l'espèce précédente. Soulage.

**PACHYCYRA**, Edwards et Haime, 1848.

**321. Labyrinthica**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 284. *Lobophyllia idem*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 290, pl. 66, fig. 3. France, montagne des Cornes (Aude).

**MEANDRINA**, Lamarck, 1816.

**321'. Saltsburgiana**, Edwards et Haime, 1849, 11, p. 284. *M. tessella*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 293, pl. 66, fig. 5 (non Gold-

fuss, pl. 21, fig. 4). Bains-de-Rennes, Martignes, Figuières, Le Baset; Gozau.

\*322. *radiata*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 294, pl. fig. 3. Bains-de-Rennes (Aude), Martignes (Bouches-du-Rhône)

\*323. *Pyrenacea*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 294, pl. fig. 2. Bains-de-Rennes, Soulage.

\*324. *Renauxiana*, d'Orb., 1847. Espèce voisine pour l'aspect *M. radiata* mais à cloisons simples. Uchaux (Vaucluse).

324'. *Koninckii*, Edwards et Haime, 1849, loc. cit., 11, p. Gozau.

\*325. *Oceani*, d'Orb., 1847. Espèce avec l'aspect du *M. pyrena* mais sans cloison médiane dans ses vallées. Soulage.

**OULOPHYLLIA**, Edwards et Haime, 1848.

326. *Ataclana*, d'Orb., 1847. *Meandrina id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 293, pl. 69, fig. 1. Bains-de-Rennes.

\*327. *Reussiana*, d'Orb., 1847. *Astrea meandrinoides*, Reuss, II Böhm. Kreideform., p. 61, pl. 43, fig. 2. France, Soulage (Aude) Bohême, Koriczan.

\*328. *turbinata*, d'Orb., 1847. Espèce à très-grandes colles très-profondes. Soulage (Aude).

\*329. *Martiniana*, d'Orb., 1849. Espèce à collines très-élevées en crêtes, côtes très-fines. Figuières.

**DIPLORIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*330. *Neptuni*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cloisons sont inégales en largeur, à vallées profondes. Soulage.

330'. *crasso-lamellosa*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 11, p. 291. Uchaux.

**MEANDRASTREA**, d'Orb., 1849. Polypier composé, division à fissiparité, au lieu de bourgeonnement; une épithèque épaisse, peltée; des traverses nombreuses.

\*331. *pseudo-meandrina*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 18, pl. 4, fig. 7. Uchaux.

\*332. *crassisepta*, d'Orb., 1847. Espèce à cloisons bien plus grosses que chez la précédente, et à cellules moins larges. Soulage, Figuières.

\*333. *Arausiaca*, d'Orb., 1847. *Meandrina Arausiaca*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 27, pl. 6, fig. 8. Soulage.

\*334. *circularis*, d'Orb., 1847. *Agarcia circularis*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 295, pl. 68, fig. 3. Montagne des Cornes. Soulage.

\*335. *reticulata*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cloisons sont comme réticulées par leur croisement. France, Uchaux.

\*335'. *Requieni*, d'Orb., 1849. *Thecosmilia Requieni*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 272. *Lobophyllia Requieni*, Michelin, p. 18, pl. 4, fig. 6. Uchaux.

**HETEROPHYLLIA**, d'Orb., 1849. C'est une Symphyllie à calices et à parois latérales des colles.

336. *macroreina*, d'Orb., 1847. *Meandrina id.*, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 292, pl. 67, fig. 4. *Symphyllia id.*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 255. France, montagne des Cornes, Soulage.

**MICROPHYLLIA**, d'Orb., 1849.

337. *Ataclana*, d'Orb., 1849. *Meandrina Ataclana*, Michelin, 1847,



Icon, p. 293, pl. 69, fig. 1. *Lutomeandra Ataciana*, Edwards et Haime, 1849. Ann. des Sc. nat., 11, p. 271. Bains-de-Rennes.

**POLYTREMACEIS**, d'Orb., 1849.

\***338. Blainvilliana**, d'Orb., 1849. *Heliopora id.*, Michelin, 1842, Icon. zooph., n. 27, pl. 7, fig. 6. Uchaux (Vaucluse).

\***339. complanata**, d'Orb., 1849. Espèce en plaques, dont les cellules sont le double de l'espèce précédente. Uchaux.

\***345. micropora**, d'Orb., 1849. Espèce en lames, dont les cellules sont la moitié des cellules des espèces précédentes. France, Uchaux.

\***346. glomerata**, d'Orb., 1849. Espèce dont les calices sont bien plus rapprochés que chez les autres espèces. Uchaux.

**DACTYLACEIS**, d'Orb., 1849. Voy. p. 183.

\***346'. subramosa**, d'Orb., 1849. Espèce rameuse dont les cellules sont aussi le double du *P. Blainvilliana*. Uchaux.

\***346". Provencialis**, d'Orb. Espèce à calices saillants, petits. Fr., Figuières.

**ACTINACEIS**, d'Orb., 1849. Ensemble *dendroïde*; calices superficiels, espacés irrégulièrement, radiés en dedans; intervalle poreux.

\***347'. Martiniana**, d'Orb., 1849. Belle espèce rameuse, à tiges grêles. Figuières.

**PLEUROCCENIA**, d'Orb., 1849. C'est une *Actinocœnia* à calices couchés sur le côté, et dès lors obliques.

\***347. Provencialis**, d'Orb., 1849. Belle espèce dont les cellules sont en demi-lunes, obliques. Uchaux (Vaucluse).

**POLYTREMA**, Risso, 1826. Voy. t. 1, p. 323.

\***348. flabellum**, d'Orb., 1849. *Chaetetes id.*, Michelin, 1847, Icon. zooph., p. 306, pl. 72, fig. 9. France, Bains-de-Rennes, Mazaugues (Var).

\***349. Marticensis**, d'Orb., 1847. *C. irregulare*, Michelin, 1847, Icon. zooph., p. 306, pl. 73, fig. 2 (non Sow., 1839). France, Martigues, Mazaugues.

\***350. Coquandi**, Michelin, 1847, Icon. zoophyt., p. 306, pl. 73, fig. 3. France, Mazaugues.

**351. cretosa**, d'Orb., 1849. *Chaetetes id.*, Reuss, 846, Böhm., p. 63, pl. 43, fig. 4. Koriczan.

\***352. mamillata**, d'Orb., 1847. Espèce en gros mamelons arrondis. France, Le Beausset.

**353. catenifera**, d'Orb., 1847. *Calamopora catenifera*, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 23, fig. 8, p. 93. Bohême, Plänergb, Kutschlin.

**CRINOPORA**, d'Orb., 1849. Ensemble *dendroïde*; calices nombreux, rapprochés, saillants, entourés extérieurement de six saillies égales; intérieur creux avec des planchers.

\***353'. Massiliensis**, d'Orb., 1849. *Alveolites Massiliensis*, Mich., Icon. zooph., pl. 73, fig. 1. Le Beausset, Figuières.

**NULLIPORA**, Lamarck.

\***354. ramosissima**, d'Orb., 1847. Espèce à tiges grêles. Figuières, Martigues (Bouches-du-Rhône).

\***355. Provencialis**, d'Orb., 1847. Espèce formée de gros mamelons. Martigues.

- \***355. Marticensis**, d'Orb., 1847. Espèce à mamelons creusés au centre d'une dépression. Martigues, Figuières.

## FORAMINIFÈRES (d'ORB.).

**CONULINA**, d'Orb., 1825. Foraminifères de Vienne.

- \***356. irregularis**, d'Orb., 1847. Espèce longue de 12 millimètres, à loges étroites. France, Valmy, Dammartin, La Planchette, Gizaucourt (Marne).

**ALVEOLINA**, Bosc, d'Orb.

- \***357. compressa**, d'Orb., 1847. Espèce comprimée dans le sens de l'axe d'enroulement, ce qui lui donne la forme d'une Nummulite, et la fait prendre pour telle par quelques observateurs. Martigues, La Fare (Bouches-du-Rhône).

**BILOCULINA**, d'Orb., 1825. Foraminifères de Vienne.

- \***358. antiqua**, d'Orb., 1847. C'est la première espèce qui se soit montrée dans les mers, au moins à notre connaissance. Martigues (Bouches-du-Rhône), avec les Hippurites.

**TRILOCULINA**, d'Orb., 1847. Foraminifères de Vienne.

- \***359. cretacea**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. trigonula*, Martigues (avec les Hippurites).

## AMORPHOZOAIRES.

**HIPPALIMUS**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 209.

- \***360. pilula**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1842, Icon. zoophyt., p. 30, pl. 7, fig. 5. Uchaux.

**STELLISPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.

- \***361. pseudo-siphonia**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michel., 1842, Icon. zoophyt., p. 28, pl. 7, fig. 3. Uchaux.

- 362. sulcataria**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1842, Icon. zoophyt., p. 29, pl. 7, fig. 1. France, Châillon, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

**MEANDROSPONGIA**, d'Orb., 1847. Lames minces, méandriformes, comme fibreuses en travers.

- \***363. foliacea**, d'Orb., 1847. Espèce flabelliforme à surface seulement ridée. France, Montrichard (Loir-et-Cher).

**AMORPHOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 178.

- 364. vola**, d'Orb., 1847. *Spongia vola*, Michelin, 1842, Icon. zooph., p. 29, pl. 7, fig. 2. Uchaux.

- 365. sanguisuga**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1842, p. 29, pl. 7, fig. 4. Uchaux.

- 366. os ranae?** d'Orb., 1847. *Scyphia idem*, Leymerie, 1842, Mém. Soc. géol., p. 1, pl. 1, fig. 4. France, Saint-Parres (Aube).

## VINGT-DEUXIÈME ÉTAGE : — SÉNONIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITELLA**, d'Orb., 1840, Moll. viv. et foss., p. 446.

\*1. **mucronata**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 31, fig. 1-6; pl. 33, Terr. crét., pl. 7. *Bel. Americanus*, Morton. Meudon, Sens (Yonne), Epernay (Marne), Orglande, Golleville, Freville (Manche); Angl. Norfolk, Ashton-Moor; Hollande, Maëstricht; Suède, Balsberg; Oldembourg; Prusse, Aix-la-Chapelle; Hanovre, Peine; Russie, Donetz, Sembrisk; États-Unis, New-Jersey, Delaware, North-Carolina, Géorgie; Pologne, Krakau, Sandomir, Lublin, Letthaus; Volhynie (Pusch).

\*2. **quadrata**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 34, fig. 5-10. France, Reims, Sens, Hardivilliers; Angl., York; Visé (Belgique).

3. **ambigua**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 34, fig. 13-14. États-Unis (New-Jersey). Tember-Creek, Gloucester-County.

\*4. **subventricosa**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 31, fig. 7-12. Pal. étrang., pl. 27, f. 7-12. Suède, Ignaberga, Balsberg, île d'Ifo.

**RHYNCHOTEUTHIS**, d'Orb., 1846. Voy. t. 1, p. 326.

5. **Dutemplei**, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., p. 599. Chavot (Marne).

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 52.

\*6. **Dekayi**, Morion, 1827-1834, Synopsis of the org. Rem. The Cret. Group., p. 33, pl. 8, fig. 4. *N. perlatus*, Morton, pl. 13, fig. 4. *N. lævigatus*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 6, fig. 1 (non *lævigatus*, d'Orb., 1840.). *N. simplex*, Rømer (non Sow.). *N. sphaericus*, *N. lævigatus*, Forbes, 1846, Pondichéry. *N. Orbignyanus*, Forbes, 1846, in Darwin, pl. 5, fig. 1. Elle diffère du *N. lævigatus*, par le siphon plus interne. Faujas, pl. 21, fig. 1. Coutune-Néhou (Manche), Royan (Charente-Inférieure), Tours (Indre-et-Loire); Westphalie, Haldeim, Streplen; Hollande, Maëstricht; États-Unis, New-Jersey, Monmouth, Burlington (Alabama), Prairie Bluff; Amérique méridionale, Chili, île de Quiriquina; Indes-Orientales, Pondichéry, Verdachellum.

7. **Indicus**, d'Orb., 1847. *N. Sowerbyanus*, d'Orb., 1846, Géol. de l'Astrolabe, pl. 4, fig. 1, 2 (non *N. Sowerbyanus*, d'Orb., 1840). *N. Clementinus*, Forbes, 1846 (non d'Orb., 1840). Elle en diffère par le siphon bien plus près du dos de la coquille. Indes-Orientales, Pondichéry, Verdachellum; Amérique méridionale, Chili, île Quiriquina.

- 18. sinuato-punctatus?** Geinitz, 1813, Kreid., pl. 1, fig. 6, p. 1 lésie, Kreslingswalde.
- AMMONITES**, Bruguière, 1789. Voy. t. 1, p. 181.
- \***9. subtricarinatus**, d'Orb., 1847. *A. tricarinatus*, d'Orb., 1 Paléont. franç., 1, p. 307, pl. 91, fig. 1, 2 (non Poitiez, 1838). Fra Sougraine (Aude).
- 10. Lafresnayanus**, d'Orb., 1840, Pal., 1, p. 326, pl. 97, fig. Freville (Manche).
- 11. Verneuilianus**, d'Orb., 1840, Paléont. franç., Terr. créé p. 316, pl. 98, fig. 3-5. France, Freville (Manche)
- \***12. Pailletteanus**, d'Orb., 1840, Pal., 1, p. 339, pl. 102, fig. Soulage (Aude), Bidart (Basses-Pyrénées); Westphalie, Haldeim
- \***13. semiornatus**, d'Orb., 1847. Espèce très-aplatie; à tours brassants, lisses, tronqués sur la carène, et ornés de chaque côté cette partie de tubercules obliques. Tours, route de Paris.
- \***14. Nouelianus**, d'Orb., 1847. Coquille voisine de l'*A. vari* mais pourvue de côtes simples et d'une forte carène dorsale, bordée de deux sillons. St-Paterne (Indre-et-Loire).
- \***15. polyopsis**, Dujardin, 1837, Mém. de la Soc. géol., 2, p. pl. 17, fig. 12. Tours (Indre-et-Loire).
- \***16. Bourgeoisianus**, d'Orb., 1847. Belle espèce voisine de l'*A. varians*, mais pourvue de côtes simples, ornées chacune près du dos de trois ou quatre tubercules externes; une carène munie de longs latéraux. Villiedieu (Loir-et-Cher), Saint-Frimbault (Sarthe)
- \***17. Gollevillensis**, d'Orb., 1847. *A. Lewesiensis*, d'Orb., 1842. Paléont. franç., Terr. créé., pl. 101 et 102, fig. 1 (non Sowerby). Fra Golleville, Freville (Manche).
- \***18. Santonensis**, d'Orb., 1847. Espèce à tours enroulés comme chez l'*A. tumidus*, munie de côtes simples, à tours complètement brassants. Saintes (Charente-Inférieure), Saint-Germain près de Flèche (Sarthe).
- 19. Stobæi**, Nilss. Hisinger, 1837. Petref. Suec., p. 32, pl. 5. Su Köpingemölla, Svenstorpsmölla, Ignaberga.
- \***20. placenta**, Dekay, 1829, Ann. New-York, Lyc. nat. hist. pl. 5. Morton, 1834, Syn. Cret. group, p. 36, pl. 2, fig. 1, 2. États-Unis, New-Jersey, Delaware dans le canal de Chesapeake, rivière Tennessee.
- 21. Delawareensis**, Morton, 1834, Synopsis Cret. group, p. pl. 2, fig. 5. Americ. Journ., 18, pl. 2, fig. 4. États-Unis (Delaware) dans le canal de Chesapeake, Alabama.
- 22. Vanuxemi**, Morton, 1834, Synopsis, p. 38, pl. 2, fig. 3. Americ. Journ., 18, pl. 3, fig. 3, 4. États-Unis (Delaware), dans le canal de Chesapeake, (Espèce voisine de l'*A. Bourgeoisianus*, d'Orb.)
- 23. syrtalis**, Morton, 1834. Synopsis, p. 40, pl. 16, fig. 4. Espèce voisine de l'*A. polyopsis*. États-Unis (Alabama), Greene-County.
- 24. vespertinus**, Morton, 1834, Synopsis, p. 40, pl. 17, fig. 1. États-Unis Arkansas, plaine de Kamesha.
- \***25. Silimani**, d'Orb., 1847. Espèce à tours presque embrassée ornée de côtes sinueuses inégales, passant sur le dos. États-Unis Montagnes Rocheuses (M. Siliman).

- \***26. Danæ**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. polyopsis*, mais à six rangées de tubercules de chaque côté. États-Unis, Montagnes Rocheuses (M. Siliman).
- 27. bidorsatus**, Römer, 1841, Kreid., p. 88, n. 16, pl. 13, fig. 5. Allem., Dürmen et Blankenburg.
- \***28. Decheni**, Römer, 1841, Kreid., p. 85, n. 2, pl. 13, fig. 1. France, Rivière (Landes); Westphalie, Haldeim, Teutoburger Waldes, Strehlen.
- 29. Cottæ**, Römer, 1841, Kreid., p. 86, n. 6, pl. 13, fig. 4. Reuss, pl. 7, fig. 10. Allem., Töplitz et Oppeln; Bohême, Postelberg, Hundorf.
- 30. Geinitzii**, d'Orb., 1847. *A. Vibrayanus*, Geinitz, 1843. Nacht. Kreid., pl. 1, fig. 8, p. 8 (non d'Orbigny, 1841). Silésie, Kreslingswalde.
- 31. Vishnu**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7 p. 100, pl. 7, fig. 9. Peut-être *A. Brahama*, var., Forbes, pl. 8, fig. 1. Indes-Orientales, Pondichéry.
- 32. Kayei**, Forbes, 1846, *id.*, vol. 7, p. 101, pl. 8, fig. 3. Peut-être le même que l'*A. Sacia*, Forbes, pl. 14, fig. 10. Pondichéry, Verdachellum.
- 33. Chrishna**, Forbes, 1846, *id.*, vol. 7, p. 103, pl. 9, fig. 2. *A. yama*, Forbes, pl. 7, fig. 4. *A. Soma*, Forbes, 1846, pl. 7, fig. 6. *A. Garudæ* *id.*, pl. 7, fig. 1 (jeune). *A. Ganesa*, Forbes, 1846, pl. 7, fig. 8. Il faut encore y réunir probablement l'*A. Gaudama*, Forbes, pl. 10, fig. 3. Pondichéry.
- 34. Durga**, Forbes, 1846, *id.*, vol. 7, p. 104, pl. 7, fig. 11. *A. Cala*, Forbes, 1846, pl. 8, fig. 4. *A. Juilleti*, Forbes, pl. 7, fig. 2 (non d'Orbigny, 1841). Pondichéry.
- 35. Indra**, Forbes, 1846, *id.*, vol. 7, p. 104, pl. 7, fig. 1. *A. Varuna*, Forbes, 1846, pl. 8, fig. 5 (jeune). Pondichéry.
- 36. Indicus**, Forbes, 1846, *id.* vol. 7, p. 104, pl. 8, fig. 9, Pondichéry.
- 37. Siva**, Forbes, 1846, *id.*, p. 110, pl. 7, fig. 6. Pondichéry.
- 38. Menu**, Forbes, 1846, *id.*, p. 111, pl. 10, fig. 1. Pondichéry.
- 39. Remba**, Forbes, 1846, *id.*, p. 111, pl. 7, fig. 3. Pondichéry.
- 40. Egertoni**, Forbes, 1846, *id.*, t. 7, p. 108, pl. 9, fig. 1. Peut-être encore variété de l'*A. Christina*, Forbes. Pondichéry.
- 41. Cunliffei**, Forbes, 1846, *id.*, p. 109, pl. 8, fig. 2. Espèce voisine de l'*Am. bidorsatus*, Römer. *A. Pavana*, Forbes, pl. 7, fig. 5 (jeune). Pondichéry.
- 42. diphylloides**, Forbes, 1846, *id.*, t. 7, pl. 8, fig. 8. Pondichéry.
- 43. Surya**, Forbes, 1846, t. 7, p. 106, pl. 7, fig. 10. Pondichéry.
- 44. Nera**, Forbes, 1846, p. 106, pl. 8, fig. 7. Pondichéry.
- 45. Forbesianus**, d'Orb., 1847. *A. Rouyanus*, Forbes, 1846, t. 7, p. 108, pl. 8, fig. 6 (non d'Orbigny, 1841, qui n'est que le jeune de l'*Infundibulum*). Pondichéry.
- 46. Buddha**, Forbes, 1846, p. 112, pl. 14, fig. 10. Verdachellum.
- 47. sugata**, Forbes, 1846, p. 113, pl. 10, fig. 2. Verdachellum.
- 48. Gaudama**, Forbes, 1846, p. 113, pl. 10, fig. 3. Verdachellum.
- \***49. Ribourianus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. polyopsis*, mais avec le dos carré, et deux rangées latérales de tubercules aigus. France, Villedieu (Loir-et-Cher), M. Bourgeois.

- 50. Bifid.** Galeotti, 1839, Bull. de l'Acad. de Bruxelles, t. 7, n. 10, p. 7, 8. Mexique, Tehuacan.
- 51. reconditus**, Galeotti, 1839, *id.*, n. 10, p. 7, fig. 9. Tehuacan.
- SCAPHITES**, Parkinson, 1811. Voy. vol. 2, p. 100.
- \*52. compressus**, d'Orb., 1841, Paléont. franç., Terr. créf., 1, p. 517, pl. 128, fig. 4, 5. Soulage (Aude), Tercis, Rivière, Lesperon (Landes).
- \*53. constrictus**, d'Orb., Paléont., 1, p. 522, pl. 129, fig. 8-11. Sainte-Colombe (Manche), Prusse, Aix-la-Chapelle; Crimée (M. Duhois).
- \*54. Conradi**, d'Orb., 1847. *Ammonites Conradi*, *Angulosus* et *Petechialis*, Morton, 1834, Synopsis or g. Rem. the cret. group, p. 39, pl. 16, fig. 3; pl. 19, fig. 4. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- 55. Hippocrepis**, Dekay. *S. Cuvieri*, Morton, 1834, Synopsis, Cret. group., p. 41, pl. 7, fig. 1. *Amm. Hippocrepis*, Dekay. États-Unis (Delaware), canal de Chesapeake.
- 56. subreniformis**, Morton, 1834, Synopsis cret. group. p. 42, pl. 2, fig. 6 (non Brug., 1790). États-Unis (New-Jersey), près de Bordentown.
- \*57. ornatissimus**, d'Orb., 1847. Belle espèce striée en travers et pourvue près du dos de la coquille de deux rangées de tubercules comprimés de chaque côté. Haldeim.
- \*58. Geinitzii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *Scaphites obliquus*, mais pourvue de plis tuberculeux externes. *Scaph. æqualis*, Geinitz (non Sowerby). France, Villedieu (Loir-et-Cher); Dresde, Strehlem.
- 59. inflatus**, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 90, n. 4, pl. 14, fig. 3. Allemagne, Dülmen.
- \*60. binodosus**, Roemer, 1841, Nordd., p. 90, n. 5, pl. 13, fig. 6. Dülmen.
- 61. Roemerii**, d'Orb., 1847. *S. compressus*, 1841, Roemer, Nordd. Kreid., p. 91, n. 6, pl. 15, fig. 1 (non *compressus*, d'Orb., 1841). Ahlten.
- 62. plicatellus**, Roemer, 1841, Nordd., p. 91, n. 7, pl. 13, fig. 7. Lemförde.
- 63. pulcherrimus**, Roemer, 1841, Kreid., p. 91, n. 8, pl. 14, fig. 4. Allemagne, Lemförde, Aix-la-Chapelle.
- 64. ornatus**, Roemer, 1841, Kreid., p. 91, n. 9, pl. 13, fig. 8. Lemförde.
- ANCYLOCERAS**, d'Orb., 1842. V. vol. 1, p. 262.
- \*65. tenuisulcatus**, d'Orb., 1847. *Hamites id.*; Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7, p. 416, pl. 11, fig. 3; pl. 10, fig. 8. *Hamites Indicus*, d'Orb., 1846. Astrolabe, pl. 1, fig. 13, 14. Indes-Orientales, Pondichéry.
- BACULITES**, Lamarck, 1799. Voy. p. 66.
- \*66. incurvatus**, Dujardin, 1836. D'Orb., Paléont. franç., Terr. créf., 1, p. 564, pl. 139, fig. 8-10. Tours, à la Tranchée, Villedieu (Loir-et-Cher); Allemagne, Quedlimburg.
- \*67. Anceps**, Lamarck, 1822, d'Orb., Pal., 1, p. 565, pl. 139, fig. 1-7. *Baculites carinatus*, Morton, 1834, pl. 13, fig. 1. Astrolabe, pl. 1, fig. 8-12. Néhou; États-Unis, Alabama, Prairie Bluff; Amér. mér.,

Ile Quiriquina (Chili); Indes-Orientales, Pondichéry; États-Unis (Alabama).

- \*68. *ovatus*, Say, *B. compressus*. Say, Journ. Acad. nat. 6, pl. 5, fig. 5, 6. Morton, 1834, Syn. cret. group., p. 42, pl. 1, fig. 6-8; pl. 9, fig. 1. Amer. journ., 18, pl. 1, fig. 6-8. États-Unis, New-Jersey, Delaware, Alabama, Missouri.
- \*69. *Faujasii*, Lamk. Reuss, 1845, Böhm. Kreid., p. 24, pl. 7, fig. 3. Sow., M. C., pl. DLXXXII, fig. 1. Angleterre; Bohême, Priesen; Hollande, Maëstricht.
- \*70. *asper*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 43, pl. 1, fig. 12-13; pl. 13, fig. 2. États-Unis (Alabama), Cahawba, Prairie Bluff.
- \*71. *vagina*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7, p. 114, pl. 10, fig. 4 (non *Vagina*, Forbes, 1846, in Darwin, pl. 5, fig. 3). *Ornata*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 2. Indes-Orientales, Pondichéry.
- \*72. *Lyelli*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 3-7. *B. vagina*, Forbes, 1846, in Darwin, pl. 5, fig. 3 (non *vagina*, Forbes, in Trans. Pondichéry); Amér. mér., Ile Quiriquina (Chili).
- \*73. *teres*, Forbes, 1846, *id.*, t. 7, p. 115, pl. 10, fig. 5. Pondichéry.
- PTYCHOCERAS**, d'Orb., 1842. Voy. p. 66.
- \*74. *sipho*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 116, pl. 11, fig. 5. Indes-Orientales, Pondichéry.
- HAMITES**, Parkinson, 1811. Voy. p. 126.
- \*75. *constrictus*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 7, 8. Indes-Orientales. Pondichéry.
- \*76. *columna*, d'Orb., 1847. *Baculites id.*, Morton, 1834. Synopsis cret. group., p. 44, pl. 19, fig. 8 (peut-être le *Hamites larcesulcatus*, Forbes, de Pondichéry, n'en est-il qu'une variété). États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- \*77. *arculus*, Morton, 1834, Synopsis cret. group, p. 44, pl. 15, fig. 1, 2. États-Unis (Alabama), Greene County.
- \*78. *torquatus*, Morton, 1834, Synopsis, p. 45, pl. 15, fig. 4. Greene County.
- \*79. *trabeatus*, Morton, 1834, Synopsis cret. group, p. 45, pl. 15, fig. 3. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- \*80. *Carolinus*, d'Orb. Espèce voisine du *Simplex*, mais à côtés non interrompus. (*H. rotundus*, C. d'Orb., non *rotundus*, Sow.). Meudon.
- \*81. *Geinitzii*, d'Orb., 1847. *Hamites ellipticus*, Geinitz (non Mantell, 1822). Bohême, Wernböhla.
- \*82. *cylindraceus*, Defrance. D'Orb., Paléont., 1, p. 551, pl. 130. Sainte-Colombe (Manche); Hollande, Maestricht.
- \*83. *Indicus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc., t. 7, p. 116, pl. 11, fig. 4. *H. intermedius*, Roem., 1841, Nordd. Kreid., p. 92, n° 3, pl. 13, fig. 15 (non Sowerby). *H. acuticostatus*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 9-12. Prusse, Aix-la-Chapelle; Indes Orientales, Pondichéry.
- \*84. *strangulatus*, d'Orb., 1847. *H. intermedius*, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 17, fig. 35, p. 68 (non Sowerby). Allem., Strehlen.

- 85. consobrinus**, d'Orb., 1847. *H. rotundus*, Geinitz, 1842, *Ch. Kreid.*, pl. 12, fig. 7 a, p. 41 (non Sowerby). Strehlen.
- 86. alternans**, Gein., 1842, *Kreid.*, pl. 17, fig. 36, p. 68. Strehlen.
- 87. Reussianus**, d'Orb., 1847. *H. plicatilis*, Reuss, 1845, *Böhm. Kreid. form.*, p. 23, pl. 7, fig. 5, 6 (non Sow., M. C., pl. 234, Bohême, Priesen, Kystra et Wollenitz).
- 88. subcompressus**, Forbes, 1846, *Trans. geol. Soc. of Lond.*, t. 7, p. 116, pl. 11, fig. 6. *H. Indicus*, Forbes, 1846, pl. 11, fig. simplex. d'Orb., 1846, *Astrolabe*, pl. 3, fig. 15-17. Pondichéry.
- 89. rugatus**, Forbes, 1846, id., p. 117, pl. 11, fig. 2. Pondichéry.
- 90. Nerels**, Forbes, 1846, id., p. 117, pl. 10, fig. 7. Pondichéry.
- 91. undulatus**, Forbes, 1846, idem, p. 118, pl. 10, fig. 6. Pondichéry.
- TURRILITES**, Lam., 1801. *Voy.* t. 1, p. 213.
- \*92. plicatus**, d'Orb., *Pal.*, 1, p. 592, pl. 143, fig. 7, 8. Soulage.
- \*93. acuticostatus**, d'Orb., *Paléont.*, 1, p. 605, pl. 147, fig. Soulage.
- \*94. Archiacianus**, d'Orb., *Paléont.*, 1, p. 607, pl. 148, fig. Royan.
- \*95. Germaniæ**, d'Orb., 1847. Espèce à petits plis et pourvue plus de deux rangées de tubercules. Haldeim.
- 96. plicatilis**, d'Orb., 1847. *Hamites plicatilis*, Römer, 1841, *N. Kreid.*, p. 94, n° 16, pl. 14, fig. 7 (non *H. plicatilis*, Sow.). Allfeld, Berne, Strehlen, Oppeln.
- 97. Geinitzii**, d'Orb., 1847. *T. undulatus*, Geinitz, 1842, *Ch. Kreid.*, pl. 13, fig. 3, p. 42 et 67 (non Sow.). Bohême, Strehlen.
- 98. Reussii**, d'Orb., 1847. *T. Astierianus*, Reuss, 1845, *Böhm. Kreid.*, p. 24, pl. 7, fig. 7 (non d'Orb., 1840). Bohême, Kystra.
- HELIOCERAS**, d'Orb., 1842. *Voy.* t. 1, p. 213.
- 99. armatus**, d'Orb., 1847. *Hamites armatus*, Geinitz (non Sowerby). Espèce pourvue, de distance en distance, de côtes élevées pour de tubercules. Allem., Strehlen.
- 100. polyplocus**, d'Orb., 1847. *Turrilites polyplocus*, Geinitz, 1842, *Nacht. Kreid.*, pl. 5, fig. 4, p. 8 (non *T. polyplocus*, Römer). Allfeld, Strehlen.
- HETEROCERAS**, d'Orb., 1847. *Voy.* t. 2, p. 102.
- 101. polyplocus**, d'Orb., 1847. *Turrilites polyplocus*, Römer, 1841, *Nordd. Kreid.*, p. 92, n° 4, pl. 14, fig. 1, 2. Allemagne, Düren, Lemförde.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801. *Voy.* t. 2, p. 2.

- 102. Sillimani**, Morton, 1834, *Synopsis cret. Group*, p. 13, fig. 9. États-Unis (Alabama), prairie Bluff.
- 103. annulata**, Morton, 1834, *Synopsis*, p. 47, pl. 3, fig. 10. États-Unis (New-Jersey), Gloucester.
- 104. Chilensis**, d'Orb., 1842, *Paléont. de l'Amér. mérid.*, p. 14, fig. 1, 2. Ile de Quiriquina, près de la Concepcion (Chili).



- 105. costato-striata**, d'Orb., 1847. *Fusus idem*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 24, pl. 171, fig. 18. Allem., Haldem.
- \***106. decorata**, d'Orb., 1847. *Melania decorata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 82, pl. 12, fig. 11. Strehlen.
- 107. subundulata**, d'Orb., 1847. *Turritiles undulatus*, Reuss, 1845, Böhm. Kreid., p. 24, pl. 7, fig. 8, 9 (non Sow., Thesaur., 1844). Priesen, Kystra et Wollenitz.
- 108. undata**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 31. *Chemnitzia undosa*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 125, pl. 15, fig. 11 (non Sow.). Indes orientales, Verdachellum, Trinchinopoly.
- \***109. Auca**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 16, 17. Amér. mérid., île Quiriquina (Chili).
- 110. subturbinata**, d'Orb., 1847. *S. turbinata*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 124, pl. 12, fig. 18 (non Conrad, 1843). Pondichéry.
- TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 67.
- \***111. Renauxiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 41, pl. 152, fig. 1-4. Uchaux, Mandragon (Lignites), Plan-d'Aups, Cadière.
- \***112. Coquandiana**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 44, pl. 153, fig. 1, 2. Cadière, Plan-d'Aups, Martigues, Soulage; Autriche, Gosau.
- \***113. Bauga**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 45, pl. 152, fig. 3, 4. Cognac.
- \***114. vertebroides**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 47, pl. 3, fig. 13. États-Unis (New-Jersey et Alabama).
- 115. encrinoides**, Morton, 1834, Synops. cret. group, p. 47, pl. 3, fig. 7. États-Unis, Alabama.
- \***116. provincialis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. Coquandiana*, mais plus petite et ornée de quatre au lieu de trois côtes longitudinales. Le Beausset.
- \***117. excavata**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. Coquandiana*, mais à tours excavés au milieu entre deux côtes. Le Beausset.
- 118. biformis**, Sowerby, 1831, Trans. geol. Soc. of London, série 2<sup>e</sup>, t. 3, pl. 38, fig. 18. Goldf., pl. 97, fig. 8. Tyrol, Gosau.
- 119. rigida**, Sowerby, 1831, id., pl. 38, fig. 19. Gosau.
- 120. læviuscula**, Sowerby, 1831, id., pl. 38, fig. 20. Gosau.
- 121. paupercula**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 230, pl. 17, fig. 9. Tours (Indre-et-Loire).
- \***122. nodosa**, Römer, 1841, Kreid., p. 80, n° 1, pl. 11, fig. 20. *T. funiculosa*, Mathéron, 1847, Catalogue, p. 239, pl. 39, fig. 15. Plan-d'Aups, Le Beausset (Var); Blankenburg, Aix-la-Chapelle.
- 123. Nerinea**, Römer, 1841, id., p. 80, n° 2, pl. 11, fig. 21. Kieselingswalde.
- \***124. lineolata**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 80, n° 3, pl. 11, fig. 24. Lemförde und Ilseburg, Haldem.
- 125. sexlineata**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 80, n° 4, pl. 11, fig. 22. Blankenburg, Aix-la-Chapelle.
- 126. alternans**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 80, n° 5, pl. 11, fig. 23. Quedlinburg, Ilseburg, Aix-la-Chapelle.

- 127. Marticensis**, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 240, pl. 39, fig. 16. France, Martigues.
- 128. quadricincta**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 106, pl. 196, fig. 16. Prusse, Aix-la-Chapelle, Haldem.
- 129. quinquecincta**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 106, pl. 196, fig. 17. Prusse, Aix-la-Chapelle, Haldem.
- 130. Næggerathiana**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 107, pl. 197, fig. 1. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- \***131. sexcincta**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 107, pl. 197, fig. 2. Le Beausset (Var), Martigues, Saint-Christophe (Loire-et-Cher); Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 132. Decheniana**, Goldf., 1844, 3, p. 107, pl. 197, fig. 3. Glatz.
- 133. Eichwaldiana**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 107, pl. 197, fig. 4. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 134. Hagenoviana**, Münst., Goldf., 1844, 3, p. 108, pl. 197, fig. 5. Haldem.
- 135. velata**, Münster, Goldfuss, 1844, 3, p. 108, pl. 197, fig. 6. Haldem.
- 136. Buchiana**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 108, pl. 197, fig. 7. Allem., Büren, Westph.
- 137. Fittoniana**, Münst., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 109, pl. 197, fig. 10. Autriche, Gosau.
- 138. multistriata**, Reuss, 1845, Böhm. Kreid., p. 51, pl. 10, fig. 17, pl. 11, fig. 16. Allem., Priesen, Wollenitz, Postelberg.
- 139. acicularis**, Reuss, 1845, Böhm., p. 51, pl. 11, fig. 17. Luschitz, Priesen, Wollenitz, Postelberg, Meronitz.
- \***140. Pondicheriensis**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 123, pl. 13, fig. 4. *T. angulosa*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 27. Pondichéry.
- 141. Breantiana**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 36, 37. *T. monilifera*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 123, pl. 13, fig. 2 (non Desh., 1824). Pondichéry.
- 142. ventricosa**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 123, pl. 13, fig. 3. Pondichéry.
- 143. Sowerbyi**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 124, pl. 15, fig. 4. Indes orientales, Trinchinopoly.
- 144. subsimplex**, d'Orb., 1847. *T. simplex*, id., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 26 (non Grateloup). Pondichéry.
- \***145. Calypso**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 28-30. Pondichéry.
- VERMETUS**, Adanson, 1757.
- 146. anguis?** Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 124, pl. 13, fig. 1. Indes orientales, Pondichéry.
- EULIMA**, Risso, 1825. Voy. t. 1, p. 116.
- 147. antiqua**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 134, pl. 12, fig. 17. Indes orientales, Pondichéry.
- CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.
- \***148. Pailletteana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 69, pl. 155, fig. 19. France, Soulage.
- NERINEA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 263.

- 149. subpulchella**, d'Orb., 1847. *N. pulchella*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 89, pl. 161, fig. 4, 5 (non Bronn, 1836). Sainte-Baume.
- 149'. Marrotiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 96, pl. 163 bis, fig. 1, 2. France, Font-Barrade, près de Bergerac.
- \*150. bisulcata**, d'Arch., 1836. *N. Espaillaciana*, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 99, pl. 164, fig. 2. France, Royan, Saintes (Charente-Inférieure), Le Beausset (Var), Cognac (Charente); Amér. sept., Friedrichsburg (Texas).
- 152. ampla**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 45, pl. 176, fig. 10. Autriche, Salzburg.
- 153. pyramidalis**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 45, pl. 176, fig. 11. Autriche, Gosau.
- 154. cincta**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 45, pl. 176, fig. 12. Autriche, Gosau.
- 155. nobilis**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 45, pl. 176, fig. 9. Autriche, Salzburg.
- 156. incavata**, Bronn, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 46, pl. 177, fig. 1. Mühlenbach, Olapian.
- 157. crenata**, Münster, Goldfuss, 1843, 3, p. 46, pl. 177, fig. 2. Gosau.
- 158. turritellaris**, Münster, Goldf., 1843, 3, p. 46, pl. 177, fig. 3. Salzburg.
- 159. Bronnii**, Münster, Goldfuss, 1843, 3, p. 46, pl. 177, fig. 4. Gosau.
- 160. bicincta**, Bronn, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 46, pl. 177, fig. 5, Reuss, pl. 44, fig. 5? Bohême, Korizan; Autriche, Gosau, Wienerisch.
- 161. granulata**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 47, pl. 177, fig. 6. Autriche, Sonnenwend-Loche (Tyrol).
- 162. flexuosa**, Sowerby, 1831, pl. 38, fig. 16. Goldf., 1843, Petref., 3, p. 47, pl. 177, fig. 7. Autriche, Gosau.
- 163. Gelnitzii**, Goldf., 1843, 3, p. 47, pl. 177, fig. 8. Dresden.
- 164. Podolica**, Pusch, 1837, Polens, Paléont., p. 113, pl. 10, fig. 17. Pologne.
- 165. involuta**, Voltz, 1835, Jahrb., pl. 6, fig. 25, p. 552. Gosau.
- ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.
- 166. subsulcatus**, d'Orb., 1847. *Auricula sulcata*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, 2, p. 231, pl. 17, fig. 3 (non Desh., 1824). Envir. de Tours (Indre-et-Loire); Strehlem.
- 167. Reussii**, d'Orb., 1847. *Acteon elongatus*, Reuss, 1845, Böhm. Kreidform., p. 50, pl. 7, fig. 21 (non Sow., in Fitton). Priesen.
- 168. lineolatus**, d'Orb., 1847. *Phasianella lineolata*, Reuss, 1845, Böhm., p. 49, pl. 10, fig. 19; pl. 7, fig. 25. Laun, Trzibnitz, Meronitz.
- \*169. unidentatus**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 22-25. Pondichéry.
- 170. Curculio**, d'Orb., 1847. *Tornatella curculio*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 135, pl. 12, fig. 25. Pondichéry.
- 171. semen**, d'Orb., 1847. *Tornatella semen*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 135, pl. 15, fig. 2. Trinchinopoly.

- 172. subacutus**, d'Orb., 1847. *Ringicula acuta*, Forbes, 1846, Tr. geol. Soc. of London, t. 7, p. 136, pl. 15, fig. 3 (non Sow., 18 Inde orientale, Trinchinopoly).
- AVELLANA**, d'Orb., 1843. Voy. p. 68.
- \***173. Royana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 140, pl. 169, fig. 16. Royan.
- 174. bullata**, d'Orb., 1847. *Tornatella id.*, Morton, 1834, S. cret. group, p. 48, pl. 5, fig. 3. États-Unis (New-Jersey).
- 175. Archiaciana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., p. 137, pl. 169, fig. 7-9. Prusse, Bois d'Aix-la-Chapelle.
- 176. decurtata**, d'Orb., 1842. *Auricula decurtata*, Sowerby, 18 Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 10. Gosau.
- \***177. Chilensis**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 32-34. Am. mérid., Ile Quiriquina (Chili).
- 177'. labiosa**, d'Orb., 1847. *Tornatella labiosa*, Forbes, 1846, Tra. geol. Soc. of London, t. 7, p. 135, pl. 12, fig. 24. Pondichéry.
- ACTEONELLA**, d'Orb., 1843. Voy. p. 191.
- \***178. gigantea**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., pl. 165, fig. 1. Au Cas, près du Beausset, Ste-Baume; Autriche, Gosau, Neustadt.
- 179. Lamarckii**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 108. *Tornatella id.* Sow., 1835. Trans. geol. Soc., t. 3, pl. 39, fig. 16. Gosau, Neustadt.
- 180. Goldfussii**, d'Orb., 1847. *Tornatella Lamarckii*, Goldf., 18 Petref. Germ., pl. 177, fig. 10 (non Sow.). Autriche, Neustadt.
- 181. subglobosa**, d'Orb., 1847. *Tornatella subglobosa*, Münster Goldf., 1843, Petref., 3, p. 49, pl. 177, fig. 13. Grumbach et Waud.
- \***182. voluta**, d'Orb., 1847. *Tornatella voluta*, Münster, Goldf., 1843, p. 49, pl. 177, fig. 14. Le Beausset, Ste-Baume; Autriche, Gosau, OEstereich.
- 183. conica**, d'Orb., 1847. *Tornatella conica*, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 49, pl. 177, fig. 11. Autriche, Abtenau.
- GLOBICONCHA**, d'Orb., 1843, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 143.
- \***184. Fleuriausa**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 144, pl. 16, fig. 18. Royan.
- \***185. Marrotiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., p. 146, pl. 170, fig. 1, 2. France, La Couse, Beaumont.
- 186. ovula**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 145, pl. 170, fig. 3. La linde.
- \***187. elongata**, d'Orb., 1847. Belle espèce conique, trois fois plus longue de spire que les autres. Le Beausset (Var).
- \***188. oliva**, d'Orb., 1847. Petite espèce de la forme d'une olive lisse. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- PTERODONTA**, d'Orb., 1843. Voy. p. 149.
- \***189. ovata**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 317, pl. 218, fig. 3. Le Beausset.
- \***190. intermedia**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., p. 319, pl. 220, fig. 1. France, Soulage (Aude), Beausset (Var).
- \***191. pupoides**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 319. Soulage.
- \***192. scalaris**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 320. Soulage.

**VARIGERA**, d'Orb. Voy. p. 68.

\***193. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Coquille bien plus courte que les deux autres espèces des terrains crétacés. France, Le Beausset; Gosau.

**194. abbreviata**, d'Orb., 1848. *Tornatella abbreviata*, Philippi, 1846, Palæontographica, n° 1, p. 23, pl. 2, fig. 1. Tyrol, Gosau.

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

\***195. Royana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 165, pl. 174, fig. 6. Royan (Charente-Inférieure), Tours (Indre-et-Loire), Le Beausset (Var), Lanquais (Dordogne); Maëstricht.

\***196. petrosa**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 48, pl. 19, fig. 6. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.

\***197. Abyssina?** Morton, 1834, Synop. cret. group, p. 49, pl. 13, fig. 13. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.

\***198. Araucana**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 115, pl. 12, fig. 4, 5. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).

\***199. australis**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mér., p. 115, pl. 14, fig. 3-5. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).

\***200. Grangeana**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 18, 19. Amér. mérid., Ile de Quiriquina (Chili).

\***201. Chilina**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 24-26. Amér. mérid., Ile de Quiriquina (Chili).

**202. Matheroniana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 166, pl. 175, fig. 5, 6. France, Fondouille, près de Gignac.

**203. bulbiformis**, Sowerby, 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 13. Tyrol, Gosau.

**204. angulata**, Sowerby, 1831, *id.*, pl. 38, fig. 12. Gosau.

**205. subcarinata**, d'Orb., 1847. *N. carinata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 83, n° 2, pl. 12, fig. 15 (non Sow., 1836). Quedlinburg.

**206. acutimargo**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 88, n° 3, pl. 12, fig. 14. Quedlinburg, Dülmen.

**207. subrugosa**, d'Orb., 1847. *N. rugosa*, Høeninghaus, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 83, n° 1, pl. 12, fig. 16. Goldf., pl. 199, fig. 11. (non Gmelin, 1789). Quedlinburg, Strehlen; Hollande, Maëstricht.

**208. nodosa**, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 15, fig. 27, 28, p. 47. Gross-Sedlitz.

**209. dichotoma**, Geinitz, 1843, Nacht. Kreid., pl. 1, fig. 19, p. 10. Kieslingswalde.

**210. cretacea**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 119, pl. 199, fig. 12. Prusse, Aix-la-Chapelle, Coesfeld.

\***211. exaltata**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 120, pl. 199, fig. 13. Prusse, Aix-la-Chapelle, Aachen, Strehlen.

**212. subfasciata**, d'Orb., 1847. *N. fasciata*, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 120, pl. 199, fig. 14 (non Schumacher, 1817). Maëstricht.

\***213. Mariae**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 32, 33. *N. suturalis*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 137, pl. 15, fig. 1 (non Gray, 1839). Inde Orientale, Trinchinopoly.

**214. pagoda**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 136, pl. 12, fig. 14. *N. affinis*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 3. Pondichéry.

- 215. obliquestriata**, Forbes, 1846, *id.*, p. 186, pl. 12, fig. 12. Pondichéry.
- 216. rugosissima**, Forbes, 1846, p. 137, pl. 14, fig. 7. Verdachellum.
- 217. munita**, d'Orb., 1847. *Nerita munita*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 122, pl. 12, fig. 15. Pondichéry.
- 218. oviformis**, d'Orb., 1847. *Nerita oviformis*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 122, pl. 12, fig. 13. Pondichéry.
- 219. Rœmeri**, d'Orb., 1847. *Auricula spirata*, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 77, n° 5, pl. 11, fig. 4 (non Sow., 1821). Allem., Strehlen.
- NERITOPSIS**, Sow., 1825. Voy. t. 1, p. 172.
- \*220. lævigata**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 177, pl. 176, fig. 11, 12. Royan.
- 221. costulata**, d'Orb., 1847. *Nerita costulata*, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 82, n° 1, pl. 12, fig. 12. Allem., Dölzschen.
- NERITA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 214.
- 222. Goldfussii**, Keferstein, Goldf., 1844, Petr., 3, p. 115, pl. 198, fig. 20. Wienerisch-Neustadt.
- \*223. divaricata**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 43, 44. *N. ornata*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 121, pl. 13, fig. 5 (non Sow. Gen.). Pondichéry.
- 224. compacta**, Forbes, 1846, *id.*, p. 122, pl. 15, fig. 6. Trinchinopoly.
- 225. arquata**, d'Orb., 1847. *Pileopsis arquata*, Münster, 1843, Petref., 3, p. 12, pl. 168, fig. 13. Moule intérieur du *Nerita*. Appenzell.
- \*225'. Betzii**, Nilson, Faujas. Maëstricht.
- PHORUS**, Montfort, 1810.
- \*226. canaliculatus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 180, pl. 176, fig. 13, 14. Royan.
- \*227. leprosus**, d'Orb., 1847. *Trochus id.*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 46, pl. 15, fig. 6. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff, New-Jersey.
- TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.
- \*228. Marrotianus**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 187, pl. 177, fig. 15, 16. France, Royan, Riberac.
- \*229. difficilis**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 187, 191, pl. 177, fig. 17. Royan.
- \*230. Girondinus**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 188, pl. 178, fig. 1-3. Royan.
- \*231. Ligeriensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. Marrotianus*, mais à spire moins élevée, à tours évidés. Tours, Beausset.
- \*232. Bourgeoisii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. difficilis*, mais dont les tours sont plus bombés du côté de la bouche. Tours.
- 233. spiniger**, Sowerby, 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 15. Tyrol, Gosau.
- 234. Tunatus**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 231, pl. 17, fig. 7. France, env. de Tours (Indre-et-Loire).
- 235. Dujardini**, d'Orb., 1847. *T. simplex*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 231, pl. 17, fig. 8 (non DeFrance, 1828). Envir. de Tours.

- 236. planatus**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 81, n° 3, pl. 12, fig. 8. Osterfeld.
- 237. concinnus**, Römer, 1841, p. 81, n° 4, pl. 12, fig. 9. Strehlen.
- 238. costellifer**, Münst., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 59, pl. 181, fig. 8. Allem., Haldem.
- 239. Bronni**, Münst., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 59, pl. 181, fig. 9. Quedlinburg.
- 240. plicato-granulosus**, Münst., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 60, pl. 182, fig. 3. Sonnenwend-Joch (Tyrol).
- 241. Rajah**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 120, pl. 13, fig. 12. Inde orientale, Pondichéry.
- \*242. Arcotensis**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 120, pl. 13, fig. 9. *T. Jason*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 12-14. Pondichéry.
- \*243. radiatulus**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 120, pl. 13, fig. 11. *T. Castor*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 15-17. Pondichéry.
- 244. dictyotus**, d'Orb. *Pleurotomaria dictyota*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 112, pl. 44, fig. 19. Bohême, Meronitz.
- PITONELLUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 64.
- \*245. cretaceus**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 18-21. Inde-Orientale, Pondichéry.
- SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.
- 246. subangulatum**, d'Orb., 1847. *s. angulatum*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 48, pl. 7, fig. 24 (non Hisinger, 1837). Priesen.
- \*247. deperditum**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 9-11. Inde-Orientale, Pondichéry.
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.
- \*248. Boyanus**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 223, pl. 186, fig. 1. Royan.
- 248'. lapidosus**, d'Orb., 1847. *Delphinula id.*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 36, pl. 19, fig. 7. (Alabama), Prairie Bluff.
- \*249. Gnidus**, d'Orb., 1847. *Delphinula tricarinata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 81, n° 2, pl. 12, fig. 3-6 (non *tricarinatus*, Brocchi, 1814). Westphalie, Haldem, Lemford, Osterfeld, Ilseburg.
- \*250. bisulcatus**, d'Orb., 1847. *Trochus bisulcatus*, Goldf. Westp., Haldem.
- \*250'. subsulcifer**, d'Orb., 1847. *T. sulcifer*, Römer, 1841, Kreid., p. 81, n° 3, pl. 12, fig. 1 (non Eichwald, 1840). Westphalie, Haldem, Ilseburg.
- 251. arenosus**, Sowerby, 1831, Trans. geol. Soc. of London, série 2<sup>e</sup>, t. 3, pl. 38, fig. 14. Tyrol, Gosau.
- \*252. Iris**, d'Orb., 1847. *Delphinula lævis*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 231, pl. 17, fig. 4 (non Nilss., pl. 3, fig. 2. *Trochus lævis*). Tours (Indre-et-Loire).
- 253. trochleatus**, d'Orb., 1847. *Monodonta trochleata*, Dujardin, 1837, *id.*, t. 2, p. 231, pl. 17, fig. 5 a, b. Tours.
- 254. coronatus**, d'Orb., 1847. *Delphinula coronata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 81, n° 1, pl. 12, fig. 2. Allem., Rügen.

- 255. plicato-carinatus**, d'Orb., *Trochus idem*, Goldf., 1844, I tref., 3, p. 59, pl. 181, fig. 11. Westphalie.
- 256. tuberculato-cinctus**, d'Orb., 1847. *Trochus idem*, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 60, pl. 181, fig. 12. Allem., Haldem.
- \*257. sublævis**, d'Orb., 1847. *Trochus lævis*, Nilsson, 1827. Goldf., 1844, Petref., 3, p. 60, pl. 181, fig. 13 (non *lævis*, Turton, 1819, n Dujardin, 1837). Westphalie, Haldem, Lemförde.
- 258. Nilssoni**, d'Orb., 1847. *Trochus Nilssoni*, Münster., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 58, pl. 181, fig. 6. Haldem.
- 259. Buchii**, d'Orb., 1847. *Trochus Buchii*, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 60, pl. 182, fig. 1. Westph., Lemförde.
- 260. alternans**, d'Orb., 1847. *Trochus alternans*, Münster., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 60, pl. 182, fig. 2. Allem., Haldem.
- 261. amatus**, d'Orb., 1847. *Trochus Basteroti*, Goldf., 1844, I tref., 3, p. 58, pl. 181, fig. 7 (non Brongniart, 1821). Allem., Haldem, Strehlaköpingen.
- 262. rotelloides**, d'Orb., 1847. *Trochus rotelloides*, Forbes, 1844, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 120, pl. 13, fig. 10. Pondichéry.
- 263. subsculpta**, d'Orb., 1847. *Littorina sculpta*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 49, pl. 10, fig. 16 (non *Turbo sculptus*, Sow., 1825, C., pl. 395, fig. 2 du London Clay). Luschnitz et Priesen.
- 264. scrobiculatus**, Reuss, 1845, Böhm., p. 48, pl. 10, fig. 1 Kustschlin.
- 265. Bohemensis**, d'Orb., 1847. *Turbo obtusus*, Reuss, 1845, Böhm., p. 48, pl. 10, fig. 10 (non *T. obtusus*, Sow., non d'Orb., 1844, Kustschlin).
- 266. subinflatus**, Reuss, 1845, Böhm., p. 49, pl. 11, fig. 12. Meranitz.
- PHASIANELLA**, Lamarck, 1802. Voy. t. 1, p. 67.
- \*267. supracretacea**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 234, pl. 187, fig. 4. France, Royan (Charente-Inférieure), Villeneuve (Loir-et-Cher), Lanquais (Dordogne), dans les silex.
- \*268. Royana**, d'Orb., 1847. Petite espèce allongée, à tours saillants dans le moule. Royan.
- \*269. Haleana**, d'Orb., 1847. Petite espèce bien plus courte que la *Ph. supracretacea*. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- \*270. lamellosa**, d'Orb., 1847. *Natica lamellosa*, Römer, 1841, Kreid., p. 83, n° 4. pl. 12, fig. 13. Kieslingswalde.
- PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.
- \*271. Fleuriausa**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 265, pl. 201, fig. 5, 6. Pérignac.
- \*272. Marrotiana**, d'Orb., 1842, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 267, pl. 202, fig. 5, 6. France, Riberac, Royan.
- \*273. Royana**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 269, pl. 202, fig. 5, 6. Royan.
- \*274. turbinoïdes**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 270, pl. 204. Royan, Montignac, Birac, Beausset, Saintes, Rochefort, Cognac, Villavard (Loir-et-Cher).
- \*275. Espallaciana**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 271, pl. 205, fig. 1, 2. Royan.



- 276. crotaloides**, d'Orb., 1847. *Cirrus id.*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 49, pl. 19, fig. 5. États-Unis, Alabama.
- \***277. Santonesa**, d'Orb., 1842, Paléont., 2, p. 258, pl. 198. Saintes, Pérignac, Cognac, Soulage, Montignac, Tours, Villedieu.
- 278. secans**, d'Orb., 1842, Pal., 2, p. 261, pl. 200, fig. 1-4. Cognac.
- \***279. Bourgeoisii**, d'Orb., 1847. Grosse espèce presque lisse, dont le canal est très-marqué. France, Villavard (Loir-et-Cher).
- \***280. Goldfussii**, d'Orb., 1847. *P. distincta*, Goldf., 1844, Petr. Germ., pl. 187, fig. 1 (non Dujardin, 1837). Westphalie, Haldem.
- \***281. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Grosse espèce carénée, lisse, assez peu élevée, à large ombilic. Le Beausset (Var).
- 282. quadrata**, d'Orb., 1847. *Solarium quadratum*, Sowerby, 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 17. Gosau.
- \***283. distincta**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 231, pl. 17, fig. 6 a, b. France, env. de Tours.
- 284. regalis**, d'Orb., 1847. *Trochus regalis*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 81, n<sup>o</sup> 5, pl. 12, fig. 7. Allem., Lemförde et Ilseburg.
- 285. velata**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 75, pl. 187, fig. 2. Allem., Haldem, Coesfeld, Lemförde.
- 286. granulifera**, Münst., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 76, pl. 187, fig. 3. Allem., Haldem.
- \***287. plana**, Münst., Goldf., 1844, Petref., 3, p. 76, pl. 187, fig. 4. Allem., Haldem.
- 288. disticha**, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 76, pl. 187, fig. 5. Coesfeld, Lemförde.
- 289. subgigantea**, d'Orb., 1847. *P. gigantea*, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 76, pl. 187, fig. 6 (non Sowerby, 1837). Aix-la-Chapelle.
- 290. fuuata**, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 47, pl. 10, fig. 11. Meronitz, Priesen.
- 291. clathrata**, d'Orb., 1847. *Catantostoma clathratum*, Sandb., 1847, Goldf., 1844, Petref., 3, p. 78, pl. 188, fig. 2. Villmar.
- 292. Verdachellensis**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 121, pl. 14, fig. 8. Inde-Orientale, Verdachellum.
- 293. Indica**, Forbes, 1846, *id.*, p. 121, pl. 13, fig. 13. Pondichéry.
- OVULA**, Bruguière, 1791.
- 294. Marticensis**, d'Orb., 1847. *Cypræa Marticensis*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 255, pl. 40, fig. 21. Martigues (B.-du-Rhône).
- 295. antiquata**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 4-6. *Cypræa Cunliffei*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 134, pl. 12, fig. 22. Espèce voisine de l'*O. Marticensis*, de France. Pondichéry.
- 296. Kayei**, d'Orb., 1847. *Cypræa Kayei*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 133, pl. 12, fig. 20. Pondichéry.
- 297. incerta**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 7, 8. *Cypræa Newboldi*, Forbes, 1846, *id.*, p. 134, pl. 12, fig. 21. Espèce voisine de l'*O. ventricosa*, d'Orb. de Bohême. Pondichéry.
- CONUS**, Linné, 1758. D'Orb., Paléont. franç., Terr. créét., 2, p. 320.
- 298. tuberculatus**, Dujardin, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 321, pl. 220, fig. 2. Tours.

**309. gyratus**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 49, pl. 10, fig. 13. États-Unis, Caroline du sud.

**300. Marticensis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 257, pl. 40, fig. 24, 25. France, Martigues (B.-du-Rhône).

**VOLUTA**, Linné, 1758.

\***301. Lahayesi**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 327, pl. 221, fig. 4. Saint-Christophe (Indre-et-Loire), Lanquais (Dordogne) dans les silex.

**302. subacuta**, d'Orb., 1847. *V. acuta*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 31 (non Risso, 1826). Tyrol, Gosau.

**303. pyruloides**, Mathéron, 1843, Cat., p. 254, pl. 40, fig. 19, 20. France, Plan d'Aups (B.-du-Rhône).

**304. deperdita**, Goldf., 1843, 3, p. 14, pl. 169, fig. 1. Maestricht.

**305. citharina**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 132, pl. 12, fig. 8 a, b. Inde-Orientale, Pondichéry.

**306. radula**, Sow., Forbes, 1846, *id.*, p. 133, pl. 12, fig. 9. Pondichéry.

**307. septemcostata**, Forbes, 1846, *id.*, p. 131, pl. 12, fig. 3. Pondichéry.

**308. submuricata?** d'Orb., 1847. *V. muricata*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc., t. 7, p. 131, pl. 12, fig. 4 (non Born, 1780). Pondichéry.

**309. Camdeo?** Forbes, 1846, *id.*, p. 131, pl. 12, fig. 5 a, b. Pondichéry.

**310. cincta**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 132, pl. 12, fig. 6. Inde-Orientale, Pondichéry, Trinchinopoly.

**311. Trinchinopolitensis**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 133, pl. 15, fig. 5. Trinchinopoly.

**312. pyriformis**, Forbes, 1846, *id.*, p. 130, pl. 12, fig. 1. Pondichéry.

**MITRA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 154.

**313. cancellata**, Sow., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 30. Tyrol, Gosau.

**314. reticulata**, d'Orb., 1847. *Cerithium reticulatum*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 79, n° 3, pl. 11, fig. 18. Allem., Strehlen.

**315. clathrata**, Reuss, 1845, Böhm., p. 44, pl. 11, fig. 13. Moronitz.

**316. Römeri**, d'Orb., 1847. *Fasciolaria Römeri*, Reuss, 1846, Böhm., p. 111, pl. 9, fig. 10; pl. 44, fig. 17. Bohême.

**PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.

\***317. supracretacea**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 309, pl. 216, fig. 3. Royan.

\***318. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Assez grosse espèce voisine du *P. pelagi*, mais moins sillonnée. France, Le Beausset.

**319. pseudobicarinata**, d'Orb., 1847. *Buccinum bicarinatum*, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 30, pl. 173, fig. 5 (non d'Orb., 1843). Halden.

**ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 2, p. 71.

- 320.** *Pyrenaica*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. cré., 2, p. 295, pl. 210, fig. 3. France, près des Bains-de-Rennes.
- 321.** *arcuatum*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 48, pl. 5, fig. 8. États-Unis, New-Jersey.
- 322.** *pinnata*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 48, pl. 19, fig. 9. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- 323.** *subcostata*, d'Orb., 1847. *R. costata*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 21; Goldf., pl. 170, fig. 9 (non DeFrance, 1827). Tyrol, Gosau.
- 324.** *plicata*, Sow., 1831, *id.*, pl. 38, fig. 22. Gosau.
- 325.** *granulata*, Sow., 1831, *id.*, pl. 38, fig. 23. Gosau.
- 326.** *laeviuscula*, Sow., 1831, *id.*, pl. 38, fig. 24. Gosau.
- 327.** *acutirostris*, Pusch, 1837, Polens, Paléont., p. 128, pl. 11, fig. 14. Pologne, Kadzimirz.
- 328.** *Buchii*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 78, no 5, Münst., pl. 12, fig. 1. *Chenopus Buchii*, Münst., Goldf. Haldem, Coesfeld, Strehlen.
- 329.** *Schlotheimii*, Römer, 1841, Kreid., p. 77, n° 2, pl. 11, fig. 6. Westphalie, Haldem, Aix-la-Chapelle.
- 330.** *turrita*, d'Orb., 1847. *Buccinum turritum*, Römer, 1841, Kreid., p. 79, n° 1, pl. 11, fig. 19. Allem., Strehlen.
- 331.** *subelongata*, d'Orb., 1847. *R. elongata*, Römer, 1841, Kreid., p. 78, n° 3, pl. 11, fig. 5 (non Sow., 1836). Prusse, Aix-la-Chapelle; Strehlen.
- 332.** *coarctata*, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 18, fig. 10, p. 71. Reuss, pl. 9, fig. 1. Luschütz.
- 333.** *Westphalica*, d'Orb., 1847. *R. Parkinsoni*, Gein., 1842, Charak. Kreid., pl. 15, fig. 1, 2; pl. 18, fig. 3, p. 44 et 70 (non Mantell). Westphalie, Strehlen.
- 334.** *Vespertillo*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 18, pl. 170, fig. 5. Glatz, Haldem.
- 335.** *stenoptera*, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 19, pl. 170, fig. 6. Prusse, Aix-la-Chapelle, Bochum.
- 336.** *striata*, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 19, pl. 170, fig. 7. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 337.** *tenuistriata*, Reuss, 1845, Böhm., p. 45, pl. 9, fig. 4. Wollenitz.
- 338.** *megaloptera*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 45, pl. 9; fig. 3. Priesen, Wollenitz, Postelberg.
- 339.** *divaricata*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 46, pl. 9, fig. 2; pl. 7, fig. 23. Priesen.
- 340.** *subsubulata*, d'Orb., 1847. *R. subulata*, Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 46, pl. 9, fig. 8 (non Schum., 1817). Priesen, Wollenitz et Luschitz.
- 341.** *papilionacea*, Goldf., Petref., 3, p. 18, pl. 170, fig. 8; Reuss, 1845, Böhm. Kreideform., p. 44, pl. 9, fig. 6. *Buccinum costatum*, Goldf., pl. 173, fig. 4. Luschitz.
- 342.** *semilineata*, d'Orb., 1847. *Pleurotoma idem*, Goldf., Petref., 3, p. 19, pl. 170, fig. 13. Bilin.

- 343.** *securifera*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 1, p. 128, pl. 13, fig. 17. Inde-Orientale, Pondichéry.
- 344.** *palliat*a, Forbes, 1846, Trans., t. 7, p. 128, pl. 13, fig. 1. *Fusus Fontanieri*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 6, 7. Pondichéry.
- 345.** *elator*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 1. Pondichéry.
- 346.** *ovata*, d'Orb., 1847. *Rostellaria ovata*, Münst., Goldf., 41 Petref., 3, p. 18, pl. 170, fig. 3. Haldem.
- FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- \*347.** *Espallaci*, d'Orb., 1843, 2, p. 340, pl. 224. Royan.
- \*348.** *Royanus*, d'Orb., 1847. *F. turritellatus*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 341, pl. 225, fig. 1. *Turbo idem*, d'Archiac (non *Fusus turritella* Deshayes), Morée. Royan.
- 349.** *Marroffianus*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., p. 342, pl. 225, fig. 3. France, près de Couse.
- \*350.** *Fleuriaus*, d'Orb., 1843, Paléont., 2, p. 343, pl. 1, fig. 1. *Fusus nodosus*, Reuss, 1845, Bohême, pl. 10, fig. 1. Roy Bohême, Kutschlin.
- \*351.** *Nereis*, d'Orb., 1847. Espèce presque lisse, pyrulifon allongée. France. Royan.
- \*352.** *Haleanus*, d'Orb., 1847. Espèce courte, large, dont les t. sont plissés. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- \*353.** *Alabamensis*, d'Orb., 1847. Coquille plus longue que précédente, à côtes longitudinales. (Alabama), Prairie Bluff.
- \*354.** *brevissimus*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *F. longitris*, d'Orb., du Chili, mais encore plus courte et carénée. États-Unis (Alabama), Prairie Bluff.
- 355.** *subheptagonus*, d'Orb., 1847. *F. heptagonus*, Sow., 11 Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 23 (non Lam., 1804). Gosau.
- 356.** *subcarinella*, d'Orb., 1847. *F. carinella*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 24 (non Min. Cor Table). Gosau.
- 357.** *subabbreviatus*, d'Orb., 1847. *F. abbreviatus*, Sow., 11 Trans., 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 26 (non Lam., 1804). Tyrol, Gosau.
- 358.** *cingulatus*, Sow., 1831, *id.*, pl. 39, fig. 27. Gosau.
- 359.** *subplicatus*, d'Orb., 1847. *F. plicatus*, Römer, 1841, Kreid., p. 79, n° 1, pl. 11, fig. 15 (non Lam., 1804). Coesfeld et Osterfeld.
- 360.** *planulatus*, d'Orb., 1847. *Pyrula planulata*, Römer, 11 Nordd. Kreid., p. 78, n° 1, pl. 11, fig. 11; Nilss., pl. 3, fig. 5. Coësl Ilseburg.
- 361.** *carinatus*, d'Orb., 1847. *Pyrula carinata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 78, n° 2, pl. 11, fig. 12 (non Lam., 1822). Lemförde.
- 362.** *subcostatus*, d'Orb., 1847. *Pyrula costata*, Römer, 11 Nordd. Kreid., p. 79, n° 4, pl. 11, fig. 10; Geinitz, pl. 16, fig. 4, 5 (non Mägnag, 1803). Quedlinburg, Strehlen.
- 363.** *subsemicostatus*, d'Orb. *Conus semicostatus*, Münst. Gol., 1843, Petref., 3, p. 14, pl. 169, fig. 2 (non Bronn, 1835). Westphalie, Haldem.

- 364. subsemiplicatus**, d'Orb. *Pleurotoma semiplicata*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 20, pl. 170, fig. 11 (non Desh., 1824). Allem., Haldem.
- 365. suturalis**, d'Orb., 1847. *Pleurotoma suturalis*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 20, pl. 170, fig. 12. Allem., Coesfeld.
- 366. propinquus**, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 23, pl. 171, fig. 16. Haldem.
- 367. Proserpinæ**, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 23, pl. 171, fig. 17. Haldem.
- 368. carinatus**, d'Orb., 1847. *Pyrula carinata*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 27, pl. 172, fig. 11. Allem., Coesfeld.
- 369. depressus**, d'Orb., 1847. *Pyrula depressa*, Münst., Goldf., 1843, 3, p. 27, pl. 172, fig. 12. Espèce voisine du *F. brevissimus*, des États-Unis. Allem., Coesfeld.
- 370. Cottæ**, d'Orb., 1847. *Pyrula cottæ*, Römer, 1841, Kreid., p. 79, n. 6, pl. 11, fig. 9. Strehlen, Bohême; Priesen.
- 371. depauperatus**, Reuss, 1845, Böhm., p. 44, pl. 12, fig. 7. Priesen.
- 372. subcarinifer**, d'Orb., 1847. *F. carinifer*, Reuss, 1845, Böhm. Kreid., p. 43, pl. 9, fig. 13 (non Bronn., 1831). Bohême, Priesen.
- 373. Nereidis**, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 24, pl. 171, fig. 20. Haldem (Westph.).
- \*374. difficilis**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 118, pl. 12, fig. 11-12. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).
- \*375. longirostra**, d'Orb., 1847. *Pyrula longirostra*, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mér., p. 119, pl. 12, fig. 13. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).
- \*376. Chininus**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 29. Amér. mér., Ile de Quiriquina (Chili).
- 377. Hombroniana**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 31. Amér. mér., Ile de Quiriquina (Chili).
- \*378. Durvillei**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 1. Amér. mérid., Ile Quiriquina (Chili).
- 379. ponderosus**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 33. Pondichéry.
- \*380. subbuccinoides**, d'Orb., 1847. *B. buccinoides*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 41-42 (non Grateloup). Indes-Orientales, Pondichéry.
- 381. purpuriformis**, d'Orb., 1847. *Voluta purpuriformis*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 130, pl. 12, fig. 2. Indes-Orientales, Pondichéry.
- 382. subcancellatus**, d'Orb., 1847. *Rostellaria cancellata*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 128, pl. 13, fig. 18 (non Sow, 1826). Indes-Orientales, Pondichéry.
- 383. subincertus**, d'Orb., 1847. *Phasianella incerta*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 123, pl. 13, fig. 8 (non Deshayes, 1824). Indes-Orientales, Trinchinopoly.
- 384. Forbesianus**, d'Orb., 1847. *Pyrula cancellata*, Sow., Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 128, pl. 15, fig. 12 (non Sow.). Indes-Orientales, Trinchinopoly.

- 385. atavus**, d'Orb., 1847. *Triton atavus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 126, pl. 13, fig. 14. Pondichéry.
- 386. fluctuosus**, d'Orb., 1847. *Murex fluctuosus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 126, pl. 13, fig. 19. Pondichéry.
- 387. Pondicherriensis**, d'Orb., 1847. *Murex idem*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 127, pl. 13, fig. 20. Pondichéry.
- 388. breviplicatus**, d'Orb., 1847. *Voluta breviplicata*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 132, pl. 12, fig. 7, a, b. Pondichéry.
- PYRULA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.
- 389. minima**, Høeningh., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 27, pl. 172, fig. 10. Aix-la-Chapelle.
- 390. fenestrata**, Römer, 1841, Kreid., p. 73, n. 5, pl. 11, fig. 14. Blankenburg.
- 391. Pondicherriensis**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 127, pl. 12, fig. 19. *P. Carolina*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 36-37. Pondichéry.
- PLEUROTOMA**, Lamarck, 1801.
- 392. induta**, Goldf., 1843, 3, p. 20, pl. 170, fig. 10. Haldem.
- 393. subfusiformis**, d'Orb., 1847. *P. fusiforme*, Sowerb., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 20 (non Sow., 1823). Tyrol, Gosau.
- 394. subspinosa**, d'Orb., 1847. *P. spinosa*, Sow., 1831, *id.*, t. 3, pl. 39, fig. 21 (non Defrance, 1826). Tyrol, Gosau.
- \*395. Araucana**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 119, pl. 14, fig. 10-11. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).
- MUREX**, Linné, 1758.
- 396. Trinchinopolitensis?** Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 127, pl. 15, fig. 7. Indes-Orientales, Trinchinopoly.
- CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.
- 397. Perigordianum**, d'Orb., 1847. *Nerinea id.*, d'Orb., 1842, Pal. franç., Terr. crét., 2, p. 96, pl. 163 bis, fig. 3-4. Laveyssière.
- \*398. Benauxianum**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 373, pl. 231, fig. 2. France, lignites de Piolen (Vaucluse).
- \*400. provinciale**, d'Orb., 1843, Paléont., 2, pl. 233, fig. 3. Corbières (Aude).
- \*401. Toucasianum**, d'Orb., 1847. Coquille courte, conique, pourvue de côtes obliques, tours étroits sans dents intérieures. France, Le Castelet, près du Beausset (Var), Pons (Charente-Inférieure).
- \*402. Royanum**. Très-grande espèce à points d'arrêts partiels. Royan (Charente-Inférieure).
- 403. reticosum**, Sow., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, vol. 3, pl. 39, fig. 17. Tyrol, Gosau.
- 404. pseudo-conoideum**, d'Orb., 1847. *C. conoideum*, Sow., 1831, *id.*, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 18 (non Lamarck, 1804). Tyrol, Gosau.
- 405. pustulosum**, Sow., 1831, *id.*, t. 3, pl. 39, fig. 19. D'Orb., Paléont., 2, p. 381, pl. 133, fig. 4. Soulages (Aude), Gosau.

- 406.** *submuricatum*, d'Orb., 1847. *Fusus muricatus*, Sow., 1831, id., t. 3, pl. 39, fig. 25 (non Brug., 1790). Gosau.
- 407.** *carinatum*, d'Orb., 1847. *Nassa carinata*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 28. Gosau.
- 408.** *affine*, d'Orb., 1847. *Nassa affinis*, Sowerb., 1831, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 29. Gosau.
- 409.** *pseudocoronatum*, d'Orb. *Terebra coronata*, Sow., 1831, Trans., 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 39, fig. 324 (non Desh., 1824.) Gosau.
- 410.** *pseudoclathratum*, d'Orb., 1847. *C. clathratum*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 79, n. 1, pl. 11, fig. 17 (non Desh., 1824.) Allem., Strehlen.
- 411.** *binodosum*, Römer, 1841, p. 79, n. 2, pl. 11, fig. 16. Strehlen.
- 412.** *Dechenii*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 34, pl. 174, fig. 2. Allem., Haldem en Westph.
- 413.** *Nerei*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 34, pl. 174, fig. 3. Allem., Haldem en Westph.
- 414.** *subimbricatum*, d'Orb., 1847. *C. imbricatum*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 34, pl. 174, fig. 4 (non Brug., 1790). Haldem.
- 415.** *amictum*, d'Orb., 1847. *Fusus amictus*, Münst., Goldf., 1843, Petref., 3, p. 24, pl. 171, fig. 19. Allem., Hæthausen, Büren.
- 416.** *Luschitzianum*, Geinitz, Caract., pl. 18, fig. 21. *C. trimonile*, Reuss (non Mich.). Bohême, Meronitz.
- 417.** *subfasciatum*, d'Orb., 1847. *C. fasciatum*, Reuss, 1845, Böhm., p. 42, pl. 10, fig. 4 (non Brug., 1790). Meronitz, Priesen, Trziblit.
- 418.** *tessulatum*, Reuss, 1845, Böhm., p. 43, pl. 10, fig. 6. Horzenz.
- 419.** *Fontanieri*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 2. Pondichéry.
- 420.** *Trinchinopolytense*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 126, pl. 15, fig. 10. Indes orientales, Trinchinopoly.
- 421.** *sphaeruliferum*, Forbes, 1846, id., p. 125, pl. 18, fig. 6. Pondichéry.
- 422.** *scalaroideum*, Forbes, 1846, id., p. 125, pl. 13, fig. 7. Pondichéry.
- 423.** *suturosum*, Galeotti, 1839, Bull. de l'Acad. de Bruxelles, t. 7, n° 10, p. 4, fig. 4. Mexique, Tehuacan.
- 423.** *Bustamentii*, Galeotti, 1839, id., t. 7, n° 10, p. 5, fig. 5. Tehuacan.
- 424.** *cingulatum*, Galeotti, 1839, id., t. 7, n° 10, p. 6, fig. 6. Tehuacan.
- 425.** *subminutum*, d'Orb., 1847. *Terebra minuta*, Galeotti, 1839, Bull. id., n° 10, p. 6, fig. 7 (non Brown, 1827). Mexique, Tehuacan.
- COLOMBELLINA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 72.
- 426.** *contorta*, d'Orb., 1847. *Strombus contortus*, Sowerby, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 129, pl. 15, fig. 9. Indes orientales, Trinchinopoly.
- 427.** *uncata*, d'Orb., 1847. *Strombus uncatatus*, Forbes, 1846, id., p. 129, pl. 13, fig. 16. *S. semi-costatus*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 28. Pondichéry.

**CAPULUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 31.

**427. Dunkeriana**, d'Orb., 1848. *Hipponis Dunkeriana*, Bosquet, 1848, Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, 15, p. 604. Maëstricht.

**INFUNDIBULUM**, Montfort, 1810. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 2, p. 389.

**428. cretaceum**, d'Orb., 1843, Pal., 2, p. 390, pl. 234, fig. 1-3. Royan.

**FISSURELLA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 126.

**429. laevigata**, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 8, pl. 167, fig. 14. Prusse, Aix-la-Chapelle.

**430. patelloides**, Reuss, 1845, Böhm., p. 41, pl. 11, fig. 9. Peut-être la même que la précédente espèce. Postelberg.

**431. subdepressa**, d'Orb., 1847. *F. depressa*, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 18, fig. 24, p. 75 (non Lamarck, 1822). Luschütz.

**EMARGINULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 197.

**432. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Grande espèce déprimée, lisse, ovale; fissure courte. France, Le Beausset (Var).

**433. cretosa**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 230, pl. 17, fig. 1. Tours (Indre-et-Loire).

**434. carinata**, Reuss, 1845, Böhm., p. 41, pl. 11, fig. 6. Bohême, Luschütz, Priesen.

**435. comosa**, d'Orb., 1847. *Patella comosa*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 77, n° 2, pl. 11, fig. 2. Ilseburg.

**HELCION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.

**437. angulosa**, d'Orb., 1847. *Patella angulosa*, Geinitz, 1843, Nacht. Kreid., pl. 6, fig. 2, 3, 4, p. 11. Allem., Strehlen.

**438. semi-striata**, d'Orb., 1847. *Patella semi-striata*, Münster, Goldf., 1843, 3, p. 7, pl. 167, fig. 12. Haldemein Westph.

**439. orbis**, d'Orb., 1847. *Patella orbis*, Römer. *Acmea orbis*, Reuss, 1845, Böhm., p. 41, pl. 7, fig. 27. Römer, pl. 11, fig. 1. Bohême, Hundorf, Luschütz.

**440. Reussii**, d'Orb., 1847. *Acmea Reussii*, Geinitz, p. 74, pl. 18, fig. 23. Reuss, 1845, Böhm. Kr., p. 41, pl. 7, fig. 22. *Patella elevata*, Forbes, 1847, pl. 12, fig. 10. France, Reims; Allem., Hundorf; Indes orientales, Pondichéry.

**441. dimidiata**, d'Orb., 1847. *Acmea dimidiata*, Reuss, 1845, Böhm. Kreid., p. 42, pl. 11, fig. 8. Bohême, Horzenx.

**442. tentorium**, d'Orb., 1847. *Patella idem*, Morton, 1834, Synops. cret. group, p. 50, pl. 1, fig. 11. États-Unis (New-Jersey), près d'Arnetown.

**443. corrugata**, d'Orb., 1847. *Patella corrugata*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 137, pl. 12, fig. 11 a, b. Pondichéry.

**DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 73.

**444. Moen**, Bronn, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 3, pl. 166, fig. 10. Maëstricht, Köpingemolla.

**445. sexcarinatum**, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 3, pl. 166, fig. 12. Hollande, Maestricht, Friedland.

**446. polygonum**, Reuss, 1845, Böhm. Kreid., p. 41, pl. 11, fig. 5. Priesen, Postelberg, Wollenitz.



- 447. Chilense**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 37, 38. Ile Quiriquina (Chili).  
**448. hamatum**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 138, pl. 15, fig. 8. Indes orientales, Trinchinopoly.  
**449. Arcotinum**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 138, pl. 12, fig. 16. Indes orientales, Pondichéry.  
**BULLA**, Linnée, 1758.  
**450. Santonensis**, d'Orb., 1847. Espèce cylindrique, allongée, lisse. Environs de Saintes.  
**451. tenuis**, d'Orb., 1847. *Volvaria tenuis*, Reuss, 1845, Böhm., p. 50, pl. 10, fig. 20. Luschnitz, Priesen et Postelberg.  
**452. Mortoni**, Lyell et Forbes, 1844, Quart. Journ., 1, p. 63. États-Unis, New-Jersey.  
**453. Chilensis**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 1, fig. 13-15. Ile Quiriquina (Chili).  
**454. alternata**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 1-5. Pondichéry.  
**455. cretacea**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 3, fig. 18-21. Pondichéry.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

- CLAVAGELLA**, Lamarck, 1807. D'Orb., Paléont., 3, p. 299.  
**456. cretacea**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 300, pl. 347. Roan.  
**457. armata**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 69, pl. 9, fig. 11. États-Unis (Alabama), prairie Bluff.  
**458. Ligeriensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont la valve est plus oblongue et bien plus allongée que chez la *C. cretacea*. France, Tours (Indre-et-Loire).  
**459. semi-sulcata**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 139, pl. 17, fig. 1. Indes orientales, Pondichéry.  
**460. clavata**, d'Orb., 1847. *Teredina clavata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 76, n° 1, pl. 10, fig. 10. Allem., Quedlinburg.  
**TEREDO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.  
**461. tibialis**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 68, pl. 9, fig. 2. États-Unis (New-Jersey).  
**PHOLAS**, Linnée, 1758. Voy. t. 1, p. 251.  
**462. cithara**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 68, pl. 9, fig. 10. États-Unis (New-Jersey), Monmouth-County.  
**PANOPEA**, Menard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.  
**463. Normaniana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. Astieriana*, mais bien plus étroite. Hauteville (Manche).  
**464. cretacea**, d'Orb., 1847. *Lutraria id.*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 141, pl. 12, fig. 10. Fondouille, près de Gignac (Bouches-du-Rhône).  
**465. Baumontii**, Münster, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 274, pl. 158, fig. 4. *P. Jugleri*, Römer, 1841, pl. 10, fig. 4 (individu déformé?). Quedlinbourg; Westph., Haldem.  
**466. Goldfussii**, d'Orb., 1847. *P. gurgites*, Goldf., 1839, Petref., 2,

- p. 258, pl. 153, fig. 7 (non Brongniart, 1822). Postelberg (Bohème Prusse, Aix-la-Chapelle).
- 467. *orientalis***, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 1, p. 139, pl. 17, fig. 4. Pondichéry et Verdachellum.
- PHOLADOMYA**, Sowerby, 1826. Voy. t. 1, p. 73.
- \***468. *Esmarkii***, Pusch, Goldf., 1830, Petref., 2, p. 272, pl. 1, fig. 10. *P. Carantoniana*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. cr. 3, p. 357, pl. 365, fig. 1, 2. Cognac; Haldem, Quedlinburg; Prusse, Aix-la-Chapelle.
- \***469. *elliptica***, Ringelheim, Münster, Goldfuss, 1839, 2, p. 1, pl. 158, fig. 1. *P. Royana*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 1, pl. 367. France, Royan; Allemagne, Halberstadt.
- \***470. *Marrotiana***, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 358, pl. 1, fig. 3, 4. Rochebeaucourt, Montignac (Dordogne), Le Beausset (Vaucluse).
- 471. *rostrata***, Mathéron, 1842, Catalogue, p. 136, pl. 11, fig. 1. Plan-d'Aups, près de La Sainte-Beaume (Bouches-du-Rhône).
- \***472. *æquivalvis***, d'Orb., 1847. *Corbula æquivalvis*, Goldf., 1830, 2, p. 250, pl. 151, fig. 15. *Pholadomya caudata*, Römer, pl. 10, fig. 1. *Cardium caudatum*, d'Orb., Astrolabe, pl. 4, fig. 25, 26. *Cardium cornum*, Forbes. Trans., pl. 17, fig. 10. *Cardita Goldfussii*, Muller, 1847, Aachen. Kreid., p. 20. Kunraede, près de Maestricht; Prusse, Aix-la-Chapelle, Quedlinburg, Kieslingswalde; Indes orientales, Pondichéry; États-Unis, Alabama, prairie Bluff.
- 473. *umbonata***, Römer, 1841, Kreid., p. 76, n° 3, pl. 10, fig. 1. Quedlinburg, Ilseburg, Lemförde.
- 474. *nodulifera***, Münst., Goldf., 1839, Petref., 2, p. 273, pl. 1, fig. 2. Schandau.
- 475. *Kasimiri***, Pusch, 1837, Polen's Paleont., p. 88, pl. 8, fig. 1. Pologne, Kadzimirz.
- 476. *designata***, Reuss, 1846, Bœhm., p. 18. *Lysianassa designata*, Goldf., 2, p. 264, pl. 154, fig. 13. Bohème, Kreibitz; Allem., Dulme, Ilseburg, Coesfeld; Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 477. *occidentalis***, Morton, 1834, Syn. of the cret. group, p. 1, pl. 8, fig. 3. États-Unis (Delaware), Chesapeake.
- 478. *connectans***, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 1, p. 140, pl. 17, fig. 5. Indes orientales, Pondichéry.
- \***479. *Moulinii***, d'Orb., 1848. Magnifique espèce oblongue, très renflée, très-courte sur la région buccale, ornée de grosses rides concentriques. Crochets contournés. France, environs de Lanquais (Dordogne), dans les silex.
- LYONSIA**, Turton, 1822. Voy. t. 1, p. 10.
- 480. *globulosa***, d'Orb., 1847. *Poromya globulosa*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 141, pl. 17, fig. 6. Pondichéry.
- 481. *lata***, d'Orb., 1847. *Poromya lata*, Forbes, 1846, id., t. 7, p. 141, pl. 15, fig. 14. Indes orientales, Trinchinopoly.
- \***482. *inornata***, d'Orb., 1847. Espèce ovale, oblongue, presque rostrée sur la région anale. France, Cognac (Charente).
- THRACIA**, Leach, 1825. Voy. t. 1, p. 216.
- 483. *Belchii***? d'Orb., 1847. *Tellina Reichii*, Römer, 1841, Kreid., p. 74, n° 4, pl. 9, fig. 26. Allem., Strehlen.

**ANATINA**, Lamarek, 1809. Voy. t. 1, p. 74.

\***484. Royana**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 377, pl. 371, fig. 5, 6. Royan.

**485. lanceolata**, d'Orb., 1847. *Corbula lanceolata*, Geinitz, 1843, Nacht. Kreid., pl. 2, fig. 3, p. 12. Bohême, Kieslingwald.

**486. arcuata**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 143, pl. 16, fig. 5. Pondichéry.

**GASTROCHÆNA**, Spingler, 1783. Voy. t. 1, p. 275.

\***487. Royana**, d'Orb., 1847. *Fistulana id.*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 395, pl. 375, fig. 9-12. France, Royan.

**488. tenuis**, d'Orb. *Fistulana tenuis*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 19, pl. 33, fig. 12, 13. Bohême, Bilin.

\***489. aspergilloides**, d'Orb., 1847. *Fistulana id.*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 139, pl. 17, fig. 2. Pondichéry.

**SOLECURTUS**, Blainville, 1834. Voy. p. 78.

**490. inflexus**, d'Orb., 1847. *solen inflexus*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 222, pl. 15, fig. 4 a, b. Tours.

**491. subcompressus**, d'Orb., 1847. *Solen compressus*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 276, pl. 159, fig. 4 (non Sow., 1823). Aix-la-Chapelle.

**492. obscurus**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 141, pl. 17, fig. 3. Pondichéry.

**LEGUMINARIA**, Schumacher, 1817. Voy. p. 158.

**493. truncatula**, d'Orb., 1847. *Solen id.*, Reuss, 1846, Kreideform., p. 17, pl. 36, fig. 13-16, 17. Bohême, Laun, Priesen.

**MACTRA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 216.

\***494. Araucana**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 125, pl. 15, fig. 3, 4. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).

\***495. Cecileana**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 126, pl. 15, fig. 5, 6. Ile de Quiriquina.

**496. tripartita**, Sow., Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 142, pl. 15, fig. 17. Indes orientales, Trinchinopoly.

**497. intersecta**, d'Orb., 1847. *Cardium intersectum*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 145, pl. 18, fig. 8. Sow., Mss. Verdachellum.

**ARCOPAGIA**, Brown, 1827. Voy. p. 75.

\***498. gibbosa**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 395, pl. 378, fig. 14, 15. Saintes.

\***499. circinalis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 414, pl. 378, fig. 16, 18. Saintes, Royan, Tours, Riberac.

\***500. rotundata**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 115, pl. 379, fig. 6, 7. Royan (Charente-Inférieure), Lanquais (Dordogne).

\***501. strigata**, d'Orb., 1847. *Tellina strigata*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 235, pl. 147, fig. 18. Aix-la-Chapelle; France, Le Beausset.

**501'. costulata**, d'Orb., 1847. *Tellina costulata*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 235, pl. 147, fig. 19. Prusse, Aix-la-Chapelle.

**502. subdecussata**, d'Orb., 1847. *Tellina subdecussata*, Römer, 1841, Kreid., p. 74, n° 3, pl. 9, fig. 20. Quedlinburg.

**503. concentrica**, d'Orb., 1847. *Tellina concentrica*, Reuss, 1846, Kreid., p. 18, pl. 36, fig. 19, 20. Bohême, Priesen et Postelberg.

- \***504. Valdiviana**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 7, 8. Amér. mérid., Ile de Quiriquina (Chili).
- TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.
- \***505. Royana**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 422, pl. 380, fig. 9-11. Royan.
- 506. Goldfussii**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 73, n° 1, pl. 9, fig. 18. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 507. pseudo-plana**, d'Orb., 1847. *T. plana*, Rœm., 1841, Nordd. Kreid., p. 74, n° 2, pl. 9, fig. 19 (non Donovan, 1799). Blankenburg.
- 508. tenuissima**, Reuss, 1846, Bœhm. Kreid., p. 19, pl. 86, fig. 18-24. Luschitz, Wollenitz, Meronitz.
- \***509. Largillierii**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 128, pl. 15, fig. 9, 10. Ile de Quiriquina, près la Conception (Chili).
- \***510. Grangei**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 8-10. *Psammobia inconspicua*, Sow., Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 142, pl. 15, fig. 18. Indes orientales, Trinchinopoly.
- \***511. Albertina**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 22-24. Pondichéry.
- 512. subradiata**, d'Orb., 1847. *Donax subradiatus*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 73, n. 2, pl. 9, fig. 16. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 513. Pondicherriensis**, Forbes, 1846. Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 142, pl. 18, fig. 15. Pondichéry.
- CAPSA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 2, p. 159.
- \***514. discrepans**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 424, pl. 381, fig. 3-5. Tours (Indre-et-Loire), Montignac (Dordogne).
- LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. t. 1, p. 11.
- 515. siliqua**, d'Orb., 1847. *Nucula siliqua*, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 156, pl. 125, fig. 13. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 516. semilunaris**, d'Orb., 1847. *Nucula semilunaris*, Buch, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 20, fig. 30, p. 77. Bohême, Luschütz, Granatengraben, près de Meronitz, Postelberg, Kystra, Creibitz.
- 517. tenuirostris**, d'Orb., 1847. *Nucula tenuirostris*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 6, pl. 34, fig. 8-10. Luschitz, Priesen, Postelberg.
- 518. producta**, d'Orb., 1847. *Nucula producta*, Nilsson, Reuss, 1846, Bœhm., p. 7, pl. 34, fig. 17-20. Priesen, Postelberg, Kystra, Wollenitz, Luschitz, Meronitz.
- 519. ovata**, d'Orb., 1847. *Nucula ovata*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 8, pl. 34, fig. 25 (non Mantell.). Bohême, Luschitz et Priesen.
- 520. falcata**, d'Orb., 1847. *Nucula falcata*, Reuss, 1846, Bœhm., Kreideform., p. 8, pl. 34, fig. 21. Bohême, Luschitz.
- 521. subæqualis**, d'Orb., 1847. *Nucula subæqualis*, Reuss, 1846, Bœhm. Kreideform., p. 8, pl. 34, fig. 23-24. Bohême, Postelberg.
- 522. Forsteri**, d'Orb., 1847. *Nucula id.*, Müller, 1847. Aachen. Kreideform., p. 16, pl. 1, fig. 5, a. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- \***523. striatula**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 148, pl. 17, fig. 14. *L. indica*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 11-13. Pondichéry.
- VENUS**, Linné, 1758. Voy. p. 15.
- \***524. uniformis**, d'Orb., 1847. *Cytherea uniformis*, Dujardin, 1837.

*Venus caperata*, d'Orb., Paléont., 3, p. 446, pl. 385, fig. 9-10 (non Sow.). Tours.

\*525. *subplana*, d'Orb., 1847. *Venus plana*, d'Orb., Paléont., 3, p. 447, pl. 386, fig. 1-3. Goldfuss, 1839, pl. 148, fig. 4. Tours, Cognac, Le Beausset (Var); Prusse, Aix-la-Chapelle.

\*526. *Royana*, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 448, pl. 386, fig. 4-5. Royan.

527. *Archiaciata*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., 3, p. 449, pl. 386, fig. 6-7. France, Montendre (Charente-Inférieure).

528. *Jucunda*, d'Orb., 1847. *Cytherea jucunda*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 228, pl. 15, fig. 6. Tours.

529. *subfaba*, d'Orb., 1847. *V. faba*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 247, pl. 151, fig. 6 (non Sow.). Aix-la-Chapelle, Quedlinburg.

530. *Bavarica*, Münst., Goldf., 1839, 2, p. 246, pl. 151, fig. 1. Regensburg.

531. *subparallela*, d'Orb., 1847. *V. parallela*, Münst., Goldf., 1839, Petref., 2, p. 246, pl. 151, fig. 2 (non Philip.). Regensburg.

532. *subgibbosa*, d'Orb., 1847. *V. gibbosa*, Münst., Goldf., 1839, 2, p. 246, pl. 151, fig. 3 (non Sow., 1817). Haldem, Lemförde.

533. *subparva*, d'Orb., 1847. *V. parva*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 247, pl. 151, fig. 4 (non Sow., 1826). Haldem (Westph.).

534. *subovalis*, d'Orb., 1847. *V. ovalis*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 247, pl. 151, fig. 5 (non Sow., 1827). Aix-la-Chapelle, Quedlinburg.

535. *fabacea*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 72, n. 6, pl. 9, fig. 13. Aix-la-Chapelle, Quedlinburg.

536. *subconcentrica*, d'Orb., 1847. *V. concentrica*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 72, n. 3, pl. 9, fig. 11 (non Born, 1780). Ilseburg.

537. *subdecussata*, Roemer, 1841, Kreid., p. 72, n. 2, pl. 9, fig. 12. Strehlen.

538. *Lamarckii*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 151, pl. 15, fig. 5. France, Fondouille (Bouches-du-Rhône).

539. *latesulcata*, Mathéron, 1843, *id.*, p. 152, pl. 16, fig. 1-2. Fondouille.

540. *ovum*, Mathéron, 1843, *id.*, p. 152, pl. 16, fig. 3-4. Fondouille.

541. *subturgida*, d'Orb., 1847. *V. turgida*, Mathéron, 1843, Catalogue, p. 153, pl. 16, fig. 5-6. (non Lam., 1818). Fondouille.

542. *subelongata*, d'Orb., 1847. *V. elongata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 20, pl. 41, fig. 9 (non M'Coy, 1844). Bohême, Priesen.

543. *sublaminosa*, d'Orb., 1847. *V. laminosa*, Reuss, 1846, Böhm., p. 21, pl. 41, fig. 6-15 (non Montagu, 1808). Priesen, Postelberg, Woltenitz, Johnsbach, Kreibitz.

544. *tumida*, Muller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 25, pl. 2, fig. 4, a, b. Prusse, Aix-la-Chapelle.

\*545. *Aucasiana*, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 122, pl. 12, fig. 17-18. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili).

546. *analogia*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 147, pl. 15, fig. 20. *V. eximia*, Forbes, 1846, *id.*, pl. 15, fig. 21. Indes orientales, Trinchinopoly.

**CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.

**547. subangustata**, d'Orb., 1847. *C. angustata*, Sowerby, 1 Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 4 (non 2 1826). Tyrol, Gosau.

**548. substriatula**, d'Orb., 1847. *C. striatula*, Goldf., pl. fig. 16, p. 251. II (non Sow.). Aix-la-Chapelle.

**\*549. Chilensis**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 11-12 Quiriquina (Chili).

**\*550. striatuloides**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of Lon t. 7, p. 141, pl. 18, fig. 14. Indes orientales, Verdachellum.

**\*551. cochlearia**, d'Orb., 1846, Astrol., pl. 5, fig. 14-17. P chéry.

**\*552. minima**, d'Orb., 1846, *id.*, pl. 5, fig. 18-20. Pondichéry

**553. caudata**, Nilss., Goldf., 1839, 2, p. 251, pl. 151, fig. 17. C feld.

**554. lineata**, Müller, 1847, Aachen. Kreid., p. 26, pl. 2, fig Prusse, Aix-la-Chapelle.

**555. obtusa**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 26, pl. 2, fig a, b. Prusse, Aix-la-Chapelle.

**OPIS**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 198.

**\*556. Truelleri**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 56, pl. 1 *O. bicornis*, Geinitz, 1843. Saintes; Allem., Wirbets; Bohême, I schlin, Bilin.

**557. pusilla**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 2, pl. 33, fig. 15. Meronit

**558. galeata**, d'Orb., 1847. *Cardium galeatum*, Müller, 1847. Aach Kreideform., p. 22, pl. 2, fig. 2. Aix-la-Chapelle.

**\*559. Haleana**, d'Orb., 1847. Espèce courte, large, carrée. Et Unis, Alabama, Prairie Bluff.

**ASTARTE**, Sowerby, 1818. Voy. t. 1, p. 216.

**\*560. difficilis**, d'Orb., 1847. Espèce presque ronde. Royan (Ch rente-Inférieure).

**561. macrodonta**, Sowerb., 1831, Trans. geol. Soc. of Lond 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 8. Tyrol, Gosau.

**562. porrecta**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 2, pl. 33, fig. 19. Trzibl

**563. nana**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 3, pl. 33, fig. 18. Priesen.

**564. acuta**, Reuss, 1846, Bœhm. Kreideform., p. 3, pl. 33, fig. 1 pl. 37, fig. 14. Bohême, Priesen, Trzibnitz.

**\*565. celata**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 22, pl. 2, fig. Prusse, Aix-la-Chapelle.

**566. planissima**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. p. 143, pl. 15, fig. 23. Indes orientales, Trinchinopoly.

**567. Arcotensis**, d'Orb., 1847. *Venus Arcotensis*, Forbes, 184 Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 146, pl. 15, fig. 19. Trind nopoly.

**CRASSATELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 77.

**\*568. Marrotiana**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 82, pl. 26 fig. 8-9. Mussidan et Sourzac; Royan (Charente-Inférieure), Villedic (Loir-et-Cher).

**\*568. regularis**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 1 p. 80, pl. 266, fig. 4-7. France, Bains-de-Rennes.

- \***569. orbicularis**, Mathéron, 1842, Catalogue, p. 141, pl. 13, fig. 7. France, Plan d'Aups (Bouches-du-Rhône).
- \***570. Galloprovincialis**, Mathéron, 1842, Catalogue, p. 142, pl. 13, fig. 8. Plan d'Aups, Martigues (Bouches-du-Rhône).
- \***571. Normaniana**, d'Orb., 1847. Espèce courte et large, un peu carrée. France, Hauteville (Manche).
- 572. impressa**, Sowerb., 1831, Trans. Soc. geol. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 3. Tyrol, Gosau.
- 573. arcacea**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 74, n. 2, pl. 9, fig. 24. Quedlinburg, Dülmen.
- 574. Bockschi**? Geinitz, 1843, Nacht. Kreid., pl. 2, fig. 17 et 18, p. 12. Peut-être une *Trigonia*? ? Kieslingsswalda.
- 575. oblonga**? d'Orb., 1847. *Cyprina oblonga*, Reuss, 1846, Böhm., p. 4, pl. 40, fig. 15 (non d'Orb.). Bohême, Sterndorf, Hochpetch.
- 576. pentagona**? d'Orb., 1847. *Venus pentagona*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 21, p. 41, fig. 7, 8. Bohême, Priesen, Meronitz.
- \***577. Alabamensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. Marrothiana*, mais plus large à l'extrémité anale; ayant une tout autre forme que le *C. vadosa*, Mort. États-Unis (Alabama), prairie Bluff.
- 578. vadosa**, Morton, 1834, Syn. of the cret. group, p. 66, pl. 13, fig. 12. États-Unis (Alabama), prairie Bluff, New-Jersey.
- \***578'. Bosquetiana**, d'Orb., 1850. Très-belle espèce, longue de 90 millimètres et large de 60, trigone, lisse, striée seulement dans le jeune âge, très-longue sur la région anale, courte sur la région buccale. Maestricht (M. Bosquet).
- CARDITA**, Bruguière, 1789. Voy. p. 77.
- 579. parvula**, V. Münster, Goldf., pl. 133, fig. 13. Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 67, n° 3. Haldem, Lemförde, Ilseburg.
- 580. Geinitzii**, d'Orb., 1847. *Venericardia tenuicosta*, Gein., 1842, Charak. Kreid., pl. 20, fig. 8, p. 76 (non Sowerby). Bohême, Luschütz.
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.
- \***581. Royana**, d'Orb., 1847. Coquille voisine de forme du *Cyprina Ligeriensis*, mais plus ronde. Royan (Charente-Inférieure).
- \***582. orbicularis**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 73, pl. 9, fig. 8. Tours; Allem., Quedlinburg.
- \***583. Provencialis**, d'Orb., 1847. Coquille carrée, un peu plus longue que large, avec une sorte de sillon déprimé sur la région anale. Le Beausset.
- 584. lata**, d'Orb., 1847. *Venus lata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 72, n° 5, pl. 9, fig. 10. Pilgramsdorf.
- \***585. elongata**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 106, pl. 277, fig. 5, 6. Royan.
- 586. Conradi**, d'Orb., 1847. *Venilia id.*, Morton, 1834, pl. 8, fig. 1, 2. *Cardita decisa*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 66, pl. 9, fig. 3. États-Unis (Delaware), Saint-Georges (New-Jersey), Arneytown (Alabama), prairie Bluff.
- \***586'. Bosquetiana**, d'Orb., 1850. Espèce presque ronde, renflée, longue et arrondie sur la région anale, courte et échancré sur la région buccale. Maestricht (M. Bosquet).

**CYPRICARDIA**, Lamarck, 1801.

- 587. tricarinata**, d'Orb., 1847. *Crassatella tricarinata*, Rœm., 1841, Nordd. Kreid., p. 74, n° 3, pl. 9, fig. 23. Quedlinburg.
- 588. trapezoidalis**, d'Orb., 1847. *Crassatella trapezoidalis*, Rœm., 1841, Nordd. Kreid., p. 74, n° 1, pl. 9, fig. 22. Strehlen.
- 589. protracta**, d'Orb., 1847. *Crassatella protracta*, Reuss, 1846, Bœhm. Kreid., p. 3, pl. 37, fig. 15. Bohême, Laun.
- TRIGONIA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 198.
- \*590. inornata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 158, pl. 297, fig. 6-8. France, Royan, Cognac.
- \*591. disparilis**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 157, pl. 299, fig. 3, 4. Tours.
- \*592. limbata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 156, pl. 298. *Trigonia aliformis* des auteurs de l'Amérique du Nord, de Goldfuss, de Rœmer, de Forbes, etc. (non Sow.). France, Soulage, Périgueux, Montignac, Mussidan, Sourzac, Tours, Saintes; États-Unis, Alabama, prairie Bluff; Indes orientales, Pondichéry; Texas à New-Braunfels.
- \*593. echinata**, d'Orb., 1847. Coquille oblongue, pourvue de très-grosses côtes presque concentriques fort épineuses. Royan (Charente-Inférieure), Tours (Indre-et-Loire), Le Beausset (Var).
- \*594. bipartita**, d'Orb. Coquille carrée, séparée en deux par une ligne oblique, qui laisse sur la région anale des côtes transverses, sur la région palléale de grosses côtes tuberculeuses coudées. Martiques.
- \*595. longirostris**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. limbata*, mais à région anale très-prolongée en rostre. France, Saint-Christophe (Indre-et-Loire).
- 596. Lamareckii**, Mathéron, 1843, Cat., p. 164, pl. 22, fig. 5-7. France, Fondouille (Bouches-du-Rhône).
- 597. tenuisulcata**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 225, pl. 15, fig. 11. Tours (Indre-et-Loire).
- 598. subexcentrica**, d'Orb., 1847. *T. excentrica*, Goldf., Petref. Germ., pl. 137, fig. 8, p. 203. Müller, 1847, Aachen. Kreid., p. 16, pl. 137, fig. 8 (non Lam). Aix-la-Chapelle.
- 599. subpulchella?** d'Orb., 1847. *T. pulchella*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 5, pl. 41, fig. 3 (non Agassiz, 1840). Bohême, Meronitz.
- 600. Thoracica**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 65, pl. 15, fig. 13. États-Unis (New-Jersey), Alabama, prairie Bluff.
- \*601. Hanetiana**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mér., p. 127, pl. 12, fig. 14-16. Ile de Quiriquina, près la Conception (Chili).
- 602. orientalis**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 150, pl. 18, fig. 11. *T. semi-ornata*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 31-32. Pondichéry.
- 603. suborbicularis**, Forbes, 1846, id., p. 150, pl. 18, fig. 10. *T. sinuata*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 29, 30. Pondichéry.
- 604. semi-culta**, Forbes, 1846, id., p. 151, pl. 18, fig. 9. Verdachellum.
- 605. plicato-costata**, Galeotti, 1839, Bull. de l'Acad. de Bruxelles, t. 7, n° 10, p. 1, fig. 1. Mexique, Tehuacan.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.



- \***606. Campaniensis**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, pl. 283, fig. 11: Saintes (Charente-Inférieure).
- 607. subglobosa**, d'Orb., 1847. *Corbula subglobosa*, Goldf., 1839, Petref., 2, p. 251, pl. 151, fig. 18. Allem., Coesfeld.
- \***608. lenticularis**, Goldfuss, 1839, p. 228, pl. 146, fig. 16. *Artemis lenticularis*, Forbes, pl. 18, fig. 7. Allem., Strehlem; Indes orientales, Verdachellum.
- 609. subnumismalis**, d'Orb., 1847. *Venus numismalis*, Müller, 1847, Aachen. Kreid., p. 25, pl. 2, fig. 5 (non Mathéron, 1842). Aix-la-Chapelle.
- ?**610. lens**, Roemer, 1841, Kreid., p. 73, n° 3, pl. 9, fig. 14. Kieselingswalde.
- 610'. excavata?** d'Orb., 1847. *Cytherea id.*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 67, pl. 5, fig. 1. États-Unis (New-Jersey), Arneytown.
- \***611. Grangei**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 13, 14. Ile de Quiriquina (Chili).
- \***612. Dumoulini**, d'Orb., 1846, id., pl. 2, fig. 15, 16. Ile Quiriquina.
- 613. jugosa**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 142, pl. 17, fig. 7. *L. ornatisima*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 27, 28. Pondichéry.
- 614. fallax**, Forbes, 1846, id., p. 143, pl. 17, fig. 8. Pondichéry.
- \***615. obesa**, d'Orbigny, 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 26-28. Pondichéry.
- CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.
- \***616. striaticostata**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 114, pl. 281, fig. 1, 2. France, Mussidan, Royan.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- \***617. Conniacum**, d'Orb., 1833, Pal., 3, p. 28, pl. 244. Cognac.
- \***618. bimarginatum**, d'Orb., 1843, Pal., 3, p. 39, pl. 250, fig. 4-8. Royan.
- \***619. Faujasi**, Desmoulins. Espèce voisine du *C. productum*, mais plus grande, plus ovoïde, moins oblongue. *Cardium intermedium*, Reuss, pl. 40, fig. 13?). Royan, Montignac (Dordogne), Tours, Saintes.
- 620. insculptum**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 224, pl. 15, fig. 9 a, b. France, Tours (Indre-et-Loire).
- \***621. radiatum**, Dujardin, 1837, Mém. de la Soc. géol., 2, pl. 15, fig. 8. France, Tours, Beausset.
- \***622. Villeneuveianum**, Mathéron, 1842, Cat., p. 158, pl. 18, fig. 7, 8. Plan d'Aups (B.-du-Rhône).
- 623. Itierianum**, Mathéron, 1842, Cat., p. 158, pl. 18, fig. 10, 11. France, Plan d'Aups (B.-du-Rhône).
- 624. alutaceum**, V. Münster, Goldf., pl. 144, fig. 5. Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 71, n. 5. Allem., Haldem.
- 625. tuberculiferum**, Goldf., pl. 144, fig. 7. Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 71, n. 6. Allem., Quedlinburg.
- 626. asperum**, Münster, Goldf., 1839, 2, p. 221, pl. 144, fig. 8. Haldem.

- 627. propinquum**, Münst., Goldf., 1839, Petref., 2, p. 222, pl. 1, fig. 1. Hollande, Maëstricht.
- 628. bipartitum**, d'Orb., 1847. *Cardita semistriata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 67, n° 4, pl. 8, fig. 21 (non Deshayes, 1824). Ile de Zittolieb, Meronitz.
- 629. lineolatum**, Reuss, 1846, Böhm., p. 1, pl. 35, fig. 17. Paléont. Bohême, Priesen et Postelberg, Kystra.
- 630. semipapillatum**, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 1, pl. 40, fig. 12. Bohême, Priesen et Postelberg, Kystra.
- 631. Beckii**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 21, pl. 1, fig. 7 a, b. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 632. semipustulosum**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 21, pl. 1, fig. 8 a. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 633. Debeyanum**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 21, pl. 1, fig. 9 a, u, b. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 634. Marquartii**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 22, pl. 1, fig. 10. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- \*635. australinum**, d'Orb., 1847. *C. australe*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 21, 22 (non Sow., 1840). Ile Quiriquina (Chili).
- \*636. acuticostatum**, d'Orb., 1842, Paléont. de l'Amér. mérid., p. 120, pl. 12, fig. 19-22. Ile de Quiriquina, près la Concepcion (Chili), Payta (Pérou).
- \*637. Jacquineti**, d'Orb., 1846, Astrol., pl. 5, fig. 23-25. Pondichéry.
- 638. incomptum**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 145, pl. 15, fig. 15. Inde orientale, Trinchinopoly.
- 639. altum**, Forbes, 1846, *id.*, p. 145, pl. 15, fig. 13. *C. ponticorum*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 21, 22. Inde orientale, Trinchinopoly.
- 640. bisectum**, Forbes, 1846, *id.*, p. 144, pl. 17, fig. 9. Pondichéry.
- 641. substriatum**, d'Orb., 1847. *Cardita striata*, Forbes, 1841, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 144, pl. 14, fig. 1 (non Defrance, 1819). Inde orientale, Verdachellum.
- 642. orbiculare**, d'Orb., 1857. *Cardita orbicularis*, Forbes, 1841, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 144, pl. 17, fig. 11. Pondichéry.
- ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. Voy. t. 1, p. 132.
- \*643. Pyrenaica**, d'Orb., 1843, Paléont. franç., Terr. crét., p. 46, pl. 251, fig. 1, 2. Soulages; Russie, sur les bords du Dniéper en Podolie.
- \*644. modiolus**, d'Orb., 1847. *Cardita modiolus*, Nilss., pl. 1, fig. 6. Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 67, n° 2. Schwiechelt unweit Peine; Westphalie, Strehlem.
- 645. sublunulata**, d'Orb., 1847. *I. lunulata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 70, n° 2, pl. 9, fig. 5 (non Nyst., 1835). Dresde.
- \*646. longirostris**, Römer, 1841, Kreid., p. 70, n° 3, pl. 9, fig. 1. *Isocardia Atzensis*, d'Orb., 1843, Paléont. franç., 3, p. 47, pl. 2, fig. 3-6. France, Bains-de-Rennes, Beausset; Kieslingwalda.
- 647. trigona**, Römer, 1841, Kreid., p. 70, n° 4, pl. 9, fig. 7. Blankenburg:

- 648. cretacea**, Goldf., pl. 141, fig. 1; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 71, n° 5. *I. turgida*, Reuss, pl. 40, fig. 16. Westphalie, Bohême, Haudorf.
- 649. pygmaea**, Reuss, 1846, Böhm., p. 2, pl. 35, fig. 14. Meronitz.
- 650. subsinuata**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 146, pl. 17, fig. 12. Inde orientale, Pondichéry.
- ISOARCA**, Münster, 1843.
- \*651. supracretacea**, d'Orb., 1847. Grosse espèce très-ventrue, lisse. France, Le Beausset (Var).
- NUCULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 12.
- 652. concinna**, Sow., 1831, Trans. Soc. geol. of London, 2<sup>e</sup> sér., t. 3, pl. 38, fig. 1. Tyrol, Gosau.
- 653. striatula**, Rœmer, 1841, Kreid., p. 68, n° 2, pl. 8, fig. 26. *N. pectinata*, Reuss, 1846, pl. 34, fig. 1-5 (non *pectinata*, Sow.). Strehlen.
- 654. subdeltoidea**, d'Orb., 1847. *Donax deltoideus*, Rœmer, 1841, Kreid., p. 73, n° 1, pl. 9, fig. 17 (non Lam., 1804). Allem., Blankenburg.
- 655. Reussii**, d'Orb., 1847. *N. margaritacea*, Reuss, 1846, Böhm., p. 6, pl. 34, fig. 26, 27 (non Lam.). Luschnitz, Priesen.
- 656. tenera**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 17, pl. 2, fig. 1 a. Aix-la-Chapelle.
- \*657. Albertina**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 25, 26. Amér. mér., île Quiriquina (Chili).
- LUNOPSIS**, Sassy. Voy. t. 1, p. 280.
- 658. Hœninghausii**, d'Orb., *Pectunculus Hœninghausii*, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 18, pl. 1, fig. 6 a. Aix-la-Chapelle.
- PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. p. 80.
- \*659. Marrotianus**, d'Orb., 1843, Paléont., 3, p. 192, pl. 307, fig. 13-16. Colombier, Royan, Tours, Ste-Colombe (Manche).
- 660. calvus**, Sow., 1831, Trans. Soc. geol. of London, 2<sup>e</sup> série, t. 3, pl. 38, fig. 2. *P. planus*, Rœmer, 1841, Kreid., p. 69, pl. 8, fig. 24. Tyrol, Gosau.
- 661. lens**, Nilss. pl. 5, fig. 4. Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 68, n° 3; Reuss, pl. 35, fig. 13. *P. sublaevis*, Goldf., pl. 126, fig. 3. Aix-la-Chapelle; Bohême, Laun.
- 662. subsulcatus**, d'Orb., 1847. *P. sulcatus*, Rœmer, 1841, Kreid., p. 69, n° 4, pl. 8, fig. 23 (non DeFrance, 1826). Kieslingswalde.
- 663. subdecussatus**, d'Orb., 1847. *P. decussatus*, Rœmer, 1841, Kreid., p. 69, n° 5. *P. umbonatus*, Goldf., pl. 126, fig. 2 (non Sow., 1823). Allem., Coësfeld et Ilseburg.
- 664. insculptus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 8, pl. 35, fig. 5. Luschnitz, Priesen, Postelberg, Meronitz.
- 665. reticulatus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 8, pl. 35, fig. 7, 8. Priesen, Luschnitz et Kystra.
- 666. hamula**, Morton, 1834, Syn. of the cret. group, p. 64, pl. 15, fig. 7. États-Unis (Alabama), prairie Bluff.
- 667. subaustralis**, d'Orb., 1847. *P. australis*, Morton, 1834, Syn. cret. group., p. 64 (non Quoy, 1833). États-Unis, New-Jersey.
- 668. subauriculatus**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 150, pl. 17, fig. 13. Inde-Orientale, Pondichéry.

**ARCA**, Linné, 1753. Voy. t. 1, p. 13.

**669. Archiaciana**, d'Orb., 1844, Pal., 3, p. 235, pl. 322. Sainte

**670. Santonensis**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 236, pl. 32. Saintes, Cognac, Montignac, St-Christophe (Indre-et-Loire); Strellem.

**671. Boyana**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 242, pl. 327, fig. 3, Royan, Tours, Soulages.

**672. Orbignyana**, Mathéron, 1843; d'Orb., Paléont., 3, p. 24 pl. 327, fig. 5, 6. Martigues (B.-du-Rhône); Tyrol, Gosau.

**673. cretacea**, d'Orb., 1847. *A. tumida*, d'Orb., 1844, Paléont. 3, p. 244, pl. 328 (non *tumida*, Sow., 1824). *Cucullea tumida*, d'Achiac, 1839. Royan, Riverac, Verteillac.

**674. affinis**, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 224, pl. 15, fig. 10. Tours, Soulages (Aude).

**675. sagittata**, d'Orb., 1844, Pal., 3, pl. 319, fig. 1, 2. Périgoux

**676. Nereis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine, mais plus étroite qu'*A. Galliennei*, d'Orb. France, Le Beausset.

**677. subalata**, d'Orb., 1847. *A. alata*, Mathéron, 1843, Catalog p. 164, pl. 21, fig. 10 (non Dubois, 1831). Plan d'Aups.

**678. laevis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 164, pl. 21, fig. 11, 12. Plan d'Aups.

**679. Marticensis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 165, pl. 21, fig. 13, 14. France, Martigues, (Gros Mourré) (B.-du-Rhône).

**680. Galloprovincialis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 163, pl. 21 fig. 3, 4. Fondouille, près de Gignac (B.-du-Rhône).

**681. Corbarica**, d'Orb., 1847. Espèce lisse, très-allongée et obtuse à ses extrémités. Bains-de-Rennes (Aude).

**682. subglabra**, d'Orb., 1847. *Arca glabra*, Goldf., 1838, Petref. 2, p. 148, pl. 124, fig. 1, c (non Sowerby). Quedlinburg, Coesfeld. Aix-la-Chapelle.

**683. octavia**, d'Orb., 1847. *A. rotundata*, Römer, 1841, Nordd Kreidd., p. 79, n. 4, pl. 9, fig. 2 (non Sow., 1836). Dülmen.

**684. Romeri**, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., pl. 20, fig. 15; pl. 10, fig. 10, p. 50. Weinbohl, Strehlen, Hundorf.

**685. orbicularis**, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 20, fig. 17, p. 74. Luschütz.

**686. arcacea**, d'Orb., 1847. *Pectunculus arcaceus*, Reuss, 1846, Böhm., p. 8, pl. 35, fig. 4. Bohême, Postelberg.

**687. subangulata**, d'Orb., 1847. *A. angulata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 10, pl. 34, fig. 30 (non Lowell-Reeve, 1844). Laun.

**688. propinqua**, Reuss, 1846, Böhm., p. 12, pl. 34, fig. 34. Luschütz.

**689. undulata**, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 12, pl. 34, fig. 33-39. Trzibitz, Meronitz.

**690. striatula**, Reuss, 1846, Böhm., p. 12, pl. 34, fig. 28. Luschütz, Priesen, Postelberg, Kreibitz.

**691. Reussii**, d'Orb., 1847. *A. subtruncata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 10, pl. 34, fig. 35 (non Lowell-Reeve, 1844). Priesen.

**692. bicarinata**, Reuss, 1846, Böhm., p. 10, pl. 34, fig. 43. Bohême, Priesen, Postelberg.

- 693. dictyophora**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 10, pl. 34, fig. 29. Postelberg.
- 694. bifida**, Reuss, 1846, Bœhm. Kreideform., p. 10, pl. 34, fig. 40. Bohême, Priesen et Postelberg.
- 695. pygmæa**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 11, pl. 34, fig. 33. Priesen et Postelberg, Luschitz, Wollenitz, Laun, Trziblit.
- 696. Geinitzii**, Reuss, 1846, Bœhm. Kreid., p. 11, pl. 34, fig. 31. Bohême, Luschitz, Postelberg.
- 697. tenuistriata**, Münster, Goldf., 2, p. 142, pl. 138, fig. 1. Reuss, 1846, Bœhm. Kreideform., p. 11. Bohême.
- \*698. Alabamensis**, d'Orb., 1847. Espèce large, lisse, à dents obliques de cucullées. États-Unis, Alabama, Prairie Bluff.
- 699. urtellata**, Morton, 1834, Synops. Cret. group, p. 64, pl. 3, fig. 11. États-Unis ; Alabama.
- 700. vulgaris**, d'Orb., 1847. *Cucullea id.*, Morton, 1834. Syn. of the Cret. group, p. 64, pl. 3, fig. 8 ; pl. 13, fig. 5. États-Unis, New-Jersey.
- 701. antrosa**, d'Orb., 1847. *Cucullea id.*, Morton, 1834, Synops. Cret. group, p. 65, pl. 13, fig. 6. États-Unis, New-Jersey.
- 702. cardioides**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 35-36. Pondichéry.
- \*703. ponticeriana**, d'Orb., 1846, *id.*, pl. 5, fig. 29-31. Pondichéry.
- \*704. Caldina**, d'Orb., 1846, *id.*, pl. 5, fig. 32-33. Pondichéry.
- 705. japetica**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 148, pl. 16, fig. 2. *A. disparilis*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 37, 38. Pondichéry.
- \*706. Camana**, Forbes, 1846, Trans., p. 148, pl. 16, fig. 3. *A. similis*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 33, 34. Pondichéry.
- \*707. Brahminia**, Forbes, 1846, Trans., p. 149, pl. 16, fig. 1. *A. Fontanieri*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 34, 35. Pondichéry.
- 708. Clellandi**, Forbes, 1846, *id.*, p. 149, pl. 16, fig. 4. Pondichéry.
- 709. Trinchinopolitensis**, Forbes, 1846, Trans. geol., p. 150, pl. 15, fig. 16. Inde orientale, Trinchinopoly et Verdachellum.
- 710. abrupta**, Forbes, 1846, *id.*, p. 149, pl. 14, fig. 2. Verda-chellum.
- 711. fucifera**, v. Münster, Goldf., pl. 121, fig. 14 ; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 69, n<sup>o</sup> 1. Haldem, Ahlten.
- 713. subradiata**, d'Orb., 1847. *A. radiata*, Münster, Goldf., pl. 138, fig. 2 ; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 69, n. 3 (non *radiata*, Münster, 1838, E, 26, n. 2359). Haldem.
- 714. exaltata**, Nilss., pl. 6, fig. 1 ; Goldf., pl. 122, fig. 1 ; Rœmer 1841, Kreid., p. 69. Westphalie.
- PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.
- \*715. recticostata**, d'Orb., 1847. Espèce à six côtes longitudinales du côté cardinal, le reste ondulé. Sa forme est quadrangulaire. Bains-de-Rennes.
- \*716. petasunculus**, Mathéron, 1843, Cat., p. 180, pl. 27, fig. 3-5. Fondouille, près de Gignac (B.-du-Rhône).

- 718. restituta**, Goldf., pl. 138, fig. 3; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 65, n. 4. Dülmen; Inde orientale, Pondichéry.
- 719. fenestrata**, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 65, n. 5, pl. 8, fig. 22. Osterfeld (Westphalie).
- 720. Cotta**, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 11, fig. 1, p. 55. Cotta.
- 721. arata**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 153, pl. 16, fig. 10. Inde orientale, Pondichéry.
- \*722. consobrina**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 39, 40. *P. decussata*, Forbes, p. 153 (non Goldf.). Verdachellum.
- 722'. Moullinsii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. restituta*, mais plus étroite et ornée seulement de cinq côtes. France, Lanquais, (Dordogne).
- MYOCONCHA**, Sowerby, 1824. Voy. t. 1, p. 165.
- \*723. supracretacea**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 266, pl. 335. France, Royan, Montignac (Dordogne), Villedieu (Indre-et-Loire).
- 724. elliptica**, Rœmer, 1841, Kreid., p. 66, pl. 8, fig. 17. Ilseburg.
- 725. discrepans**, d'Orb., 1847. *Lithodomus discrepans*, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 86, pl. 2, fig. 15 a. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- MITYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.
- \*726. divaricatus**, d'Orb., 1844, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 275, pl. 340, fig. 3, 4. Saintes, Royan, Cognac.
- \*727. solutus**, Dujardin, 1844, Paléont. franç., 3, p. 276, pl. 340, fig. 5, 6. Tours (Indre-et-Loire), Le Beausset (Var).
- \*728. Dufrenoyi**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 284, pl. 343. Royan (Charente-Inférieure), Cherves, près de Cognac (Charente), Périgueux (Dordogne).
- \*729. Marrotianus**, d'Orb., 1847. Grande espèce voisine du *M. ligeriensis*, mais lisse et plus étroite. Périgueux (Dordogne).
- \*730. Bourgeoisianus**, d'Orb. Jolie espèce treillisée, à crochets obtus. France, Villedieu (Loir-et-Cher). *M. Bourgeois*.
- \*731. Moullinsii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *M. semiornatus*, mais plus large sur la région anale. France, Lanquais (Dordogne).
- 732. Cuvieri**, Mathéron, 1843, Cat., p. 179, pl. 28, fig. 9, 10. Fondouille (B.-du-Rhône).
- 733. subquadratus**, Mathéron, 1843, Cat., p. 178, pl. 28, fig. 7. France, plan d'Aups (B.-du-Rhône).
- 734. subradiatus**, d'Orb., 1847. *M. radiatus*, Münster, Goldfuss, p. 138, fig. 6; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 66, n. 3 (non Müller, 1774). Gehrden, Quedlimburg et Dülmen.
- \*735. concentricus**, v. Münster, Goldf., pl. 138, fig. 5; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 67, n. 5. Haldem, Lemförde.
- 736. ornatus**, v. Münster, Goldf., pl. 129, fig. 8; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 66, n. 1. Haldem, Lemförde.
- 737. Cotta**, Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 66, n. 2, pl. 8, fig. 18; Reuss, pl. 33, fig. 4. Allem., Quedlimburg; Bohême, Kutschlin, Hundorf.
- 738. tetragonus**, d'Orb., 1847. *Modiola tetragona*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 15, pl. 33, fig. 6. Brozau, Priesen.
- 739. fractus**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 16, pl. 33, fig. 11. Laun.

**740. Reussii**, d'Orb. *Mytilus ligeriensis*, Reuss, 1846, Böhm., p. 16, pl. 33, fig. 3 (non d'Orb.). Wildenschwert, Dülmen (Westphalie).

**741. sphenoides**, Reuss, 1846, Böhm., p. 15, pl. 33, fig. 7. Laun.

**742. Mulleri**, d'Orb., 1847. *M. scalaris*, Müller, 1847, Aachen. Kreid., p. 35, pl. 2, fig. 11 (non Phillips, 1841). Aix-la-Chapelle.

**743. inflatus**, Müller, 1847, *id.*, p. 35, pl. 2, fig. 9 a. Aix-la-Chapelle.

**744. tegulatus**, Müller, 1847, *id.*, p. 35, pl. 2, fig. 12 a, b. Aix-la-Chapelle.

**\*745. Araucanus**, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 27, 28. Amér. mérid., Ile Quiriquina (Chili).

**746. typicus**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 152, pl. 14, fig. 4. Inde occidentale, Verdachellum.

**747. nitens**, Forbes, 1846, *id.*, p. 151, pl. 16, fig. 8. Pondichéry.

**748. flagelliferus**, Forbes, 1846, *id.*, p. 152, pl. 16, fig. 9. Pondichéry.

**749. polygonus**, d'Orb., 1846, Astrol., pl. 5, fig. 41, 42. *M. pulcherrinus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 153, pl. 14, fig. 6 (non Phillips, 1839). Pondichéry.

#### **LITHODOMUS**, Cuv., 1817.

**\*750. intermedius**, d'Orb., 1844, Paléont., 3, p. 296, pl. 345, fig. 9, 10. Colombier.

**\*751. Aglae**, d'Orb., 1847. Espèce allongée, égale sur sa longueur, à crochets contournés. France, Le Beausset (Var).

**\*752. contortus**, d'Orb., 1847. *Modiola contorta*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 225, pl. 15, fig. 12. *Lithodomus obtusus*, d'Orb., 1844, Paléont. franç., p. 296, pl. 345, fig. 11-13. Tours (Indre-et-Loire), Royan (Charente-Infér.), Vendôme (Loir-et-Cher).

**753. spatulatus**, Geinitz, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 16, pl. 86, fig. 10. Trzibnitz, Malnitz.

**754. faba**, d'Orb., 1847. *Mytilus faba*, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., p. 36, pl. 2, fig. 13 a, b. Aix-la-Chapelle.

**755. cypris**, d'Orb., 1847. *Mytilus Cypris*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 152, pl. 16, fig. 7. Pondichéry.

#### **LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.

**\*756. tecta**, Goldf., 1836; d'Orb., Paléont., 3, p. 547, pl. 419, fig. 5-8. Tours; Westphalie, Strehlem, Maëstricht; Les Essards (Loir-et-Cher).

**\*757. ovata**, Römer, 1841; d'Orb., Paléont., 3, p. 554, pl. 421, fig. 16-19. *Lima Martiansii*, Math. Fondouille, Martigues (Bouches-du-Rhône), Bains-de-Rennes (Aude), Le Beausset (Var), Villedieu (Loir-et-Cher); Allem., Ilseburg, Alfeld.

**\*758. difficilis**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 551, pl. 423, fig. 10, 11. Royan.

**\*759. pulchella**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 551, pl. 423, fig. 12-15. Tours (Indre-et-Loire), Couture (Loir-et-Cher), St-Frambault (Sarthe).

**\*760. Marrotiana**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 551, pl. 424,

- fig. 1-4. Mussidan, Sourzac, Montignac (Dordogne), Coze (Charente Inférieure), Cambrai (Nord).
- \***761. semisulcata**, Desh., d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 562, pl. 4; fig. 5-9. France, St-Gervais, près de Blois (Loir-et-Cher), Tour Hollande, Maëstricht; Allem., Rugen.
- \***762. Hoperi**, Desh., 1830; d'Orb., Paléont., 3, p. 564, pl. 4; fig. 10-13. Cambrai, Rouen, St-Gervais, près de Blois.
- \***763. Santonensis**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 565, pl. 425, fig. 2. Saintes, Pérignac, Riberac, Périgueux, Montignac, Bivac, Sair Gervais, près de Blois (Loir-et-Cher).
- \***764. Aspera**, Goldf., 1836; d'Orb., Paléont., 3, p. 566, pl. 4; fig. 3-6. Mancy.
- \***765. maxima**, d'Arch., 1837; d'Orb., Paléont. franç., Terr. cré 3, p. 567, pl. 426, fig. 1, 2. France, Royan, Riberac.
- \***766. Mantellii**, Goldf., 1836; d'Orb., Paléont., 3, p. 568, pl. 4; fig. 3-5. Mancy, Ablois (Marne), Tercis, Rivière (Landes); Allen Quedlimbourg.
- \***767. Dujardini**, Desh., 1832; d'Orb., Paléont., 3, p. 569, pl. 4; fig. 1-4. Tours (Indre-et-Loire), St-Gervais, près de Blois.
- \***768. granulata**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 570, pl. 4; fig. 5-9. Chavot, Cramant, Tours; Hollande, Maëstricht; Allen Kinkerode.
- \***769. Dutempleana**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 571, pl. 42; fig. 10-14. Chavot.
- \***770. pectita**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 572, pl. 427, fig. 15-1 Chavot.
- \***771. divaricata**, Dujardin, 1837, Mém. de la Soc. géol., 2, pl. 1; fig. 7. *L. arcuata*, Geinitz. Envir. de Tours; Allem., Strehlem.
- \***772. obsoleta**, Dujardin, 1837, *id.*, 2, pl. 16, fig. 6. Tours.
- 773. elegans**, Dujardin, 1847, *id.*, 2, pl. 16, fig. 1. Tours.
- 774. Ligeris**, Dujardin, 1847, *id.*, 2, pl. 16, fig. 5. Tours.
- \***775. intercostata**, Dujardin, 1847, Mém. de la Soc. géol., 1, pl. 16, fig. 8. Tours (Indre-et-Loire), Villedieu (Loir-et-Cher).
- \***776. truncata**, Münster, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 91, pl. 10; fig. 6. France, Royan; Hollande, Maestricht.
- \***777. Bourgeoisiana**, d'Orb., 1847. Jolie espèce transverse, côtes complexes, granuleuses. France, Les Essards (Loir-et-Cher).
- \***778. elegantula**, d'Orb., 1847. Espèce striée au milieu, costulé inégalement au milieu des stries, sur les côtés. Les Essards.
- \***779. Baugasiana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. proboscidea* à 8 grosses côtes. Cognac (Charente).
- \***780. Coniacensis**, d'Orb., 1847. Espèce oblique en coin, à petite côtes égales. Cognac (Charente), Cambrai (Nord).
- \***781. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Grande espèce avec des indices de côtes granuleuses sur la région anale, le reste marqué de fortes lignes d'accroissement concentriques. Le Beausset.
- \***782. multicostata**, Geinitz, 1842, p. 28, pl. 8, fig. 3; Reuss pl. 38, fig. 7, 8-18. France, Cognac.
- \***783. decussata**, Goldf., pl. 104, fig. 5; Roemer, 1841, Kreid., p. 55 n. 2; Reuss, pl. 38, fig. 15. Rügen; Bohême, Pokralitz, Kanta.



- 784. *minuta***, Goldf., pl. 103, fig. 6 ; Rømer, 1841, Nordd. Kreid., p. 56, n. 5. Allem., Rinkerode.
- 785. *squamifera***, Goldf., pl. 103, fig. 3 ; Rømer, 1841, Nordd. Kreid., p. 56, n. 9. Allem., Coesfeld.
- 786. *laticosta***, Rømer, 1841, Kreid., p. 57, n. 12, pl. 8, fig. 9. All., Gehrden, Strehlem.
- 787. *Nilssoni***, Rømer, 1841, Nordd. Kreid., p. 57, n. 17. *Plagiostoma punctatum*, Nilss., pl. 9, fig. 1. Allem., Ilseburg.
- 788. *septemcostata***, Reuss, 1846, Böhm., p. 33, pl. 38, fig. 5. Laun.
- \*789. *Reussii***, d'Orb., 1847. *L. elongata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 33, pl. 38, fig. 6-9 (non Sowerby, pl. 559, fig. 2). Strehlem, près Dresde; Bohême, Laun, Malnitz, Kutschlin.
- 790. *undulata***, Reuss, 1846, Böhm., p. 35, pl. 38, fig. 13, Trzibitz, Schirzowitz, Laun.
- 791. *dichotoma***, Reuss, 1846, Böhm., p. 35, pl. 38, fig. 10. Hündorf.
- 792. *paucicostata***, Reuss, 1846, Böhm., p. 33, pl. 38, fig. 4. *L. minuta*, Goldf., 2, p. 89, pl. 103, fig. 6. Bohême, Kautz et Horzenc.
- 793. *Pelagica***, d'Orb., 1847. *Plagiostoma id.*, Morton, 1844, Syn. cret. group, p. 61, pl. 5, fig. 2. Etats-Unis (New-Jersey), Burlington-County.
- 794. *reticulata***, Lyell et Forbes, 1844, Quart. journ., 1, p. 62. Etats-Unis, New-Jersey.
- 795. *obliqui-striata***, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London t. 7, p. 154, pl. 18, fig. 13. Inde orientale, Verdachellum.
- AVICULA**, Klein, 1753. Voy. t. 1, p. 13.
- \*796. *Perigordina***, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. pectiniformis*, mais plus étroite et plus oblique. France, Lanquais (Dordogne).
- 797. *Laripes***, Morton, 1834, Syn. of the cretac. group, p. 63, pl. 17, fig. 5. *A. tenuicostata*, Rømer, 1841; d'Orb., in Murch., Vern. et de Keys.; Reuss, 2, p. 490, pl. 43, fig. 5-7. Russie, Simbirsk; Crimée à Bagtché-Seraï; Etats-Unis (Delaware).
- \*798. *approximata***, Goldf., 1838, 2, p. 133, pl. 118, fig. 7. Maëstricht.
- \*799. *triptera***, Goldf., 1838, 2, p. 133, pl. 118, fig. 8. Maëstricht.
- 800. *sublineata***, d'Orb., 1847. *A. lineata*, Rømer, 1841, Kreid., p. 64, n. 3, pl. 8, fig. 15 (non Goldf., 1838). Hanovre.
- \*801. *cœrulescens***, Nilss., pl. 3, fig. 19; Rømer, 1841, Kreid., p. 64, n. 4; Goldf., pl. 118, fig. 6. France, Lanquais (Dordogne); Allem., Lemförde.
- 802. *triloba***, d'Orb., 1847. *Gervilia triloba*, Rømer, 1841, Nordd. Kreid., p. 64, n. 2, pl. 8, fig. 13. Blankenburg.
- \*803. *pectiniformis***, Geinitz, 1842, Kreid., pl. 20, fig. 37, p. 79. *A. pulchella*, Mathéron, 1843, Cat., p. 176, pl. 26, fig. 4, 5. Plan d'Aups (B.-du-Rhône), Lanquais (Dordogne); Bohême, Luschütz, Nacht.
- 804. *glabra***, Reuss, 1846, Böhm., p. 22, pl. 32, fig. 4, 5. Bohême, Laun, Priesen, Postelberg.

- 805. Geinitzii**, Reuss, 1846, Bœhm., p. 23, pl. 32, fig. 6. Bohm Luschitz et Priesen.
- 806. neglecta**, Reuss, 1846, Bœhm., Kreideform., p. 23, pl. fig. 10. Bohême, Luschitz, Priesen, Postelberg.
- 807. paucilincata**, Reuss, 1846, Bœhm. Kreideform., p. 23, pl. fig. 11. Bohême, Luschitz.
- 808. modioliformis**, Müller, 1847, Aachen. Kreideform., pl. 2, fig. 14 a, b. Prusse, Aix-la-Chapelle.
- 809. nitida**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, 4 p. 151, pl. 16, fig. 11. Pondichéry.
- \*809'. pederalis**, Roemer, 1849. Etats-Unis, Friedrich (Texas).
- GERVILIA**, DeFrance, 1820. Voy. t. 1, p. 201.
- \*810. Renauxiana**, Mathéron, 1843; d'Orb., Paléont. franç., 3, crét., 3, p. 490, pl. 298. Mondragon, Fondouilles.
- \*811. Solenoides**, DeFrance, 1818. *Gervilia aviculoides*, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 489, pl. 397, Astrolabe, pl. 4, fig. 37. Val de l'Inde orientale, Pondichéry; Allem., Quedlimburg.
- PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 176.
- \*812. Royana**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 499, pl. 403, fig. 4. Royan.
- INOCERAMUS**, Parkinson, 1811. Voy. t. 1, p. 237.
- \*813. impressus**, d'Orb., 1845, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 409, pl. 409. France, Orglande, Royan.
- \*814. regularis**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 516, pl. 410. *I. Goldf.*, pl. 112, fig. 4 a, b, c (exclus. d). Royan, Mescher, Pérignac, près de Bergerac, Tours, Lanquais (Dordogne), Teras (Land Westphalie, Haldem.
- \*815. Goldfussianus**, d'Orb., 1845, Paléont., 3, p. 517, pl. 4 *I. Cripsii*, Goldf., p. 112, fig. 4 d (non Mantell). Royan, Pérignac (Charente-Inférieure), Caudau, Lanquais (Dordogne), Tours (Ind et-Loire); Westphalie, Haldem.
- \*816. Lamarckii**, Roemer, 1841; d'Orb., Paléont., 3, p. 518, pl. 4 Fécamp, Sens, Mas (Var), Pérignac, Epernay (Marne), Tercis (Lot et-Garonne), Lanquais (Dordogne).
- \*817. involutus**, Sow., 1828; d'Orb., Pal., 3, p. 520, pl. 413. Sa.
- \*818. Cuvieri**, d'Orb., 1845, Pal., 3, p. 520. Meudon, Fécamp, Dieppe (Seine-Inférieure).
- 819. siliqua**, Mathéron, 1843, Cat., p. 174, pl. 25, fig. 6. P. d'Aups (B.-du-Rhône).
- \*820. planus**, Münster., Goldf., 1838, Petref., 2, p. 117, pl. 11 fig. 1. France, St-André-de-Mouille (B.-Alpes), Rivières (Landes), Osnabrück.
- 821. orbicularis**, Münster., Goldf., 1838, Petref., 2, p. 117, pl. 11 fig. 2. Westphalie, Paderborn.
- \*822. propinquus**, Münster., Goldf., 1836, Petref., 2, pl. 109, fig. *J. Cuvieri*, et *concentricus* (pars), Geinitz, sur des échantillons envoyés par lui. Schandau, Strehlem.
- 823. cancellatus**, Goldf., 1836, 2, p. 113, pl. 110, fig. 4. Dülmen.
- 824. lingua**, Goldf., 1836, 2, p. 113, pl. 110, fig. 5. Dülmen.

- \***825. alatus**, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 116, pl. 112, fig. 3. Dresde, Haldem.
- 826. annulatus**, Goldf., pl. 110, fig. 7; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 62, n. 6. Allem., Rothenfelde, Werl.
- 827. Barabini**, Morton, 1834, Syn. of the cret. group, p. 62, pl. 13, fig. 11; pl. 17, fig. 3. Etats-Unis (Alabama), Greene-County.
- 828. alviatus**, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 63, pl. 17, fig. 4. Etats-Unis (Alabama), Greene-County.
- 829. lobatus**, Goldf., pl. 110, fig. 3; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 63, n. 13. Allem., Quedlimburg.
- PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.
- \***830. Barbesillenus**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 611, pl. 437, fig. 5-8. Barbezieux.
- \***831. Marrotianus**, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 612, pl. 438, fig. 1-6. France, Chapelle-Montabouriet.
- \***832. Royanus**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 613, pl. 438, fig. 7-12. Royan, Tours, Le Beausset, Villedieu (Loir-et-Cher).
- \***833. Espallaci**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 614, pl. 439, fig. 1-4. Royan (Charente-Inférieure), Montignac, Colombier (Dordogne), Le Beausset (Var).
- \***834. Dujardini**, Rœmer, 1846; d'Orb., Paléont., 3, p. 615, pl. 439, fig. 5-11. Tours, Royan, Saintes, Montignac (Dordogne), Colombier, Cognac (Charente), Cambrai (Nord), Soulage (Aude); Bohême, Weinbohle.
- \***835. Nilssoni**, Goldf., 1834; d'Orb., Paléont., 3, p. 616, pl. 439, fig. 12-14. Birac (Dordogne), Cambrai (Nord); Westphalie, Strehlem, Maëstricht.
- \***836. cretosus**, Defrance, 1821; d'Orb., Paléont., 3, p. 617, pl. 440, fig. 1-7. Chavot, Nancy, Sézanne, Reims (Marne), St-Gervais de Blois, Meudon; Westphalie, Haldem.
- \***837. Mantellianus**, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 619, pl. 440, fig. 8-11. Chavot.
- \***838. campaniensis**, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 620, pl. 440, fig. 12-16. Chavot.
- \***839. Matronensis**, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 620, pl. 440, fig. 17, 18. Chavot.
- 840. undulatus**, Nilsson, 1827; d'Orb., in Murch. et Vern., Russie, 2, p. 490, pl. 43, fig. 8-10. Russie, Simbirsk; Allem., Osnabruck.
- \***841. Girondinus**, d'Orb., 1847. Espèce à 8 grosses côtes, larges, striées en long. Royan.
- 842. submuricatus**, d'Orb., 1847. *P. muricatus*, Goldf., pl. 93, fig. 9; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 53, n. 25 (non Risso, 1826). Quedlimburg, Haltern.
- 843. seriato-punctatus**, v. Münster, Goldf., pl. 92, fig. 1; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 54, n. 30. Allem., Quedlinburg.
- 844. depressus**, v. Münster, Goldf., pl. 92, fig. 4; Rœmer, 1841, Nordd. Kreid., p. 54, n. 31. Allem., Quedlinburg, Liebenburg et près de Kromsberge.
- 1846. miscallus**, Münst., Goldf., 1835, Petref., 2, p. 51, pl. 91, fig. 8. Osnabrück.

- 847. complicatus**, Goldf., 1835, 2, p. 51, pl. 91, fig. 11. Mûtricht.
- 848. actinodus**, Goldf., 1835, 2, p. 53, pl. 91, fig. 12. Maëstricht.
- 849. ptychodes**, Goldf., 1836, 2, p. 56, pl. 93, fig. 4. Maëstricht.
- 850. cicatrissatus**, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 56, pl. 93, fig. Hollande, Maëstricht; Bohême, Priesen.
- 851. Faujasii**, DeFr., Goldf., 1836, Petref., 2, p. 57, pl. 93, fig. Hollande, Maëstricht, Goslar.
- 852. circularis**, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 76, pl. 99, fig. Haltern, Dorsetshire.
- 853. spathulatus**, Römer, 1841, Kreid., p. 50, n. 4, pl. 8, fig. Rügen.
- 854. subgranulatus**, v. Münster, Goldf., pl. 93, fig. 5; Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 53, n. 21. Osnabrück, Lemförde, Haldem.
- 855. ternatus**, v. Münster, Goldf., pl. 91, fig. 13; Römer, II Nordd. Kreid., p. 53, n. 23. Quedlinburg, Schandau, Saxe.
- 856. trigeminatus**, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 53, n. Goldf., pl. 91, fig. 14; Lemförde, Osnabrück; Bohême, Priesen.
- 857. multicostatus**, Nilss., Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. n. 28; Goldf., pl. 92, fig. 3. Goslar; Hollande, Maëstricht.
- 858. subpulchellus**, d'Orb., 1847. *P. pulchellus*, Goldf., II pl. 91, fig. 9 (non Nilsson, 1827). Coesfeld.
- 859. concentric-punctatus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 28, pl. fig. 8. *P. arcuatus*, Nilsson, pl. 9, fig. 14 (non Sow.). Laun, Kystr.
- 860. decalvatus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 35, pl. 38, fig. 19. Trzibitz.
- \*861. divaricatus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 28, pl. 39, fig. 6. *arcuarius*, Goldf., pl. 91, fig. 6 (non Sow.). Haltern, Trzibitz, Priesen, Czencziz, Neuschloss, Malnitz, Bilin, Meronitz; Prusse, Aix-la-Chapelle, Maëstricht.
- \*862. septemplicatus**, Nilss., pl. 10, fig. 8; Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 51, n. 11. *P. ptychodes*, Goldf., pl. 93, fig. 4. Quedlinburg, Gehrden, Maëstricht.
- 862'. nitidus**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 130, pl. 394, fig. Angleterre, Suffolk.
- 863. subaratus**, Nilss., pl. 9, fig. 11; Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 52, n. 18. Allem., Rügen.
- \*864. pulchellus**, Nilss., pl. 9, fig. 12; Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 52, n. 19. *P. miscellus*, v. Münster, Goldf., pl. 91, fig. Haldem, Maëstricht.
- 865. spurius**, v. Münster, Goldf., pl. 91, fig. 10; Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 52, n. 20. Allem., Haldem.
- 866. granulifer**, Reuss, 1846, Böhm., p. 28, pl. 39, fig. 9. Hohenpetersch.
- 867. spatulæformis**, Reuss, 1846, Böhm., p. 28, pl. 39, fig. 1. Bilin.
- 868. subaffinis**, d'Orb., 1847. *P. affinis*, Reuss, 1846, Böhm., p. 28, pl. 39, fig. 11 (non Risso, 1825). Bilin.
- 869. Reussii**, d'Orb., 1847. *Pecten obliquus*, Reuss, 1846, Böhm., Kreideform., p. 29, pl. 39, fig. 18 (non Sow.). Bohême, Trzibitz.
- 870. rarispinus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 31, pl. 39, fig. 15. Priesen.

- 871. *venustus***, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 58, pl. 5, fig. 7. Etats-Unis (New-Jersey), Arneytown.
- 872. *calceatus***, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 58, pl. 10, fig. 3. Etats-Unis (South-Carolina), Eutaw-Sprengs.
- 873. *membranosus***, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 59, pl. 10, fig. 4. Etats-Unis (South-Carolina).
- \*874. *granulatus***, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 29, 30. Ile Quiriquina (Chili).
- \*875. *Chilensis***, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 2, fig. 31, 32. Ile Quiriquina (Chili).
- 876. *Verdachellensis***, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 154, pl. 14, fig. 5. Inde occidentale, Verdachellum.
- 877. *subvirgatus***, d'Orb., 1847. *P. virgatus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 154, pl. 15, fig. 22, (non Nilsson, pl. 9, fig. 15). Les côtes sont plus fines dans celui de l'Inde. Trinchinopoly.
- 878. *subsquamula***, d'Orb., 1847. *P. squamula*, Roemer, 1841, Kreid., p. 50, n. 6 (non Lam., 1804). *P. inversus*, Nilss., pl. 9, fig. 18; Goldf., pl. 99, fig. 6. Lemförde.
- JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. p. 83.
- \*879. *quadrircostata***, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 644, pl. 447, fig. 1-7. Talmont, Saintes, Pérignac, Royan, Birac, Cognac, Tours, Valognes, Sougraigne, Mareuil, Montignac, Riberac, Le Beausset (Var); Maëstricht.
- \*880. *Dutemplei***, d'Orb., 1846, Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 646, pl. 447, fig. 8-11. France, Chavot; Maëstricht.
- \*881. *Truellei***, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 647, pl. 448, fig. 1-4. Saintes.
- \*882. *sexangularis***, d'Orb., 1846, Paléont. franç., 3, p. 648, pl. 448, fig. 5-8. France, Pons, Coze, Mirambeau.
- \*883. *decemcostata***, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 649, pl. 449, fig. 1-4. Cognac.
- \*884. *substriato-costata***, d'Orb., 1847. *J. striato-costata*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 650, pl. 449, fig. 5-9 (non Goldf., 1840). Cognac, Royan; Molineuf, près de Blois. Allem., Coesfeld, Lemförde, Dülmen.
- \*885. *Simbirskensis***, d'Orb., 1847. *Pecten id.*, d'Orb., 1845, in Murch., de Keys. et de Vern., Russie, 2, p. 491, pl. 43, fig. 11-14. Russie, Simbirsk.
- \*886. *Podolica***, d'Orb., 1847. *Pecten id.*, d'Orb., 1844, Paléont. du Voy. de M. Hommaire, p. 440, pl. 6, fig. 21-24. Crimée, Bagtché-Seraï.
- 887. *Makovii***, d'Orb., 1847. *Pecten id.*, Dubois, 1831, Conch. foss., p. 70, pl. 8, fig. 12. Podolie, Makow.
- \*888. *Mortoni***, d'Orb., 1847. *Pecten quinquecostatus*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 57, pl. 19, fig. 1 (non Sowerby). Il diffère par 5 côtes intermédiaires aux grosses côtes latérales, au lieu de quatre. Etats-Unis; France, Grand-Pivoie, près de Martigues (B.-du-Rhône).
- 889. *craticula***, d'Orb., 1847. *Pecten craticula*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 57. Etats-Unis (New-Jersey), Arneytown.
- 890. *Fontanieri***, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 4, fig. 38-40. *Pecten*

- quinquecostatus*, Forbes, Pondichéry (non Sowerby). Verdaillum.
- SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.
- \*891. *Carantonensis*, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 665, pl. 456, fig. 7. Cognac.
- \*892. *Santonensis*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 666, pl. 457. France, Saintes, Mareuil, Rochebeau-Court.
- \*893. *globulosus*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 667, pl. 458. Saintes, Cognac.
- \*894. *truncatus*, Goldf., 1842; d'Orb., Paléont., 3, p. 668, pl. 459. (non Reuss). Tours, Villedieu, Couture, St-Gerolte; France, Aix-Chapelle.
- \*895. *Royanus*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 671, pl. 460, fig. 1. Royan.
- \*896. *Dutempleanus*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 672, pl. 461, fig. 6-11. Chavot (Marne), Le Beausset (Var), Royan, St-Gervais, Blois.
- \*897. *spinosus*, Desh., 1828; d'Orb., Paléont., 3, p. 673, pl. 462, fig. 1-4. St-Gervais, près de Blois, Vendôme, Meudon, Sens, Fécamp, Soulage, Sougraigne (Aude); Bohême, Kosslitz, Lauen, Blin, Tep, Costenblatt, Trzibnitz, Hundorf, Kutschlin, Pokalitz, Mariaschewitz.
- \*898. *obesus*, d'Orb., 1846, Paléont., 3, p. 675, pl. 461, fig. 5. France, Troyes; Tournay, Belgique. (Espèce sans doute cénomanienne.)
899. *lineatus*, Goldf., pl. 106, fig. 3; Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 59, n. 9. Alfeld, Strehlem; Aix-la-Chapelle.
- \*900. *imbricatus*, Goldf., pl. 106, fig. 2; Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 60, n. 11. France, Tours; Hanovre, Peine, Quedlinburg.
901. *subplicatus*, d'Orb., 1847. *S. plicatus*, Münster, Goldf., 1848, Petref., 2, p. 98, pl. 106, fig. 7 (non Linné, 1767). Maëstricht.
902. *sublevis*, Münst., Goldf., 1836, 2, p. 99, pl. 106, fig. 8. Maëstricht.
903. *asper*, v. Münster, Goldf., pl. 106, fig. 1; Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 59, n. 5. Allem., Runkeroede.
904. *dumosus*, d'Orb., 1847. *Plagiostoma id.*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 59, pl. 16, fig. 8. Etats-Unis (Alabama), prairie Blanche, St-Stephens.
905. *gregalis*, d'Orb., 1847. *Pl. giostoma id.*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 60, pl. 5, fig. 6. Etats-Unis (New-Jersey), Burlington County.
906. *calcaratus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, 1, p. 155, pl. 18, fig. 2. *S. subsquamosus*, Forbes, 1846, pl. 18, fig. 1. Pondichéry.
- PPLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 202.
907. *aspera*, Sow., 1831, d'Orb., Paléont., 3, p. 685, pl. 463, fig. 11-12. *Plicatula urtica*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 63, pl. x, fig. 2. France, Tours; Etats-Unis, New-Jersey, Alabama; Tyrol, Gozau.
- \*908. *nodosa*, Dujardin, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 228, pl. 15, fig. 14. *P. pectinoides*, Reuss, 1846, Kreid., pl. 31,

- fig. 16, 17 (non Spwarby). France, Tours (Indre-et-Loire); Bohême, Webeschan, Trziblit.
- 909. radiata**, Goldf., pl. 107, fig. 7; Roemer, 1841, *Nordd. Kreid.*, p. 60, n. 3, Allem., Coësfeld; Bohême, Kossitz.
- 910. multicostata**, Forbes, 1846, *Trans. geol. Soc. of London*, t. 7, p. 155, pl. 18, fig. 3. Verdachellum.
- 911. septemcostata**, Forbes, 1846, *Trans. geol. Soc. of London*, t. 7, p. 155, pl. 18, fig. 4. Peut-être *Pl. acedosa*, Dujardin: Pondichéry.
- CHAMA**, Linné, 1758. *Voy.* p. 170.
- \*912. angulosa**, d'Orb., 1846, *Paléont.*, 3, p. 699, pl. 464, fig. 8, 9. Royan.
- \*913. semiplana**, Roemer, 1841, *Kreid.*, p. 67, n. 2, pl. 8, fig. 19. Gehrden.
- OSTREA**, Linné, 1752. *Voy.* t. 1, p. 166.
- \*914. curvirostris**, Nilsson, 1827. *D'Orb.*, *Paléont.*, 3, p. 750, pl. 488, fig. 9-11. Tours (Indre-et-Loire); Hollande, Maëstricht.
- \*915. canaliculata**, d'Orb., *Paléont.*, 3, p. 709, pl. 471, fig. 4-8. *O. lateralis*, Reuss, pl. 27, fig. 138-45. Chavot (Marne). Pyrénées, la Falaise; Maëstricht; Bohême.
- \*916. frons**, Parkinson, 1811. *D'Orb.*, *Paléont.*, 3, p. 733, pl. 483. *O. Harpa*, Goldf., pl. 75, fig. 3. St.-Gervais-de-Blois, Saintes, Royan, Thénon, Pérignac, Riberac, Birac, Cognac, Villadieu, Tours, Louviers; Suède, Balsberg; Maëstricht.
- \*917. hippopodium**, Nilsson, 1827. *D'Orb.*, *Paléont.*, 3, p. 731, pl. 481, fig. 4-6, pl. 482. Saintes, Royan (Char.-Inférieure); Suède, Kopengemolla.
- \*918. laciniata**, d'Orb., *Paléont.*, 3, p. 739, pl. 486, fig. 1-3. Vendôme (Loir-et-Cher), Saintes (Charente-Inférieure); Scanie; Suède; Hollande, Maëstricht; Prusse, Aix-la-Chapelle, Coësfeld.
- \*919. larva**, Lamarck, 1819. *D'Orb.*, *Paléont.*, 3, p. 740, pl. 486, fig. 4-8. *O. tegulacea*, Forbes, 1846, *Trans. geol. Soc.*, 7, pl. 18, fig. 6. *O. Ponticerianus*, D'Orb., *Astrolabe*, pl. 5, fig. 45; 46. *O. falcata*, Morton, 1834, *Syn. cret. group*, pl. 3; fig. 5, pl. 9, fig. 6, 7. *O. nasuta*, Morton. *O. mesenterica* id. France, Royan, Mescher (Charente-Inférieure), Ginsac (Haute-Garonne); Hollande, Maëstricht; Indes, Pondichéry; États-Unis, Delaware, Saint-Georges (Alabama), prairie Bluff, Cahawba (New-Jersey), Shrewsbury.
- \*920. Matheroniana**, d'Orb., 1847, *Paléont.*, 3, p. 737, pl. 485. *Ezogrya Texasana*, Roemer, 1849. Texas (New-Braunfels). *O. spinosa*, Roemer, 1836. *Ezogrya spinosa*, Math., 1843. France, Martigues (B.-du-Rhône), Beausset (Var), Tours (Indre-et-Loire), Saintes, Royan, Cognac (Charente-Inférieure), Saint-Crépin, Chapelle-Montalembert (Dordogne).
- \*921. Normaniana**, d'Orb., 1847, *Paléont.*, 3, p. 746, pl. 488, fig. 1-3. France, Dieppe (Seine-Inférieure), Chavot (Marne).
- \*922. Santoneusis**, d'Orb., 1847, *Paléont.*, 3, p. 736, pl. 484. *O. diluviana*, Goldfuss, p. 75, fig. 4, d. *O. pes-leonis*, Forbes, 1846, Pondichéry, pl. 18, fig. 5. Tours (Indre-et-Loire), Le Beausset; Prusse, Aix-la-Chapelle, Mazange, Authon, Montoire (Loir-et-Cher). Saintes

(Charente-Inférieure), Grand-Piroeu, près de Martigues (Bouches-du-Rhône); Indes orientales, Pondichéry.

- \***923. semi-plana**, Sow., d'Orb., Paléont., 3, p. 747, pl. 4 fig. 4, 5. *O. Naumani*, Reuss, pl. 27, fig. 48-53. *O. acuticosta*, Galea 1839, Bull. de l'Acad. de Brux., 7, p. 2, fig. 2. France, Épernay, Villedieu (Loir-et-Cher); Suède; Russie; Bohême, Kosslitz; Mexique, Tehuacan.
- \***924. Turoniensis**, d'Orb., 1847, Paléont., 3, p. 748, pl. 4 fig. 4-7. Tours, Cognac (Charente), Martigues (Bouches-du-Rhône) Le Baussat; Hanovre, Gehrden.
- 925. vesicularis**, Lamarck, 1819. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., 3, p. 742, pl. 487. *Gryphæa expansa*, Sow., 1831, Trans. geol. Soc., 3, pl. 38, fig. 5. *G. elongata*, Sow., id., pl. 38, fig. 6. *Gryphæa cella*, F. Römer, 1849, *Gryphæa. Ostrea et Gryphæa convessa*, G. A. tabilis, Say et Morton, 1834, pl. 4, fig. 1-3. *Gryph. Pitcheri*, Morton, pl. 15, fig. 5-9. France, Meudon, Sens, Rouen, Épernay, Vendôme, Royan, Pérignac, Saintes (Charente-Inférieure), Tours; Caenn (Var), Cognac (Charente), Montignac, Saint-Crépin, Lanquais, Lot (Dordogne); Russie, Simbirsk; Crimée, Bagtcheseraï; États-Unis (New-Jersey), Delaware, Alabama, Tennessee, Missouri (Arkansas), Kiameska; Tyrol, Gozau; Bohême, Kutschlin, Bilin, Kosslitz; Hollande, Maëstricht, Osnabruck, Texas à New-Braunfels.
- 926. Wegmaniana**, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. crét., p. 749, pl. 488, fig. 6-8. Fr., Chavot, Césane (Marne), Pouilly (Oise).
- 927. acutirostris**, d'Orb., 1846, Pal., 3, p. 730, pl. 1-3. France, La Malle, Beausset, Martigues, Uchaux; Hollande, Maëstricht.
- \***928. lunata**, Nilsson, Goldf., Petref. Germ., 3, pl. 75, fig. 2. Hollande, Maëstricht.
- 929. Proteus**, Reuss, 1846, Böhm., p. 41, pl. 27, fig. 12-27. Bohême, Luschitz, Kystra, Kantz.
- \***929'. ponderosa**, d'Orb., 1849. *Exogyra ponderosa*, F. Römer, 1849. Texas, New-Braunfels.
- \***930. subinflata**, d'Orb., 1847. *Exogyra inflata*, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 121, pl. 114, fig. 8 (non Gmel., 1789). *Ex. decussata*, Goldf., pl. 86, fig. 11. *Ex. conica*, Goldf., pl. 87, fig. 1. *Gryphæa staumaloide*, Forbes, 1848, Trans. geol. Soc., 7, pl. 17, fig. 15. *G. orientalis*, Forbes, id., pl. 14, fig. 6. *O. crepidula*, d'Orb., Astrolabe, pl. 5, fig. 44. Hollande, Maëstricht; Indes orientales, Pondichéry, Verchellum.
- 931. auricularis**, d'Orb., 1847. *Exogyra auricularis*, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 39, pl. 88, fig. 2. Maëstricht.
- \***931'. anomisiformis**, F. Römer, 1849. Texas, New-Braunfels.
- 932. latirostris**, Dubois, 1831, Conch. foss., p. 74, pl. 8, fig. 41-46. Podolie, Makow.
- 933. plumosa**, Mort., 1834, Synop. crét. group, p. 51, pl. 3, fig. 1. États-Unis (New-Jersey), Arnetown.
- 934. panda**, Morton, 1834, Syn. crét. group, p. 51, pl. 3, fig. 4 pl. 19, fig. 10. États-Unis (Delaware), Saint-Georges, Caroline du Sud, Alabama.



- 935.** *torosa*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 52, pl. 10, fig. 1. États-Unis (New-Jersey), Mullica-Hill.
- 936.** *cretacea*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 52, pl. 19, fig. 3. États-Unis (Alabama), Greene-County, prairie bluff, Erié (South-Carolina).
- 937.** *vomer*, d'Orb., 1847. *Gryphæa id.*, *G. plicatella*, Mort., 1834, Synopsis cret. group, p. 54, pl. 9, fig. 5. États-Unis (New-Jersey), Egypte.
- 938.** *Americana*, Desh., 1830, Encycl., p. 304. *Exogyra costata*, Say, 1821, Amer. Journ., t. 2, p. 43. Morton, 1834, Syn. cret., pl. 9 fig. 1-4. (non Sow.). États-Unis, Delaware, New-Jersey, South-Carolina, Alabama, Tennessee, Arkansas.
- 939.** *subpatulata*, Forbes, 1844, Quarterly Journal, 1, p. 61. États-Unis, New-Jersey.
- 940.** *subsimilis*, d'Orb., 1847. *O. similis*, Galeotti, 1839, Bull. de l'Acad. de Bruxelles, t. 7, n° 10, p. 3, fig. 3 (non Pusch, 1837). Mexique, Tehuacan.
- 940.** *Arietina*, d'Orb., 1849. *Exogyra arietina*, F. Roem., 1849. Texas, New-Braunfels.
- ANOMYA**, Linné, 1758.
- 941.** *subradiata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 45, pl. 31, fig. 18, 19. Luschnitz et Horzens.
- 942.** *argentaria*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 61, pl. 5, fig. 10. États-Unis (Delaware), St.-Georges.
- 943.** *tellinoides*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 61, pl. 5, fig. 11. États-Unis (New-Jersey).
- 944.** *lamellosa*, Römer, 1841, Kreid., p. 49, n° 2, pl. 8, fig. 3. Quedlinburg.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

- LINGULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 14.
- 945.** *Meyeri*, Dunker, 1847, Palæontographica, n° 1, p. 130, pl. 18, fig. 9. Allemagne, Osnabrück.
- REYNCHONELLA**, Fischer. Voy. t. 1, p. 92.
- 946.** *Baugasii*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, p. 43, pl. 498, fig. 10-13. Cognac (Charente-Inférieure), Villedieu (Loir-et-Cher).
- 947.** *Vespertilio*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, p. 44, pl. 499, fig. 1-8. Saint-Christophe, Tours (Indre-et-Loire), Saintes (Charente-Inférieure), Vendôme, Villedieu (Loir-et-Cher), Cognac (Charente), Montignac (Dordogne); Italie.
- 948.** *octoplicata*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, p. 46, pl. 499, fig. 9-11. Villedieu (Loir-et-Cher), Meudon, Fécamp, Sens (Yon.), Chavot (Marne); Russie, Simbirsk; Belgique, Ciply; Bohême, Strehlen; Angleterre, Lewes; Russie, Somborsk.
- 949.** *subplicata*, d'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 499, fig. 12-15. Chavot, Meudon; Belgique, Ciply.
- 950.** *difformis*, d'Orb., 1847, Paléont. franç., Terr. cré., pl. 38, fig. 6-9. France, Royan (Charente-Inférieure), Martigues (Bouches-du-Rhône).

**MAGAS**, Sowerby, 1816. D'Orb., Paléont. franç., Terre crét., t. 4.

\***951. pumilus**, Sow., 1816. D'Orb., Paléont., 4, pl. 501. France Blois, Meudon, Saint-Germain, Sens, Fécamp, Saint-Servais, Epernay; Russie, Simbirsk; Angleterre.

**TREBRATULINA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 85.

\***952. echinulata**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 500, fig. 7-8. *Terebr. id.*, Dujardin. Tours, Cognac, Saintes, Gros-Pirou, près de Martigues, Vendôme (Loir-et-Cher).

\***953. elegans**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 504, fig. 1-3. Chavot Cramant, Maney, Ablois, Fécamp, Muides.

\***954. striata**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 504, fig. 9-12. *Terebr. chrysalis*, Davidson, Lons. geol. Journ., pl. 18, fig. 18-20. Paris, Sen Chavot, Cramant, Maney, Ablois, Vendôme, Villedieu (Indre-et-Loire); Russie, Simbirsk; Maëstricht.

\***955. gracilis**, d'Orb., 1847. *Terebr. id.*, Schli. D'Orb., 1847, Murch. de Vern. et de Keys., 2, p. 495, pl. 43, fig. 24-26. Russie, Simbirsk; Bohême, Kossnitz, Bilin, Kystra, Trzibitz, Meronitz, Sleslen.

**956. ornata**, d'Orb., 1847. *Terebratula ornata*, Roem., 1840, Nordd. Kreid., p. 40, n° 26, pl. 7, fig. 10. Strehlen, Weinböhla, THURINGIE.

\***957. floridana**, d'Orb., 1847. *Terebratula id.*, Morton, 1834, Id. cret. group, p. 72, pl. 16, fig. 7. Etats-Unis (Alabama), prairie.

**TREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

\***958. carnea**, Sow., 1813. D'Orb., Paléont., 4, pl. 513, fig. 1-4. Muides, Charot, Sens, Villedieu (Indre-et-Loire); Russie, Simbirsk dans le Donetz; Angleterre, Worwich; Mingrélie, Saiesini; Westphalie, Halden; Maëstricht.

\***959. semi-globosa**, Sow., 1813. D'Orb., Paléont., 4, pl. 514, fig. 1-4. Fécamp, Dieppe, Muides, Sens, Césane; Angl., Testmouth, Warminster; Allem., Danesdake; Maëstricht.

\***960. Hebertiana**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 514, fig. 5-10. France, Chavot, Césane.

\***961. Toucasiana**, d'Orb., 1847. Espèce avec le pli de la région palléale du *T. semi-globosa*, mais toujours plus déprimée, à lèvre plus saillant. Le Beausset (Var), Martigues (Bouches-du-Rhône).

**962. longirostris**, Wahlemborg, Roemer, 1839, Nordd. Geol., p. 24, pl. 18, fig. 13. Nilsson, Petr. sues., pl. 4, fig. 1. Suède, Bahberg, Schandelahe.

\***963. Harlani**, Morton, 1834. *Id. Camilla*, Morton, Synops. cret. group, p. 70, pl. 3, fig. 1, pl. 9, fig. 8-9. Etats-Unis (New-Jersey); Egypte.

\***963'. subfragilis**, d'Orb., 1847. *T. fragilis*, Morton, 1834, Synops. cret. group, p. 70, pl. 3, fig. 2 (non Schlottheim, 1813). Etats-Unis (New-Jersey); Egypte.

**964. arabilla**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 138, Espèce voisine du *T. Toucasiana*, d'Orb., pl. 13, fig. 12. Perdidichéry.

\***965. Vendocinensis**, d'Orb., 1847. Petite espèce globuleuse, ronde, lisse, sinueuse sur la région palléale, la petite valve peu convexe. France, Vendôme.

**TEREBRATELLA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 222.

\***966. Santonensis**, d'Orb., 1847. Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 518, fig. 5-9. France, Royan, Périgueux.

\***967. Bourgeoisii**, d'Orb., 1847. Paléont., 4, pl. 518, fig. 10-16. Lavardin.

\***968. plicata**, d'Orb., 1847. *Terebratula Sayi*, Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 71, pl. 3, fig. 3, 4. *Terebr. plicata*, Say, 1839; Amér. Journ., 2, p. 43. Etats-Unis (New-Jersey), Burlington-county.

**969. Vanuxemiana**, d'Orb., 1847. *Terebratula vanuxemiana*, Lyell et Forbes, 1844, Quarterly Journ., 1, p. 62. Etats-Unis, New-Jersey.

\***970. Parisiensis**, d'Orb., 1847. Petite espèce ronde, à valves très-inégales, ornée de larges côtes dichotomes, carénées. France, Meudon.

**FISSURIROSTRA**, d'Orb., 1847. Paléont. franç., Terr. crét., 4.

\***971. recurva**, d'Orb., 1847. Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 520, fig. 1-8. France, Néhou (Manche).

\***972. elegans**, d'Orb., 1847. Paléont., 4, pl. 520, fig. 9-13. Néhou.

\***973. pectita**, d'Orb., 1847. Paléont., 4, pl. 520, fig. 14-18. Maëstricht.

\***974. pulchella**, d'Orb. *Terebr. pulchella*, Nilsson, Petref. sues., pl. 3, fig. 14. Scanie, Charlottenlund.

**CRANIA**, Retzius, 1781. Voy. t. 1, p. 21.

\***975. Parisiensis**, DeFrance, 1819. D'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., pl. 524, fig. 8-13. France, Meudon, Sens.

\***976. Ignabergensis**, Retzius, 1781. D'Orb., pl. 525, fig. 1-6. *Crania striata*, DeFr., 1819. Meudon, Fécamp, Sens; Royan (Char.-Inférieure); Angleterre, Hampton; Suède, Ignaberga; Hollande, Maëstricht.

\***977. antiqua**, DeFr., 1818. D'Orb., Paléont., pl. 525, fig. 11-16. France, Néhou (Manche); Schlenacken.

\***978. costata**, Sow., d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., pl. 525, fig. 7-10. France, Néhou; Suède, île Rugen.

\***979. Brattemburgensis**, d'Orb., 1847. *Nummulus Brattemburgensis*, Stœrus, Diss. epist., 1732. *C. nummulus*, Lamarck, Goldfuss, pl. 162, fig. 5. Maëstricht; Prusse, Aix-la-Chapelle, Schlenacken; Allemagne, Gehrden.

\***980. tuberculata**, Nilss., Petref. sues., p. 37, pl. 8, fig. 10. Dann., Goldf., pl. 162, fig. 7. Suède, Copenhague.

\***981. nodulosa**, Hœningh., Goldf., pl. 162, fig. 9. Maëstricht.

\***982. spinulosa**, Nilsson, Petref. sues., p. 37, tab. 3, fig. 9. Holl., Maëstricht; Suède, Morby.

**MEGATHIRIS**, d'Orb., 1847. Paléont. franç., Terr. crét., 4.

\***983. cuneiformis**, d'Orb., 1847. Paléont., 4, pl. 521, fig. 1-11. *Terebratula Duvalii*, Davidson, Lons. geol. Journ., 5, pl. 18, fig. 15-18. Chavot, Ablois (Marne), Fécamp (Seine-Inférieure), Meudon.

\***984. depressa**, d'Orb., 1847. Paléont., 4, pl. 521, fig. 12-16. Chavot, Ablois, Fécamp.

**THECIDEA**, DeFrance, 1828.

\***985. papillata**, Bronn, d'Orb., Paléont. franç., Terr. crét., pl. 523, fig. 1-8. France, Néhou; Hollande, Maëstricht.

- \***986. recurvirostra**, DeFrance, 1828. D'Orb., Paléont. franç. Terr. crét., pl. 523, fig. 9-17. France, Néhou; Holl., Maëstricht.
- \***987. hippocrepis**, Goldf., 1841, 2, p. 289, pl. 161, fig. 4. Maëstricht.
- \***988. hieroglyphica**, DeFrance, Goldf., 1841, Petref. Germ., p. 290, pl. 161, fig. 5. Hollande, Maëstricht.
- HIPPURITES**, Lamarck, 1801. Voy. p. 198.
- \***990. radiosa**, Desmoulins, Spherul., p. 141, pl. 9, fig. 2. D'Orb. Paléont., pl. 535, fig. 1-3. Vache-Perdue (Dordogne).
- 991. Espallaciana**, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 535, fig. 4. Royan.
- RADIOLITES**, Lamarck, 1801. Voy. p. 108.
- \***992. Hœninghausii**, d'Orb. *Sphærul. id.*, Desmoulins. D'Orb. Paléont., 4, pl. 565, 566, 567. Royan, Mescher (Charente-Inférieure) la Vache-Perdue (Dordogne).
- \***993. crateriformis**, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 563. *Sphærites id.*, Desmoulins, 18, 26. Royan (Charente-Inférieure), Lanquais (Dordogne).
- 994. Bournonii**, d'Orb., 1842, Ann. des Sc. nat., p. 188. *Sphærites id.*, Desmoul., 1826. Essai sur les Sphér., p. 124. France, Royan, Talmont, vallée de La Couze (Dordogne).
- \***995. dilatata**, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 568. *Sphærolites id.*, Desmoulins 1826. France, Royan.
- \***996. alata**, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 569. Royan.
- \***997. acuta**, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 571, fig. 4-8. Royan.
- \***998. Royana**, d'Orb., 1842, Paléont., 4, pl. 571, fig. 1-3. Royan.
- \***999. Jouannetii**, d'Orb., 1845. *Sphærolites Jouannetii*, Desmoulins, *Sphærolites*, pl. 3. D'Orb., 1847, Pal., 4, pl. 564. France, Lanquais, Vache-Perdue (Dordogne).
- 1000. cylindracea**?, d'Orb., 1847. *Sphærolites cylindracea*, Desmoulins, *Sphærolites*, pl. 4. France, vallée de la Couze (Dord.).
- 1001. ingens**?, d'Orb., 1847. *Sphærolites ingens*, Desmoulins, *Sphærolites*, p. 122. Talmont, Royan.
- 1002. calceoloides**?, d'Orb., 1847. *Sphærolites id.*, Desmoulins, *Sphærolites*, p. 130, pl. 9, fig. 1. Vallée de la Couze (Dordogne).
- \***1002'. sinuata**, d'Orb., 1847, Pal. franç., Terr. crét., 4, pl. 571. Le Beausset, Martigues.
- 1003. Lapeirousii**, d'Orb., 1847. *Hippurites Lapeirousii*, Goldf., 1841, Petref., 2, p. 303, pl. 165, fig. 5. France, Lanquais (Dordogne); Maëstricht.
- BIRADIOLITES**, d'Orb., 1847. Voy. p. 200.
- \***1004. fissicostata**, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 575. Martigues.
- CAPROTINA**, d'Orb., 1839. Voy. p. 109.
- 1005. Russiensis**, d'Orb., 1847. *Caprina id.*, d'Orb., 1845, in Vern. Murch. et de Keys., 2, p. 496, pl. 43, fig. 31-33. Russie, Simbirsk.
- \***1006. Marticensis**, d'Orb., 1847. *Depilidia Marticensis*, Mathér., 1842, Catal., pl. 7, fig. 1, 2. D'Orb., Paléont., 4, pl. 599. France, Martigues, Beausset.

## MOLLUSQUES BRYOZOAIRES.

**VINCULARIA**, DeFrance, 1828.

\*1007. *Normaniana*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 600, fig. 14-16. France, Fécamp (Seine-Inférieure), Meudon, près de Paris.

\*1008. *gracilis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 600, fig. 11-13. Fécamp.

\*1009. *cretacea*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 600, fig. 17-19. Fécamp.

\*1010. *regularis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 601, fig. 1-3. Fr. Fécamp, Meudon, près de Paris.

\*1011. *sulcata*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 601, fig. 4-6. Meudon.

\*1012. *macropora*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 601, fig. 7-9. Meudon.

1013. *Bronnii*, Reuss, 1846, Böhm., p. 66, pl. 15, fig. 30. Bilin.

1014. *subrhombifera*, d'Orb., 1847. *V. rhombifera*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 67, pl. 15, fig. 28 (non Goldf., 1830). Bohême, Luschitz.

1015. *nodulosa*, d'Orb., 1847. *Escharites nodulosa*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 17, n° 3, pl. 5, fig. 8. Allemagne.

1016. *labiata*, d'Orb., 1847. *Escharites labiata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 17, n° 4, pl. 5, fig. 9. Allemagne.

1017. *incrustata*, d'Orb., 1847. *Escharites incrustata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 17, n° 2, pl. 5, fig. 10. Allem., Gehrden.

\*1018. *grandis*, d'Orb., 1850, Pal., 4, pl. 601, fig. 10-13. Royan.

\*1019. *dubia*, d'Orb., 1850, Pal., 4, pl. 601, fig. 14-17. Fécamp.

\*1019'. *porosa*, d'Orb., 1847. *Melicerilites porosa*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 18, n° 3, pl. 15, fig. 12. Fr., Royan; All., Gehrden.

**MEMBRANIPORA**, Blainville, 1834. Edwards, Edit. de Lamarck, p. 218.

1020. *velamen*, d'Orb., 1847. *Cellepora id.*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 26, pl. 9, fig. 4. Hollande, Maëstricht; Bohême; Rugen.

\*1021. *dentata*, Blainville, 1834. *Cellepora id.*, Goldf., Petref., 1, p. 27, pl. 9, fig. 5. Hollande, Maëstricht.

\*1022. *bipunctata*, Blainv., 1834. *Cellepora id.*, Goldf., Petref., 1, p. 27, pl. 9, fig. 7. Hollande, Maëstricht; Allem., Rugen.

\*1023. *cyclostoma*, d'Orb., 1847. *Eschara cyclostoma*, Goldf., 1830, Petref. Germ., 1, p. 23, pl. 8, fig. 9. Hollande, Maëstricht.

\*1024. *concatenata*, d'Orb., 1847. Pal., 4, pl. 607, fig. 7, 8. *Marginaria concatenata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 69, pl. 15, fig. 16. Kutschlin; Fr., Meudon, Néhou.

1025. *ostiolata*, d'Orb., 1847. *Marginaria ostiolata*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 69, pl. 15, fig. 14. Bohême, Bilin.

1026. *hexagonalis*, d'Orb., 1847. *Discopora hexagonalis*, Reuss, 1846, Böhm. Kreidef., p. 69, pl. 15, fig. 9. Goldf., 1, p. 102, pl. 36, fig. 16. Bohême, Traunstein, Hradek.

\*1027. *simplex*, d'Orb., 1847, Paléont., 4, pl. 605, fig. 3, 4. *Discopora simplex*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 69, pl. 15, fig. 8. Bohême, Bilin; France, Tours, Saintes, Royan.

**1028. *crispa***, d'Orb., 1847. *Discopora crispa*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 69, pl. 15, fig. 7. Bohême, Bilin.

\***1029. *Normaniana***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 607, fig. 9, H. Fécamp, Tours.

\***1030. *Ligeriensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 607, fig. 10, H. Fécamp, Tours.

**1031. *subrotunda***, d'Orb. *Marginaria subrotunda*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 69, pl. 15, fig. 11. Bohême.

**1032. *tenera***, d'Orb., 1847. *Marginaria tenera*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 69, pl. 15, fig. 12. Bohême, Bilin.

**MARGINARIA**, Römer, 1841.

**1033. *tenuisulcata***, Reuss, 1846, Böhm., p. 69, pl. 15, fig. 11. Bohême.

\***1034. *hippocrepis***, d'Orb., 1847, *Cellepora hippocrepis*, Goldf., p. 26, pl. 9, fig. 3. Hollande, Maëstricht.

**1035. *polymorpha***, d'Orb., 1847. *Discopora polymorpha*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 70, pl. 15, fig. 5. Bohême, Bilin.

**1036. *circumvallata***, d'Orb., 1847. *Discopora id.*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 70, pl. 15, fig. 4. Bohême.

**1037. *sulcata***, d'Orb., 1847. *Escharina sulcata*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 67, pl. 15, fig. 25. Bohême.

**1038. *impressa***, d'Orb., 1847. *Escharina impressa*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 68, pl. 15, fig. 24. Bohême.

**1039. *reticulata***, d'Orb., 1847. *Discopora reticulata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 12, n. 1, pl. 5, fig. 1. Falkenberg, Maëstricht.

\***1040. *Parisiensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 606, fig. 11. Meudon, Tours.

\***1041. *Santonensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 606, fig. 12. Saintes.

**ESCHARINA**, Edwards, 1836.

**1042. *radiata***, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 13, n. 2, pl. 4, fig. 4. Hanovre, Peine.

**1043. *crepidula***, V. Hag., pl. 4, fig. 10. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 14, n. 3. Bohême, Rügen.

**1044. *bulbifera***, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 14, n. 4, pl. 4, fig. 6. Allem. Gehrden.

**1045. *Pavonia***, V. Hag., pl. 4, fig. 9. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 14, n. 7. Bohême, Rügen.

**1046. *convexa***, V. Hag., pl. 5, fig. 1. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 14, n. 12. Allem.

**1047. *confluens***, Reuss, 1846, Böhm., p. 68, pl. 15, fig. 22. Rügen.

**1048. *incisa***, V. Hag., pl. 4, fig. 11. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 13, n. 1. Bohême, Rügen.

**1049. *polystoma***, Reuss, 1846, Böhm., p. 68, pl. 15, fig. 4. Bilin.

**1050. *peltata***, d'Orb., 1847. *Escharoides peltata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 14, n. 1, pl. 5, fig. 7. Hanovre, Peine.

\***1051. *ornata***, d'Orb., 1847. *Cellepora id.*, Goldf., p. 26, pl. 9, fig. 1. Hollande, Maëstricht.

- 1052.** *cucullata*, d'Orb., 1847. *Discopora cucullata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 12, n. 2, pl. 5, fig. 2. Gehrden, Goslar.
- 1053.** *sagena*, Lonsdale, 1844, Quarterly Journal, 1, p. 71. États-Unis, New-Jersey.
- \*1054.** *micropora*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 605, fig. 5-7. Fécamp.
- \*1055.** *simplex*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 605, fig. 10-11. Tours.
- \*1056.** *Villiersi*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 605, fig. 8-9. Tours.
- \*1057.** *Neptuni*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 605, fig. 12-13. Tours, Meudon.
- \*1058.** *Oceani*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 605, fig. 14-15. Tours.
- DISCOPORA**, Lamarck, 1816, Edwards, Ed. de Lam., 2, p. 247.
- 1059.** *crustulenta*, Edwards, 1836, Ed. de Lam., 2, p. 252. *Cellepora id.*, Goldf., p. 27, pl. 9, fig. 6. Hollande, Maëstricht.
- PHYRIPORA**, d'Orb., 1847. Cellules ovales, fixes, isolées, ou par groupes formant des branches dans leur ensemble, à la surface des corps où elles sont parasites.
- 1060.** *crenulata*, d'Orb., 1847. *Escharina crenulata*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 68, pl. 15, fig. 20-21. Bohême.
- \*1061.** *perforata*, d'Orb., 1847. *Escharina perforata*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 68, pl. 15, fig. 23. France, Meudon; Bohême.
- 1062.** *dispersa*, d'Orb., 1847. *Escharina dispersa*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 67, pl. 15, fig. 26. Bohême, Bilin.
- ESCHARA**, Lamarck, 1816, Edwards, 2<sup>e</sup> édition de Lamarck.
- 1063.** *pyriformis*, Goldf., 1830, Petref. Germ., 1, p. 24, pl. 8, fig. 10. Holl., Maëstricht; Allem., Rügen, Gehrden.
- \*1064.** *stigmatophora*, Goldf., 1830, 1, p. 24, pl. 8, fig. 11. Maëstricht.
- \*1065.** *sexangularis*, Goldf., 1830, 1, p. 24, pl. 8, fig. 12. Maëstricht.
- \*1066.** *cancellata*, Goldf., 1830, 1, p. 24, pl. 8, fig. 13. Maëstricht.
- \*1067.** *Arachneidea*, Goldf., 1830, 1, p. 24, pl. 8, fig. 14. Maëstricht.
- \*1068.** *dichotoma*, Goldf., 1830, 1, p. 25, pl. 8, fig. 15. D'Orb., Paléont., 4, pl. 603, fig. 1-4. Maëstricht; Allemagne, Gehrden; Tours.
- \*1069.** *striata*, Goldf., 1830, 1, p. 25, pl. 8, fig. 16. Maëstricht.
- \*1069.** *filograna*, Goldf., 1830, 1, p. 25, pl. 8, fig. 17. Maëstricht.
- \*1070.** *disticha*, Goldf., 1830, Petref. Germ., 1, p. 25, pl. 30, fig. 8. France, Meudon; Rügen.
- 1071.** *magalostoma*, Reuss, 1846, Böhm., p. 67, pl. 15, fig. 29. Kuitschlin.
- 1072.** *elegans*, V. Hag., pl. 4, fig. 3; Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 16, n. 7. Bohême; Rügen.
- 1073.** *Hagenowii*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 16, n. 8. E. *dichotoma*, V. Hag. Allem., Ebendorf.

**1074. *digitata***, Morton, 1834, Quaterly Journal, 1, p. 73. Etats-Unis, New-Jersey.

\***1075. *Ligeriensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 603, fig. 13-15. France, Tours, Royan.

\***1076. *Girondina***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 602, fig. 9-11. Royan.

\***1077. *Royana***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 603, fig. 12-14. Royan.

\***1078. *Oceani***, d'Orb., 1850, id., 4, pl. 602, fig. 15-17. Royan, Saintes.

\***1079. *Neptuni***, d'Orb., 1850, pl. 603, fig. 7-9. Tours.

\***1080. *Nerei***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 603, fig. 10-12. Tours.

\***1081. *Parisiensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 603, fig. 4-6. Meudon.

\***1082. *horrida***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 603, fig. 16-19. Meudon.

\***1082'. *Santonensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 603, fig. 1-3. Saintes.

#### **CUPULARIA**, Lamouroux, 1821.

**1083. *Münsteri***, V. Hagenow; Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 15, n. 1. Bohême, Rügen.

#### **LUNULITES**, Lamarck, 1816.

\***1084. *Bourgeoisii***, d'Orb., 1850, Paléont. franç., Terr. crét., 4, pl. 600, fig. 1-4. St-Frambault (Sarthe).

**RETEPORIDEA**, d'Orb., 1847. Cellules nombreuses, placées par lignes transverses latéralement sur des branches longitudinales, dichotomes.

\***1085. *Lichenoides***, d'Orb., 1847. *Retepora lichenoides*, Goldf., 1831, Petref., p. 29, pl. 9, fig. 13. Holl., Maëstricht.

\***1086. *cancellata***, d'Orb., 1847. *Retepora cancellata*, Goldf., 1831, Petref., p. 103, pl. 36, fig. 17. Holl., Maëstricht.

\***1088. *Royana***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 608, fig. 1-4. Royan.

**BIRETEPORA**, d'Orb., 1847. Cellules saillantes, sur deux lignes parallèles, latérales, sur des branches peu anastomosées.

\***1090. *disticha***, d'Orb. *Retepora disticha*, Goldf., 1831, Petref., pl. 9, fig. 15, a b, exclus., fig. c-1. Hollande, Maëstricht.

**RETEPORINA**, d'Orb., 1850, Paléont. franç., Terr. crét., 4.

\***1090'. *dactylus***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 607, fig. 13-16. Pérignac.

**RETICULIPORA**, d'Orb., 1847. Cellules latérales par lignes, sur des lames verticales anastomosées, comme celles des Rétépores

\***1091. *Ligeriensis***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 609, fig. 1-6. France, Tours; Royan, Saintes, Maëstricht.

\***1092. *clathrata***, d'Orb., 1847. *Retepora clathrata*, Goldf., 1831, pl. 9, fig. 12. Maëstricht.

\***1093. *obliqua***, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 610, fig. 1-6. France, Royan; Tours, St-Christophe (Indre-et-Loire), Fécamp (Seine-Inférieure), Néhou (Manche).



\***1094.** *Girondina*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 609, fig. 7-12. Royan.

\***1094'.** *ramosa*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 610, fig. 7-12. Pérignac.

\***1094'.** *papyracea*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 611, fig. 1-5. Fécamp.

\***1094'.** *cultrata*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 611, fig. 6-10. Pérignac.

**ALECTO**, Lamouroux, 1821.

\***1095.** *ramea*, Blainville, 1834, Man. d'Actin., p. 464, pl. 78, fig. 6. *Aulopora ramosa*, Römer, pl. 5, fig. 15. *Diastopora Hagenowii*, Reuss, pl. 15, fig. 38-39. France, Meudon, Fécamp (Seine-Inférieure), Tours (Indre-et-Loire). Bohême, Bilin; Allem., Sarstedt.

\***1096.** *Calypso*, d'Orb., 1847. Espèce à cellules épaissies, larges et courtes. France, Fécamp, Saintes (Charente-Inférieure).

**STICHOPORA**, d'Orb., 1850, Paléont. franç., Terr. crét., 4.

\***1096'.** *regularis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 613, fig. 11-15. Pérignac.

**IDMONEA**, Lamouroux, 1821.

\***1097.** *serpulæformis*, d'Orb., 1847. *Diastopora serpulæformis*, Reuss, 1846, Böhm., p. 66, pl. 15, fig. 40. *Rosâcilla serpulæformis*, Römer, pl. 5, fig. 16. Bohême, Bilin; Allem., Gehrden.

\***1098.** *fasciculata*, d'Orb., 1847. *Diastopora fasciculata*, Reuss 1846, Böhm., p. 66, pl. 15, fig. 35-37. France, Saintes, Tours; Bohême, Bilin.

\***1099.** *elegans*, d'Orb., 1847. Espèce formée de branches dichotomes régulières, d'autant plus larges, qu'elles s'éloignent de leur point de départ. Fécamp.

\***1100.** *Toucasiana*, d'Orb., 1847. Espèce à rameaux dichotomes, mais à cellules très-petites. Le Beausset (Var).

**ORISISINA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 175.

\***1101.** *gradata*, d'Orb., 1847. *Idmonea gradata*, DeFrance, 1822, Dict. des sc. nat., 22, p. 565, Actynologie, pl. 68, fig. 5. *I. disticha*, Blainv., 1834. *Retepora disticha*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 29, pl. 9, fig. 15, c-i exclus., fig. a, b. *Idmonea carinata*, Römer, pl. 5, fig. 20. France, Valognes; Hollande, Maëstricht; Belgique, Fauquemont.

\***1102.** *carinata*, d'Orb., 1847. *Hornera carinata*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 63, pl. 14, fig. 6. France, Fécamp; Bohême, Weiskirchlitz; Maëstricht.

\***1103.** *contortilis*, d'Orb., 1847. *Idmonea contortilis*, Lonsdale, 1844, Quaterly Journal, 1, p. 68. Etats-Unis, New-Jersey.

\***1103'.** *Ligeriensis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 614, fig. 7-15. Tours.

\***1104.** *subgracilis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 614, fig. 6-10. Fécamp.

**ORISINA**, d'Orb., 1850, Paléont. franç., Terr. crét., t. 4.

\***1105.** *unipora*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 613, fig. 1-5. Fécamp.

\***1105'.** *Normaniana*, d'Orb., 1850, Paléont., franç., Terr. crét., 4, pl. 612, fig. 1-5. France, Fécamp, Royan, Tours.

\*1105<sup>2</sup>. *ramosa*, d'Orb., 1850, Paléont., 4; pl. 611, fig. 11.  
Royan.

\*1105<sup>3</sup>. *subgradata*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 612, fig. 1.  
Tours.

\*1106. *triangularis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 613, fig. 11-15. Pérignac.

**TUBULIFORA**, Lamarck, 1816.

1107. *parca*, Rømer, 1840, Nordd. Kreid., p. 19, n. 1, pl. 17, fig. 17. Hanovre, Peine.

1108. *Megara*, Lonsdale, 1844, Quaterly Journal, 1, p. 69. New Jersey.

**DEFRAVOLA**, Rømer, 1841.

\*1109. *convexa*, Rømer, 1840, Nordd. Kreid., p. 20, n. 4, pl. 18, fig. 18. France, Meudon; Allem., Gehrden.

\*1110. *complanata*, Rømer, 1840, Nordd., p. 19, n. 3, pl. 18, fig. 19. France, Meudon, Fécamp; Allemagne, Sarstedt.

1111. *Brongniartii*, d'Orb., 1847. *Tubulipora Brongniartii*, towards, Michelin, Icon. Zooph., p. 122, pl. 31, fig. 4. France, Meudon.

1112. *subdisciformis*, d'Orb. 1847, *D. disciformis*, Reuss, Böhm. Kreid., p. 64, pl. 14, fig. 34. Bohême, Bilin.

\*1113. *simplex*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont saillies à la surface du disque. France, Fécamp.

**DIASTOPORA**, Edwards, 1839.

1114. *ornata*, d'Orb., 1847. *Flustra ornata*, Reuss, Böhm. Kreid., p. 70, pl. 15, fig. 3. Bohême, Kutschlin.

1115. *papillosa*, Reuss, 1846, Böhm., p. 65, pl. 15, fig. 44. Bilin.

\*1116. *confluens*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 65, pl. 15, fig. 41-42. France, Tours; Bohême, Bilin, Kutschlin.

\*1117. *Oceanica*, d'Orb., 1847. Espèce plane formant des saillies encroûtantes circulaires. France, Fécamp, Tours.

**BIDIATOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 239.

1118. *lamellosa*, d'Orb., 1847. Espèce à grandes lames, formant des groupes ondulés et labyrinthiformes. Tours (Indre-et-Loire), Sables (Charente-Inférieure).

\*1119. *ramosa*, d'Orb., 1847. Espèce à rameaux comprimés, dichotomes, très-divisés. France, Meudon, près de Paris, Chavot (Marne).

**PERIPORA**, d'Orb., 1850, Paléont. franç., Tert. crét., t. 2, p. 611.

\*1119<sup>2</sup>. *Ligeriensis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 616, fig. 1.  
Tours.

**CRICOPORA**, Blainville, 1834.

\*1120. *verticillata*, Blainv., 1834. *Ceripora id.*, Goldf., 1835, Petref., 1, p. 36, pl. 11, fig. 1. Hollande, Maëstricht; Allemagne, Gehrden.

\*1121. *annulata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 64, pl. 14, fig. 33. France, Fécamp; Bohême, Weisskirchlitz, Teplitz, Bilin, Hradek.

\*1122. *Ligeriensis*, d'Orb., 1850, Paléont., 4, pl. 615, fig. 12-13.  
Tours.

\*1122'. *laevigata*, d'Orb. 1850, Paléont., 4, pl. 615, fig. 16-18. Pérignac, Royan.

**ENTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.

\*1123. *echinata*, d'Orb., 1847. *Pustulopora echinata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 22, n. 4, pl. 5, fig. 23. France, Fécamp, Meudon; Allem., Ebene.

\*1124. *raripora*, d'Orb., 1847. Espèce grêle à cellules éloignées les unes des autres. Fécamp.

\*1125. *subgracilis*, d'Orb., 1847. Espèce à tige filiforme à cellules très-rares et très-saillantes. Fécamp.

\*1126. *clavata*, d'Orb., 1847. Espèce dont la tige, étroite en bas et grosse au sommet, ressemble à une massue. Fécamp.

\*1127. *horrida*, d'Orb., 1847. Espèce à cellules éparses, très-irrégulières et très-saillantes. Fécamp.

\*1128. *subregularis*, d'Orb., 1847. Espèce à tige étroite, à cellules régulièrement disposées en quinconce et peu saillantes. Fécamp.

\*1129. *madreporacea*, d'Orb., 1847. *Ceripora id.*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 35, pl. 10, fig. 12. Holl., Maëstricht; France, Meudon.

\*1131. *pustulosa*, d'Orb., 1847. *Ceripora id.*, Goldf. 1830, Petref., 1, p. 37, pl. 11, fig. 3. Holl., Maëstricht; France, Royan, Meudon; Allem., Gehrden.

\*1132. *Royana*, d'Orb., 1847. Grosse espèce raméuse, à cellules très-petites, inégales, et irrégulièrement placées. France, Royan.

\*1133. *irregularis*, d'Orb., 1847. Espèce à grosse tige dont les cellules sont irrégulièrement placées, presque par bandes. France, Royan.

**DOMOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 176.

\*1134. *stellata*, d'Orb., 1847. *Ceripora stellata*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 35, pl. 30, fig. 12. Hollande, Maëstricht.

\*1135. *radiata*, d'Orb., 1847. *Chrysaora radiata*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 64, pl. 14, fig. 1. Bohême, Bilin.

\*1136. *diadema*, d'Orb., 1847. *Ceripora diadema*, Goldf., pl. 11, fig. 12, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 20, n. 3. Ilseburg, Maëstricht.

**RADIOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 140.

\*1137. *gregaria*, d'Orb., 1847. Espèce dont les étoiles forment des groupes réunis. France, Royan; Hollande, Maëstricht.

**ZONOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 87.

\*1138. *spiralis*, d'Orb., *Ceripora id.*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 36, pl. 11, fig. 2. Holl., Maëstricht.

\*1139. *caespitosa*, d'Orb., 1847. *Ceripora caespitosa*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 22, n. 3, pl. 5, fig. 29. Allem., Goslar.

\*1140. *elegans*, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont en groupes disposés en spirale très-allongée, tournée du côté opposé au *Spiralis*. France, Royan.

**OSCULOPORA**, d'Orb., 1847.

\*1140'. *truncata*, d'Orb., *Retepora truncata*, Goldf., 1831, Petref. Germ., 1, p. 29, pl. 9, fig. 14. *Idmonea semicylindrica*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 20, pl. 5, fig. 21. Hollande, Maëstricht; Allemagne, Gehrden.

\***1141.** *rugosa*, d'Orb., 1847. Espèce dont l'intervalle des faisceaux de pores est ridé en long. France, Fécamp.

**1141'.** *Royana*, d'Orb., 1847. Grande espèce à grosses tiges dichotomes, pourvues de lignes très-saillantes de cellules. France, Royan.  
**FASCIOLIPORA**, d'Orb., 1839. Voy. p. 177.

\***1141".** *clavata*, d'Orb., 1847. Espèce en massue, parasite sur les autres polypiers. Fécamp.

\***1142.** *cretacea*, d'Orb., 1847. Espèce rameuse à branches grêles. France, Fécamp.

\***1143.** *urnula*, d'Orb., 1847. Espèce ayant la forme d'une urne antique. France, Fécamp.

**1144.** *cribrosa*, d'Orb., 1847. *Lichenopora cribrosa*, Reuss, 1846, Boehm. Kreid., p. 64, pl. 14, fig. 10; pl. 24, fig. 3-5. Bohême, Billin, Weisskirchlitz.

**CHRYSAORA**, Lamouroux, 1821.

**1145.** *clathrata*, Goldf., 1830, 1, p. 29, pl. 9, fig. 12. Maëstricht.

## ÉCHINODERMES.

**HEMIPNEUSTES**, Agassiz.

\***1146.** *radiatus*, Agassiz, 1847, Catal., p. 137. *Spatangus radiatus*, Lamk., Goldf., p. 150, pl. 46, fig. 3. France, Lanquais (Dordogne); Hollande, Maëstricht.

**ANANCHYTES**, Lamarck.

\***1147.** *ovata*, Lamk., Goldf., Petref., p. 145, pl. 44, fig. 1. Agassiz, 1847, Catal., p. 135. France, Meudon, Beauvais, Villeneuve-l'Archevêque (Yonne), Rouen, Saint-Aignan, Douvres, Royan, Bougival, Notre-Dame-de-Thil, Abbeville (Oise), Fécamp, Rivière (Landes), Soulage (Aude), les Ferres (Var); Westphalie.

\***1148.** *gibba*, Lamk. *Ananchytes rustica*, DeFrance. *Ananchytes striata*, var. *subglobosa*, Goldf., Petref., p. 146, pl. 44, fig. 3. Agass., 1847, Catal., p. 136. Paris, Beauvais, Guiscard, Tercis (Landes), Chami, Sens (Yonne); Aix-la-Chapelle, Quedlinburg.

\***1149.** *striata*, Lamk., Encycl. meth. zooph., pl. 154, fig. 11 et 12. Agass., 1847, Catal., p. 136. Goldf., pl. 44, fig. 2. *A. hemisphaerica*, Brongn., pl. 5, fig. 8. *A. carinata*, DeFrance. *Conoidea*, Goldf. France, Beauvais, Guiscard, Tercis, Reims, Meudon, Saint-Aignan; Royan (Charente-Inférieure), Chamy, Sens (Yonne), Orglande, mont Jubert, près Provins; Saint-André (Basses-Alpes); Aix-la-Chapelle; Schwiegg, près Hildesheim, Lunebourg; Angleterre, Brighton.

**1150.** *Gravesii*, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 136, Notre-Dame-de-Thil, Pouilly (Oise).

\***1151.** *tuberculata*, DeFrance, Agassiz, 1847, Cat., p. 136. Italie, Monte di Magre.

**1152.** *semi-globus*, Lamk., *Ananchytes corculum*, Lamk., Goldf., Petr., p. 147, pl. 45, fig. 2. France, Tercis; Belgique Ciply; Suède, Stada; Jutland (Forchhammer).

**1153.** *sulcata*, Goldf., Petref., p. 146, pl. 44, fig. 1. Agass., 1847,

Cat., p. 136. France, Saint-Jamson, Blouost, Haute-Épine (Oise)?; Maëstricht.

\*1154. *conica*, Agassiz, Cat., 1847, p. 137. France, Blainville, le Menil, Saint-Firmin (Oise).

**HOLASTER**, Agassiz.

1155. *Ananchytes*, Agassiz, 1847, Cat., p. 133. *Spatangus Ananchytes*, Leske, p. 243, pl. 53, fig. 1. France, du Périgord.

1156. *granulosus*, Agassiz, 1847, Cat., p. 133. *Spatangus granulosus*, Goldf., Petref., p. 148, pl. 45, fig. 3. Maëstricht.

1157. *Indicus*, Forbes, Trans. geol. Soc. L., 1846, t. 7, p. 159, pl. 19, fig. 4. Agass., 1847, Cat., p. 133. Environs de Pondichéry.

1158. *cinctus*, Agassiz, 1847, Cat., p. 133. *Ananchytes cinctus*, Morton, Syn., pl. 3, fig. 19; Amer. Journ., pl. 8, fig. 7. États-Unis, New-Jersey.

1159. *amygdala*, Agass., 1847, Cat., p. 134. *Spatangus amygdala*, Goldf., Petref., p. 155, pl. 48, fig. 3. Aix-la-Chapelle.

1160. *carinatus*, Agass., 1847, Cat., p. 134. *Holaster nodulosus*, Agassiz, *Spatangus suborbicularis*, Echin. Suiss., 1, pl. 3, fig. 41-42. Sainte-Maure-sur-Loire.

1161. *Trecensis*, Leym., Mém. Soc. géol. Fr., t. 5, p. 2, pl. 2, fig. 4, Agassiz, 1847, Cat., p. 134. France, Aube.

1162. *planus*, Agass., 1847, Cat., p. 134. *Spatangus planus*, Mant. geol. Suss., pl. 17, fig. 19 et 21. Angl., Sussex.

\*1163. *truncatus*, Agass., 1847, Cat., p. 135. *Spatangus truncatus*, Goldf., Petref., p. 152, pl. 47, fig. 1. France, St.-Christophe; Maëstricht.

1164. *Italicus*, Agass., 1847, Cat., p. 135. Italie, Roveredo.

1165. *imbriatus*, Agass., 1847, Cat., p. 141. *Ananchytes imbricatus*, Mort., Amer. Journ., p. 78, pl. 3, fig. 20, Synopsis, pl. 3, fig. 20. États-Unis, New-Jersey.

\*1166. *pillula*, Agass., 1847, Cat., p. 135. *An. pillula*, Lam., Fr., Beauvais (Oise), Saintes (Charente-Inférieure), Joligny (Yonne).

**MICRASTER**, Agassiz.

\*1167. *cor-anguinum*, Agass., 1847, Cat., p. 129. *Spatangus cor-marinum*, Park., Org. Rem., 3, pl. 3, fig. 2. *M. cor-testudinarium*, Agass. France, Meudon, Tours, Roches, près Vendôme, environs de Beauvais; Périgueux (Dordogne), Cognac (Charente), Rochefort, Saintes (Charente-Inférieure), Saint-Frambault (Sarthe), Chamy, Sens (Yonne); Woolwich, Rochester; Scanie; environs de Nice (Sardaigne).

\*1168. *Michelinii*, Agass., 1847, Cat., p. 129. *Micraster cor-anguinum*, Agass., Echin. suiss., 1, p. 24, pl. 3, fig. 14 et 15. France, St.-Aignant, Flèche, le Périgord, Meglisalp, Chamy (Yonne).

1169. *angula*, Agass., 1847, Catal., p. 141. *Spatangus angula*, Morton, Synops., p. 78, pl. 10, fig. 6. États-Unis, Chesapeake et Delaware.

1170. *cordatus*, Agassiz, 1847, Cat., p. 129. *Spatangus rostratus*, Mant., 1822, Geol. suiss., pl. 17, fig. 10-12. Brighton; Paderborn, La Palarea près Drap; Berry.

1171. *gibbus*, Agassiz, 1847, Cat., p. 130. *Spatangus gibbus*, Lamk.,

*Encycl. méth.*, pl. 156, fig. 4-6. la Palarea près Drap, la Lunette, près La Trinité, environs de Beauvais.

- \*1172. *breviporus*, Agass., 1847, Cat., p. 130. *Spatangus Leskei*, Desml., Tabl. syn., p. 392. Le Coudray (Oise), Fécamp, Caumont près Rouen (Seine-Inférieure), Chamy (Yonne).

**HEMIASTER**, Agassiz.

- 1172'. *rana*, Agassiz, 1847, Cat., p. 126. *Brissus rana*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7, p. 161, pl. 19, fig. 5. *Micraster sexangulatus*, d'Orb., 1846, Astrolabe, pl. 5, fig. 47-49. Indes orientales, Verdachellum.

- \*1173. *prunella*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 122. *Spatangus prunella*, Lamk., Goldf., Petref., p. 155, pl. 48, fig. 8. Orglande (Manche), Talmont, Royan, Chamouillac (Charente-Inférieure); Hollande, Maëstricht.

1174. *Bucardium*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 123. *Spatangus Bucardium*, Goldf., Petref., p. 157, pl. 49, fig. 1. Lanquais (Dordogne); Allem., Aix-la-Chapelle.

1175. *amplus*, Desor., Agass., 1847, Cat., p. 123. *Spatangus lacunosus*, Gold., Petref., p. 153, pl. 49, fig. 3. Aix-la-Chapelle.

- \*1176. *Leymerii*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 122. Saint-Christophe (Indre-et-Loire), Royan.

1177. *nucleus*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 122. France; Thauais (Charente-Inférieure).

1178. *parastatus*, Desor. *Spatangus parastatus*, Mort., Synops., p. 77, pl. 3, fig. 21. Agass., 1847, Cat., p. 141. États-Unis, Prairie-Bluff (Alabama).

- \*1179. *stella*, Desor. *Spatangus stella*, Mort., Synops., p. 78, pl. 3, fig. 18. Agass., 1847, Cat., p. 141. États-Unis, Timber-Creek (New-Jersey).

**CONOCLYPUS**, Agassiz.

1180. *scutus*, Agass., 1847, Cat., p. 109. *Echinolampas acuta*, Desml., Tabl. syn., p. 352. France, Couze (Dordogne) et port de Lena.

- \*1181. *Leskei*, Agass., 1847, Catal., p. 109. *Clypeaster idem*, Goldf. pl. 42, fig. 1. *Echinolampas ovata*, Desm. *Galerites ovata*, Lam. France, Royan, Talmont; Hollande, Maëstricht.

**PYGURUS**, Agassiz.

- \*1182. *Faujasii*, Agass., 1847, Cat., p. 104. *Echinolampas Faujasii*, Desml., Tabl. syn., p. 346. Lanquais.

1183. *apicalis*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 104. *Faujas de Saint-Fonds*, pl. 30, fig. 3-7. Maëstricht.

1184. *geometricus*, Agass., 1847, Cat., p. 141. *Clypeaster florealis*, Mort., 1834, Synops., p. 76, pl. 10, fig. 9. États-Unis, Delaware.

**PYGAULUS**, Agassiz.

1185. *subaequalis*, Agass., 1847, Cat., p. 101. France, Saintes (Charente-Inférieure).

**CATOPYGUS**, Agassiz.

1186. *conformis*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 100. Orglande (Manche).

**1187. laevis**, Agass., 1847, Cat., p. 100. *Nucleolytes ovulum*, Goldf., Petref., p. 138, pl. 43, fig. 2. Maëstricht, Fox-les-Caves.

\***1188. pyriformis**, Agass., 1847, Cat., p. 100. *Nucleolites pyriformis*, Gold., Petref., p. 141, pl. 43, fig. 7. Maëstricht; Belgique Ciplý; Sens (Yonne).

\***1189. elongatus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 100. Royan.

\***1190. fenestratus**, Agass., 1847, Cat., p. 99. Belgique, Ciplý.

\***1191. subcarinatus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *carinatus*, mais plus large du côté anal. France, Saint-Christophe.

#### **CASSIDULUS**, Lamarck.

\***1192. lapis-cancræ**, Lamk., Agass., 1847, Cat., p. 99. *Nucleolites lapis-cancræ*, Goldf., p. 143, pl. 43, fig. 12. France, la Flèche (Sarthe), Valognes (Manche); Hollande, Maëstricht; Belgique, Ciplý.

**1193. Marmini**, Agass., 1847, Cat., p. 99. *Nucleolites Marmini*, Desml., Tabl. syn., p. 360. Maëstricht; Orglande; Angleterre, port de Lena.

\***1194. squoreus**, Morton, 1834, Synop. th. Cret. group, p. 76, pl. 3, fig. 14. Agass., Cat., p. 141. États-Unis, Prairie Bluff, Alabama.

#### **NUCLEOLITES**, Lamarck.

**1195. scrobiculatus**, Goldf., Petref., p. 138, pl. 43, fig. 3, Agass., 1847, Cat., p. 97. Hollande, Maëstricht.

**1196. analis**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 97. Ciplý.

\***1197. cruciferus**, Agass., 1847, Cat., p. 97. *Ananchites cruciferus*, Mort., Amer. journ. 18, p. 245, pl. 3, fig. 8. France, Couze (Dordogne); États-Unis, New-Jersey.

\***1198. parallelus**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 96. St-Christophe.

\***1199. Collegnyi**, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 97. Couze (Dordogne).

#### **NUCLEOPYGUS**, Agassiz.

\***1200. minor**, Agass., 1847, Cat., p. 94; Desor, Monogr. des Galér., p. 33, pl. 5, fig. 30-22. France, Royan (Charente-Inférieure).

\***1201. cor-avium**, Agass., 1847, Cat., p. 94. *Nucleolites cor-avium*, Defr. Tours, Orglande.

#### **PARATOMUS**, Agassiz.

**1202. peltiformis**, Agass., 1847, Cat., p. 93. *Echinites peltiformis*, Wahlenb., Act. Soc., Ups. 8, pl. 3, fig. 4 et 5. Suède, Scanie; Gehrden.

**1203. hemisphaericus**, Desor, Monogr. des Galér., p. 37, pl. 5, fig. 14-19, Agass., 1847, Cat., p. 93. Maëstricht.

**1204. sulcato-radiatus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 93. *Gale-rites sulcato-radiatus*, Goldf., Petref., p. 130, pl. 41, fig. 4. Maëstricht.

**1205. avellana**, Agass., 1847, Cat., p. 93. Desor, Monogr. des Galér., p. 36, pl. 5, fig. 11-13. Belgique, Ciplý; Cotentin; Crimée.

#### **PYRINA**, Desmoulin.

\***1206. Goldfussii**, Agass., 1847, Cat., p. 92. *Nucleolites depressus*, Münst. in Goldf., p. 137, pl. 43, fig. 1. Aix-la-Chapelle.

\***1207. ovulum**, Agass., 1847, Cat., p. 92. Desor, Monogr. des Galér., p. 26, pl. 5, fig. 85-37. St-Christophe, Tours (Indre-et-Loire).

**1208. ovata**, Agass., 1847, Cat., p. 92, Desor, Monogr. des Galér.,

- p. 27, pl. 5, fig. 32-34. Saintes (Charente-Inférieure), Tours (Indre-et-Loire), Périgueux (Dordogne).
- 1210. petrocoriensis**, Desml., Tabl. syn., p. 258. *Globularia* Agass., Cat. 1847, p. 92. France, environs de Périgueux, Soulaire.
- 1211. nucleus**, Agass., 1847, Cat., p. 92, Desor, Monogr. Galér., p. 30, pl. 3, fig. 1-4. Belgique, Ciply.
- GALEBITES**, Lamarck.
- \*1212. albo-galerna**, Lamk., Anim. s. Vét., 3, p. 306, Agass., 1847, Cat., p. 90, Desor, Monogr. des Galér., p. 11, pl. 1, fig. 1 et pl. 13, fig. 7. Angleterre; Ile de Rügen; Quedlinbourg; Chapelle. France, Pouilly, Fabry, Roquemont (Oise), Chamy (Yonne).
- \*1213. vulgaris**, Lamk., Anim. s. vert., 3, p. 307. Agass., 1847, Cat., p. 90, Desor, Monogr. des Galér., p. 14, pl. 2, fig. 1-10. Menil-Saint-Firmin, Hardevilliers (Oise), Chamy (Yonne), Rouen, Dieppe, Angleterre, Ile de Wight.
- 1214. conica**, Agass., 1847, Cat., p. 90, Desor, Monogr. des Galér., p. 16, pl. 1, fig. 12-19. Angleterre, Ile de Wight; Fécamp, Blicourt, Menil-Courte-Ville (Oise), Chamy (Yonne).
- \*1215. subtruncata**, Agass., 1847, Cat., p. 90, Desor, Monogr. des Galér., p. 18, pl. 2, fig. 11-14. France, Rouen, Chamy (Yonne), Angleterre, Ile de Wight; Belgique, Tournay.
- 1216. globulus**, Desor, Monogr. des Galér., p. 18, pl. 4, fig. 1, Agass., 1847, Cat., p. 90. Angleterre; France, Menil-Saint-Firmin (Oise).
- 1217. abbreviata**, Lamk., Anim. s. vert., 3, p. 307. Desor, Monogr. des Galér., p. 20, pl. 3, fig. 9-17. Agass., 1847, Cat., p. 91. Allemag. sept., Strada.
- 1218. Orbignyana**, Agass., 1847, Cat., p. 91. Desor, Monogr. des Galér., p. 22, pl. 3, fig. 5-8. Envir. de Tours.
- 1219. angulosa**, Desor, Monogr. des Galér., p. 24, pl. 4, fig. 1, Agass., 1847, Cat., p. 91. Angleterre.
- 1220. lævis**, Agass., 1847, Cat., p. 91. Desor, Monogr. des Galér., p. 24, pl. 4, fig. 8-11. France.
- 1220'. oblongus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 91. *Galerites abbreviatus*, Goldf., Petref., p. 128, pl. 40, fig. 20 et 21. Marseille (Oise).
- DISCOIDEA**, Gray.
- \*1221. infera**, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 89. Fécamp.
- 1221'. faba**, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 90. Ciples.
- 1222. excisa**, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 90. Tours.
- 1223. lævissima**, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 90. Royan.
- FIBULARIA**, Lamarck.
- 1224. subglobosa**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 84. *Echinocypis subglobosus*, Goldf., Petref., p. 135, pl. 42, fig. 9. Maëstricht.
- ECHINOCYPANUS**, Van Phels.
- 1225. placenta**, Agass., 1847, Cat., p. 88. *Echinocypis placenta*, Goldf., Petref., pl. 42, fig. 2. Maëstricht.
- ECHINUS**, Linnée.
- 1226. Carantonianus**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 65. Saintes.
- 1227. toxopeus**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 65. Saintes.



\*1227. *arenatus*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 57. France. Martignies, près Quiévrain.

**GLYPTIUS**, Agassiz.

1228. *Koninekii*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 57. Ciply. **CYPHOSOMA**, Agassiz.

\*1229. *Milleri*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 47. *Cidarites granulatus*, Goldf., Petref., p. 122, pl. 40, fig. 7. France, Le Havre; (Seine-Inférieure), Goincourt, Broyes (Oise), Montolieu (Drôme); Westphalie; Rügen.

\*1230. *corollare*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 47. *Echinus corollaris*, Lam. Mant, pl. 17, fig. 2. Périgord, Talmont, Royan.

1231. *tiara*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 47. *Cidaris tiara*, Hagenow, France, Meudon; Rügen.

\*1232. *rugosum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 47. France, la Flèche (Sarthe), Saintes (Charente-Inférieure), Beausset (Var), Vendôme, Saint-Martin-le-Nœud (Oise).

\*1233. *circinatum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 47. *Echinus circinatus*, Lamk. Périgord, Royan, Tours.

\*1234. *sulcatum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 48. St.-Christophe.

1235. *perfectum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 48. France, la Flèche (Sarthe), Strehla, Thil (Oise).

\*1236. *ornatissimum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 48. *Cidaris variolaris*, Goldf., p. 123, pl. 40, fig. 9. France, Royan, Saintes (Charente-Inférieure), Cognac (Charente), Périgueux, Tours; Angleterre, Plaener.

\*1237. *tenuistriatum*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 48? La Flèche.

\*1238. *regulare*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 48. France, La Flèche (Sarthe), Tours, Vendôme.

**DIADEMA**, Gray.

1239. *diatretum*, Agass., 1847, Cat., p. 141. *Cidarites diatretum*, Mort., Synops., p. 75, pl. 10, fig. 10. États-Unis, New-Jersey.

\*1240. *Klenii*, Desml., Agass., 1847, Cat., p. 46. Desml., Tabl. syn., p. 314. Royan, Périgord, Soulages (Aude), Cognac (Charente), Coudon (Lot), Tours (Indre-et-Loire), le Beausset (Var).

\***GONIOPYGUS**, Agassiz.

1241. *heteropygus*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 40, Mon. des Salén. p. 23, pl. 4, fig. 1-8. France, env. de Tours.

**SALENIA**, Gray.

\*1242. *geometrica*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 37, pl. 1, fig. 25-32. Saintes (Charente-Inférieure), Tours (Indre-et-Loire).

1243. *areolata*, Desorm., Agass., 1847, Cat. syst., p. 37, pl. 3, fig. 1-8. Balsberg (Scanie).

1244. *minima*, Desor, Agas., 1847, Cat. syst., p. 38. Ciply.

\*1245. *Heliopora*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 38. Maëstricht; Belgique, Ciply; France, Villedieu, Saintes (Charente-Infér.).

**CIDARIS**, Lamarck.

\*1246. *clavigera*, Kœnig. Deluc., t. 4, p. 467, pl. 12. Agass., Cat., 1847, p. 23. Dieppe, Fécamp (Seine-Inférieure), Trichâteau (Oise), Thil, Pouilly, Ménil-Saint-Firmin; Anglet, Kent, Lewes, Tournay.

- \***1247. cyathifera**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 25. Saint-Aignan; Tours (Indre-et-Loire).  
 \***1248. colocynda**, Agass., Cat. syst., 1847, p. 25. Meudon.  
**1249. pleracantha**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 26. Meudon.  
 \***1250. regalis**, Goldf., Petref., p. 116, p. 39, fig. 2. Agass., Cat., 1847, p. 24. Hollande, Maëstricht.  
 \***1251. septifera**, Mantell., 18-22. Geol. of Sussex, pl. 17. Agass., Cat., 1847, p. 24. Reims (Marne), Tours (Indre-et-Loire), Dieppe, Meudon, Beauvais, Broyes, le Ménéil (Oise); Angl., Sussex.  
**1252. Vendocinensis**, Agass., Cat., 1847, p. 24. Vendôme.  
**1253. papillata** (Park.), Phillips, 1839, Yorkshire, pl. 1, fig. 14, a. Angleterre, Dannés, Dike.  
 \***1255. subvesiculosa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *Vesiculosa*, mais s'en distinguant par deux au lieu de trois rangées de tubercules sur la ligne ambulacraire. Royan, Fécamp, Saintes.  
 \***1256. Sarthacensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les pointes, très-longues, très-grêles, sont fortement épineuses. France, la Flèche (Sarthe).

**PENTETAGONASTER**, Linck, 1733.

- \***1257. quinqueloba**, d'Orb., 1847. *Asterias quinqueloba*, Goldf., pl. 63, fig. 5. Römer, 1840, Nordd., Kreid., p. 27, pl. 6, fig. 20. Meudon, Veules (Seine-Inférieure); Maëstricht; Rügen, Gehrdens.  
 \***1258. Dutemplei**, d'Orb., 1847. Espèce à très-larges plaques oblongues. France, Chavot (Marne), Sens.  
 \***1259. costata**, d'Orb., 1847. Espèce dont les plaques marginales, ont chacune une côte au milieu. Meudon.  
**1260. stratifera**, d'Orb., 1847. *Asterias stratifera*, Desmoulins, 1832, Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux, 5, 4<sup>e</sup> liv., p. 17, pl. 2, fig. 6. France, Royan, Lanquais (Dordogne).  
**1261. Chiffora**, d'Orb., 1847. *Asterias chiffora*, Desmoulins, 1832, Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux, 5, 4<sup>e</sup> liv., p. 19, pl. 2, fig. 5. Talmont, près l'embouchure de la Gironde.  
 \***1262. Moulinssii**, d'Orb., 1847. Charmante espèce, dont les bras sont prolongés et garnis de plaques très-convexes. France, Lanquais (Dordogne), dans le silex.

**ACROURA**, Agassiz.

- 1263. serrata**, d'Orb., 1847. *Ophiura serrata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 28, n. 1, pl. 6, fig. 23. Hanovre.  
**OPHYCOMA**, d'Orb., 1847. Bras pourvus d'une série de gros articles, avec une seule petite pièce supérieure.  
**1264. granulosa**, d'Orb., 1847. *Ophiura granulosa*, Römer, 1840, Nordd., Kreid., p. 28, n. 2, pl. 6, fig. 22. Hanovre.  
**PALÆOCOMA**, d'Orb., 1847. Voy. 1, p. 240.  
**1265. Fürstenbergii**, d'Orb., 1847. *Ophiura Fürstenbergii*, Müller, 1847, Aachen., Kreideform., p. 6, pl. 1, fig. 3. Prusse, Aix-la-Chapelle.  
**1266. Cunliffei**, d'Orb., 1847. *Ophiura Cunliffei*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7, p. 158, pl. 19, fig. 8. Indes orientales, Verdachellum.

**COMATULA**, Lamarck.

**1267. conoidea**, d'Orb., 1847. *Glenotremites conoidea*, Goldf. 1839, Petref., 2, p. 286, pl. 160, fig. 18. Allem., Rügen.

**MARSUPITES**, Miller, 1821.

\***1268. ornatus**, Miller, 1821, Nat. Hist. Crinod., p. 136. Dieppe, Meudon; Angleterre, Offham, Chalk-Pits, près de Lewes, Clayton, Chalk-Pits, Hurst-Point, Sussex, Preston, Brighton, Kent, Westminster, Yorkshire, Dane's Dike; Pologne, Krzeminec, Volhynie.

**BOURGUETIORINUS**, d'Orb., 1839, Crinoides, p. 95.

\***1269. ellipticus**, d'Orb., 1839, Crinoides, pl. 17, fig. 1-9. *Apio crinus ellipticus*, Miller. Meudon, Sens, Fécamp, Dieppe, Tours; Angl.; Maëstricht, Lemforde, près d'Osnabruck.

**1270. aequalis**, d'Orb., 1839, Crin., pl. 17, fig. 10-12. Maëstricht, **PENTACRINUS**, Miller, 1821.

\***1271. carinatus**, Roëmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 26, n. 1, pl. 6, fig. 1. *P. scalaris*, d'Archiac, 1837, Mém. de la Soc. géol., 2, p. 179 (non Goldf.). Cognac (Charente), Royan (Charente-Inférieure), Périgueux; Angleterre, Sussex; Allem., Hanovre.

**1272. Buchii**, Hag., Roëmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 27, pl. 6, fig. 2, a, b. Rügen, Ebene; Hanovre.

\***1273. lanceolatus**, Roëmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 27, n. 3, pl. 6, fig. 3. *P. nodulosus*, Roëmer, id., p. 27, pl. 6, fig. 4. France, Tours; Allem., Gehrden, Ebene.

## ZOOPHYTES.

**CYATHINA**, Ehrenberg, 1834.

\***1274. cylindracea**, d'Orb., 1847, *Anthophyllum cylindraceum*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 61, pl. 14, fig. 23-30. France, Néhou (Manche); Bohême, Bilin, Weisskirchlitz.

**1274'. laevigata**, Edwards et Haime, 1838, Ann. des Sc. nat., p. 291. Angleterre, Dinton (Wiltshire).

**1275. Koninckii**, Edwards et Haime, 1838, Ann. des Sc. nat., p. 290. Belgique, Ciply.

**DISCOPSAMMIA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 180.

**1275'. Suecica**, d'Orb., 1849. *Stephanophyllia suecica*, Michelin, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., t. 10, p. 94. Suède, Ignaberga.

**FUNGINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 91.

\***1276. numismalis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les lamelles sont moins inégales que chez le *F. provincialis*. France, Saint-Christophe (Indre-et-Loire); Angl. Folkston.

**CYLOLITES**, Lamarck, 1801. Voy. p. 201.

\***1277. cancellata**, d'Orb., 1847. *Fungia cancellata*, Goldf., 1830, Petref. 1, p. 48, pl. 14, fig. 5. Royan; Maëstricht.

**1278. radiata** ? d'Orb., 1847, *Fungia radiata*, Goldf., pl. 14, fig. 1. Roëmer, 1840, Kreid., p. 25, n. 1. Aix-la-Chapelle.

**1279. filamentosa**, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7, p. 163, pl. 19, fig. 11. Indes orientales, Pondichéry.

\***1280. cupularia**, d'Orb., 1847. Espèce cupuliforme, creuse en dessous, à très-fines cloisons. Royan, silex de Lanquais (Dordogne).

\*1281. *elliptica*, Lam. Voy. Étage turonien, n. 236. Royan.

**ELLIPSO SMILIA**, d'Orb., 1847. Voy. 2, p. 36.

1281'. *Arcotensis*, d'Orb., 1847, *Turbinolia Arcotensis*. Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, vol. 7, p. 168, pl. 19, fig. 9, a, b. Pondichéry.

\*1282. *obliqua*, d'Orb., 1847. Espèce oblique, aplatie, très-allongée et arquée. Martigues (Bouches-du-Rhône), Soulages (Aude).

1283. *inauris*, d'Orb., 1847. *Turbinolia inauris*, Morton, 1834, Synop. th. Crét. group, p. 31, pl. 15, fig. 11. États-Unis, Alabama, in New-Jersey.

\*1283'. *Faujasii*, d'Orb., 1849. *Trochosmilia Faujasii*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 241, pl. 5, fig. 6. Maëstricht.

\*1283". *Bourgeoisii*, d'Orb., 1849. Grande espèce dont on ne connaît que l'empreinte. Villavard (Loir-et-Cher).

**CELOSMILIA**, d'Orb., 1847.

\*1284. *centralis*, d'Orb., 1849. *Turbinolia*, id., Mantell, 1822, d'Orb., 1845, in Murch. vern. et de Keys., Russie, 2, p. 497, pl. 43, fig. 34. *Parasmilia centralis*, Edwards. France, Sézanne; Russie, Simbirek; Angleterre, Brighton, Lewes, Dane's-Dike; Allemagne, Rügen, Peine, Cœsfeld, Ilseburg.

\*1284'. *Gravesii*, d'Orb., 1849. *Parasmilia Gravesii*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 245. France, Beauvais.

1285. *Faujasii*, d'Orb., 1849. *Parasmilia Faujasii*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 248. Cipy.

1285'. *punctata*, d'Orb., 1849. *Parasmilia punctata*, Edwards et Haime, 1848, id., p. 249.

1286. *rudis*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum rude*, Reuss, 1846, Bohm. Kreideform., p. 62, pl. 14, fig. 22. Bohême, Bilin.

\*1287. *Atlantica*, d'Orb., 1847. *Anthophyllum Atlanticum*, Morton, 1834, Synop. th. Crét. group, p. 80, pl. 1, fig. 9 et 10. Journ. Acad. nat. sc., vol. 6, pl. 8, fig. 9 et 10. États-Unis, Gloucester-County, New-Jersey.

1287'. *elongata*, d'Orb., 1847. *Parasmilia elongata*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 246. Cipy.

**FLACOSMILIA**, Edwards et Haime, 1849.

\*1288. *Carusensis*, d'Orb. Grande espèce comprimée dont on ne connaît que le moule du calice. France, Villavard (Loir-et-Cher).

**CELOSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*1288'. *Edwardsii*, d'Orb., 1849. Espèce conique, lisse extérieurement, ou du moins sans côtes. France, Sézanne.

**DIPLOCTENIUM**, Goldf., 1830.

\*1289. *subcirculare*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 10, p. 246, pl. 6, fig. 4. France, Royan (Charente-Inférieure).

\*1290. *lunatum*, Michelin, 1847, Icon. Zoophyt., p. 289, pl. 65, fig. 8. *Fungia semi-luna*, Lamarck, 1816. *Madrepora lunata*, Brug., 1792. France, Bains-de-Rennes, Martigues.

1291. *Goldfussianum*, d'Orb., 1847. *D. cordatum*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 107, pl. 37, fig. 16 (non pl. 15, fig. 1). Allemag., Gosau, Hallein.

\*1292. *cordatum*, Goldf., 1830, 1, p. 51, pl. 15, fig. 1. Maëstricht.

- 1293. pluma**, Goldf., 1830, 1, p. 51, pl. 15, fig. 3. Maëstricht.
- \***1294. lamellosum**, d'Orb., 1847. Espèce presque circulaire, à très-grosses cloisons espacées. Royan.
- SYNHELIA**, Edwards et Haime, 1849. Ensemble dendroïde, calices non saillants latéraux épars.
- 1296. gibbosa**, Edwards et Haime, 1849. *Lithodendron gibbosum*, Münst., Goldf., 1831, Petref., 1, p. 106, pl. 37, fig. 9. Westph., Bochum.
- APLOSASTREA**, d'Orb., 1848. Ce sont des *Astrea*, dont la columelle est styliforme, saillante.
- \***1297. gemminata**, d'Orb., 1849. *Astrea gemminata*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 69, pl. 23, fig. 8, a, b, d. Royan, Maëstricht.
- AOTINASTREA**, d'Orb., 1849. C'est une *Aplosastrea*, dont les calices sont en contact par les côtes, sans intervalles entre eux.
- 1298. Godfussii**, d'Orb. *Astrea gemminata*, Goldfuss, pl. 23, fig. 8, c. Hollande, Maëstricht.
- PHYLOCENIA**, Edwards et Haime; 1848.
- 1300. arachnoïdes**, d'Orb., 1847. *Astrea arachnoïdes*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 70, pl. 23, fig. 9, a, c. Maëstricht.
- 1300'. macrocona**, d'Orb., 1847. *Astrea macrocona*, Reuss, 1846, Bæhm. Kreidform., p. 60, pl. 24, fig. 2. Bilin, Kutschlin.
- CRYPTOCENIA**, d'Orb., 1848. Voy. vol. 1, p. 322.
- 1301. rotula**, d'Orb., 1847. *Astrea rotula*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 70, pl. 24, fig. 1. Maëstricht.
- PLACOCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *phylocenia* à columelle transverse lamelleuse.
- \***1302. macrophthalma**, d'Orb., 1847. *Astrea*, *id.*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 70, pl. 24, fig. 2. Maëstricht.
- ASTREA**, Lamarck, Edwards et Haime, 1848.
- \***1304. Royana** d'Orb., 1847. Espèce à très-petites cellules, pourvues de six à huit cloisons. France, Royan.
- STEPHANOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.
- 1305. angulosa**, d'Orb., 1847, *Astrea angulosá*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 69, pl. 23, fig. 7. Maëstricht.
- PRIONASTREA**, Edwards et Haime, 1848.
- \***1307. Idgeriensis**, d'Orb., 1847. Espèces à cellules très-profondes en entonnoir. France, Saint-Christophe (Indre-et-Loire).
- OULOPHILLIA**, Edwards et Haime, 1848.
- 1307'. reticulata**, d'Orb., 1847. *Meandrina reticulata*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 63, pl. 21, fig. 5. Maëstricht.
- MORPHASTREA**, d'Orb., 1849. Voy. 2, p. 183.
- 1308. escharoïdes**, d'Orb., 1847. *Astrea escharoïdes*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 68, pl. 23, fig. 2. Maëstricht.
- SYNASTREA**, Edwards et Haime, 1848.
- 1309. filamentosa**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Goldf., 1831, Petref. 1, p. 68, pl. 23, fig. 4. Maëstricht.
- 1310. gyrosa**, d'Orb., 1847. *Astrea gyrosa*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 68, pl. 23, fig. 5. Maëstricht.
- 1311. textilis**, d'Orb., 1847. *Astrea textilis*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 68, pl. 23, fig. 3. Maëstricht.

- 1312. flexuosa**, d'Orb., 1847. *Astrea flexuosa*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 67, pl. 22, fig. 10. Maëstricht.
- 1313. geometrica**, d'Orb., 1847. *Astrea geometrica*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 67, pl. 22, fig. 11. Maëstricht.
- 1314. clathrata**, d'Orb., 1847. *Astrea clathrata*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 67, pl. 23, fig. 1. Maëstricht.
- ACTINHELLA**, d'Orb., 1849. Calices ovales, profonds, entourés de cloisons régulières nombreuses, laissant au centre un large espace creusé. Intervalle poreux, ensemble amorphe.
- 1315. elegans**, d'Orb., 1849. *Astrea elegans*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 69, pl. 23, fig. 6. Hollande, Maëstricht.
- MEANDRINA**, Lamarck.
- 1316. Agaricites**, Goldfuss, 1833, Petref., 2, p. 109, pl. 38, fig. 2. Autriche, Gozan.
- CERIOFORA**, Goldf., 1830. *Melicerites*, Römer, 1844.
- 1317. Römeri**, d'Orb., 1847. *Melicerites Römeri*, Hag., Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 18, n° 2. V. Hag., pl. 5, fig. 7. Rügen.
- 1318. seriata**, d'Orb., 1847. *Melicerites seriata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 17, n° 7, pl. 5, fig. 11. Gehrden.
- 1319. clavata**, Goldf., pl. 10, fig. 15. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 22, n° 2. Allemagne.
- 1320. anomalopora** Goldf., 1830, Petref., 1, p. 33, pl. 10, fig. 5. Maëstricht.
- 1321. verrucosa**, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 22, n° 8, pl. 5, fig. 24. Allemagne, Gehrden.
- \***1322. subdichotoma**, d'Orb., 1847. *Escharites dichotoma*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., p. 66, pl. 15, fig. 31 (non McCoy, 1844). Rojan; Bilin.
- 1323. tubiporacea**, Goldf., 1831, Petref. Germ., 1, p. 35, pl. 10, fig. 13. Suède, Faxoe; Maëstricht.
- \***1324. milleporacea** Goldfuss, 1831, 1, p. 34, pl. 10, fig. 10. Maëstricht.
- 1325. concinna**, d'Orb., 1847. *Heteropora concinna*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 24, n° 6, pl. 5, fig. 27. Allem., Gehrden.
- \***1326. digitata**, d'Orb., 1847. *Heteropora digitata*, Michelin, 1844, Icon. zooph., p. 124, pl. 84, fig. 4. Tours.
- 1327. tubulata**, d'Orb., 1847. *Tubipora tubulata*, Lonsdale, 1849, Quarterly Journal, 1, p. 70. États-Unis, New-Jersey.
- \***1328. madreporacea**, Goldf., 1830, p. 21, pl. 8, fig. 3. Maëstricht. France, Tours.
- 1329. racemosa**, Goldf., 1830, 1, p. 21, pl. 8, fig. 2. Hollande, Maëstricht.
- \***1330. cryptopora**, Goldf., 1830, 1, p. 33, pl. 10, fig. 3. Holl., Maëstricht. France, Saintes, Tours.
- 1331. cervicornis**, d'Orb., 1847. *Millepora cervicornis*, Pusch, 1837, Polens Paleont., p. 6, pl. 2, fig. 4. Pologne, Kazimirz et Weichsel.
- POLYTREMA**, Risso, 1826.
- \***1332. Pavonia**, d'Orb., 1847. Espèce formée de larges expansions lamelleuses. Saintes.

- 1333. Meandra**, d'Orb., 1847. Espèce formée de lames saillantes méandriformes. Saintes.
- 1334. subirregularis**, d'Orb., 1847. Espèce presque lamelleuse, ou tuberculeuse très-irrégulière. Saintes, Tours, Royan.
- 1335. Avellana**, d'Orb., 1847. Espèce ellipsoïde avec des indices de sillons rayonnants. Saintes.
- 1336. sphaera**, d'Orb., 1847. Espèce sphérique sans point d'attache. France, Meudon, Fécamp, Tours, Royan (Charente-Inférieure), Maney, Chavot, Ablois, Cramant (Marne).
- 1337. nuciformis**, d'Orb., 1847. *Ceripora nuciformis*, v. Hag., pl. 5, fig. 9. Rœm., 1840, Nordd. Kreid., p. 25, n° 3. Hanovre, Peine.
- 1338. urceolata**, d'Orb., 1847. *Lunulites urceolata*, Lam., Phillips, 1839, Yorkshire, pl. 1, fig. 11. France, Tours, Royan, Meudon; Angleterre, Davne's-Dike.
- 1339. compressa**, d'Orb., 1847. *Ceripora compressa*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 37, pl. 11, fig. 4. Hollande, Maëstricht.
- 1340. micropora**, d'Orb., 1847. *Ceripora micropora*, Goldfuss, 1831, Petref. Germ., 1, p. 33, pl. 10, fig. 4. Holl., Maëstricht; Allem., Gehrden, Goslar.
- 1341. mamilla**, d'Orb., 1847. *Ceripora mamilla*, Reuss, 1846, Bohm., p. 63, pl. 14, fig. 11, 12. Bilen.
- 1342. pygmaea**, d'Orb., 1847. *Ceripora pygmaea*, Reuss, 1846, Bohm., p. 63, pl. 14, fig. 9. Stecknadelkopfgrosse.
- 1343. incrustans**, d'Orb., 1847. *Ceripora incrustans*, Reuss, 1846, Bohm., p. 63, pl. 14, fig. 8. Bohême.
- 1344. dilatata**, d'Orb., 1847. *Palmipora dilatata*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 25, n° 2, pl. 5, fig. 30. France, Saintes; Allemagne, Gehrden.
- 1345. MONTICULIPORA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 25.
- 1346. ramulosa**, d'Orb., 1847. Espèce à grosses branches dichotomes irrégulières, les cellules grandes. Royan.
- 1347. cervicornis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont à moitié plus petites que chez le *N. ramosa*. Royan.
- 1348. mamillosa**, d'Orb., 1847. *Ceripora mamillosa*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 23, n° 6, pl. 5, fig. 25. Allem., Goslar.
- NULLIPORA**, Lamarck.
- 1349. glomerata**, d'Orbigny, 1847. Espèce dont l'ensemble est comme tuberculeux. Royan.

## FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**ORBITOLITES**, d'Orb., 1847.

- 1349. media**, d'Orb., 1847. *Orbitolites media*, d'Archiac, 1837, Mém. Soc. géol. de France, t. 2, p. 178. Faujave de Saint-Fond, pl. 34, fig. 1, 2, 3, 4. France, Royan (Charente-Inférieure), Lanquais (Dordogne); Maëstricht.

**ORBITOLINA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 148.

- 1350. gigantea**, d'Orb., 1847. Espèce qui atteint jusqu'à 16 cen-

timètres de diamètre ; concave en dessous, convexe en dessus. France, Royan, Pérignac (Charente-Inférieure).

- \*1351. *radiata*, d'Orb., 1847. Espèce pourvue de rayons qui convergent du bord au centre. France, Royan.

**NODOSARIA**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 241.

- \*1352. *limbata*, d'Orb., 1839, Mém. Soc. géol. de France, p. 13, pl. 1, fig. 1. Meudon.

**DENTALINA**, d'Orb., 1825. Voy. t. 1, p. 242.

- \*1353. *aculeata*, d'Orb., 1839, id., p. 13, pl. 1, fig. 2, 3. Meudon ; Angleterre, Kent.

- \*1354. *subcommunis*, d'Orb., 1847. *D. communis*, d'Orb., Mém. de la Soc. géol. de France, p. 13, pl. 1, fig. 4 (non 1847). Meudon.

- \*1355. *gracilis*, d'Orb., 1839, id., p. 14, pl. 1, fig. 5. Sens.

- \*1356. *nodosa*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 14, pl. 1, fig. 6, 7. France, Meudon, Saint-Germain.

- \*1357. *Lorneiana*, d'Orb., 1839, id., p. 14, pl. 1, fig. 3, 4. Sens.

- \*1358. *sulcata*, d'Orb., 1839, id., p. 15, pl. 1, fig. 10, 11, 12. *Nodosaria sulcata*, Nilss. (1825), Acad. Holm., p. 241, id., Peten. suec., t. 9. France, Sens, Meudon, Saint-Germain, le Mans ; Angleterre, Kent ; Suède, Kopinge.

- \*1359. *multicostata*, d'Orb., 1839, id., p. 15, pl. 1, fig. 13, 14. France, Sens, Saint-Germain ; Maëstricht.

**MARGINULINA**, d'Orb., 1825. Voy. t. 1, p. 242.

- \*1360. *trilobata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 16, pl. 1, fig. 16, 17. Sens, Meudon, Saint-Germain ; Angleterre, Kent.

- \*1361. *compressa*, d'Orb., 1839, id., Mém. de la Soc. géol., p. 17, pl. 1, fig. 18, 19. France, Meudon, le Mans.

- \*1362. *elongata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol., p. 17, pl. 1, fig. 20, 21, 22. France, Meudon, Sens, Saint-Germain.

- \*1363. *gradata*, d'Orb., 1839, id., p. 18, pl. 1, fig. 23, 24. Sens.

- \*1364. *raricosta*, d'Orb., 1839, id., p. 51, pl. 1, fig. 25. Meudon.

**FRONDICULARIA**, DeFrance. Voy. t. 1, p. 241.

- \*1365. *radiata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 19, pl. 1, fig. 26, 27, 28. Meudon, Saint-Germain.

- \*1366. *elegans*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 19, pl. 1, fig. 29, 30, 31. Meudon, Sens.

- \*1367. *Verneuiliana*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 20, pl. 1, fig. 32-38. Sens, Saint-Germain, Meudon.

- \*1368. *Archiaciana*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 20, pl. 1, fig. 34, 35 et 36. Meudon, Sens.

- \*1369. *ornata*, d'Orb., 1839, id., p. 21, pl. 1, fig. 37, 38. Meudon.

- \*1370. *tricarinata*, d'Orb., 1839, id., p. 21, pl. 2, fig. 1, 2, 5. Sens.

- \*1371. *angulosa*, d'Orb., 1839, id., p. 22, pl. 1, fig. 39. Meudon.

- \*1372. *cordata*, Römer, 1841, Nordd. Kreid., p. 96, n° 1, pl. 15, fig. 8. Gehrden.

- \*1372'. *ovata*, Römer, 1841, Kreid., p. 69, pl. 15, fig. 9. Gehrden.

**ORISTELLARIA**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 242.

- \*1373. *retulata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France,



p. 26, pl. 2, fig. 15, 16, 17, 18. Meudon, Saint-Germain, Sens; Angl., Kent.

\***1374. navicula**, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 27, pl. 2, fig. 19, 20. Sens, Meudon.

\***1375. triangularis**, d'Orb., 1839, id., p. 27, pl. 2, fig. 21, 22. Sens.

\***1375'. recta**, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 28, pl. 2, fig. 23, 24, 25. Meudon, Saint-Germain.

\***1376. Gaudryana**, d'Orb., 1839, id., p. 28, pl. 2, fig. 26, 27. St-Germain.

**1377. Sanguantula**, d'Orb., 1847. *Nummulina id.*, Galeotti, 1838, Bull. de la Soc. géol., 10, p. 35, pl. 1, fig. 6. Amérique; Mexique, à Sanguantla.

**1378. compressa**, Roem., 1841, Nordd. Kreid., p. 99, n° 1, pl. 15, fig. 33. Allem., Ilseburg.

**FLABELLINA**, d'Orb., 1846. Voy. p. 185.

\***1379. rugosa**, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 23, pl. 2, fig. 4, 5-7. Sens, Meudon.

\***1380. Bandouiniana**, d'Orb., 1839, id., p. 24, pl. 2, fig. 8, 9, 10, 11. Sens.

\***1381. pulchra**, d'Orb., 1839, id., p. 25, pl. 2, fig. 12, 13, 14. Meudon.

**SIDEROLINA**, Lamarck (Siderolites).

\***1382. calictrapoides**, Lamarck, Faujas, p. 134, pl. 34, fig. 7-12. Mæstricht.

\***1383. lævigata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 131, n° 2, modèles n° 89. Mæstricht.

**LITUOLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 185.

\***1384. nautiloides**, Lamarck, 1839. D'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 29, pl. 2, fig. 28, 29, 30, 31. Sens, Meudon, Saint-Germain; Angleterre, Kent.

**ROTALINA**, Lamarck, d'Orb., Foraminifères de Vienne.

\***1385. Voltziana**, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 31, pl. 2, fig. 32, 33, 34. Meudon, Saint-Germain; Angl., Kent.

\***1386. Micheliniana**, d'Orb., 1839, id., p. 31, pl. 3, fig. 1, 2, 3. Saint-Germain, Meudon, Sens; Angleterre, Kent.

\***1387. umbilicata**, d'Orb., 1839, id., p. 32, pl. 3, fig. 4, 5, 6. Meudon, Saint-Germain, Sens; Autriche.

\***1388. crassa**, d'Orb., 1839, id., p. 32, pl. 3, fig. 7, 8. France, St.-Germain, Meudon; Angleterre, Kent.

\***1389. Cordieriana**, d'Orb., 1839, id., p. 33, pl. 3, fig. 9, 10, 11. France, Saint-Germain; Angleterre, Kent; Mæstricht.

\***1390. gibbosa**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 106, n° 3. Espèce lisse sans disque inférieur. Mæstricht.

**1391. conica**, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 97, n° 1, pl. 15, fig. 21. Allem., Gehrden.

**GLOBIGERINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.

\***1392. cretacea**, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 34, pl. 3, fig. 12, 13, 14. Saint-Germain; Anglet., Kent.

- \*1393. *elevata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 34, pl. 3, fig. 15, 16. Sens; Anglet., Kent.
- TRUNCATULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1394. *Beaumontiana*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 35, pl. 3, fig. 17, 18, 19. Meudon; Anglet., Kent.
- ROSALINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1395. *depressa*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 163, 164. Espèce lisse ombiliquée très-déprimée. Maastricht.
- \*1396. *Lorneiana*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 36, pl. 3, fig. 20, 21, 22. Saint-Germain, Meudon, Sens; Anglet., Kent.
- \*1397. *Clementiana*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 37, pl. 3, fig. 23, 24, 25. Saint-Germain; Anglet., Kent.
- VALVULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1398. *gibbosa*, d'Orb., 1839, id., p. 38, pl. 4, fig. 1, 2. Saint-Germain.
- VERNEUILINA**, d'Orb., 1839, Foraminifères de Vienne.
- \*1398'. *tricarinata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 39, pl. 4, fig. 3, 4. France, Saint-Germain, Sens.
- BULMINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1399. *obtusa*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 39, pl. 4, fig. 5, 6. Meudon, Saint-Germain; Anglet., Kent.
- \*1400. *obliqua*, d'Orb., 1839, id., p. 40, pl. 4, fig. 7, 8. Meudon, Saint-Germain, Sens; Anglet., Kent.
- \*1401. *variabilis*, d'Orb., 1839, id., p. 40, pl. 4, fig. 9, 10, 11, 12. France, Sens, Meudon, St.-Germain; Anglet., Kent.
- \*1402. *brevis*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 41, pl. 4, fig. 13, 14. Meudon, Saint-Germain, Sens.
- \*1403. *Murchisoniana*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 41, pl. 4, fig. 15, 16. Saint-Germain; Anglet., Kent.
- UVIGERINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1404. *tricarinata*, d'Orb., 1839, id., p. 42, pl. 4, fig. 15, 17. Sens.
- PYRULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1405. *acuminata*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 43, pl. 4, fig. 18, 19. Sens, Saint-Germain, Meudon.
- GAUDRYNA**, d'Orb., 1839, Foraminifères de Vienne.
- \*1406. *rugosa*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 44, pl. 4, fig. 20, 21. Meudon, Saint-Germain, Sens.
- \*1407. *pupoides*, d'Orb., 1839, Mém. id., p. 44, pl. 4, fig. 22, 23, 24. France, Meudon, Sens, Saint-Germain; Anglet., Kent.
- PAUJASINA**, d'Orb., 1846, Foraminifères de Vienne, p. 193.
- \*1408. *carinata*, d'Orb., 1846, Foraminifères de Vienne, p. 193, pl. 21, fig. 29-31. Hollande, Maastricht.
- POLYMORPHINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \*1409. *glomerata*, Roemer, 1841, Nordd. Kreid., p. 97, fig. 1, pl. 15, fig. 19. Ilseburg.
- TEXTULARIA**, DeFrance.
- \*1410. *trochus*, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 45, pl. 4, fig. 25, 26. France, Meudon.

- 1411. turris**, d'Orb., 1839, Mém. id., p. 46, pl. 4, fig. 27, 28. Sen., Meudon, Saint-Germain; Anglet., Kent.  
**1412. Baudouiniana**, d'Orb., 1839, Mém. de la Soc. géol. de France, p. 46, pl. 4, fig. 29, 30. Saint-Germain, Meudon.  
**1413. rugosa**, d'Orb., 1839, Foraminifères de Vienne.  
**1414. Fleurbaeysiana**, d'Orb., 1835, Ann. des Sc. nat., p. 138, n° 7. Espèce très-comprimée. Maëstricht.

# AMORPHOZOAIRES.

## COSCINOPORA, Goldfuss, 1830.

- 1415. nuda**, d'Orb., 1847. *Oscellaria nuda*, Ramond; Lamarck, Michelin, p. 145, pl. 41, fig. 3. France, Saint-Martin-le-Nœud, près Beauvais.  
**1416. infundibuliformis**, Goldf., 1830, Petref. Germ., 1, p. 1, pl. 9, fig. 16; pl. 30, fig. 10. Westph., Coesfeld; Hanovre, Peine.  
**1417. cupuliformis**, d'Orb., 1847. *Coscinopora infundibuliformis*, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 120, pl. 29, fig. 1 (non Goldf.). Elle en diffère par les oscules en lignes verticales et non obliques. France, Tours, Chinon, Châteaueux, Provins, Meudon.  
**1418. macropora**, Goldf., pl. 9, fig. 17. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 9, n° 33. Leer, Werl.  
**1419. porosa**, d'Orb., 1847. *Spongia porosa*, Phillips, 1839, Yorkshire, pl. 1, fig. 8. Angl., Bridlington.  
**1420. alternans**, d'Orb., 1847. *Scyphia alternans*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 9, n° 37, pl. 3, fig. 9. Hanovre, Peine, Werl.  
**1421. striato-punctata**, d'Orb., 1847. *Scyphia idem*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 9, n° 30, pl. 3, fig. 7. Hanovre, Peine.  
**1422. angularis**, d'Orb., 1847. *Scyphia angularis*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 8, n° 23, pl. 3, fig. 2 c. Hanovre, Peine.  
**1423. venosa**, d'Orb., 1847. *Scyphia venosa*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 8, n° 21, pl. 3, fig. 4. Hanovre, Peine.  
**1424. isopleura**, d'Orb., 1847. *Scyphia Zippel*, Reuss, 1846, Böhm., p. 76, pl. 17, fig. 10. Bohême, Bilin.  
**1425. Zippel**, d'Orb., 1847. *Scyphia Zippel*, Reuss, 1846, Böhm., p. 76, pl. 18, fig. 5. Bohême, Hundorf, Kutschlin.  
**1426. Beaumontii**, d'Orb., 1847. *Scyphia Beaumontii*, Reuss, 1846, Böhm., p. 76, pl. 17, fig. 12. France, Fécamp (Seine-Infér.), Tours (Indre-et-Loire); Bohême, Bilin.  
**1427. heterostoma**, d'Orb., 1847. *Siphonia heterostoma*, Reuss, 1846, Böhm., p. 73, pl. 17, fig. 5. Bohême, Bilin.  
**1428. biseriata**, d'Orb., 1847. *Siphonia biseriata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 73, pl. 17, fig. 6. Bohême.  
**1429. Turoniensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. biseriata*, mais avec des pores non par lignes. France, Tours.

\***1430. Galdrynus**, d'Orb., 1847. Espèce dont les oscules sont du même diamètre que chez l'espèce précédente, mais en lignes obliques irrégulières. Veules (Seine-Inférieure).

\***1431. quadrangularis**, d'Orb. *Ventriculites quadrangularis*, Mantell, 1822, Foss. Illust. geol. of Sussex, p. 177, pl. 15, fig. 6. Angleterre, Offham; France, Tours (Indre-et-Loire), Meudon près Paris, Noirmoutiers (Vendée).

**1432. globularis**, d'Orb. *Tragos globularis*, Reuss, 1846, Böhm., p. 78, pl. 20, fig. 5. Kutschlin, Bilin, Trzeibitz.

**1433. pedunculata**, d'Orb., 1847. *Scyphia pedunculata*, Reuss, 1846, Böhm., p. 75, pl. 17, fig. 7, 8, 9. Kutschlin, Meronitz.

**1434. Murchisoni**, d'Orb., 1847. *Scythia Murchisoni*, Goldf., pl. 65, fig. 8. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 9, n° 31. Hanovre, Peine; Ilseburg, Lemförde, Coesfeld.

**GUETTARDIA**, Michelin, 1844.

\***1435. stellata**, Michelin, 1844, Icon. zooph., p. 120, pl. 30, fig. 1-5. France, Honfleur, Saint-Jean-la-Forêt, près de Bellesme (Orne), Noirmoutiers (Vendée).

**OCELLARIA**, Lamarck, 1816. *Ventriculites*, Mantell, 1822.

\***1436. radiata**, d'Orb., 1847. *Ventriculites radiatus*, Mantell, 1822, Foss. Illust. geol. of Sussex, p. 168, pl. 11, 12, 13, 14. Angleterre, Sussex.

**1437. Benettiae**, d'Orb., 1847. *Ventriculites Benettiae*, Mantell, 1822, Sussex, p. 177, pl. 15, fig. 3. Fécamp (Seine-Inférieure); Angleterre, Lewes.

**1438. alcyonides**, d'Orb., 1847. *Ventriculites alcyonides*, Mantell, 1822, Sussex, p. 176. Park., Org. Rem., t. 2, pl. 10, fig. 12. Angleterre, Lewes.

**1439. grandipora**, Michel., 1844, p. 145, pl. 40, fig. 3. Rouen.

\***1450. cupuliformis**, d'Orb., 1847. Espèce ayant la forme d'un verre à vin de Champagne; oscules par lignes. Sens (Yonne).

**1451. Decheni**, d'Orb., 1847. *Scyphia Decheni*, Goldf., pl. 65, fig. 6. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 7, n° 15. Lemförde, Coesfeld.

**1452. longipora**, d'Orb., 1847. *Scyphia longipora*, Pusch, 1837, Polens Paleont., p. 7, pl. 2, fig. 3. Pologne, Kazmirz et Weichsel.

**1453. muricata**, d'Orb., 1847. *Chælophicum muricatum*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 11, n° 8, pl. 4, fig. 8. Alfeld.

**RETISPONGIA**, d'Orb., 1847., Cupule comme réticulée par des branches; l'intérieur lisse.

**1454. Hæninghausii**, d'Orb., 1847. *Scyphia Hæninghausii*, Goldf., pl. 65, fig. 7. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 7, n° 19. *Scyphia radiata*, Reuss, 1846, pl. 17, fig. 4. Westphalie, Darup, Coesfeld, Oppeln; Bohême, Hundorf, Kutschlin, Kosstitz, Luschitz, Priesen, Meronitz.

**1455. retiformis**, d'Orb., 1847. *Scyphia retiformis*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 7, n° 17, pl. 3, fig. 1. Hanovre, Peine.

**OELOPTYCHUM**, Goldf., 1830.

**1456. agaricoides**, Goldf., pl. 9, fig. 20. Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 10, n° 1, pl. 4, fig. 5. Hanovre, Peine und Theidessen; Lemförde und Coesfeld.

**1457. *deedminum***, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 10, n. 2, pl. 4, fig. 3. Peine.

**1458. *lobatum***, Goldf., pl. 65, fig. 11. Rœmer, 1840, p. 10, n. 3. Bronn, Lathæca, pl. 29, fig. 4. Allem., Coesfeld.

**1459. *sulcifera***, Rœm., 1840, Kreid., p. 10, n. 4, pl. 4, fig. 4. Ilseburg.

**1460. *alternans***, Rœmer, 1840, Kreid., p. 10, n. 6, pl. 4, fig. 6. Peine.

**1461. *plicatellum***, Rœmer, 1840, Kreid., p. 11, n. 7, pl. 4, fig. 7. Schida.

**GAMEROSPONGIA**, d'Orb. Genre formant une cupule criblée en dessous, rétrécie et lisse en dessus, avec une ouverture ronde; l'intérieur rude.

**\*1462. *fungiformis***, d'Orb., 1847. *Scyphia fungiformis*, Goldfuss, 1831, pl. 65, fig. 4. Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 7, n. 20. *Manon monostoma*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., pl. 1, fig. 8. Westphalie, Coesfeld; Hanovre, Peine; France, Sens (Yonne), Rouen (Seine-Inférieure).

**VERTICILLITES**, DeFrance, 1828. Voy. t. 2, p. 96.

**\*1463. *Goldfussii***, d'Orb., 1847. *Scyphia verticillites*, Goldfuss, 1833, Petref., 1, p. 220, pl. 65, fig. 9. Maëstricht; France, Néhou (Manche), Royan.

**GONIMIDIUM**, Goldf., 1830.

**1464. *Benettiae***, d'Orb., 1847. *Spongia Benettiae*, Phillips, 1829, Yorkshire, pl. 1, fig. 4. Angleterre, Bridlington.

**\*1465. *gregarium***, d'Orb., 1847. Espèce agrégée; plusieurs tubes, très-irréguliers, en dehors et en dedans. France, Tours.

**SIPHONIA**, Parkinson, 1811.

**\*1466. *Lycoperdites***, d'Orb. *Alcyonium id.*, DeFrance, 1816. *Siphonia pyriformis*, *S. incrassata*, Goldf., 1830, pl. 6, fig. 7; pl. 30, fig. 5. *S. pyriformis*, Michelin, 1844, pl. 33, fig. 1. France, Tours, Fécamp, Havre, Château-Vieux, Saintes, Blois, Périgueux, Chaumont, Nogent-le-Rotrou; Allemagne, Westphalie, Coesfeld.

**\*1467. *Konigii***, d'Orb., 1847. *Choanites Konigii*, Mantell, 1822, Foss. illust. geol. of Sussex, p. 179, pl. 16, fig. 19, 20, 21. *Spongia terebrata*, Phillips, 1829, pl. 1, fig. 10. *Scyph. pertusum*, Reuss, pl. 16, fig. 7, 8, 11-14. France, Fécamp, Saintes, Périgueux, Cognac, Tours, Sens; Bohême, Bilin; Angleterre, South-Street, Lewes, Bridlington.

**1469. *tuberosa***, d'Orb., 1847. *Scyphia tuberosa*, Rœmer, 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n. 10, pl. 2, fig. 9. Allem., Goslar.

**1470. *dichotoma***, d'Orb., 1847. *Scyphia dichotoma*, Michelin, p. 142, pl. 28, fig. 5. France, Tours.

**\*1471. *infundibulum***, d'Orb., 1847. *Scyphia terebrata*, Michelin, p. 141, pl. 29, fig. 4 (non Phillips). France, Poitiers, Cap La Hève.

**1472. *arbuscula***, Michelin, 1844, p. 139, pl. 33, fig. 2. Tours.

**1473. *acoides***, Michelin, 1844, p. 139, pl. 29, fig. 5. Poitiers.

**1474. *Fittoni***, Michelin, 1844, p. 29, fig. 140, pl. 6 (non *pyriformis*, Fitton). France, Cognac, Loudun.

- 1475. brevicostata**, d'Orb., 1847. *Hallimontia* id., Michelin, 1844, Icon. Zoophyt., p. 127, pl. 31, fig. 2. France, Tours.
- 1476. elongata**, Reuss, 1846, Böhm., p. 73, pl. 43, fig. 1. Bohême, Kutschlin, Hundorf.
- 1477. ternata**, Reuss, 1846, Böhm., p. 72, pl. 41, fig. 1. Bohême, Kutschlin.
- 1478. multiformis**, Bronn, Lethæa, pl. 25, fig. 22; Reuss, 1840, Nordd. Kreid., p. 5, n° 7. Hanovre, Peine.
- HIPPALIMUS**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 200.
- 1479. radiceiformis**, d'Orb., 1847. *Spongica radiceiformis*, Phillips, 1829; Yorkshire, pl. 1, fig. 9. *Scyphia heteropora*, Bronn, Lethæa, Kreid., pl. 2, fig. 13. Angleterre, Bridlington; Allemagne, Goslar.
- 1480. acuta**, Roemer, 1840, d'Orb., 1847. *Scyphia acuta*, Nordd. Kreid., p. 6, n° 2, pl. 2, fig. 4. Allem., Goslar.
- 1481. socialis**, d'Orb., 1847. *Scyphia socialis*, Roem., 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n° 4, pl. 2, fig. 5. Allem., Goslar.
- \*1482. micropora**, d'Orb., 1847. *Scyphia micropora*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n° 7, pl. 2, fig. 6. Hanovre; Maëstricht.
- RHYSOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Des racines dichotomes rampantes encroûtées comme chez les *Lymnorea*, supportant une cupule comme celle des *Yerea*.
- \*1483. pictonica**, d'Orb., 1847. *Polypotecia* id., Michelin, 1847, pl. 37, fig. 1. France, Saintes, Angoulême, Cognac, Touraine.
- SPARGIOPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 169.
- \*1483. rugosissima**, d'Orb. Espèce à oscules rares, au milieu d'une masse comme vermoulue. Royan.
- IREEA**, Lamouroux, 1821.
- 1484. multioculata**, d'Orb., 1847. *Siphonia multioculata*, Michelin, 1844, p. 138, pl. 33, fig. 6. France, Tours.
- \*1485. tubulifera**, d'Orb., 1847. *Manon tubuliferum*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 2, pl. 1, fig. 5. Maëstricht.
- 1486. excavata**, d'Orb., 1847. *Siphonia excavata*, Goldf., 1830, 1, p. 17, pl. 6, fig. 8. *S. præmorsa*, Goldf., 1830, 1, p. 17, pl. 6, fig. 9. Maëstricht.
- 1487. pistillum**, d'Orb., 1847. *Siphonia pistillum*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 17, pl. 6, fig. 10. France, Epernay.
- \*1488. nuciformis**, d'Orb., 1847. *Ierea excavata*, Michelin, pl. 33, fig. 3 (non pl. 39, fig. 2). *Siphonia nuciformis*, Michelin, pl. 33, fig. 4 (non Goldfuss, 1830, pl. 6, fig. 8, 9). France, Tours.
- \*1489. cupula**, d'Orb., 1847. *Ierea excavata*, Michelin, pl. 39, fig. 2 (non pl. 33, fig. 3; non Goldfuss, pl. 6, fig. 8, 9). France, Tours.
- 1490. pyriformis**, d'Orb., 1847. *Siphonia pyriformis*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid. *Manon pyriforme*, Goldf., 1831, pl. 65, fig. 10. Coesfeld.
- 1491. oligostoma**, d'Orb., 1847. *Siphonia oligostoma*, Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 5, n° 6, pl. 2, fig. 3. Allem., Isenbourg.
- 1492. gregaria**, Michelin, 1844, p. 134, pl. 38, fig. 1. France, Vieux.
- 1493. cespitosa**, Michelin, 1844, p. 136, pl. 41, fig. 2. France, Vieux.

- 1494. *ramosa***, Michelin. *Spongia id.*, Mantell, 1822. *Ierea arborescens*, Michelin, 1834, p. 136, pl. 42, fig. 2. France, Tours.
- 1495. *Turonensis***, d'Orb., 1847. *Siphonia ramosa*, Michelin, 1844, p. 141, pl. 28, fig. 6 (non *ramosa*, Mantell, 1822). France, Tours.
- CHEMENDOPORA**, Lamouroux, 1821.
- \*1496. *marginata***, Michelin, 1844, Icon. Zoophyt., p. 129, pl. 28, fig. 7. *Spongia marginata*, Phillips. *Manon seriatoporum*, pl. 1, fig. 6. *Manon Phillipsii*, Reuss, 1847, Böhm., Kreid., pl. 19, fig. 7, 8, 9. Meudon, Châteaueux; Anglet, Wiltshire, Bridlington; Bohême, Bilin.
- 1497. *millaris***, d'Orb., 1847. *Manon miliaris*, Reuss, 1846, Böhm. Kreid., pl. 19, fig. 10-13, pl. 20, fig. 3. Bohême, Bilin.
- 1498. *micrommata***, d'Orb., 1847. *Manon micrommata*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 3, n. 7, pl. 1, fig. 4. Allem., Goslar.
- FOROSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 295.
- 1499. *turbinata***, d'Orb., 1847. *Manon turbinatum*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 3, n. 9, pl. 1, fig. 5. Allem., Goslar.
- MARGINOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 2, p. 187.
- \*1500. *irregularis***, d'Orb., 1847. Espèce dont les lames épaisses sont méandriiformes. Saintes (Charente-Inférieure), Saint-Christophe (Indre-et-Loire).
- STELLISPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.
- 1501. *conica***, d'Orb., 1847. *Chnemidium conicum*, Römer, 1840, Nordd. Kreid., p. 4, n. 3, pl. 1, fig. 10. Allem., Goslar.
- 1502. *odontostoma***, d'Orb., 1847. *Scyphia odontostoma*, Reuss, 1846, Böhm., p. 74, pl. 45, fig. 4, 5. Bohême, Meronitz.
- 1503. *conglobata***, d'Orb., 1847. *Chnemidium conglobatum*, Reuss, 1846, Böhm., p. 72, pl. 16, fig. 2, 3. Bohême.
- 1504. *cylindrica***, d'Orb., 1847. *Scyphia cylindrica*, Römer, 1840, Kreid., p. 5, n. 4, pl. 2, fig. 1. Allem., Steckelnburg.
- PLEUROSTOMA**, Römer, 1841.
- 1505. *lacunosum***, Römer, 1840, Kreid., p. 5, n. 1, pl. 1, fig. 12. Peine.
- 1506. *radiatum***, Römer, 1840, Kreid., p. 5, n. 2, pl. 1, fig. 14. Peine.
- VERRUCOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Des saillies verruqueuses percées couvrent toute la surface polymorphe.
- 1507. *sparsa***, d'Orb., 1847. *Manon sparsum*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 78, pl. 18, fig. 12-20. Bohême, Bilin.
- 1508. *convoluta***, d'Orb. *Spongia convoluta*, Phillips, 1829, Yorkshire, pl. 1, fig. 6. Angleterre, Bridlington.
- 1509. *osculifera***, d'Orb., 1847. *Spongia osculifera*, Phillips, 1829, Yorkshire, pl. 1, fig. 3. Angleterre, Bridlington.
- 1510. *turbinata***, d'Orb., 1847. *Manon turbinatum*, Reuss, 1846, Kreid., pl. 19, fig. 1. Bohême, Bilin.
- CUPULOSPONGIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 210.
- 1511. *micrommata***, d'Orb., 1847. *Scyphia micrommata*, Römer, 1840, Kreid., p. 7, n. 16, pl. 2, fig. 11. Allem., Coesfeld.
- 1512. *auricularis***, d'Orb., 1847. *Scyphia auricularis*, Römer, 1840, Kreid., p. 8, n. 22, pl. 2, fig. 10. Hanovre, Peine.

- 1513. porosa**, d'Orb., 1847. *Scyphia porosa*, Roemer, 1840, Kreid., p. 7, n. 14, pl. 2, fig. 12. Allem., Rothenfeld.
- 1514. tenuis**, d'Orb., 1847. *Scyphia tenuis*. Roemer, 1840, Kreid., p. 9, n. 36, pl. 4, fig. 1. Allem., Lemförde.
- 1515. stellata**, d'Orb., 1847. *scyphia stellata*, Roemer, 1840, Kreid., p. 7, n. 18, pl. 3, fig. 3. Hanovre, Peine.
- 1516. bifrons**, d'Orb., 1847. *scyphia bifrons*, Reuss, 1846, Böhm. Kreideform., p. 76, pl. 18, fig. 6. Bohême.
- 1517. pocillum**, d'Orb., 1847. *Chenendopora pocillum*, Michelin, 1844 id., p. 132, pl. 33, fig. 5. France, Tours.
- 1518. Townsensis**, d'Orb., 1847. *spongius Townsensis*, Mantell, 1822, Foss. Illust. geol. of Sussex, p. 164, pl. 15, fig. 9. *Achilleum auriforme* ? Böhm. Kreid., pl. 1, fig. 3. France, Saintes; Angleterre, Lewes; Allem., Ilseburg.
- \*1519. plana**, d'Orb., 1847. *spongia plana*, Phillips, 1829, Yorkskire, pl. 1, fig. 1. Angleterre, Bridlington.
- \*1520. capitata**, d'Orb., 1847. *spongia capitata*, Phillips, 1829, Yorkshire, pl. 1, fig. 2. *Scyphia marginata*, Roemer, pl. 2, fig. 7. Anglet., Bridlington; Hanovre.
- \*1521. subpeziza**, d'Orb., 1847. *Manon pexisa*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 12, pl. 5, fig. 1. Maëstricht.
- \*1522. fragilis**, d'Orb., 1847. *Scyphia fragilis*, Roemer, 1840, Kreid., p. 8, n. 28, pl. 3, fig. 11. Saint-André-de-Méouille (Basses-Alpes); Allem., Oppeln.
- 1523. subtenuis**, d'Orb., 1847. *Manon tenue*, Roemer, 1840, Kreid., p. 2, n. 5, pl. 1, fig. 7 (non n. 1514). Allem., Oppeln.
- \*1524. obliqua**, d'Orb., 1847. *Chenendopora obliqua*, Michelin, 1844, Icon., pl. 132, pl. 41, fig. 2. Châteaueux.
- \*1525. dilatata**, d'Orb., 1847. Espèce renflée à la base de sa cupule, puis évasée, ensuite substriée en dehors. Saintes.
- \*1526. oblonga**, d'Orb., 1847. Espèce en forme de bouteille renversée, de contexture très-grenue. Saintes.
- \*1527. costata**, d'Orb., 1847. Espèce de la forme du *C. Townsendi*, mais avec des côtes en travers en dedans. France, Tours.
- 1528. Mantellii**, d'Orb., 1847. *Scyphia Mantellii*, Goldf., pl. 65, fig. 5. Roemer, 1840, Nordd. Kreid., p. 6, n. 9. Goslar, Coesfeld.
- \*1529. Santonensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les oscules sont rapprochés. Saintes, Meudon, près de Paris.
- FLOSCOPYPHIA**, Reuss, 1846.
- 1530. labyrinthica**, d'Orb., 1847. *spongia labyrinthicus*, Mantell, 1822, Foss. Illust. geol. of Sussex, p. 165, pl. 15, fig. 7. Angleterre, Lewes.
- \*1531. contortolobata**, d'Orb., 1847. *Spongia id.*, Michelin, 1844, p. 144, pl. 42, fig. 1. *Plocoscyphia labyrinthica*, Reuss, 1846, Böhm., pl. 18, fig. 10. Tours; Bohême, Kutschlin, Liebschitz.
- 1532. formosa**, d'Orb., 1847. *Achilleum formosum*, Reuss, 1846, Böhm., p. 79, pl. 43, fig. 7. Bohême, Bilin.
- 1533. Bennettiæ**, d'Orb., 1847. *scyphia Bennetti*, Reuss, 1846, Böhm., pl. 18, fig. 11. Bohême, Bilin.



- 1524.** *rugosa*, d'Orb., 1847. *Achilleum rugosum*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 79, pl. 20, fig. 4. Bohême, Kutschlin, Bilin.
- 1525.** *expansa*, d'Orb., 1847. *Guetiardia idem*, Michelin, 1844. Icon. Zoophyt., p. 122, pl. 32, fig. 4. France, Saint-Jean-la-Forêt, près de Bellesme.
- 1526.** *variabilis*, Michelin, 1844.
- 1527.** *variabilis*, Michelin, 1844, Icon. Zoophyt., p. 125, pl. 35, fig. 1-8. *Scyphia trilobata*, Michelin, pl. 28, fig. 2? *Spongia sulcata*, Michelin, pl. 28, fig. 4. Tours, Saint-Agnan.
- 1528.** *MORPHOSPONGIA*, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 178.
- 1529.** *ramosa*, d'Orb., 1847. *Spongia ramosa*, Mantell, 1822, Sussex, p. 162, pl. 15, fig. 11. Tours, Saintes, Chinon, Sens, Noirmoutiers; Anglet, Brighton, Lewes.
- 1530.** *glomerata*, d'Orb., 1847. *Achilleum glomeratum*, Goldfuss, 1830, Petref., 1, p. 1, pl. 1, fig. 1. Maëstricht.
- 1531.** *fungiformis*, d'Orb., 1847. *Achilleum fungiforme*, Goldfuss, 1830, Petref., 1, p. 1, pl. 1, fig. 3. Maëstricht.
- 1532.** *capitatum*, d'Orb., 1847. *Manon capitatum*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 2, pl. 1, fig. 4; peut-être *Manon pulvinaticum*, Goldf., pl. 1, fig. 6. Maëstricht.
- 1533.** *hippocastanum*, d'Orb., 1847. *Tragos idem*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 13, pl. 5, fig. 7. Hollande, Maëstricht.
- 1534.** *byssoides*, d'Orb., 1847. *Scyphia byssoides*, Römer, 1840, Kreid., p. 6, n. 11, pl. 2, fig. 8. Hanovre, Peine.
- 1535.** *crassa*, d'Orb., 1847. *Chemidium crassum*, Michelin, 1844, p. 142, pl. 28, fig. 3. France, Cbâteaueux.
- 1536.** *heteromorpha*, d'Orb., 1847. *Scyphia heteromorpha*, Reuss, 1846, Bœhm., p. 74, pl. 18, fig. 1-4. Bohême, Muggendorf.
- 1537.** *angustata*, d'Orb., 1847. *Scyphia angustata*, Römer, 1840, Kreid., p. 8, n. 25, pl. 3, fig. 5. Allem., Schönau près Tæplitz.
- 1538.** *multiporella*, d'Orb., 1847. *Spongia multiporella*, Michelin, 1844, p. 143, pl. 29, fig. 2. France, Tours.
- 1539.** *laevis*, d'Orb., 1847. *spongia laevis*, Phillips, 1839, Yorkshire, pl. 1, fig. 8 a. Anglet., Bridlington.
- 1540.** *alveolites*, d'Orb., 1847. *Scyphia alveolites*, Römer, 1840, Kreid., p. 8, n. 24, pl. 3, fig. 6. Hanovre, Peine.
- 1541.** *tubulosa*, d'Orb., 1847. *Scyphia tubulosa*, Römer, 1840, Kreid., p. 8, n. 26, pl. 3, fig. 10. Hanovre, Peine.
- OLIONA**, Grant., 1826. *Vicia*, Nardo, 1829. *Spongia*, Duvernoy, 1840.
- 1551.** *irregularis*, d'Orb., 1847. Espèce dont les oscules extérieurs sont irrégulièrement épars. France, Tours, Meudon, Saintes, Royan.
- 1552.** *ramosa*, d'Orb., 1847. Espèce dont les oscules extérieurs forment des rameaux. France, Tours, Saint-Christophe.

## VINGT-TROISIÈME ÉTAGE : — DANIEN.

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELEMNITTELLA**, d'Orb., 1839. Voy. p. 210.

1. **mucronata**, d'Orb., 1839. Voy. Étage sénonien, n° 1. Suède, Faxö (d'après M. Lyell).

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 52.

\*2. **Danicus**, Schlotheim, 1820, Petref., p. 117. Lyell, 1835, on the Cret., p. 250; Trans. géol. Soc., 5. France, Laversine, Vigny, près de Beauvais; Suède, Faxö.

\*3. **Robertinus**, d'Orb., 1848. Grande espèce globuleuse, très-convexe, lisse, à ombilic très-étroit (dans le moule); cloisons peu arquées, non sinueuses, à siphon placé bien plus près du retour de la spire que du bord externe. France, Montereau (Seine-et-Marne), la Falaise, Montainville, près de Beynes (Seine-et-Oise).

**BACULITES**, Lamarck, 1799. Voy. p. 66.

?4. **Faujasii**, Lamarck. Voy. Étage sénonien, n° 69. Danemark; Faxö (d'après M. Lyell).

### MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 2, p. 67.

\*5. **supracretacea**, d'Orb., 1847. Espèce dont l'angle spiral est d'environ 16°, à tours aplatis, saillants seulement à la partie antérieure, ornés de stries inégales longitudinales, dont une plus forte en avant. France, Meudon, près de Paris (Seine-et-Oise).

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. vol. 1, p. 29.

\*6. **supracretacea**, d'Orb., 1848. Grosse espèce, globuleuse, lisse, dont les tours ont un léger méplat près de la suture. (Sous le nom de *N. Patula*.) France, la Falaise, près de Beynes, Port-Marly, près Saint-Germain, Meudon, près de Paris.

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 64.

- 7. polyphyllus**, d'Orb., 1848. Moyenne espèce, remarquable par ses tours de spire anguleux, pourvus, sur l'angle, de longues expansions foliacées anguleuses, de deux côtes en dessus et de quatre au-dessous de cette carène. La Falaise, près de Beynes.
- 8. Gabriellæ**, d'Orb., 1847. Espèce petite, conique, à tours étroits, légèrement saillants en toit, les uns sur les autres, ornés d'une série de légères nodosités et de stries fines longitudinales. France, la Falaise, près de Beynes, Vigny (Oise).
- SOULARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 1, p. 300.
- 9. Danne**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *S. Granulatum*, mais plus déprimée et presque enroulée horizontalement, à très-large ombilic, carénée extérieurement et ornée d'une côte tuberculeuse en dessus. La Falaise, près de Beynes, Meudon.
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 5.
- 10. Gravesii**, d'Orb., 1848. Espèce conique, élevée, à tours étroits, saillants, ornés de neuf côtes longitudinales tuberculeuses. La Falaise.
- PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. vol. 1, p. 7.
- 11. penultima**, d'Orb., 1848. Belle espèce dont l'angle spiral est de 82° d'ouverture, formée de tours légèrement évidés au milieu, ornés de fines côtes granuleuses longitudinales, avec lesquelles se croisent des lignes d'accroissement; bande du sinus près de la suture, dont elle est séparée seulement par trois stries; dessous, légèrement ombiliqué. La Falaise, près Beynes.
- VOLA**, Bruguière, 1791.
- 12. cretacea**, d'Orb., 1848. Espèce ovale, lisse, prolongée en avant et en arrière, du côté de la bouche. Spire conique saillante; bouche très-étroite, droite. (Le jeune est donné comme *Olivæ brandaris*.) La Falaise, près de Beynes, Vigny (Oise).
- 13. bullaria**, d'Orb., 1847. *Cypræa bullaria*, Lyell, 1838, on the Cret., p. 250. *Cypræites bullaria*, Schloth. Danemark; Faxeö.
- VOLUTA**, Linné, 1758, Voy. p. 154.
- 12. subfusiformis**, d'Orb., 1848. Espèce fusiforme, un peu voisine du *V. Requieniana*, mais plus allongée et ornée seulement de quatre à cinq saillies longitudinales. Vigny.
- MITRA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 154.
- 14. Vignyensis**, d'Orb., 1848. Petite espèce, allongée, subpupilde, à péristome prononcé, dont le moule intérieur est lisse, avec quatre plis sur la columelle. Vigny.
- FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- 15. Neptuni**, d'Orb., 1847. Voy. Étage sénonien, n. 351. Espèce longue de 12 centimètres, allongée, entièrement lisse, à tours peu convexes, le dernier très-grand, pyriforme, muni d'un assez long canal. France, la Falaise, Vigny; Royan (Charente-Inférieure).
- FASCIOLARIA**, Lamarck, 1801.
- 16. prima**, d'Orb., 1848. Espèce très-voisine, pour la forme et les côtes, du *Fusus Marotianus*, et qui ne nous a pas montré d'autres caractères distinctifs que ses saillies longitudinales plus espacées et les deux plis de sa columelle. France, la Falaise.
- 17. supracretacea**, d'Orb., 1848. Petite espèce fusiforme et même

turriculée, à grosses côtes longitudinales, et munie de deux plis sur la columelle. France, Vigny.

**ORRITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

\*18. **Carolinum**, d'Orb., 1848. Espèce voisine d'aspect du *C. Requinianum*, mais avec des côtes longitudinales plus nombreuses, se correspondant moins exactement d'un tour à l'autre, et ornés, par tour, de sept côtes inégales transverses. La Falaise (Seine-et-Oise), Mont-Aimé (Marne), Meudon.

\*19. **gea**, d'Orb., 1848. Espèce allongée, lisse dans l'âge adulte, à tours peu saillants, larges, pourvus de varices de distance en distance; dans le jeune âge, il y a des stries inégales transverses. La Falaise.

\*20. **dymorphum**, d'Orb., 1848. Espèce longue de 12 centimètres, à tours non saillants, qui deviennent de moins en moins ornés suivant l'âge. Jeune, ils ont quatre côtes longitudinales noueuses, qui deviennent lisses à la moitié de l'accroissement de la coquille et disparaissent chez les adultes, entièrement lisses. Le moule montre de distance en distance que la bouche avait trois dents sur le labre, et un pli sur la columelle. La Falaise, Vigny (Oise).

\*21. **uniplicatum**, d'Orb., 1848. Coquille presque aussi grande que le *C. giganteum* (27 centimètres de longueur) et prise par erreur pour cette espèce, dont elle diffère par les tours bien plus courts, par son angle spiral de 23° d'ouverture, et enfin par des ornements différents. Les tours sont plans, lisses, et seulement marqués de quatre sillons longitudinaux; un seul pli à la columelle. France, la Falaise, Vertus (Marne), Vigny, Port-Marly, Meudon.

\*22. **uranis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. nudum*, mais à tours de spire très-finement striés en long, pourvus d'un sillon au milieu de leur largeur. France, la Falaise, près de Beynes.

\*23. **Hebertianum**, d'Orb., 1848. Espèce de 15 centimètres de longueur, voisine du *C. uniplicatum*, mais s'en distinguant, d'abord par deux plis sur la columelle, par les tours plans ornés à la partie supérieure d'une légère côte, et, à l'inférieure, d'une série de petites nodosités peu saillantes. Falaise, Vigny.

**INFUNDIBULUM**, Montfort, 1810. Voy. p. 232.

\*24. **supracretacea**, d'Orb., 1848. Petite espèce citée sous le nom de *Calyptæa trochiformis*, mais dont on ne connaît encore que le moule intérieur. Port-Marly.

**CAPULUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 31.

\*26. **ornatissimus**, d'Orb., 1848. Espèce voisine par les lames concentriques du *C. spirirostris*, mais s'en distinguant par son sommet non spiral, obtus, et par ses stries longitudinales fines et non inégales. France, la Falaise, Port-Marly.

\*27. **consobrinus**, d'Orb., 1848. Espèce voisine du *C. cornu-copiae*, mais plus large, plus court, ornée de côtes rayonnantes bien plus saillantes et régulièrement alternes; des rides concentriques profondes. France, la Falaise, Vigny.

\***EMARGINULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 197.

\*28. **cretacea**, d'Orb., 1828. Petite espèce voisine de l'*E. sancta Catharinae*, élevée, droite, comprimée, ornée de onze grosses côtes

rayonnantes, qui en ont chacune trois inégales intermédiaires. France, la Falaise, près de Beynes.

**HELOTON**, Montfort 1810. Voy. t. 1, p. 9.

**30. Hebertiana**, d'Orb., 1848. Grande et belle espèce ovale, à sommet latéral, ornée de quelques rayons indistincts, et de quelques rides d'accroissement sur les grands individus. France, la Falaise, Vigny.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**BRASSATELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 77.

**31. Hellica**, d'Orb., 1848. Espèce oblongue, également large partout, très-bombée, tronquée et presque carénée sur la région anale, courte du côté opposé, ornée de rides concentriques assez régulières. (Sous le nom de *Cytherea obliqua*.) France, Meudon, Vigny.

**32. pisolithica**, d'Orb., 1848. Espèce citée comme le *C. tumida*, Lamarck, mais n'ayant que peu de rapport avec cette espèce. Sa forme est oblongue, bien plus étroite, plus allongée sur la région anale, plus droite sur la région palléale; son moule diffère complètement, par le manque d'impressions palléales profondes, par ses empreintes musculaires non saillantes, etc., etc. France, Meudon (Seine-et-Oise).

**CARDITA**, Bruguière, 1789. Voy. p. 77.

**33. Hebertiana**, d'Orb., 1848. Espèce quadrangulaire, renflée, ornée d'environ vingt-six grosses côtes rayonnantes, saillantes, carénées, pourvues dessus d'une série de tubercules, et latéralement d'une saillie longitudinale. (Sous le nom de *Cardium porulosum*.) France, Vertus (Marne), Port-Marly, Meudon.

**LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.

**34. supracretacea**, d'Orb., 1848. Espèce circulaire, comprimée, ornée de petites côtes concentriques inégales d'accroissement. (Sous le nom de *Lucina grata*.) France, Meudon (Seine-et-Oise), Port-Marly.

**COMBES**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.

**35. multilamellosa**, d'Orb., 1848. Grande espèce ovale, voisine du *C. pectunculus*, mais beaucoup moins bombée, à côtes concentriques très-rapprochées, à côtes rayonnantes à peine visibles. France, Vertus (Marne), Port-Marly, Meudon.

**36. sublamellosa**, d'Orb., 1848. Espèce voisine du *C. lamellosa*, mais plus courte, bien plus bombée, à côtes concentriques plus espacées, moins régulièrement placées. France, Vertus (Marne), Meudon, Port-Marly.

**CARDIUM**, 1791. Voy. t. 1, p. 33.

**37. pisolithicum**, d'Orb., 1848. Espèce rapportée à tort au *C. granulatum*, dont elle diffère, par sa forme plus ovale, moins oblique, tronquée non obliquement sur la région anale, enfin, par ses stries le double plus nombreuses. France, Meudon, Port-Marly (Seine-et-Oise).

**38. Dutempleanum**, d'Orb., 1848. Espèce rapportée à tort au

*C. porulosum*, dont elle diffère par ses côtes arrondies, simples, plus rapprochées et non poreuses. France, Meudon.

**ARCA**, Linné, 1753. Voy. t. 1, p. 13.

\*38. *supracretacea*, d'Orb., 1848. Espèce ovale oblongue, comprimée, plus longue et plus étroite du côté anal, élargie et courte du côté opposé, subcarénée antérieurement, ornée de côtes rayonnantes et concentriques croisées. France, la Falaise, près de Beynes, Vigny (Oise).

\*39. *Herope*, d'Orb., 1848. Espèce voisine de la précédente, mais plus large et plus anguleuse sur la région anale; elle est ornée de côtes concentriques et rayonnantes bien plus grosses et plus millantes. France, Port-Marly.

\*40. *Gravesii*, d'Orb., 1848. Espèce voisine de forme de *A. Giliensis*, mais plus étroite, plus longue, ornée de côtes concentriques fines, avec lesquelles se croisent des côtes rayonnantes. (Donnée sous le nom d'*A. rudis*.) France, la Falaise, près de Beynes, Meudon, Port-Marly (Seine-et-Oise), Vigny, Laversine, près de Beauvais (Oise).

**MYTILUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.

\*41. *Phædra*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme et d'ornement du *M. lineatus*, mais plus étroite et plus acuminée sur la région buccale, plus large et moins oblique sur la région anale; ses stries rayonnantes plus interrompues. France, la Falaise.

**LINA**, Bruguière, 1791, Voy. t. 1, p. 175.

\*42. *Carolina*, d'Orb., 1848. Petite espèce ovale, ornée de fines stries rayonnantes et de lignes d'accroissement marquées. France, Meudon (Seine-et-Oise), Vigny, la Falaise, Port-Marly, Laversine, près de Beauvais (Oise).

**SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. t. 2, p. 83.

\*43. *Aonis*, d'Orb., 1848. Petite espèce irrégulière ornée de stries rayonnantes, fines, inégales, avec lesquelles se croisent à peine quelques rares lignes d'accroissement. France, Laversine.

**CHAMA**, Linné, 1758. Voy. p. 170.

\*44. *supracretacea*, d'Orb., 1848. Espèce convexe, arrondie, fortement contournée sur elle-même, ornée de très-petites côtes concentriques, marquée de lignes rayonnantes aussi serrées que les côtes. France, la Falaise, Meudon.

**OSTREA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 166.

\*45. *Megara*, d'Orb., 1848. Petite espèce oblongue, convexe, ornée de cinq grosses côtes rayonnantes, peu régulières, très-élargies à la région palléale. France, la Falaise.

\*46. *canaliculata*, d'Orb., 1847. Voy. Étage sénonien, n° 915. La Falaise.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**RYNCHONELLA**, Fischer. Voy. t. 1, p. 92.

\*47. *incurva*, d'Orb., 1848. *Tereb. incurva*, Schloth., Cat., p. 65, n. 72. De Buch, Mém. de la Soc. géol., 3, p. 207, pl. 19, fig. 6. Faxoë.

'48. *Danica*, d'Orb., 1848. Espèce presque ronde, plus longue que large, à crochet courbé et saillant, ornée de côtes fines, rayonnantes, dichotomes; commissure palléale, relevée d'un côté et abaissée de l'autre.

*PERBRATULA*, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

'50. *incisa*, Münster, de Buch, Mém. de la Soc. géol., 3, p. 204. Suède, Faxö.

### ÉCHINODERMES.

*PRIMA*, Desmoulins.

'50. *Freuchenii*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 92. Suède, Faxö.

*PRINOLAMPAS*, Gray.

'51. *Francii*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 106. *Clypeaster setiformis*, DeFrance. Orglande (Manche).

*PRADENA*, Gray.

'52. *Heberti*, Desor, Agass., 1847, Cat. syst., p. 45. Orglande, Valognes (Manche).

*PRARIS*, Lamarck.

'53. *venulosa*, Desor, pl. 6; Agass., Cat., 1847, p. 24. Nord de l'Europe.

'55. *Forchhammeri*, Hising., Leth., Suec., pl. 20, fig. 2; Agass., Cat., 1847, p. 24. France, Vigny, Laversine (Oise); Suède, Faxö.

### ZOOPHYTES.

*ELIPSOMILIA*, d'Orb., 1847. Voy. p. 36.

'53. *supracretacea*, d'Orb., 1848. Espèce voisine de forme de l'*E. obliqua*, également arquée, mais ayant extérieurement des côtes bien plus saillantes et plus égales. France, Port Marly, Meudon, la Falaise (Seine-et-Oise), Vertus (Marne), Laversine (Oise).

'54. *Meudonensis*, d'Orb., 1848. Espèce le double de la précédente, bien plus large et plus comprimée; les cloisons pourvues de trois cycles. Meudon.

*ELANOPHYLLIA*, Blainville.

'54'. *Faxöensis*, d'Orb., 1848. *Caryophyllia Faxöensis*, Beck, Lyell, 1837, Trans. geol. Soc. of London, 5, p. 249. Suède, Faxö.

*ASTREA*, Lamarck, 1816.

'54'. *Calypso*, d'Orb., 1848. Espèce dont les cellules, rapprochées, ont 2 millimètres de diamètre, et sont pourvues de six doubles cloisons; l'intervalle irrégulier. France, la Falaise.

'55. *Hebertiana*, d'Orb., 1848. Espèce dont les cellules, très-espacées, sont larges de près de 2 millimètres, à six doubles cloisons. La Falaise.

'55'. *microphyllia*, d'Orb., 1848. Espèce dont les cellules, espacées, ont un millimètre de diamètre, à huit cloisons égales. La Falaise.

*PRIONASTREA*, Edwards et Haime, 1848.

'56. *supracretacea*, d'Orb., 1848. Espèce à cellules ovales, comprimées, multilamellées, à columelle poreuse. La Falaise.

**PHYLLOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*57. *Oceani*, d'Orb., 1848. Belle espèce dont les cellules, espacées, ont un peu plus de deux millimètres de diamètre, multilamellées, profondes; intervalle finement orné de stries onduleuses. France, la Falaise.

\*58. *Neptuni*, d'Orb., 1848. Espèce dont les cellules, espacées, ont 6 millimètres de diamètre, peu profondes et multilamellées; intervalle finement strié. France, la Falaise.

**POLYTREMACEA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 183.

60. *supracretacea*, d'Orb., 1848. Espèce dont les cellules sont intermédiaires, pour la taille, entre les *P. macropora* et *Blainvilliana*; les canelures du pourtour saillantes en lames. La Falaise, Vigny.

**ENALLHELIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 322.

\*61. *regularis*, d'Orb., 1848. Espèce à rameaux comprimés, munis latéralement de cellules; stries extérieures très-régulières. France, la Falaise, près de Beynes.

#### AMORPHOZOAIRES.

**HIPPALIMUS**, Lamouroux, 1821. Voy. t. 1, p. 209.

62. *proliferus*, d'Orb., 1848. *Anthophyllum proliferum*, Goldfuss, 1830, Petref., 1, p. 46, pl. 13, fig. 13. Suède, Faxö.



## TERRAINS TERTIAIRES.

### VINGT-QUATRIÈME ÉTAGE : SUESSONIEN

#### OU NUMMULITIQUE.

(A. — COUCHES INFÉRIEURES.)

---

#### MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**HELIX**, Linné, d'Orb., Traité élémentaire de paléont.

- \*1. **luna**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 81, fig. 1-3. France, Rilly (Marne).
- \*2. **hemisphærica**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 81, fig. 4-6. Rilly.
- \*3. **Arnoudii**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 81, fig. 7-9. Rilly.
- \*4. **Lunellii**, d'Orb., 1847. *Cyclostoma id.*, Mathéron, 1843, Catal., p. 209, pl. 35, fig. 12, 13. France, les Baux, Vitrolles (B.-du-Rhône).
- \*5. **heliceiformis**, d'Orb., 1847. *Cyclostoma id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 210. Les Baux, les Mons (B.-du-Rhône).
- \*6. **subdisjuncta**, d'Orb., 1847. *Cyclostoma disjuncta*, Mathér., 1832, Ann. des Sc. et de l'Ind., p. 59, pl. 2, fig. 1-4 (non *disjuncta*, Turton, 1804). Les Mons.
- \*7. **proboscidea**, d'Orb., 1847? *Ampullaria id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 225, pl. 87, fig. 25, 26. Peynier (B.-du-Rhône).
- \*8. **Matheronia**, d'Orb., 1847. *Ampullaria galloprovincialis*, Mathéron, 1843, Cat., p. 226, pl. 38, fig. 1-3 (non Mathéron, Étage 26, n. 6). C'est une Hélice et non une Ampullaria. Canet, près de Meyreuil (B.-du-Rhône).
- \*9. **rotellaris**, Mathéron, 1843, Cat., p. 197, Ann. des Sc. et de l'Industrie du midi de la France, t. 3, p. 56, pl. 1, fig. 1-3. Simanne, près de Gardanne (B.-du-Rhône).
- \*10. **subfallax**, d'Orb., 1847. *H. fallax*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 45, pl. 5, fig. 4-7 (non Dekay, 1843). Châlons-sur-Vesles (Marne).
- \*11. **Rillysensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*H. hemisphærica*, mais sans ombilic ouvert et plus globuleuse. France, Rilly-la-Montagne.

**TOMOGERES**, Montfort, 1810, *Anostoma*, Lamarck, 1822; *Lychnus*, Mathéron, 1843.

**12. elliptica**, d'Orb., 1847. *Lychnus ellipticus*, Mathéron, 1843, Cat., p. 204, Ann. des Sc. et de l'Indust., 3, pl. 2, fig. 5-7. Les Baux, Mimet (B.-du-Rhône).

**13. Urgonensis**, d'Orb., 1847. *Lychnus id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 204. Orgon (B.-du-Rhône).

**\*14. Matheroni**, d'Orb., 1847. *Lychnus id.*, Requier., Bull. de la Soc. géol., 1842; Mathéron, Cat., p. 204, pl. 34, fig. 1, 2. Vitrolles, St-Victoret (B.-du-Rhône).

**BULIMUS**, Bruguière, 1789.

**\*15. Affuvelensis**, d'Orb., 1847. *Lymnea id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 214, pl. 36, fig. 1, 2. Cette espèce nous paraît être un *Bulimus* et non une *Lymnea*. Fuveau, Peynier (B.-du-Rhône).

**16. longissimus**, d'Orb., 1847. *Lymnea longissima*, Mathéron, 1843, Cat., p. 214, pl. 36, fig. 3, 4. C'est un *Bulimus*. Simianne (Bouches-du-Rhône).

**17. obliquus**, d'Orb., 1847. *Lymnea obliqua*, Mathéron, 1843, Cat., p. 214, pl. 36, fig. 5. C'est un *Bulimus* et non pas une *Lymnea*. Bords de l'Arc (B.-du-Rhône).

**18. meridionalis?** d'Orb., 1847. *Lymnea aquensis*, Mathér., 1843, Cat., p. 213, pl. 36, fig. 6, 7. C'est un *Bulimus* mais non le *B. aquensis* de Mathéron, ce qui oblige de changer cette dénomination. Quartier de Montaigu, près d'Aix (B.-du-Rhône).

**19. terebra**, Mathéron, 1832, Ann. des Sc. et de l'Indust., p. 57, pl. 1, fig. 12, 13. Les Baux (B.-du-Rhône).

**20. Panescorsii**, Mathéron, 1843, Cat., p. 206, pl. 34, fig. 5. Orgon, Aups (B.-du-Rhône).

**PUPA**, Draparnaud, 1801.

**21. subantiqua**, d'Orb., 1847. *P. antiqua*, Mathéron, 1832, Ann. des Sc. et de l'Indust., p. 56, pl. 1, fig. 4; id., 1843, Cat., p. 205, pl. 34, fig. 3, 4 (non Schubler, 1830). Baux (B.-du-Rhône).

**\*22. patula**, Mathéron, 1832, Ann. des Sc. et de l'Indust., p. 57, pl. 1, fig. 8-10. Rognac (B.-du-Rhône).

**\*23. tenuicostata**, d'Orb., 1847. *Melania id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 213, pl. 36, fig. 19-22. (C'est certainement un *Pupa* et non une *Melania*). Rognac, Les Baux.

*N. B.* Nous en possédons encore cinq espèces de Rilly-la-Montagne, qui ont probablement été nommées par M. de Boissy.

**AURICULA**, Lamarck, 1796.

**24. Requieri**, Mathéron, 1843, Cat., p. 203, pl. 35, fig. 1-73. France, Les Baux, Aups (Var).

**25. subovula**, d'Orb., 1847. *A. ovula*, Mathéron, 1843, Cat., p. 203, pl. 35, fig. 4-6 (non Férussac). France, Les Baux.

**PHYSA**, Draparnaud, 1801.

**\*26. columnaris**, Deshayes, Paris, 2, p. 90, pl. 10, fig. 11, 12. France, Aix (B.-du-Rhône), envir. d'Épernay (Marne).

**27. Draparnaudii**, Mathéron, 1843, Cat., p. 216, pl. 36, fig. 8. Langresse, près d'Aix (B.-du-Rhône).

- 28. galloprovincialis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 216, pl. 36, fig. 9, 10. Les Baux, Orgon.
- 29. Gardanensis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 217, pl. 36, fig. 13, 14. Gardanne, Simianne (B.-du-Rhône).
- 30. dollolum**, Mathéron, 1843, Cat., p. 217, pl. 36, fig. 15, 16. Simianne.
- 31. Michaudi**, Mathéron, 1843, Cat., p. 218, pl. 36, fig. 17, 18. Simianne.
- \*32. gigantea**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 82. *P. Prinsepil*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc., 5, pl. 47, fig. 14, 15. France, Rilly, près de Reims (Marne), Montagnes-Noires (Aude); Indes, Munnoor, Chicknee.
- \*33. pulchella**, d'Orb., 1847. Petite espèce allongée, conique, à tours convexes. France, Mont Bernon, près d'Épernay (Marne).
- LYMNÆA**, Lamarck, 1801.
- 34. subulata**, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 5, pl. 47, fig. 13. Inde, Munnoor, Chicknee.
- FLANORIS**, Guettard, 1756.
- 35. subcingulatus**, Mathéron, 1843, Cat., p. 212, pl. 35, fig. 26, 27. Langresse (B.-du-Rhône).
- 36. pseudo-rotundatus**, Mathéron, 1843, Cat., p. 213, pl. 35, fig. 28, 29. Moutaignet, près d'Aix (B.-du-Rhône).
- \*37. subovatus**, Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 85, pl. 9, fig. 19, 20, 21. Épernay (Marne).
- \*38. lavigatus**, Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 85, pl. 10, fig. 1, 2. France, Épernay (Marne), Mareuil-la-Motte (Oise).
- \*39. Sparnacensis**, Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 86, pl. 10, fig. 6, 7. Épernay (Marne), Muirancourt, Mareuil (Oise).
- CYCLOSTOMA**, Lamarck, 1801.
- \*40. Arnoudii**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 83. Rilly (Marne).
- \*41. solarium**, Mathéron, 1843, Cat., p. 209, pl. 35, fig. 7-11. Fuveau, Peynier, Les Baux (B.-du-Rhône).
- \*42. abbreviata**, Mathéron, 1843, Ann. des Sc. et de l'Industr., p. 61, fig. 10-12. Vallon du Duc, près de Velaux (Bouches-du-Rhône).
- PALUDINA**, Lamarck, 1822.
- \*43. aspera**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 84, fig. 1, 2 (adulte). *Paludina subangulata*, Michelin, 1836, id., pl. 84, fig. 3 (jeune). Rilly (Marne).
- \*44. rimata**, Michaud, 1836, Mag. de zool., pl. 84, fig. 4. Rilly.
- 45. subulenta**, d'Orb., 1847. *Paludina lenta*, Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 128, pl. 15, fig. 5, 6 (non *vivipara lenta*, Sow., Min. Conch., pl. 31, fig. 3). France, env. de Soissons.
- \*46. Desnoyerii**, Deshayes, 1824, 2, p. 127, pl. 16, fig. 7, 8. Épernay.
- 47. Bosquiana**, Mathéron, 1843, Cat., p. 223, pl. 37, fig. 19, 20. Auriol (B.-du-Rhône).
- 48. Beaumontiana**, Mathéron, 1843, Cat., p. 224, pl. 37, fig. 23, 24. Baux, Rognac (B.-du-Rhône).

**49. Deccanensis**, Sowerby, 1837, Trans. geol. Soc. of London, t. pl. 47, fig. 20-23. Indes orientales, Munnoor, Chicknec.

**PALUDESTRINA**, d'Orb., 1840, Mollusques des Antilles.

**50. Deshayesiana**, d'Orb., 1847. *Paludina id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 224, pl. 37, fig. 21, 22. Rognac.

**\*51. miliola**, d'Orb., 1847. *Paludina id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. geol., p. 49, pl. 4, fig. 1-3. Ciry-Salsogne (Aisne), Crontoy (Oise).

**\*52. intermedia**, d'Orb., 1847. *Paludina id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 50, pl. 4 fig. 4-6. Ciry-Salsogne (Aisne), Ognolles (Oise).

**53. striatula**, d'Orb., 1847. *Paludina striatula*, Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 133, pl. 15, fig. 15, 16. Soissons (Aisne), Athis, theuil, Solente, Porquéricourt, Cuvilly (Oise).

**\*54. Desmaresti**, d'Orb., 1847. *Paludina Desmaresti*, Prevost, Deshayes, n. 5, pl. 15, fig. 13, 14. Cendrières de Beaurains, Cuvilly (Oise).

**MELANIA**, Lamarck, 1801.

**56. subtenuistriata**, d'Orb., 1847. *M. tenuistriata*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. geol., p. 48, pl. 4, fig. 7-9 (non Münster, 1843, France, Ciry-Salsogne (Aisne)).

**57. curvicostata**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 48, pl. fig. 10-12. France, Ciry-Salsogne.

**\*58. inquinata**, DeFrance, Deshayes, n. 2, pl. 12, fig. 7, 8-10, 15, 16. Cendrières de l'Oise, Soissons, Épernay.

**59. lyra**, d'Orb., 1847. *Melanopsis lyra*, Mathéron, 1843, Cat., p. 22, pl. 37, fig. 8-10. Ce n'est pas un *Melanopsis*, par le manque de canal. France, Martigues (B.-du-Rhône).

**60. subrugosa**, d'Orb., 1847. *Melanopsis rugosa*, Mathéron, 1843, Cat., p. 221, pl. 37, fig. 11 (non *rugosa*, Lea). Le manque de canal en fait une *Melania*. Martigues.

**61. armata**, d'Orb., 1847. *Melanopsis armata*, Mathéron, 1843, Cat., p. 222, pl. 38, fig. 12-14. C'est une *Mélanie*. Rognac, Saint-Victoret (B.-du-Rhône).

**\*62. turricula**, d'Orb., 1847. *Melanopsis turricula*, Mathéron, 1843, Cat., p. 222, pl. 37, fig. 15, 18. C'est une véritable *Mélanie*. Martigues.

**63. scalaris**, Sowerby, 1829, Edimburg new philosophical journal, p. 13. Fuveau, env. d'Aix (B.-du-Rhône).

**64. Gardanensis**, d'Orb., 1847. *Cerithium id.*, Mathéron, 1843, Cat., p. 243, pl. 40, fig. 2-4. Gardanne, Simiane (B.-du-Rhône).

**\*65. triticea**, Fér., Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 140, pl. 14, fig. 7, 8. Les Rosières, près Épernay (Marne).

**66. quadrilimeata**, Sowerby, 1837, Trans. geol. Soc. of London, t. 5, pl. 47, fig. 17-19. Indes orientales, Munnoor, Chicknec.

**MELANOPSIS**, Ferussac, 1806.

**67. buccinulum**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 49, pl. 4, fig. 13-15. Châlons-sur-Vesles (Marne).

**68. fusiformis**, Sow., 1823, Min. Conch., 4, p. 35, pl. 322, fig. 1-7. *M. buccinoidea*, Fér., Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 120, pl. 14, fig. 24-27 et pl. 15, fig. 3, 4. Féruss., Mém. géol., p. 64, n. 1 (non espèce vivante). France, Boulincourt, St-Sauveur, Salency

(Oise), Soissons (Aisne), Bernon, Disy-les-Rosières, près Reims, Gilecourt entre Crespy et Compiègne; Anglet., Charlton, Woolwich, New-Crotz, Pordevel.

**70. subcostata**, d'Orb., 1847. *Melanopsis costata*, Deshayes, n. 4, pl. 19, fig. 15-16 (non espèce vivante). Antheuil (Oise), Soissons.

**71. galloprovincialis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 219, pl. 37, fig. 1-6. Martigues, Simiane, Gardanne, Fureau (B.-du-Rhône).

**72. Marticensis**, Mathéron, 1843, Cat., p. 220, pl. 37, fig. 7. Martigues (B.-du-Rhône).

**TURRITELLA**, Lam., 1801. Voy. p. 67.

**74. rotifera**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 274, pl. 40, fig. 20, 21. France, Soissons.

**CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.

**75. plicatula**, d'Orb., 1847. *Melania plicatula*, Deshayes, 1824, Envir. de Paris, 2, p. 115, pl. 14, fig. 5, 6. Abbecourt, près de Beauvais, Bracheux (Oise).

**TURBONILLA**, Risso, 1825.

**76. bimarginata**, d'Orb., 1847. *Auricula bimarginata*, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 2, p. 70, pl. 8, fig. 12, 13. Abbecourt.

**PYRANIDECLA**, Lamarck, 1796.

**77. elongata**, d'Orb., 1847. *Pupa id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 46, pl. 4, fig. 23-25. Châlons-sur-Vesles (Marne).

**ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.

**78. biplicatus**, d'Orb., 1847. *Tornatella biplicata*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 52, pl. 4, fig. 20-22. Châlons-sur-Vesles.

**FEDIPES**, Adanson, 1757.

**79. crassidens**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 47, pl. 6, fig. 5, 6. Châlons-sur-Vesles (Marne).

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.

**80. glaucinoides**, Desh., n. 3, pl. 20, fig. 7, 8 (exclus. localités). Abbecourt, Nouailles (Oise).

**NERITA**, Guettard, 1756.

**81. subornata**, d'Orb., 1847. *Neritina ornata id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 50, pl. 6, fig. 9-10 (non Sow., 1835). Châlons-sur-Vesles.

**82. vicina**, d'Orb., 1847. *Neritina id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 51, pl. 6, fig. 11, 12. Châlons-sur-Vesles.

**83. consobrina**, d'Orb., 1847. *Neritina consobrina*, Féruss., Desh., n. 4, pl. 19, fig. 5, 6. Catenoy, Grandfresnoy, Cuise-Lamotte (Oise), Épernay (Marne).

**84. globulus**, d'Orb., 1847. *Nerita globulus*, DeFr., Desh., n. 2, pl. 17, fig. 19, 20. *Neritina implicata*, Sow., 1823, Min. Conch., 4, p. 117, pl. 385, fig. 9, 10. Arsy, Cauly, Mareuil-la-Motte, Orvilliers (Oise), Mont Bernon (Oise); Angleterre, Charlton, Woolwich.

**85. nucleus**, d'Orb., 1847. *Nerita nucleus*, Desh., n. 9, pl. 25, fig. 3-5. Moyvilliers, Catenoy, Cuise-la-Motte, Tresly, Breuil (Oise).

**86. pisiformis**, d'Orb., 1847. *Neritina pisiformis*, Desh., n. 7, pl. 17, fig. 21, 22. France, Cappy, Bussy, Cuise-la-Motte (Oise).

**87. Brongniartina**, d'Orb., 1847. *Neritina Brongniartina*, Mathéron, 1843, Cat., p. 226, pl. 38, fig. 4, 5. La Cadière (Var).

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.

**88. subfragilis**, d'Orb., 1847. *T. fragilis*, Desh.; 1824, Envir. de Paris, 2, p. 237, pl. 29, fig. 11-14 (non Gmelin, 1789). Abbecourt, Noailles, près Beauvais (Oise).

**SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 800.

**\*89. marginatum**, Desh., n. 5, pl. 25, fig. 21-23. Abbecourt, Creil (Oise).

**OVULA**, Bruguière, 1791.

**\*91. gigantea**, d'Orb., 1847. *Strombus giganteus*, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 14, pl. 169, fig. 3. Kressenberge; France, env. de Castellanne (B.-Alpes).

**VOLUTA**, Linné, 1758. Voy. p. 154.

**\*92. depressa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 479, n. 12; Desh., 1824, Envir. de Paris, 2, p. 688, pl. 93, fig. 14, 15. *Voluta fuscum*, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 353, n. 15. Bracheux, Abbecourt, Noailles, Rétheuil, Cuise-la-Motte, Laon.

**STROMBUS**, Linné, 1758. Voy. p. 132.

**93. callosus**, Desh., n. 1, pl. 84, fig. 7, 8. Abbecourt, Bracheux, Cuise-la-Motte (Oise).

**FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.

**94. gradatus**, Morris, 1843, Cat. *Murex gradatus*, Sow., 1813, Min. Conch., t. 2, p. 225, pl. 199, fig. 6. Angl., Londres, Plumsted.

**\*95. costellifer**, Desh., n. 43, pl. 76, fig. 27, 28. Les Essarts, près Cuy, Cuise-la-Motte (Oise).

**96. deceptus**, Defr., Desh., n. 37, pl. 76, fig. 7-9. Noailles, les Essarts, près Cuy (Oise), Abbecourt.

**\*97. planicostatus**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 68, pl. 9, fig. 11, 12. Châlons-sur-Vesles (Marne).

**98. Mariae**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 67, pl. 9, fig. 7, 8. Laon, Châlons-sur-Vesles (Marne).

**99. latus**, Morris, 1843, Cat. *Murex latus*, Sow., 1813, Min. Conch., t. 1, p. 79, pl. 35. Angl., Plumsted.

**PLEUROTOMA**, Lamarck, 1801.

**100. cancellata**, Desh., n. 42, pl. 66, fig. 8-10. France, Abbecourt, Cuise-la-Motte (Oise).

**101. angulata**, Münster, Goldf., 1843, Petref., 3, p. 20, pl. 174, fig. 1. Allem., Kressenberg.

**PYRULA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.

**102. intermedia**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 69, pl. 10, fig. 8, 9. France, Châlons-sur-Vesles.

**CERITHIUM**, Adanson, 1757.

**\*103. granuloseum**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 61, pl. 7, fig. 17-19. France, Châlons-sur-Vesles.

**\*104. gibbosum**, Defr., Desh., n. 63, pl. 54, fig. 9-12. Abbecourt, Bracheux, St-Martin-aux-Bois (Oise), Cuise-la-Motte.

**105. obesum**, Desh., n. 83, pl. 56, fig. 7, 8. Abbecourt, Bracheux, Noailles (Oise).

**106. Defranci**, Desh., 1824, Envir. de Paris, 2, p. 375, pl. 57, fig. 5, 6. France, Abbecourt, Noailles.

- 107. semi-costatum**, Desh., 1824, Envir. de Paris, 2, p. 376, pl. 55, fig. 1, 2. France, Abbecourt, Noailles.
- \***108. turris**, Desh., n. 34, pl. 51, fig. 13, 14. Trésly, Breuil, St-Pierre-en-Chartres (Oise), Epernay, Ay, Lisy (Marne).
- 109. turbinatum**, Desh., n. 112, pl. 60, fig. 12, 13. St-Sauveur, Moyvillers, Sermaize (Oise).
- \***110. funatum**, Mantell, 1822, Foss. illust. geol. of Sussex, p. 368, pl. 17, fig. 4; Sow., Min. Conch., 2, p. 64, pl. 128. *C. funiculatum, intermedium*, Sow., Min. Conch., 2, pl. 147, fig. 1-4. *C. variable*, Desh., 1824, Envir. de Paris, 2, p. 403, pl. 60, fig. 19, 20; pl. 61, fig. 21, 22-25, 26, 27, 28. France, Montagne de Bernon, Ay, Disy-la-Rivière, Cumières, le Soissonnais, Noyon; Angleterre, Hordeliff, Castle-Hell, près de New-Hawen, Sussex, Woolwich, Newcross, Upnor, Plumstead.
- BUCCINUM**, Linné, 1758. Voy. p. 134.
- \***112. ovatum**, Desh., n° 8, pl. 94, fig. 14-16. France, Noailles, Bracheux, Cuise-Lamotte (Oise).
- \***113. granulosum**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 7, pl. 10, fig. 2, 3. France, Châlons-sur-Vesles.
- 114. bicorona**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 73, pl. 10, fig. 4, 5. France, Villers-Franqueux.
- BUCCINANOPS**, d'Orb., 1841. Voy. dans l'Amérique méridionale.
- \***115. arenarium**, d'Orb., 1847. *Buccinum arenarium*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 72, pl. 10, fig. 1. Châlons-sur-Vesles.
- SULCOBUCCINUM**, d'Orb., 1847. C'est un *Buccinanops*, qui a toujours un fort sillon sur le labre, qui se continue en dehors.
- \***116. fissuratum**, d'Orb., 1847. *Buccinum fissuratum*, Deshayes, n° 13, pl. 87, fig. 21, 22. Bracheux, Abbecourt (Oise), Noailles.
- 117. semi-costatum**, d'Orb., 1847. *Buccinum semi-costatum*, Desh., n° 15, pl. 88, fig. 3, 4. Clermont, Noyon (Oise).
- 118. tiara**, d'Orb., 1847. *Buccinum tiara*, Deshayes, n° 12, pl. 77, fig. 23-24. Abbecourt, Noailles, Bracheux (Oise).
- BULLA**, Linné, 1758.
- 119. angustoma**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 41, pl. 5, fig. 29, 30. Bracheux, Noailles, Abbecourt (Oise).
- DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 73.
- 120. incertum**, Desh., Monogr., n° 23, pl. 3, fig. 17. Abbecourt, Noailles (Oise).
- 123. sulcatum**, Lam., Desh., Monogr., n° 9, pl. 4, fig. 15. Bracheux, Liancourt, Saint-Pierre (Oise).

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**PANOPEA**, Ménard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.

- 123. intermedia**, Sow. *Mya intermedia*, Sowerby, pl. 76, fig. 4; pl. 419, fig. 2. *Panopæa Deshayesii*, Valenciennes, p. 20, pl. 4, fig. 2. *Corbula dubia*, Desh., pl. 9, fig. 13, 14. Abbecourt (Oise), Retheuil; Angl., Boygnor, Reading, Walford, Plumstead.

- 134. Remensis**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., pl. 1, fig. 5. Châlons-sur-Vesles.
- PHOLADOMYA**, Sow., 1826. Voy. t. 1, p. 73.
- 125. subplicata**, d'Orb., 1847. *P. plicata*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., pl. 1, fig. 3, 4 (non Porlock). Châlons-sur-Vesles.
- TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.
- 127. pseudo-donacialis**, d'Orb., 1847. *Tellina donacialis*, var., Desh., n° 14, pl. 12, fig. 7, 8, 11, 12 (non *donacialis*). Bracheux, Cuise-Lamotte (Oise).
- VENU**, Linné, 1758. Voy. p. 15.
- \*128. Bellovacina**, d'Orb., 1847. *Cytherea bellovacina*, Deshayes, n° 22, pl. 23, fig. 1, 2. Bracheux, Saint-Martin-aux-bois, Cuise-Lamotte (Oise).
- \*129. subobliqua**, d'Orb., 1847. *Cytherea obliqua*, Desh., n° 13, pl. 31, fig. 7, 8 (non 25, n° 821). Bracheux, Abbecourt (Oise), Noailles.
- 130. subpusilla**, d'Orb., 1847. *Cytherea pusilla*, Deshayes, n. 16, pl. 22, fig. 14, 15 (non Gmel, 1789). Abbecourt (Oise).
- CYCLAS**, Bruguière, 1791. Voy. p. 60.
- \*131. angustidens**, d'Orb., 1847. *Cyrena id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 35, pl. 2, fig. 1, 2. Châlons-sur-Vesles.
- \*132. suborbicularis**, d'Orb., 1847. *Cyrena idem*, Melleville, 1843, p. 35, pl. 2, fig. 3, 4 (non Roemer, 1836). Châlons-sur-Vesles.
- 133. intermedia**, d'Orb., 1847. *Cyrena id.*, Melleville, 1843, p. 35, pl. 2, fig. 5, 6. Châlons-sur-Vesles, Cuise-Lamotte.
- \*134. sublaevigata**, d'Orb., 1847. *C. laevigata*, Desh., n. 1, pl. 18, fig. 12, 13 (non Schum., 1817). Cuvilly, Orvilliers-Sorel (Oise), Épernay (Marne).
- \*135. antiqua**, d'Orb., 1847. *Cyrena antiqua*, Feruss., Desh., n. 5, pl. 18, fig. 19, 20. Guiscard, Muirancourt, Boulincourt (Oise), Épernay.
- \*136. trigona**, d'Orb., 1847. *Cyrena trigona*, Desh., n. 2, pl. 19, fig. 16, 17. Lisy, près d'Épernay (Marne), Ognolles, Babeuf, Cuvilly (Oise).
- \*137. cuneiformis**, Sow., 1817. *Cyrena cuneiformis*, Férussac, Deshayes, n. 10, pl. 19, fig. 1, 2, 20, 21. Sow., pl. 162, fig. 2, 3. Saint-Martin-aux-bois, Salency, Noyon (Oise), Soissons; Angl., Charlton, Headen-Hill.
- \*138. tellinella**, d'Orb., 1847. *Cyrena tellinella*, Fér., Desh., 1834, Environs de Paris, 1, p. 123, pl. 19, fig. 18, 19. Féruss., Hist. des Moll., fig. 1. Lisy, près Épernay (Marne).
- \*139. Gardanensis**, Mathéron, 1842, Catalogue, p. 145, pl. 14, fig. 1. Gardanne, Fuveau, Tretz (Bouches-du-Rhône), Quatre-Œufs, près d'Épernay (Marne).
- \*140. Matheroni**, d'Orb., 1847. *C. Brongniartina*, Mathéron, 1843, Catal., p. 145, pl. 14, fig. 2 (non Basterot, 1825). Gardanne, Auriol (Bouches-du-Rhône), environs d'Ay (Marne).
- 141. galloprovincialis**, Mathéron, 1847, Catal., p. 146, pl. 14, fig. 3, 4. France, Gardanne, Auriol (Bouches-du-Rhône).
- 142. nummismalis**, Mathéron, 1842, Catal., p. 146, pl. 14, fig. 5. Fuveau, Pinchinier, près d'Auriol (Bouches-du-Rhône).



- 143. subdeperdita**, d'Orb., 1847. *C. deperdita*, Sow., 1817, Min. Conch., t. 2, p. 139, pl. 162, fig. 1. *Cyrena deperdita*, Morris (non Lamarck, 1804). Londres, Charlton, Plumstead.
- 144. gibbosa**, Sowerby, 1829, Edinburg, New Philosophical Journal, p. 13. Environs d'Aix (Bouches-du-Rhône).
- 145. aquae-sextile**, Sowerby, 1829, id., p. 13. Aix.
- 146. concinna**, Sowerby, 1829, id., p. 13. Fuveau, près d'Aix.
- 147. cuneata**, Sowerby, 1829, Edinburg, New Philosoph. Journ., p. 13. France, Fuveau, près d'Aix.
- CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.
- 148. longirostra**, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 1, p. 51, pl. 7, fig. 20, 21. Château-Rouge, près de Noailles, Bracheux.
- CRASSATELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 77.
- \***149. subsulcata**, d'Orb., 1847. *C. sulcata*, Lam., 1804, Ann. du Mus., t. 6, p. 409, n. 2. Desh., 1824, Envir. de Paris, 1, p. 34, pl. 3, fig. 1, 2, 3 (non Brander, 1766). Abbecourt, Bracheux, près Beauvais.
- 150. scutellaria**, Desh., n. 11, pl. 5, fig. 1, 2. Abbecourt, Saint-Martin-aux-Bois (Oise).
- CARDITA**, Bruguière, 1789. Voy. p. 77.
- 151. pseudo-crassa**, d'Orb., 1847. *Cardita crassa*, Desh., 1824, Env. de Paris, 1, p. 181, pl. 30, fig. 17, 18 (non Lamarck, Anim. S. Vert., t. 6, p. 27, n. 25). Env. de Soissons.
- \***152. pectuncularis**, Desh., 1830. *Venericardia pectuncularis*, Lam., Ann. du Mus., t. 7, p. 58, n. 6. Desh., 1824, Env. de Paris, 1, p. 150, pl. 25, fig. 1, 2. Bracheux, Noailles, Martin-aux-Bois (Oise).
- \***153. multicosata**, d'Orb., 1847. *Venericardia multicosata*, Lam., Ann. du Mus., t. 7, p. 55, n. 2. Desh., 1824, Env. de Paris, 1, p. 151, pl. 26, fig. 1, 2. Bracheux, Abbecourt, Noailles (Oise).
- CYPRINA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 173.
- \***154. scutellaria**, Desh., n. 1, pl. 20, fig. 1-3 (non *scutellaria*, Nyst., 1843). Bracheux, Abbecourt, Noailles (Oise).
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.
- \***155. contorta**, Defr., Desh., n. 14, pl. 16, fig. 1, 2. Abbecourt, Bracheux, Noailles, Bresles, Cuise-Lamotte (Oise).
- \***156. subadians**, d'Orb., 1847. *L. radians*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 34, pl. 1, fig. 13, 14 (non Conrad, 1842). Châlons-sur-Vesles (Marne), Laonais, Cuise-Lamotte.
- 158. subtrigona**, Deshayes, n. 8, pl. 16, fig. 15, 16. Abbecourt, Noailles (Oise).
- 159. uncinata**, Defr., Desh., n. 20, pl. 16, fig. 3, 4. Abbecourt, Noailles, Saint-Martin-aux-Bois (Oise).
- \***160. grata**, Defr., Desh., n. 17, pl. 16, fig. 5, 6. France, Bracheux, Abbecourt (Oise).
- \***161. laevigata**, Desh., n. 5, pl. 15, fig. 9, 10. France, Abbecourt, Bresles, Noailles (Oise).
- 162. minuta**, Desh., n. 22, pl. 17, fig. 15, 16. France, Abbecourt, Noailles (Oise).
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- \***163. hybridum**, Desh., n° 6, pl. 28, fig. 1, 2. France, Abbecourt, Noailles, Bracheux (Oise).

- \***164. Plumstedianum**, Sow., 1813, *Conch.*, t. 1, p. 41, pl. 14, fig. 2. *Cardium semi-granulatum*, Deshayes, pl. 23, fig. 7-8 (non Sowerby). Angleterre, Subbington, Plumstead, Upnor; France, Abbecourt, Bracheux, Noailles (Oise), Châlons-sur-Vesles (Marne).

**UNIO**, Retzius, 1788. *Voy.* p. 79.

- 165. galloprovincialis**, Matheron, 1843, *Cat.*, p. 163, pl. 2, fig. 1. France, Fuveau, Gardanne.

- 166. Bosquiana**, Mathéron, 1843, *Cat.*, p. 163, pl. 23, fig. 24. France, Auriol, Peynier, Simiane.

- 167. Toulouzanii**, Mathéron, 1848, *Cat.*, p. 169, pl. 23, fig. 54. France, Martigues (Bouches-du-Rhône).

- 168. Cuvieri**, Mathéron, 1843, *Cat.*, p. 169, pl. 24, fig. 1-3. France, Velaux, Rognac (Bouches-du-Rhône).

- 169. Gardanensis**, Mathéron, 1848, *Cat.*, p. 170, pl. 24, fig. 44. France, Peynier, Gardanne (Bouches-du-Rhône).

- 170. subrugosa**, Mathéron, 1843, *Cat.*, p. 171, pl. 24, fig. 1. France, Fuveau, Gardanne.

- 171. Deccanensis**, Sowerby, 1837, *Trans. geol. Soc. of London*, 5, pl. 47, fig. 4-10. Indes orientales, Sichel-Hells, Munnoor.

- 172. subtumidus**, d'Orb., 1847. *U. tumidus*, Sowerby, 1837, *Trans. geol. Soc. of London*, 5, pl. 47, fig. 11-12 (non Schumacher, 1847). Indes orientales, Sichel-Hills, Munnoor.

**ANODONTA**, Lamarck, 1801.

- 173. Cordieri**, Ch. d'Orb., *Mag. de Zoolog.*, 1836, pl. 78, fig. 1. Meudon.

- 174. antiqua**, Ch. d'Orb., *Mag. de Zoolog.*, 1836, pl. 78, fig. 2. Meudon.

**NUCULA**, Lamarck, 1801. *Voy.* t. 1, p. 12.

- \***175. fragilis**, Deshayes, *Env. de Paris*, t. 1, p. 34, pl. 36, fig. 10, 11, 12. Abbecourt, Noailles, Bracheux, Cuise-Lamotte (Oise).

**PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. *Voy.* t. 2, p. 80.

- \***176. terebratularis**, Lam., *Desh.*, n° 2, pl. 35, fig. 10. H. Abbecourt, Bracheux, Salency (Oise).

- 177. Plumstediensis**, Sow., 1813, *Min. Conch.*, t. 1, p. 71, pl. 27, fig. 3. Angleterre, env. de Woolwich, Plumstead, Upnor.

**ARCA**, Linné, 1758. *Voy.* t. 1, p. 13.

- \***178. modioliformis**, *Desh.*, n° 20, pl. 32, fig. 5, 6. Moyvillers, Giraumont, Batigny, Troslybreuil, Cuise-Lamotte (Oise).

- 179. obliquaria**, *Desh.*, n° 21, pl. 34, fig. 18, 19. Moyvillers, Saint-Sauveur, Cuise-Lamotte (Oise).

- \***180. crassatina**, d'Orb., 1847. *Cucullæa crassatina*, Lamk., *Ann. du Mus.*, t. 6, p. 338; Deshayes, *Env. de Paris*, t. 1, p. 193, pl. 31, fig. 8. 9. Bracheux, Abbecourt, Noailles, Saint-Martin-aux-Bois.

- 181. incerta**, d'Orb., 1847. *Cucullæa incerta*, Deshayes, 1824, *Env. de Paris*, p. 194, pl. 31, fig. 6, 7. Abbecourt, Noailles, Bracheux.

- 182. depressa**, Sow., 1824, *Min. conch.*, t. 5, p. 416, pl. 474, fig. 2. Angleterre, env. de Woolwich, Kent.

- \***183. Mellevillei**, d'Orb., 1847. *A. levis*, Melleville, 1843, *Annal.*

des Sc. géol., p. 37, pl. 2, fig. 10, 11 (non Mathéron). Chalons-sur-Vesles.

- 184. striatularis**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 37, pl. 2, fig. 12-14. Ciry-Salsogne, près de Braine.

**MYTILUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.

- \***185. subantiquus**, d'Orb., 1847. *Dreissena id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 39, pl. 2, fig. 15, 16 (non Sow., 1839). Chalons-sur-Vesles (Aisne), Arsy, Passel (Oise).

- 186. angularis**, d'Orb., 1847. *Modiola angularis*, Desh., n° 5, pl. 41, fig. 4, 5. Bracheux, Noailles (Oise).

- 187. hastatus**, d'Orb., 1847. *Modiola hastata*, Desh., n° 6, pl. 38, fig. 13, 14. Abbecourt, Noailles, Chaumont (Oise).

**PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voyez t. 1, p. 87.

- 189. brevisauritus**, Desh., n° 2, pl. 41, fig. 16, 17. France, Saint-Martin-aux-Bois, Cressonsacq, Pronleroy (Oise).

**SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.

- 190. asperulus**, Münster, Goldf., 1836, Petref., 2, pl. 106, fig. 9. Allemagne, Kressenberg.

**PLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 203.

- 191. foliis**, DeFrance, Dict. des Sc. nat., art. *Plicatula*. Deshayes, 1824, Env. de Paris, 1, p. 313, pl. 45, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbecourt, près Beauvais.

**CHAMA**, Linné, 1753. Voy. p. 170.

- \***192. sublamellosa**, Münster, Goldf., 1836, Petref., 2, p. 206, pl. 139, fig. 3. Allemagne, Kressenberg.

**OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.

- 193. eversa**, d'Orb., 1847. *Gryphaea id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 41, pl. 3, fig. 3, 4. *O. lateralis*, Leym., 1846, pl. 15, fig. 7 (non Nilsson). Cormicy, Villers-Franqueux, Roubaix (Aude). Biarritz (Pyrénées-Orientales).

- 194. subpunctata**, d'Orb., 1847. *O. punctata*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 42, pl. 3, fig. 5-8 (non Gmel., 1839). Cormicy, Villers-Franqueux (Aisne), Noailles, Villecosse.

- \***195. Bellovacina**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 459, n. 1, et t. 14, pl. 20, fig. 1; Deshayes, 1824, Env. de Paris, 1, p. 356, pl. 48, fig. 1-2; pl. 49, fig. 1, 2; pl. 50, fig. 6; pl. 55, fig. 1-3. Sow., Min. Conch., pl. 388, fig. 1. *O. edulina*, Lamarck, Desh., pl. 55, fig. 1-3. France, Bracheux, Noailles, le Soissonnais; Angleterre, Charlton, Woolwich.

- 196. Sparnacensis**, Desh., n. 18, pl. 64, fig. 5-8. Mont Bernon, Ay, Disy (Marne), Cuise-Lamotte, Pierrefonds, Thourrette (Oise).

- 198. heteroclitia**, DeFr., Desh., n. 17, pl. 63, fig. 2-4. Cauny-sur-Matz, Clairoux, Bayencourt (Oise).

- 199. tenera**, Sow., 1819, Min. Conch., 3, p. 95, pl. 252, fig. 2-3. Angleterre, Charlton, Woolwich.

- 200. pulchra**, Woolb., Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 141, pl. 279. Angleterre, Bromley (Kent), Charlton.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**TEREBRATULINA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 85.

- \*200'. **parracena**, d'Orb., 1848. *Terebratula parracena*, Talavignes M. S. Espèce remarquable par sa forme arrondie, non tronquée sur la région palléale. France, Mont Alaric (M. Talavignes).

## ÉCHINODERMES.

**HEMIASTER**, Agassiz.

- ?201. **suborbicularis**, Desor., Agass., 1847, Cat., p. 125. *Spatangus suborbicularis*, Goldf., Petref., p. 153, pl. 47, fig. 6. Allemagne, Kressenberg.

- ?202. **æquifissus**, Desor., 1847. *Schizaster æquifissus*, Agass., 1847, Cat. Syst., p. 124. Allemagne, Kressenberg.

**BRISUS**, Klein.

- ?203. **antiquus**, Desor., Agass., 1847, Cat., p. 120. France, Aurillac, près Bagnère de Bigorre.

**CONOCLYPUS**, Agassiz.

- \*204. **subcylindricus**, Agass., 1847, Cat., p. 110. *Clypeaster subcylindricus*, Münster in Goldf., Petref., p. 131, pl. 41, fig. 6. Allem., Kressenberg; canton de Saint-Gall; Sardaigne, Nice.

205. **Osiris**, Desor., Agassiz, 1847, Cat., p. 109. Égypte, Montradan.

206. **æquidilatatus**, Agassiz, 1847, Cat., p. 109. Allem., Kressenberg.

- \*207. **conoideus**, Agassiz, 1847, Cat., p. 109. Échin. suiss., 1, p. 64, pl. 10, fig. 16. Allem., Kressenberg; Seealp (cant. d'Appenzell); Égypte; Salghyre en Crimée.

208. **costellatus**, Agass., 1847, Cat., p. 110. *Conoclypus conoideus*, Agassiz, Cat. Syst., p. 5. Allem., Kressenberg.

209. **Bouei**, Agass., 1847, Cat., p. 110. *Clypeaster Bouei*, Goldf., Petref., p. 131, pl. 41, fig. 7. Allem., Kressenberg.

210. **Duboisii**, Agass., 1847, Cat., p. 110, Echin. suiss., 1, p. 67, pl. 10, fig. 11-13. Salghir en Crimée.

**PYGORHYNCHUS**, Agassiz.

211. **Brongniarti**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 103. *Clypeaster Brongniarti*, Goldf., p. 133, pl. 42, fig. 3. Allem., Kressenberg.

## VINGT-QUATRIÈME ÉTAGE : SUESSONIEN

OU NUMMULITIQUE.

(B. — COUCHES SUPÉRIEURES.)

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**BELOPTERA**, Deshayes, d'Orb., Paléont. univers. Mollusq. viv. et foss., p. 307.

\***212. Levesquei**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 8, fig. 10-12. Paléont. franç., Terr. tert., pl. 2, fig. 5-7. Cuise-Lamotte, Gilocourt (Oise).

\***213. belemnitoidea**, de Blainv., Malac., suppl., pl. 11, fig. 8; d'Archiac, 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 216. Basses-Pyrénées, Biaritz.

?**214. anomala**, Sow., d'Orb., Paléont. univ., pl. 8, fig. 8-10. C'est peut-être le même que le *B. Levesquei*, d'Orb. Angl., Highgate, Middlesex.

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. t. 1, p. 52.

\***215. Rollandi**, Leym., 1846, Mém. soc. géol. de France, t. 1, p. 365, pl. 17, fig. 1. Montagne-Noire (Aude), Nice, Montagne du Jarrier.

**MEGASIPHONIA**, d'Orb., 1847. C'est une *Clymenia* avec le siphon très-large, en entonnoir et placé contre le retour de la spire.

**216. Delphinus**, d'Orb., 1847. *Nautilus Delphinus*, Forbes, 1846, Trans. geol. Soc. of London, t. 7, p. 98. Indes orientales, Pondichéry.

### MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**HELIX**, Linné, 1758.

\***217. damnata**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 52, pl. 2, fig. 2. Vicentin, Ronca, Nice, Montagne du Jarrier.

**MELANOPSIS**, Férussac, 1806.

\***218. obtusa**, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 2, p. 123, pl. 16, fig. 22, 23. Retheuil, près Pierrefonds, Cuise-Lamotte (Oise).

\***219. Parkinsoni**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 123, pl. 17, fig. 3, 4. Cuise-Lamotte, St-Pierre en Chartres (Oise).

?**220. ancillaroidea**, Desh., n° 3, pl. 15, fig. 1, 2. France, Cuise-Lamotte (Oise), envir. de Meaux.

\***221. Emerici**, d'Orb., 1847. Espèce longue de 45 mill., ovale.

renflée, ornée d'une rangée de gros tubercules sur la partie postérieure des tours. France, Levit, près de Castellanne.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 2.

**222. monilifer**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 53, pl. 6, fig. 7, 8. Laon (Aisne).

**TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 67.

**\*224. marginulata**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 56, pl. 5, fig. 20-22. Bièvre, Chavailles, Laon, Mons-en-Laonnois, Cuise-Lamotte (Oise).

**\*225. hybrida**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 278, pl. 36, fig. 5, 6. Retheuil, Cuise-Lamotte, Soissons, Verneuil, Pont-Ste-Maxence, Thury-sous-Clermont (Oise).

**\*226. carinifera**, Desh., n° 2, pl. 36, fig. 1, 2. France, Cuise-Lamotte, Vieux-Moulin, Hermes, St-Félix (Oise); Biaritz (Basses-Pyrénées), Vicentin, Ronca.

**\*227. edita**, Sow., Desh., pl. 36, fig. 7, 8. Bracheux, Abbecourt, Noailles, Mouv (Oise), Vicentin, Ronca.

**\*228. Dufrenoyi**, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 364, pl. 16, fig. 5. Couiza (Aude).

**229. incisa**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 54, pl. 2, fig. 4. Ronca.

**230. asperula**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 54, pl. 2, fig. 9. Ronca.

**231. Archimedis**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 55, pl. 2, fig. 8. Ronca.

**\*232. Ataciana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. carinifera*, mais toujours bien plus étroite, à carènes plus saillantes. Couiza (Aude); Piémont, Montagne du Jarrier, près de Nice.

**\*233. Corbarica**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. hybrida*, mais à sutures saillantes en côtes. Couiza (Aude).

**\*234. Brauniana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. Archimedis*, mais à côte supérieure plus aiguë et plus saillante. Lagrasse (Aude).

**\*235. Pyrenaica**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. fasciata*, mais à tours de spire carénés, et à trois côtes inégales. Couiza.

**\*236. Pailletteana**, d'Orb., 1847. Petite espèce voisine du *T. perforata*, ornée de quatre côtes. Couiza.

**RISSEO**, Freminville. Voy. t. 1, p. 183.

**\*237. submarginata**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *R. marginata*, mais dont la coquille, plus petite, à ses tours plus brillants, plus convexes, et ornée de sillons non carénés. France, Cuise-Lamotte (Oise).

**RISSOINA**, d'Orb., 1840. Voy. t. 1, p. 297.

**\*238. cochlearella**, d'Orb., 1847. *Melania cochlearella*, Lam., Desh., n° 21, pl. 14, fig. 13-17. France, Cuise-Lamotte (Oise).

**CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.

**\*239. subhordacea**, d'Orb., 1847. *Melania hordacea*, var. d.; Desh., n. 6, pl. 13, fig. 14, 15 (non *hordacea*, fig. 22, 23). Abbecourt, Creil, Chaumont (Oise).

**\*241. lactea**, Lamarck, Deshayes, pl. 13, fig. 1, 2. *Melania Stygi*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 59, pl. 2, fig. 10. Fortis della vall. di Ronca, pl. 1, fig. 7; Hacquet, pl. 2, fig. 10. Vicentin, Ronca.

- \***242. costellata**, d'Orb., 1847. *Melania costellata*, Lam., Ann. du Mus., 4, p. 430, n. 1, 8, pl. 60, 12, fig. 2; Brongniart, 1823, Vicentin, p. 59. Cuise-Lamotte (Oise), Levit, près de Castellanne (Basses-Alpes), Vicentin, Ronca, Sangonini.
- EULIMA**, Risso, 1825. Voy. t. 1, p. 116.
- \***244. subnitida**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*E. nitida*, mais bien plus allongée. Cuise-Lamotte (Oise).
- 245. elongata**, d'Orb., 1847. *Melania elongata*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 59, pl. 3, fig. 13. Castelgomberto.
- TURBONILLA**, Risso, 1825.
- 246. turella**, d'Orb., 1847. *Pyramidella id.*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 52, pl. 4, fig. 26-28. Laon, Chavailles (Aisne), Cuise-Lamotte, Grand-Fresnoy (Oise).
- \***247. nitida**, d'Orb., 1847. *Pyramidella id.*, Melleville, id., p. 53, pl. 9, fig. 17-19. Laon, Cuise-Lamotte (Oise).
- 248. minuta**, d'Orb., 1847. *Terebra id.*, Melleville, 1843, id., p. 73, pl. 4, fig. 29-32. Laon.
- 249. acicula**, d'Orb., 1847. *Auricula acicula*, Lam., Desh., n. 8, pl. 8, fig. 6, 7. Creil, Chaumont, Bliancourt (Oise).
- \***250. Tarbelliana**, d'Orb., 1847. *Melania Tarbelliana*, Grattetoup, 1847, Conch. foss. Mel., pl. 1, n. 4, fig. 3. Dax, Lesperon (Landes).
- ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 263.
- \***251. elegans**, d'Orb., 1847. *Tornatella id.*, Melleville, 1843, Annal. des Sc. géol., p. 51, pl. 4, fig. 16-19. Laon, Cuise-Lamotte (Oise).
- \***252. Castellanensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*A. sulcata*, mais plus courte et plus renflée. Levit, près de Castellanne (Basses-Alpes).
- NATICA**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 29.
- \***253. intermedia**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 177, pl. 22, fig. 1, 2. Retheuil, Cuise-Lamotte, Houdan, Pierrefonds, Meauriaumont (Oise).
- \***256. longispira**, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, 2<sup>e</sup> partie, t. 1, p. 363, pl. 16, fig. 3. Dans la Montagne-Noire (Montolieu, Conques).
- \***257. brevispira**, Leym., 1846, id., p. 363, pl. 16, fig. 4. Dans la Montagne Noire (Montolieu, Bize).
- \***258. Vulcani**, d'Orb., 1847. *Ampullaria Vulcani*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 57, pl. 2, fig. 16. Ronca.
- \***259. acutella**, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, 2<sup>e</sup> part., t. 1, p. 363, pl. 15, fig. 16. Albas, Fonjoncouse, Levit, près Castellanne (B.-Alpes).
- \***260. Albasensis**, Leym., 1846, id., p. 363, pl. 15, fig. 17. Albas, Fonjoncouse.
- 261. obtusa**, d'Orb., 1847. *Globulus obtusus*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 10. Indes, prov. de Cutch, Baboahill.
- \***262. perusta**, d'Orb., 1847. *Ampullaria perusta*, Defr., Brongniart, 1823, Vicentin, p. 57, pl. 2, fig. 17. Cuise-Lamotte (Oise), Levit, près de Castellanne (B.-Alpes), Vicentin, Ronca.
- \***263. Levesquiei**, d'Orb., 1847. Espèce donnée par M. Levesque.

sous le nom d'*A. acuta*, mais bien distincte de l'*acuta* Desh., par sa spire plus longue, plus évidée et son sommet plus aigu. Cuise-Lamotte (Oise).

\***264. sinuosa**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. spirata*, mais plus petite et remarquable par le sinus du bord columellaire près de l'ombilic. France, Cuise-Lamotte.

\***265. paludiniiformis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme de la précédente, mais sans échancrure au labre columellaire; ses tours sont légèrement striés en long. Cuise-Lamotte.

**266. Suessoniensis**, *N. spirata*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 173, pl. 21, fig. 1, 2 (non Sow., 1821). France, Retheuil, Cuise-Lamotte, Pierrefonds (Oise), Vicentin, Ronca.

\***267. cochlearia**, Desh., 1838, *Ampullaria cochlearia*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 58, pl. 2, fig. 20. Castelgomberto, Ronca.

\***268. obesa**, Desh., 1838, *Ampullaria obesa*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 58, pl. 2, fig. 19. Castelgomberto.

**SIGARETTUS**, Adanson, 1757.

\***269. Levesquei**, Recluz. Chenu, Illustr. Conch., pl. 1, fig. 10. Cuise-Lamotte (Oise).

**NERITA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 214.

\***270. Schemidelliana**, Chemnitz, 1786, t. 9, p. 180, pl. 114, fig. 975, 976. *Nerita perversa*, Gmelin, 1789. *Neritina conoides*, Lam., 1802, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 149, pl. 18. Brong., Vicentin, pl. 2, fig. 22; Hacquet, pl. 2, fig. 12. *Neritina grandis*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc., 5, p. 228, pl. 24, fig. 9. France, Retheuil, Cuise-Lamotte, Croutoy, Hondainville, Pierrefonds (Oise), Soissonnais (Aisne), Ville-neuve-les-Chaudins (Aude), Vicentin, Ronca; Tyrol, bassin de Trente; Indes, prov. de Cutch, Wagé-Ké-Pudda.

\***271. Zonaria**, d'Orb., 1847. *Neritina zonaria*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 156, pl. 25, fig. 1, 2. Retheuil, Cuise-Lamotte, Gilcourt Creil (Oise), Couisa (Aude).

\***272. Acherontis**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 60, pl. 2, fig. 13. Ronca.

**273. Caronis**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 59, pl. 2, fig. 14. Castelgomberto, Ronca.

**PHOBUS**, Montfort, 1810.

**275. cumulans**, d'Orb., 1847. *Trochus cumulans*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 57, pl. 4, fig. 1. Castelgomberto.

\***276. Gravesianus**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *Pariensis*, dont il se distingue par les stries fines longitudinales dans le sens de l'enroulement qu'on remarque en dessous. Cuise-Lamotte.

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.

**277. uniaangularis**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 238, pl. 29, fig. 19-22; pl. 30, fig. 6-9. Retheuil, Verbois (Oise), Soissons, Laon (Aisne).

**278. Cerberi**, d'Orb., 1847. *Monodonta Cerberi*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 53, pl. 2, fig. 5. Ronca.

\***279. Lucastianus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 55, pl. 2, fig. 6. Castelgomberto, Ronca.

\***280. Bosclianus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 56, pl. 2, fig. 11. Castelgomberto.



- \***281. Cetus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. uniangularis*, mais plus élevée, ornée de six côtes longitudinales à peine marquées. Couiza (Aude).
- \***282. Triton**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente par la forme, mais avec les tours évidés sur la moitié de leur largeur. Coniza (Aude).
- SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.
- 283. subgranulatum**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 54, pl. 5, fig. 8-11 (non Lamarck, 1822). France, Laon.
- 284. raristriatum**, d'Orb., 1847. *Turbo id.*, Melleville, 1843, id., p. 56, pl. 5, fig. 16-19. Laon.
- \***285. bistriatum**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 215, pl. 25, fig. 19, 20. Retheuil, Cuise-Lamotte, Laon, Vicentin, Ronca.
- 286. simplex**, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 363, pl. 16, fig. 7. Montagne-Noire, Conques, Montolieu (Aude).
- 287. umbrosum**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 57, pl. 2, fig. 12. Ronca.
- \***287'. Castellanensis**, d'Orb., 1847. Charmante espèce très-comprimée, pourvue, sur la carène, de trois côtes granuleuses. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).
- BIFRONTIA**, Deshayes, 1824. *Deshayesii*, Michaud, 1835, Galerie de Douai, p. 325, pl. 29, fig. 20-21. Melleville, p. 54, pl. 5, fig. 12-15. Mons-en-Laonnois, Laon, Bièvre.
- \***288. Laudinensis**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 226, pl. 26, fig. 15, 16. Retheuil, Cuise-Lamotte, Tiverny, Creil (Oise), Soissons, Laon (Aisne).
- DELPHINULA**, Lamarck. Voy. t. 1, p. 191.
- \***289. submarginata**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *D. marginata*, mais s'en distinguant par le manque de stries longitudinales, par son ombilic plus large. Cuise-Lamotte (Oise).
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.
- 290. Asmodei**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 53, pl. 2, fig. 3. Val Sangonini.
- 291. Scobina**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 53, pl. 2, fig. 7. Castelgomberto; Ronca.
- ELIQUARIA**, Bruguière, 1791.
- 292. spinosa**, Lam., Anim. s. vert., n. 5, p. 585. Cuise-Lamotte, Chaumont (Oise).
- PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. t. 1, p. 7.
- \***293. Peresii**, d'Orb., 1847. Belle espèce aussi grande, mais plus surbaissée que le *P. concava*, à tours munis de deux angles striés en long. Nice, le Jarrier.
- CYPRÆA**, Linné.
- 294. acuminata**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 74, pl. 10, fig. 14, 15. Laon, Mons-en-Laonnois, Cuise-Lamotte (Oise).
- 295. exserta**, Desh., n. 5, pl. 94 bis, fig. 35-37. Cuise-Lamotte (Oise).
- 296. Levesquei**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 722, pl. 94 bis, fig. 33, 34. Retheuil, le Soissonnais, Cuise-Lamotte, Vicentin, Ronca.
- OVULA**, Bruguière, 1791.

**297. tuberculosa**, Duclos, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 717, pl. 96, fig. 16; pl. 97, fig. 17. Retheuil, Cuise-Lamotte, Pierrefonds (Oise).

**298. depressa**, d'Orb., 1847. *Cypræa depressa*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 329, pl. 24, fig. 12. Indes, Prov. de Cutch. Baboahill.

**MARGINELLA**, Lamarck, 1801.

**299. Phæcolus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 64, pl. 2, fig. 21. Ronca.

**ANCILLARIA**, Lamarck, 1801.

**\*300. subulata**, Lam. *Ancill. buccinoides*, Desh., pl. 97, fig. 12, 14. Trosly-Breuil, Creil, Pont-Saint-Maxence (Oise), Cuise-Lamotte.

**\*301. canalifera**, Lam., Desh., n. 5, pl. 96, fig. 14, 15. Cuise-Lamotte (Oise).

**OLIVA**, Lamarck, 1801.

**\*302. mucronata**, d'Orb., 1847. Espèce infiniment plus allongée que toutes les autres olives du bassin parisien. Cuise-Lamotte.

**TREBELLUM**, Lamarck, 1801.

**303. Braunii**, d'Orb., 1847. *Terebellopsis Braunii*, Laym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 365, pl. 16, fig. 8. Montolieu, Conques, Villegalhène (Aude).

**\*304. fusiforme**, Lam., Desh., n. 2, pl. 95, fig. 30, 31. Cuise-Lamotte (Oise).

**305. Carcassense**, Leymerie, 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 365, pl. 16, fig. 9 a, b. Au nord de Carcassonne, Montagne-Noire (Aude).

**306. obvolutum**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 62, pl. 2, fig. 15. Ronca.

**\*307. Brongniartianum**, d'Orb., 1847. Espèce voisine, par ses tours embrassants, du *T. convolutum*, mais bien plus acuminée et plus longue en arrière. Vicentin, Ronca.

**CONUS**, Linné, 1758.

**308. bicoronatus**, Mellev., Sabl. tert., p. 75, pl. 10, fig. 12, 13. Cuise-Lamotte (Oise), Laon (Aisne).

**\*309. Brongniartii**, d'Orb., 1847. *Conus deperditus*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 61, pl. 3, fig. 1 (non Lam.). Ronca.

**310. Alsiosus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 61, pl. 3, fig. 2. Ronca.

**VOLUTA**, Linné, 1758. Voy. p. 154.

**311. multistriata**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 705, pl. 95, fig. 1, 2. Retheuil, Cuise-Lamotte.

**\*312. angusta**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 697, pl. 94, fig. 5, 6. Rétheuil, Cuise-Lamotte, Soissons.

**313. ambigua**, Lamk., Ann. du Mus., t. 17, p. 77, n. 12. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 691, pl. 93, fig. 10, 11. Sow., pl. 399, fig. 1. France, Retheuil, Cuise-Lamotte, le Vit, près de Castellane (Basses-Alpes), Coaiza (Aude), Ronca, Vicentin.

**314. trisulcata**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 690, pl. 94, fig. 10, 11. Laon, Soissons, Gilocourt, Pont-St-Maxence (Oise).

**\*315. plicatella**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 700, pl. 94, fig. 19, 20. Retheuil, Cuise-Lamotte.

- 316.** *subspinea*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 64, pl. 3, fig. 5. Ronca.
- \***317.** *pseudo-lyra*, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec la *V. lyra*, dont elle se distingue par de forts sillons transverses partout. Cuise-Lamotte.
- CANCELLARIA**, Lamarck, 1801.
- \***318.** *crenulata*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 501, pl. 79, fig. 31-33. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- 319.** *Maglorii*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 66, pl. 9, fig. 1-3. Mons-en-Laonnois.
- \***320.** *subevulsa*, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *C. evulsa*, mais ayant des côtes plus fines où les côtes transverses dominant. Cuise-Lamotte.
- NITRA**, Lamarck, 1801.
- \***321.** *torebelloides*, d'Orb., 1847. Espèce voisine et confondue avec le *M. torebellum*, mais très-distincte de celle-ci par ses fortes stries transverses au dernier tour et à la partie inférieure des tours. Cuise-Lamotte.
- ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801.
- 322.** *laevigata*, Melleville, 1843, Annales des Sc. géol., p. 71, pl. 10, fig. 10-11. Laon.
- \***323.** *Assarella*, Lam., Desh., n° 3, pl. 83, fig. 2-4. Cuise-Lamotte, Trosly-Breuil (Oise), le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).
- OMPHOPUS**, Phillipi, 1837.
- \***324.** *pescarbonis*, d'Orb., 1847. *Rostellaria pescarbonis*, Brongn., 1823, Vicentin, p. 75, pl. 4, fig. 2. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes), Vicentin, Ronca.
- STROMBUS**, Linné, 1758. Voy. p. 132.
- \***325.** *fortis*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 73, pl. 4, fig. 7. Ronca.
- PTEROCERA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 231.
- 326.** *radix*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 74, pl. 4, fig. 9. Castलगomberto.
- FLEUROTOMA**, Lamarck, 1801.
- \***327.** *cancellata*, Desh., n° 42, pl. 66, fig. 8-10. Abbecourt, Cuise-Lamotte (Oise).
- 328.** *striolaris*, Desh., n° 54, pl. 68, fig. 4, 5. Cuise-Lamotte.
- 329.** *tenuistriata*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 462, pl. 63, fig. 17-19. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- \***330.** *Lajonkairii*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 467, pl. 65, fig. 18-20. Retheuil, Cuise-Lamotte, Soissons, le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).
- 331.** *subelegans*, d'Orb., 1847. *P. elegans*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 62, pl. 8, fig. 1, 2 (non Schl., 1820). Mons-en-Laonnais (Aisne), Cuise-Lamotte (Oise).
- 332.** *tenuiplicata*, Melleville, 1843, id., p. 63, pl. 8, fig. 3-5. Laon (Aisne), Cuise-Lamotte, Monenval (Oise).
- 333.** *subaffinis*, d'Orb., 1847. *P. affinis*, Melleville, 1843, id., p. 63, pl. 8, fig. 6-8 (non Risso, 1826). Laon.
- 334.** *sublaevigata*, d'Orb., 1847. *P. laevigata*, Melleville, 1843, id., p. 63, pl. 8, fig. 9-11 (non Sow., 1823). Laon.

- 335. seminuda**, Melleville, 1843, id., p. 64, pl. 8, fig. 12-14. Laon.
- 336. alifer**, Melleville, 1843, id., p. 64, pl. 8, fig. 15-17. Laon (Aisne), Pont-Ste-Maxence (Oise).
- 337. pseudo-spirata**, d'Orb., 1847. *P. spirata*, Melleville, 1843, id., p. 65, pl. 8, fig. 18-20 (non Lam., 1822). Laon.
- 338. monilifer**, Melleville, 1843, id., p. 65, pl. 8, fig. 21-23. Laon, Cuise-Lamotte, Creil.
- 339. subgranulosa**, d'Orb., 1847. *P. granulosa*, Melleville, 1843, id., p. 66, pl. 8, fig. 24-26 (non Sow., 1833). Laon, Cuise-Lamotte.
- \*340. subattenuata**, d'Orb., 1847. *P. attenuata*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 483, pl. 68, fig. 6-8 (non Sow., 1816). Retheuil, Cuise-Lamotte, Creil.
- \*341. elongata**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 484, pl. 68, fig. 4, 5, 9. Retheuil.
- 342. pseudo-colon**, d'Orb., 1847. *P. colon*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 492, pl. 66, fig. 4-7 (non Sowerby). Le Soissonnais, Cuise-Lamotte.
- FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.
- 343. angusticostatus**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 67, pl. 9, fig. 9, 10. Mons-en-Laonnais, Laon.
- \*344. subaffinis**, d'Orb., 1847. *F. affinis*, Melleville, 1843, id., p. 68, pl. 9, fig. 13, 14 (non Bronn, 1837). Laon, Cuise-Lamotte.
- 345. costarius**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 532, pl. 73, fig. 8, 9. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- 346. simplex**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 533, pl. 76, fig. 5, 6. Cuise-Lamotte, Retheuil.
- \*347. subficulneus**, d'Orb., 1847. *F. ficulneus*, Desh., n° 55, pl. 73, fig. 23, 24 (non Lam., non fig. 25, 26). Cuise-Lamotte, Martimont (Oise).
- \*348. longævus**, Lam., Desh., n° 10, pl. 74, fig. 18-21. Bracheux, Cuise-Lamotte, Creil (Oise), Couiza (Aude).
- 349. costellifer**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 558, pl. 76, fig. 27, 28. Retheuil, Cuise-Lamotte, les Essarts.
- 350. regularis**, Sow., Min. Conch., pl. 187, fig. 2; Desh., 1824, Paris, 2, p. 559, pl. 76, fig. 35, 36. Retheuil, Cuise-Lamotte, Soissons; Barton, Angleterre.
- \*351. sulcatus**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 553, pl. 76, fig. 1, 2. Soissons, Retheuil, Cuise-Lamotte.
- \*352. semi-plicatus**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 554, pl. 76, fig. 37, 38; pl. 78, fig. 1, 2. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- 353. angustus**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 543, pl. 76, fig. 30, 31. Envir. de Soissons.
- 354. unicarinatus**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 515, pl. 72, fig. 11, 12. Retheuil, Soissons, Cuise-Lamotte.
- \*355. subscalarinus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *F. scalarinus*, mais à côtes plus rapprochées, à stries transverses régulières. France, Cuise-Lamotte.
- \*356. exiguus**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 546, pl. 76, fig. 16-18. Retheuil, Cuise-Lamotte.

- 357. subfusiformis**, d'Orb., 1847. *Cerithium fusiforme*, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 354, pl. 16, fig. 11 (non Schum., 1817). Albas (Aude).
- 358. Sowerbyi**, d'Orb., 1847. *Fusus bulbiformis*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 329, pl. 24, fig. 11 (non Lam.). Indes, prov. de Cutch, Wagé-Ké-Pudda.
- \*359. polygonatus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 73, pl. 4, fig. 4. Ronca.
- 360. Noe**, Lam., Ann. du Mus., n° 2, t. 6, pl. 4, fig. 2; Brongniart, 1823, Vicentin, p. 72. Ronca, Nice, Montagne du Jarrier.
- \*361. Roncanus**, d'Orb., 1847. *Fusus subcarinatus*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 73, pl. 6, fig. 1 (non Lamarck). Les échantillons que nous avons vus sont toujours plus allongés. Vicentin, Ronca.
- \*362. Brongniartianus**, d'Orb., 1847. *Fusus polygonus*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 73, pl. 4, fig. 3 b (exclus. fig. a) (non Lamarck). Vicentin, Ronca.
- FASCIOLARIA**, Lamarck, 1801.
- \*363. Levesquei**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *F. uniplicata*, dont elle se distingue par sa forme plus allongée, à stries transverses infiniment plus fortes. Cuise-Lamotte.
- FYRULA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.
- \*364. tricostata**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 584, pl. 79, fig. 10, 11. Retheuil, Cuise-Lamotte, Longmont.
- MUREX**, Linné, 1758.
- 365. foliaceus**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 70, pl. 10, fig. 6, 7. Mons-en-Laonnais.
- \*366. reticulosus**, Lam., Anim. s. vert., 7, p. 575; Desh., pl. 81, fig. 19-21. Cuise-Lamotte.
- 367. plicatilis**, Desh., 1824, Envir. de Paris, 2, p. 588, pl. 81, fig. 16-18 (exclus. 19-21). France, Retheuil, Cuise-Lamotte.
- TRITON**, Montfort, 1810.
- \*368. Lejeunii**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 70, pl. 10, fig. 6, 7. Mons-en-Laonnais (Aisne), Cuise-Lamotte.
- 369. angustum**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 609, pl. 91, fig. 7-9. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.
- 370. tenuistriatum**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 57, pl. 7, fig. 4, 5. France, Laon, Mons-en-Laonnais.
- 371. cancellaroides**, Melleville, Ann., p. 58, pl. 7, fig. 6, 7. Laon, Cuise-Lamotte.
- 372. heteroclitum**, Melleville, 1843, Ann., p. 58, pl. 7, fig. 9-11. Laon, St-Vaast de Longmont.
- 373. canaliculatum**, Melleville, 1843, Ann., p. 59, pl. 7, fig. 14, 15. Chavailles, près de Martigny.
- 374. subobtusum**, d'Orb. 1847. *C. obtusum*, Melleville, 1843, Ann. p. 60, pl. 7, fig. 16-19 (non Lam., 1822). Laon.
- 375. regulare**, Melleville, 1843, Ann., p. 60, pl. 7, fig. 20-23. Laon (Aisne), Trosly-Breuil (Oise).
- 376. gibbosulum**, Melleville, 1843, Ann., p. 60, pl. 7, fig. 24-26. Laon, Cuise-Lamotte.

- 377. curvicostatum**, Desh., n° 11, pl. 50, fig. 4, 5. Cuise-Lamotte.
- 378. detritum**, Desh., n° 30, pl. 43, fig. 5-8. Cuise-Lamotte.
- 379. subterebrale**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de *C. teres*, mais plus allongée et à tours de spire plus convexes. Cuise-Lamotte.
- 380. papale**, Desh., n° 33, pl. 43, fig. 11-13. Cuise-Lamotte, Gilocourt, Trosly-Breuil (Oise).
- 381. plicatulum**, Lam., n° 61, pl. 54, fig. 1, 2-7, 8. Cuise-Lamotte.
- 382. pyramidatum**, Desh., n° 71, pl. 57, fig. 7. Retheuil, Cuise-Lamotte (Oise).
- 383. resectum**, Desh., n° 137, pl. 61, fig. 23, 24. Cuise-Lamotte, Orrouy (Oise).
- 384. alternans**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 329, pl. 50, fig. 2, 3. Cuise-Lamotte.
- 385. subacutum**, Desh., n° 56, pl. 43, fig. 1-4 (non Sow., 1822). Orvilliers, Cuise-Lamotte, Pierrefonds, Battigny, Attichy (Oise).
- 386. breviculum**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 435, pl. 61, fig. 9-12. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- 387. biserialis**, Desh., n° 51, pl. 52, fig. 6-7. Cuise-Lamotte, Battigny, St.-Pierre-en-Chartres, Pierrefonds (Oise).
- 388. clathratum**, Desh., n° 59, pl. 53, fig. 23-25. Cuise-Lamotte, Pont-Ste-Maxence, St-Vaast-de-Longmont (Oise).
- 389. involutum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 348; Desh., 1824, Paris, 2, p. 328, pl. 51, fig. 10-13. *C. Gradatum*, Deshayes, pl. 43, fig. 9, 10. Cuise-Lamotte.
- 390. obliquatum**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 318, pl. 51, fig. 7, 17, 18. Soissonnais.
- 391. mitreola**, Desh., n° 14, pl. 48, fig. 21-23. Cuise-Lamotte, Pierrefonds, Mareuil-sur-Ourcq (Oise).
- 392. pyreniforme**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 366, pl. 43, fig. 14-15. Retheuil.
- 393. Suzanna**, d'Orb., 1847. *C. Spinorum*, Desh., n° 73, pl. 54, fig. 27-28 (non *Pyrena*, id., Lam.). Cuise-Lamotte, Henouvill (Oise).
- 394. stephanophorum**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 352, pl. 53, fig. 1, 2, 7. Retheuil, Cuise-Lamotte.
- 395. pseudo-ventricosum**, d'Orb., 1847. *C. ventricosum*, Desh., n° 131, pl. 58, fig. 27-30 (non Gmelin (Trochus), Cuise-Lamotte, Retheuil (Oise)).
- 396. combustum**, Brongniart, 1823, Vicentin; pl. 3, fig. 17. *Melanopsis*.
- 396'. Dufrenoyi**, Deshayes, 1830, Paris, 2, p. 120, pl. 12, fig. 3, 4. Vicentin, Ronca, env. de Soissons (Aisne), Cuise-Lamotte (Oise).
- 397. Cuvieri**, d'Orb., 1847. *Melania Cuvieri*, Desh., n° 1, pl. 12, fig. 1-2. Cuise-Lamotte, Chaumont (Oise).
- 398. subclavus**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec de *C. Clavus*, mais plus allongée, à tours de spire plus étroits, etc. Cuise-Lamotte.
- 399. subquadrilucatum**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec

- la *C. quadrisulcatum*, mais plus étroite, plus longue; à tours légèrement saillants en avant. Cuise-Lamotte.
400. *subpyrenaicum*, Leym., 1846. Mém. Soc. géol. de France, tome 1<sup>er</sup> p. 365, pl. 16, fig. 10. Veraza (Aude).
401. *Venel*, Leymerie, 1846, id., p. 365, pl. 16, fig. 14. Albas (Aude).
402. *Albasiense*, Leym., 1846, id., p. 364, pl. 16, fig. 12. Albas.
403. *Deshayesianum*, Leym., 1846, id., p. 364, pl. 16, fig. 6. Albas, Couiza.
404. *athleta*, d'Orb., 1847. *C. giganteum*? Leym., 1846, id., p. 367, pl. 16, fig. 2 (non Lamarck). Elle manque de plis sur la columelle. Montagne Noire.
405. *sublamellosum*, d'Arch., 1846, Mém. de la Société géol. 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 215, pl. 9, fig. 8. Basses-Pyrénées, Port-des-Basques.
406. *baccatum*, Brongn., 1823, pl. 3, fig. 22? d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 216. Basses-Pyrénées, Port-des-Basques, Vicentin, Ronca.
407. *calcaratum*, Brongniart, 1823. Vicentin, p. 69, pl. 3, fig. 15. Ronca.
408. *bicalcaratum*, Brongniart, 1823. Vicentin, p. 69, pl. 3, fig. 16. Ronca.
409. *vulcanicum*, d'Orb., 1847. *Muricites vulcanicus*, Schloth., 1821, Petref., p. 148, n<sup>o</sup> 23. *C. Castellini*, Brongniart, 1823. Vicentin, p. 69, pl. 3, fig. 20. *C. Gestini*, Deshayes 1830, Paris, pl. 43, fig. 17, 18. *C. polygonum*, Leym., 1846, pl. 16, fig. 13. Vicentin, Ronca, France, Cuise-Lamotte, Retheuil (Oise), Couiza, Albas (Aude).
410. *Maraschini*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 70, pl. 3, fig. 19; Fortis, Ronca, pl. 1, fig. 10, 11. (Il n'a jamais que cinq angles, vérifiés sur un grand nombre d'individus; ce n'est point l'*Esagonum*.) Vicentin, Ronca.
411. *corrugatum*, Brongniart, 1823, id., p. 70, pl. 3, fig. 25. Ronca.
412. *corvinum*? Catullo. *Pterocera corvina*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 74, pl. 4, fig. 8. Vicentin, Ronca.
413. *roncanum*, d'Orb., 1847, *C. sulcatum* (var. *Roncanum*, non Bruguière, 1789). Ronca.
414. *multisulcatum*, Brongniart, 1823, id., p. 68, pl. 3, fig. 14. Ronca.
415. *undosum*, Brongniart, 1823, id., p. 68, pl. 3, fig. 12. Ronca.
416. *lemniscatum*, Brongniart, 1823, id., p. 71, pl. 3, fig. 24; Fortis, Ronca, pl. 1, fig. 16. Vicentin, Ronca.
417. *Vulcani*, d'Orb., 1847. *Terebra Vulcani*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 67, pl. 3, fig. 11. Vicentin, Ronca.
418. *ampullosum*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 71, pl. 3, fig. 18. Vicentin, Castel-Gomberto.
419. *stroppus*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 71, pl. 3, fig. 21. Vicentin, Castel-Gomberto.
- SUCOINUM**, Linné, 1758. Voy. p. 134.

- \***420. stromboides**, Lam., Desh., n. 2, pl. 86, fig. 8-10. St-Félix, Cuise-Lamotte (Oise).
- 421. subambiguum**, d'Orb., 1847. *B. ambiguum*, Desh., 1824, n. 9, pl. 87, fig. 11-14 (non Montagu, 1803). Cuise-Lamotte.
- SULCOBUCCINUM**, d'Orb., 1847. Voy. p. 303.
- 422. obtusum**, d'Orb., 1847. *Buccinum obtusum*, Desh., n. 14, pl. 88, fig. 1-2. Cuise-Lamotte, Chaumont (Oise).
- NASSA** (Klein), Lamarck, 1801.
- 423. caronis**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 64, pl. 3, fig. 10, Borson, Oritt. piem., pl. 1, fig. 12. Vicentin, Ronca.
- TEREBRA**, Lamarck, 1801.
- \***424. Nereis**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *T. plicatula*, mais plus petite, toujours munie de côtes plus rapprochées et plus aiguës; plis de la columelle plus marqués. Cuise-Lamotte.
- CASSIS**, Bruguière, 1791.
- 425. Thesei**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 66, pl. 3, fig. 7. Ronca.
- 426. Æneæ**, Brongniart, 1823, Vicentin, page 66, pl. 3, fig. 8. Ronca.
- MORIO**, Montfort 1810. *Cassidaria*, Lamarck, 1811.
- 427. substriatus**, d'Orb., 1847. *Cassis striata*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 66, pl. 3, fig. 9 (non Sowerby). Ronca.
- INFUNDIBULUM**, Montfort, 1810. Voy. p. 232.
- \***428. Suessoniensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'*I. trochiformis*, mais sans pointes extérieures, la surface étant finement striée dans le sens de l'enroulement et en travers des lignes d'accroissement. Cuise-Lamotte.
- CAPULUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 31.
- 429. lævigatus**, d'Orb., 1847; *Pileopsis id.*, Melleville, 1843, Annal. des sc. géol. p. 45, pl. 5, fig. 1-3. Fleury-la-Rivière (Marne).
- FISSURELLA**, Bruguière, 1791.
- 430. Minosti**, Melleville, 1843, Annal. des sc. géol., p. 44, pl. 9, fig. 15, 16. Monampeuil.
- DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 73.
- 431. subentalis**, d'Orb. 1847. *D. entalis*, Lam., Desh., Monogr., n. 18, pl. 1, fig. 7. Cuise-Lamotte, Varinfroy (Oise).
- \***432. abbreviatum**, Desh., Monogr., n. 6, pl. 4, fig. 21-22. Cuise-Lamotte, Hautefontaine, Verneuil, Creil (Oise).
- \***433. Castellanensis**, d'Orb., 1847. Grande espèce à côtes inégales, granuleuses. Le Vit, près de Castellanne (B.-Alpes), Bidart (Basses-Pyrénées).
- UMBRELLA**, Lamarck, 1819.
- 434. Laudunensis**, Melleville, 1843, Ann. des sc. géol., p. 44, pl. 6, fig. 3, 4. Laon.
- BULLA**, Linné, 1758.
- 435. semistriata**, Desh., n. 12, pl. 5, fig. 27-28. Soissons, Neuilly-sous-Clermont, Creil, St-Waast-de-Longmont (Oise).
- SCAPHANDER**, Montfort, 1810.



- 436. conica**, d'Orb., 1847. *Bulla conica*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 45, pl. 8, fig. 1, 2, 3. Soissons.
- \*437. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *Bulla lignaria*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 44, pl. 5, fig. 4, 5, 6 (non Linné. Les stries sont bien plus fines). Soissons, Cuise-Lamotte.
- \*438. Fortisii**, d'Orb., 1847. *Bulla Fortisii*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 52, pl. 2, fig. 1; Fortis, Della vall. di Ronca, pl. 1, fig. 3. Ronca.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**PHOLAS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.

**439. Orbignyana**, Levesq., Sabl. glaucon. moy. Belle espèce, remarquable. (Nous ne pouvons la caractériser, ne l'ayant pas sous les yeux.) Cuise-Lamotte (Oise).

**TEREDO**, Linné. Voy. 1, p. 251.

**\*440. Tarbelliana**, d'Orb., 1847. *Septaria tarbelliana*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, p. 207, pl. 8, fig. 11. Basses-Pyrénées, Biaritz.

**\*441. Tournali**, Leymerie, 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 360, pl. 14, fig. 1, 2, 3, 4. France, Paris, Corbières (Aude), Biaritz (Basses-Pyrénées).

**TEREDINA**, Lamarck, 1806.

**\*442. personata**, Lam., 1806, Desh., n. 1, pl. 1, fig. 23-26. *Teredo antenautæ*, Sow., M. Conch., pl. 102, fig. 3. Cuise-Lamotte (Oise), Cuise (Marne).

**PANOPŒA**, Menard, 1807. Voy. t. 1, p. 164.

**\*443. Pyrenaica**, d'Orb., 1847. *P. elongata*, Leymerie, 1846, Mém. de la Soc. géol., t. 1, p. 360, pl. 14, fig. 8 (non Römer, 1836). Cous-touge et Foujoncouse.

**\*444. Castellansensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. intermedia*, mais moins longue et surtout beaucoup plus couverte de grosses côtes concentriques. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).

**PHOLADOMYA**, Sowerby. Voy. t. 1, p. 13.

**\*445. Puschii**, Goldf., pl. 158, fig. 3; d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 208. France, Basses-Pyrénées, Biaritz.

**446. Mellevillei**, d'Orb., 1847. *P. margaritacea*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 31, pl. 1 fig. 1, 2 (non Sow.). Laon.

**SOLECURTUS**, Blainville, 1824. Voy. p. 75.

**447. pudicus**, d'Orb., 1847. *Psammobia pudica*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 82, pl. 5, fig. 9. Val-Sangonini.

**448. cyclopeus**, d'Orb., 1847. *Venericardea cyclopea*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 82, pl. 5, fig. 12 a (Exclusif, b, c, d, e). Ronca.

**449. elongatus**, d'Orb., 1848. *Lutraria elongata*, Michelotti, M. S. Magnifique espèce allongée, pourvue d'un sillon longitudinal sur la région cardinale. Vicentin Ronca (Michelotti).

**CRASSATELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 77.

**MACTRA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 216.

\*450. *Levesquei*, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *M. semisulcata*, mais plus courte et plus triangulaire. Cuise-Lamotte.

**AROOPAGIA**, Brown. Voy. p. 75.

\*451. *Levesquei*, d'Orb., 1847. Espèce donnée sous le nom de *T. subrotundata*, mais presque lisse et beaucoup plus ovale. Cuise-Lamotte.

\*452. *Lamottensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais plus longue et presque sans dents latérales. Cuise-Lamotte.

**TELLINA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 275.

\*453. *pseudorostralis*, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *T. rostralis*, dont elle diffère par une forme plus allongée, plus étroit et plus longue sur la région anale. Cuise-Lamotte.

\*454. *Culaensis*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. tenuistriis*, mais sans sinus à la région anale. Cuise-Lamotte.

\*455. *Oceani*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *T. lunulata*, mais formant un triangle plus régulier. Cuise-Lamotte.

**DONAX**, Linné, 1758.

\*456. *Levesquei*, d'Orb., 1847. Belle espèce ornée de stries concentriques sur la région anale, de stries rayonnantes sur la région palléale. Cuise-Lamotte.

**VENUS**, Linné, 1758. Voy. p. 15.

\*457. *Custugensis*, d'Orb., 1847. *Cytherea custugensis*, Leymerie, 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 361, pl. 16, fig. 1. Coustouge, St-Laurent (Aude).

\*458. *Babica*, Leym., 1846, id., p. 361, pl. 15, fig. 3. Coustouge, les bords du Rabe, près St-Laurent (Aude).

\*459. *Rubiensis*, Leym., 1846, id., p. 361, pl. 15, fig. 6. Roubia, canal du Midi (Aude).

\*460. *subpyrenaica*, Leym., 1846, id., p. 361, pl. 15, fig. 5. Roubia, Corbières (Aude).

\*461. *Verneuilli*, d'Orb., 1847. *Cytherea Verneuilli*, d'Arch., 1844, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 208, pl. 7, fig. 19. Cuise-Lamotte (Oise), Basses-Pyrénées, Rochers de la Chambre-d'Amour.

\*462. *Maura*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 81, pl. 5, fig. 11. Vicentin, Ronca.

\*463. *subtransversa*, d'Orb., 1847. *Venus transversa*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 208 (non Sowerby. Elle est plus tronquée sur la région anale). Basses-Pyrénées, Rochers de la Chambre-d'Amour, Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes), Couiza (Aude).

\*464. *oblonga*, d'Orb., 1847. *Cypricardia*, id., Deshayes. Voy. étage parisien, n. 841. Cuise-Lamotte.

\*465. *Aglauræ*, d'Orb., 1847. *Corbis aglauræ*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 80, pl. 5, fig. 5. Castel-Gomberto.

**CYCLAS**, Bruguière, 1791. Voy. p. 60.

\*466. *pisum*, d'Orb., 1849. *Cyrena pisum*, Desh., n. 4, pl. 49, fig. 10-13. Cuise-Lamotte, Pont-Ste-Maxence, Neuilly-s-Clermout (Oise).

- \***467. Gravesii**, d'Orb., 1847. *Cyrena Gravesii*, Desh., n. 6, pl. 19, fig. 3, 4. Cuise-Lamotte, Pierrefonds, Gilocourt (Oise).
- 468. erebea**, d'Orb., 1847. *Mactra erebea*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 81, pl. 5, fig. 8. Vicentin, Ronca.
- \***469. Sirena**, d'Orb., 1847. *Mactra Sirena*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 81, pl. 5, fig. 10. Ronca.
- 470. Proserpina**, d'Orb., 1847. *Venus Proserpina*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 81, pl. 5, fig. 7. Ronca.
- SPHENIA**, Turton.
- 471. Victoria**, d'Orb., 1847. *Corbula*, id., Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., pl. 1, fig. 8-10. Laon, Cuise-Lamotte.
- \***472. minima**, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, 2<sup>e</sup> part., t. 1, p. 360, pl. 14, fig. 9, 10. Les Corbières (Aude).
- 473. scutellaria**, Desh., Leym., id., p. 360, pl. 14, fig. 11. France, Couiza (Aude).
- \***474. securis**, Leym., 1846, id., p. 360, pl. 14, fig. 12. Coustouge, Lagrasse.
- \***475. Pyrenaica**, d'Orb., Paléont. franç., terr. crét., 3, p. 78, pl. 265, fig. 6, 7. France, Saint-Martory.
- \***476. rhomboides**, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 208, pl. 7, fig. 9. Basses-Pyrénées, Biaritz, Vicentin, Ronca.
- \***477. Michelottii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. tumida*, mais infiniment plus longue, plus anguleuse et plus comprimée. Vicentin, Ronca.
- 478. ponderosa**, Nyst., 1843. *C. tumida*, Lam., Desh., n. 1, pl. 3, fig. 10, 11. Vicentin, Ronca.
- \***479. subtumida**, d'Orb., 1847. Petite espèce rapportée à tort au *C. tumida*, mais bien distincte par sa taille, par le manque des côtes concentriques du jeune âge, etc. Cuise-Lamotte.
- 480. trigonata**, Lam., Desh., n. 5, pl. 13, fig. 4, 5. Cuise-Lamotte.
- CARDITA**, Bruguière, 1789. Voy. p. 77.
- \***481. decussata**, d'Orb., 1847. *Venericardia decussata*, Lam., Desh., n. 14, pl. 26, fig. 7, 8. Cuise-Lamotte (Oise).
- \***483. subminuta**, d'Orb., 1847. *Venericardia minuta*, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 362, pl. 15, fig. 4 (non Phillips, 1844). Couiza, Esperaza, Coustouge, Albas (Aude).
- \***484. trigona**, d'Orb., 1847. *Venericardia trigona*, Leym., 1846, id., p. 362, pl. 15, fig. 8. Bords du Rabe, entre St-Laurent et Coustouge (Aude).
- \***485. vicinalis**, d'Orb., 1847. *Venericardia vicinalis*, Leym., 1846, id., p. 362, pl. 15, fig. 9. St-Laurent.
- 486. Arduini**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 79, pl. 5, fig. 2. Sangonini.
- 487. Lauræ**, d'Orb., 1847. *Venericardia Lauræ*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 80, pl. 5, fig. 3. Sangonini.
- \***488. Astieri**, d'Orb., 1847. Belle espèce voisine du *C. acuticostata*, mais plus courte, presque ronde, ornée de dix-huit côtes crénelées. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).

\*489. *planicosta*, Desh., n. 1, pl. 24, fig. 1-3. Cuise-Lamotte (Oise).

\*490. *Alpina*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. acuticostata*, mais bien plus longue, et un peu carrée, ornée de vingt-deux côtes crénelées. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).

**LUCINA**, Bruguière, 1791.

\*491. *squamula*, Desh., n. 23, pl. 17, fig. 17, 18. Cuise-Lamotte, Autreval, Gypseuil (Oise), Soissonnais.

\*492. *concava*, Defr., Desh., n. 21, pl. 17, fig. 8, 9. Cuise-Lamotte, Pierrefonds, Trosly, Vaudremont (Oise).

\*493. *argus*, Melleville, 1843. Ann. des Sc. géol., p. 33, pl. 6, fig. 1, 2. Laon, Cuise-Lamotte.

\*494. *Coquandiana*, d'Orb., 1843. Paléont. franç., terr. crét., 3, p. 121, pl. 282. *L. corbarica*, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, 2<sup>e</sup> part., t. 1, p. 361, pl. 14, fig. 5. Coustouge, Montolieu, Conques, Villeneuve-les-Châfnes, Montagne-Noire, Couiza (Aude), vallée du Verdon.

\*495. *Leymeryi*, d'Orb., 1847. *L. corbarica*, *quadrata*, Leym., 1846, id., p. 361, pl. 14, fig. 6. Montolieu, Villeneuve, Conques (Aude).

\*496. *sulcosa*, Leym., 1846, id., p. 361, pl. 14, fig. 13 et 14. Corbières.

\*497. *scopulorum*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 79 (non figuré). Ronca.

\*498. *subdivaricata*, d'Orb., 1848. Espèce confondue avec le *L. divaricata*, mais s'en distinguant, ainsi que des autres espèces fossiles qui y ont été réunies à tort, par le coude des côtes placé bien plus près du milieu de la région palléale. Cuise-Lamotte.

N. B. Nous connaissons encore sept espèces nouvelles de *Lucina*, de Cuise-Lamotte.

**CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. vol. 1, p. 33.

\*499. *subfragile*, d'Orb., 1847. *C. fragile*, Melleville, 1843, Annales des Sc. géol., p. 36, pl. 3, fig. 1, 2 (non Brocchi, 1814). Laon, Neuville (Aisne), Cuise-Lamotte (Oise).

\*500. *Orbignyianum*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sér., t. 2, p. 209, pl. 7, fig. 13. Basses-Pyrénées, Biaritz.

\*501. *intermedium*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 1. Indes, province de Cutch, Babohill.

\*502. *ambiguum*, Sow., 1837, id., 5, p. 328, pl. 24, fig. 2. Babohill.

\*503. *subporulosum*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. porulosum*, mais sans pores aux crénelures des côtes. Cuise-Lamotte.

\*504. *Levesquei*, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *C. granulosum*, mais plus arrondie, plus courte et avec de petits tubercules déprimés, triangulaires aux côtes. Cuise-Lamotte.

\*505. *subdiscors*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. discors*, mais plus large, moins oblique et ornée de stries rayonnantes plus serrées. Cuise-Lamotte.

\*506. *subasperulum*, d'Orb., 1847. *C. asperulum*, Brongniart,

1823, Vicentin, p. 79, pl. 5, fig. 13 (non Lamarck, ses côtes sont plus rapprochées et plus nombreuses). Vicentin, Comberto.

\***507. Peresii**, d'Orb., 1847. Grosse espèce voisine du *C. hippopodium*, mais comme pourvue de deux saillies rayonnantes séparées par un méplat, qui circonscrivent les régions anales et buccales. De grosses côtes aplaties. Nice, le Jarrier.

\***508. Astlerianum**, d'Orb., 1847. Belle espèce très-oblique, courte sur la région buccale, allongée et très-oblique sur la région anale; côtes fines, simples, égales. Nice, le Jarrier.

\***509. Vandeneckii**, d'Orb., 1847. Espèce ovale, oblongue, comprimée, ornée de sillons rayonnants, espacés, très-atténués sur la région buccale. Nice, le Jarrier.

\***510. Niciense**, d'Orb., 1847. Espèce renflée, aussi large que longue, ornée de côtes nombreuses, égales aux sillons qui les séparent. France, le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes). Nice, le Jarrier.

\***511. Baremensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais avec des côtes plus larges, plus espacées et moins nombreuses. France, Barrême (Basses-Alpes), Nice, le Jarrier.

**UNIO**, Retzius, 1788.

\***512. truncatosa**, Mich., 1836, Mag. de Zool., pl. 85. France, Cuy, près d'Épernay (Marne), Saulzi (Oise).

**NUCULA**, Lamarck, 1801.

**513. Baboensis**, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 5. Indes, province de Cutch, Baboa-hill.

\***514. Levesquei**, d'Orb., 1847. Espèce confondue sous le nom de *Margaritacea*, avec le *N. Parisiensis*, mais plus oblongue et plus excavée sur la région buccale. Cuise-Lamotte.

**PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. p. 80.

**515. pecten**, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 4. Indes, prov. de Cutch, Baboa-hill.

\***516. pseudopulvinatus**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *P. pulvinatus*, mais s'en distinguant par ses côtes infiniment plus rapprochées au bord. France, Cuise-Lamotte.

**LIMOPSIS**, Sassy. Voy. vol. 1, p. 280.

\***517. subgranulatus**, d'Orb., 1847. Espèce voisine et réunie à tort au *T. granulatus*, mais presque lisse et sans stries treillissées. Cuise-Lamotte.

\***518. inequilateralis**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec le *T. deltoidea*, mais plus courte, plus renflée, plus triangulaire, très-carénée et très-inéquilatérale. Cuise-Lamotte.

**ARCA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 13.

\***519. globulosa**, Desh., n. 14, pl. 33, fig. 4-6. Cuise-Lamotte, Chaumont, Martimont, Gypseuil (Oise).

**520. hybrida**, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 3. Indes, province de Cutch, Baboa-hill.

**521. Pandora**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 76, pl. 5, fig. 14. Castel-Gomberto.

**PINNA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 135.

**522. transversa**, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série,

- t. 2, p. 210, pl. 8, fig. 1. Basses-Pyrénées, au delà du rocher du Goulet.
- MYTILUS**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 82.
- 523. Mellevillei**, d'Orb. *Modiola tenuistriatus*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 39, pl. 2, fig. 17-19 (non Münster, 1838). Laon (Aisne), Cuise-Lamotte, Mirancourt, Babeuf (Oise).
- 524. serratus**, d'Orb., 1847. *Dreissena*, id., Melleville, 1823, Ann. des Sc. géol., p. 40, pl. 1, fig. 11, 12. Soissonnais.
- 525. corrugatus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 78, pl. 5, fig. 6. Ronca.
- AVICULA**, Klein, 1758. Voy. t. 1, p. 13.
- 526. Levesquei**, d'Orb., 1847. Espèce confondue avec l'*A. trigonata*, mais s'en distinguant par des côtes rayonnantes. Cuise-Lamotte.
- PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.
- 527. Mellevillei**, d'Orb., 1847. *P. corneus*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 40, pl. 3, fig. 11, 12. France, Laon, Cuise-Lamotte.
- 528. squamula**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 354, n° 3. Deshayes, 1824, Paris, 1, p. 304, pl. 45, fig. 16, 17, 18. Soissons, Laon.
- \*529. Niciensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *P. Biaritzensis*, mais à côtes lisses. Nice, le Jarrier.
- \*530. Biaritzensis**, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 210, pl. 8, fig. 9. Basses-Pyrénées, phare de Biaritz et au delà du rocher du Goulet.
- \*531. Thorenti**, d'Archiac, 1846, id., p. 211, pl. 8, fig. 8. Le Vit, près Castellanne (Basses-Alpes), Basses-Pyrénées, phare de Biaritz et au delà du rocher du Goulet.
- \*532. Boiseyi**, d'Arch., 1846, id., p. 211, pl. 13, fig. 15, 16. Biaritz.
- 533. subdiscors**, d'Arch., 1846, id., p. 211, pl. 8, fig. 10. Biaritz.
- 534. laevicostatus**, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 6. Indes, prov. de Cutch, Baboa-hill.
- SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.
- \*536. bifrons**, Münst., Goldf., 1836, Petref., 2, pl. 106, fig. 10, *S. dubius*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 213, pl. 9, fig. 1. *S. Nystii*, d'Arch., pl. 9, fig. 3. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes), Basses-Pyrénées, au pied du phare de Biaritz, Vicentin, Castel-Gemberto; Allem., Osnabruck.
- \*537. detritus**, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 212, pl. 9, fig. 2. Biaritz.
- \*538. Cisalpinus**, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 76, pl. 5, fig. 1. Castel-Gomberto.
- 539. subcalcaratus**, d'Orb., 1847. *Chama subcalcarata*, d'Arch., 1846, Mémoire de la Société géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 209, pl. 7, fig. 11. Biaritz.
- PLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 202.
- 540. solida**, d'Orb., 1847. *Placuna solida*, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 43, pl. 1, fig. 6, 7.
- 541. Moninckii**, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 212, pl. 9, fig. 5. Basses-Pyrénées, moulin de Sopite, au delà du rocher du Goulet.
- CHAMA**, Linné, 1758. Voy. p. 170.

- 542. plicatella**, Melleville, 1843, Ann. des Sc. géol., p. 38, pl. 2, fig. 7-9. Laon (Aisne).
- \*543. Ataxenxis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *C. calcarata*, mais à côtes plus espacées, finement striées en long dans leurs intervalles. Couiza (Aude), Nice, le Jarrier.
- \*544. Invigata**, d'Orb., 1847. Espèce remarquable par sa surface entièrement lisse. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).
- OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.
- 545. subangusta**, d'Orb., 1847. *O. angusta*, Desh., pl. 53, fig. 1-3 (non *angusta*, Lam., 1819). Carlepont, Giraumont, Roye-sur-Matz, Cuise (Oise), Soissons (Aisne).
- \*546. multicosata**, Desh., n° 32, pl. 57, fig. 3-6. *O. plicatella*, Desh., pl. 50, fig. 2-5. *O. flabellula*, d'Arch., Mém. de la Soc. géol., 2, p. 213. Cuise-Lamotte, Pierrefonds, Gilocourt, le Mont-Quin (Oise), Soissonnais (Aisne), Couiza (Aude), St-Palais, près de Royan (Char.-Infér.), Tuc-du-Saumon, près de Casoen, au nord de Montfort (Landes), Vandremont (Oise), Champagne, Biaritz (Pyrénées-Orientales).
- \*548. Pyrenaica**, d'Orb., 1847. *O. gigantea*, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 366, pl. 17, fig. 2 (non Sowerby, non Brander). *O. latissima*, Desh., Mém. de la Soc. géol., 3, p. 19, pl. 6, fig. 1-3. Le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes), Brassoempony (Landes). France, Fontcouverte, Corbières, Biaritz (Pyrénées-Orientales); Crimée.
- \*549. Hersilia**, d'Orb., 1847. *Vulsella falcata*, Münst., Goldf., pl. 107, fig. 10. D'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 214, pl. 8, fig. 2, 3 (non Morton, 1834). Biaritz, au delà du rocher du Goulet; Bavière orientale, Cresseberg.
- \*550. Tarbelliana**, d'Orb., 1847. *Orbicula Tarbelliana*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 215, pl. 9, fig. 6. Basses-Pyrénées, Port-des-Basques.
- 551. Sowerbyana**, d'Orb., 1847. *O. callifera*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 7 (non Lamarck). France, le Vit, près de Castellanne, St-Julien-de-Méoulle (Basses-Alpes), St-Vallier (Var); Indes, prov. de Cutch, Wagé-ké-Pudda.
- 552. Melania**, d'Orb., 1847. *O. orbicularis*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 328, pl. 24, fig. 8 (non Gmel., 1789). Indes, prov. de Kutch, Luckput.
- 553. Archiaciana**, d'Orb., 1847. *O. vesicularis*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 213 (non Lamarck). Espèce toute différente, plus irrégulière et plus mince, surtout au talon. Basses-Pyrénées, Chambre-d'Amour, rocher du Goulet.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

- \*554. Montolearensis**, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 362, pl. 13, fig. 13 a, b, 14. Montagne Noire, entre Moussoulens et Montolieu, Fontcouverte (Corbières), St-Vallier (Var).
- \*555. sequilateralis**, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> sé-

rie, t. 2, p. 214, pl. 9, fig. 7. Basses-Pyrénées, au delà du rocher du Goulet.

**TEREBRATULINA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 85.

\*556. *tenuistriata*, d'Orb., 1847. *Terebratula tenuistriata*, Leym., pl. 15, fig. 11. d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 214, pl. 7, fig. 14. *Terebratula Defrancis*, Leym., pl. 15, fig. 12 (non Brongniart). Basses-Pyrénées, au delà du rocher du Goulet et sur le chemin de Villefranque, Roubia, Fontcouverte (Aude).

557. *Venei*, d'Orb., 1847. *Terebratula Venei*, Leym., 1846, Mém. de la Soc. géol. de France, t. 1, p. 362, pl. 15, fig. 10 a, b. Roubia, Fontcouverte (Aude).

### MOLLUSQUES BRYOZOAIRE.

**ESCHARINA**, Edwards, 1839.

558. *subpyriformis*, d'Orb., 1847. *Eschara subpyriformis*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 195, pl. 5, fig. 21. Basses-Pyrénées, rocher du Goulet.

559. *labiata*, d'Orb., 1847. *Eschara labiata*, d'Arch., id., p. 195, pl. 5, fig. 12. Rocher du Goulet à Biarritz.

**ESCHARA**, Lamarck.

560. *subchartacea*, d'Orb., 1847. *E. chartacea*, d'Arch., 1846, id., p. 196, pl. 5, fig. 13 (non Blain, 1819). Basses-Pyrénées, rocher du Goulet et chemin de Villefranque.

561. *Leymeriana*? Michelin, 1846, Iconog. zoophyt., p. 278, pl. 60, fig. 17. Biarritz.

**LUNULITES**, Lamarck.

\*562. *glandulosa*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc., 2, p. 196, pl. 5, fig. 14. Le Goulet, près de Biarritz.

563. *punctata*, Leymerie, 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 1, p. 358, pl. 13, fig. 4. Michelin, pl. 63, fig. 13. Couiza (Aude).

564. *Vandenheckei*, Michelin, 1846, Icon. zoophyt., p. 279, pl. 63, fig. 12. Nice, Fontaine du Jarrier (non Samats).

**MARGINARIA**, Roemer, 1842.

\*565. *hexagonalis*? d'Orb., 1847. *Cellepora hexagonalis*, Münster, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 102, pl. 36, fig. 16. Bavière orient., Austern et Nummiliten.

**RETEPORA**, Lamarck.

\*566. *Biaritziana*, d'Orb., 1847. *Retepora echinulata*, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 279 (non pl. 14, fig. 11). Espèce à mailles bien plus irrégulières. Biarritz.

**ALECTO**, Lamouroux, 1821.

\*567. *nummulatorum*, d'Orb., 1847. Espèce à longues cellules, fixe sur le *Nummulus rotula*. France, Gibret, près de Montfort (Landes).

**IDMONEA**, Lamouroux, 1821.

568. *Petri*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 195, pl. 5, fig. 11. Basses-Pyrénées, rocher du Goulet.

**RADIOFORA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 140.



**569. conjuncta**, d'Orb., 1847. *Lichenopora id.*, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 277, pl. 63, fig. 16. Biaritz.

**ENTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.

**570. mamillata**, d'Orb., 1847. *Pustulopora mamillata*, d'Archiac, 1846, Mémoire de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 194, pl. 5, fig. 9. Biaritz.

**571. Labati**, d'Orb., 1847. *Pustulopora Labati*, d'Arch., id., p. 195, pl. 5, fig. 10. Biaritz.

**572. Thorentil**, d'Orb., 1847. *Diastopora id.*, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 278, pl. 63, fig. 15. Biaritz.

#### ÉCHINODERMES.

**MICRASTER**, Agassiz.

**573. Aquitanicus**, Agassiz, 1847, Cat., p. 130. *Spatangus Aquitanicus*, Grat., Mém. Ours. foss., p. 74, pl. 2, fig. 17. Laplane, Montfort.

**SCHIZASTER**, Agassiz.

**574. ambulacrum**, Agass., 1847, Cat., p. 127. *Spatangus ambulacrum*, Desh., Biaritz.

**575. Djulsensis**, Dub. Voy. au Caucase, pl. 4, fig. 14. Agassiz, 1847, Cat., p. 128. Caucase.

**576. rimosus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 128. Biaritz.

**577. vicinalis**, Agass., 1847, Cat., p. 127. *Schizaster eurynotus*, Agass., Cat. syst., p. 3. Saint-Palais, près Royan (Charente-Inférieure), Biaritz.

**578. subincurvatus**, Agass., 1847, Cat., p. 127. St-Palais, près Royan (Charente-Inférieure); Italie, Vérone, Priabona, près de Castel-Gomberto.

**579. obliquatus**, d'Orb., 1847. *Spatangus obliquatus*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 327, pl. 24, fig. 22. Indes, prov. de Kutch, Baboa hill.

**580. acuminatus**, d'Orb., 1847. *Spatangus acuminatus*, Sowerby, 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 327, pl. 24, fig. 23, 23 a. Indes, prov. de Kutch, Baboa-hill.

**MEIASTER**, Agassiz.

**581. obesus**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 123. *Spatangus obesus*, Leym., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, t. 1, pl. 13, fig. 15. Conques (Aude); l'Égypte.

**582. brevisulcatus**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 126. *Micraster brevisulcatus*, Agass., Cat. syst., p. 2. Italie, Montecchio-Maggiore.

**583. inaequalis**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 125. *Brissus inaequalis*, Forb., Tr. geol. Soc. L., 1846, t. 7, p. 160, pl. 19, fig. 6. Environs de Pondichéry, Verdachellum (Grandes-Indes).

**584. expansus**, Desor, Agassiz, Cat., p. 125. *Brissus expansus*, Forbes, Tr. geol. Soc. L., 1846, t. 7, p. 160, pl. 19, fig. 7. Environs de Pondichéry, Verdachellum (Grandes-Indes).

**585. verticalis**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 124. *Schizaster verticalis*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 3. D'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 202, pl. 6, fig. 2. Biaritz, Royan (Charente-Inférieure).

**586. complanatus**, d'Arch., Agass., 1847, Cat., p. 125. Monfort.

**587. latisulcatus**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 125. Égypte.

**BRISOPSIS**, Agassiz.

**588. angustus**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 121. Égypte.

**\*589. oblonga**, Agass., 1847, Cat., p. 121. La Fontaine du Jarrier, près de Nice.

**\*590. elegans**, Agass., 1847, Cat., p. 121. *Spatangus Grignonensis*, Desmar., in Desml., Tabl. syn., p. 390. Royan, Montfort, près Dax, St-Estèphe (Gironde).

**BRISSUS**, Klein.

**\*591. subacutus**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 120. *Micraster subacutus*, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 201, pl. 7, fig. 5. Biaritz (Pyrénées-Orientales).

**592. Helveticus**, Agass., 1847, Cat., p. 120. *Micraster Helveticus*, Agass., Echin. suiss., 1, p. 27, pl. 3, fig. 19, 20. Suisse, Einsiedeln, canton de Schwitz.

**AMPHIDETUS**, Agassiz.

**\*593. subcentralis**, Agass., 1847, Cat., p. 118. St-Palais, près Royan (Charente-Inférieure).

**GUALTIERIA**, Desor.

**\*594. Orbignyana**, Agass., 1847, Catal., p. 116. Saint-Palais, près Royan (Charente-Inférieure).

**EUPATAGUS**, Agassiz.

**\*595. brissoides**, *Spatangus brissoides*, Desml., Tabl. syn., p. 392. Agass., Cat., p. 116. *Spatangus punctatus*, Grat., Ours. foss., p. 69, pl. 1, fig. 11. Montfort, près Dax.

**596. Veronensis**, Agass., 1847, Cat., p. 116. *Spatangus Veronensis*, Mer. in Agass., Cat. syst., p. 2. Italie, Vérone.

**\*597. ornatus**, Agass., 1847, Cat., p. 115. *Spatangus ornatus*, De-france, Dict. Sc. nat. Cuv., Oss. foss., 2, 2<sup>e</sup> part., pl. 5, fig. 6. France, Biaritz (Pyrénées-Orientales).

**MACROPNEUSTES**, Agassiz.

**599. pulvinatus**, Agass., 1847, Cat., p. 114. *Micraster pulvinatus*, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 201, pl. 6, fig. 1. Biaritz.

**600. Beaumonti**, Agass., 1847, Cat., p. 114. *Micraster Beaumonti*, Agass., Cat. syst., p. 2. Italie; Montecchio-Maggiore.

**601. Ammon**, Desor, Agassiz, 1847, Cat., p. 115. Égypte.

**SPATANGUS**, Klein.

**602. depressus**, Dub. Voy. au Caucase, pl. 1, fig. 16. Agass., 1847, Cat., p. 114. Crimée, Sinaï.

**603. pendulus**, Agass., 1847, Cat., p. 114. Sinaï.

**AMBLYPYGUS**, Agassiz.

**604. apheles**, Agass., 1847, Cat., p. 108. Italie, Vérone.

**605. dilatatus**, Agass., 1847, Cat., p. 109. Salghir en Crimée.

**PYGURUS**, Agassiz.

**606. Beaumonti**, Agass., 1847, Cat., p. 107. Italie, Vérone.

**\*607. politus**, Desml., Tabl. syn., p. 348. Agass., 1847, Cat., p. 106. Italie, env. de Nice, de Vérone, de Sienne; France, Biaritz.

**608. ellipsoidalis**, Agass., 1847, Cat., p. 106. *Echinolampas ellip-*

- soidalis*, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 203, pl. 6, fig. 3. Biaritz.
- 609.** *Escheri*, Agass., 1847, Cat., p. 107. Echin. suiss., 1, p. 59, pl. 9, fig. 7-9. Suisse, Appenzell, Fachuern (St-Gall).
- \*610.** *subsimilis*, Agass., 1847, Cat., p. 107. *Echinolampas subsimilis*, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 204, pl. 6, fig. 4. France, Biaritz, St-Palais, près Royan (Charente-Inférieure).
- \*611.** *dorsalis*, Agass., 1847, Cat., p. 106. St-Palais, près Royan (Charente-Inférieure).
- 612.** *amygdala*, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 106. Égypte.
- 613.** *curtus*, Agass., 1847, Cat., p. 106. *Echinolampas eurypygus*, Agass., Cat. syst., p. 5. Italie, Vérone.
- 614.** *brevis*, Agass., 1847, Cat., p. 186. Suisse, Appenzell.
- 616.** *Delbosii*, Des., Agass., 1847, Cat. syst., p. 103. France, Montfort, près Dax.
- 617.** *affinis?* d'Orb., 1847. *Clypeaster affinis*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, p. 327, pl. 24, fig. 20, 20 a. Goldf., 42, 6. Indes, prov. de Cutch, Baboa-hill et Joongrea.
- 618.** *varians*, d'Orb., 1847. *Clypeaster varians*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 327, pl. 24, fig. 21, 21 a. Indes, prov. de Cutch, Baboa-hill, Wagé-ké-Pudda.
- PYGORHYNCHUS**, Agassiz.
- 619.** *crassus*, Agass., 1847, Catalog., p. 103. Italie, Brendola, Vérone.
- 620.** *heptagonus*, Des., Agass., 1847, Cat., p. 103. *Nucleolites heptagona*, Grat. France, Montfort, près Dax.
- 621.** *Desorii*, d'Arch., Agass., 1847, Cat., p. 102. Biaritz.
- 622.** *sopititanus*, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 203, pl. 6, fig. 5. Agass., 1847, Cat., p. 102. Biaritz.
- 623.** *elatus*, Agass., 1847, Cat., p. 102. *Cassidulus elatus*, Forbes, Trans. geol. Soc. L., 7, 1846, p. 182, pl. 19, fig. 1. Env. de Pondichéry, Verdachellum.
- 624.** *testudo*, Forbes, Tr. geol. Soc. L., 7, p. 161, pl. 19, fig. 2. Agass., 1847, Cat., p. 102. Env. de Pondichéry, Verdachellum.
- 625.** *planatus*, Forbes, Tr. geol. Soc. L., 7, p. 162, pl. 19, fig. 3. Agass., 1847, Cat., p. 102. Envir. de Pondichéry, Verdachellum (Indes orientales).
- 626.** *testudinarius*, d'Orb., 1847. *Cassidulus testudinarius*, Brongniart, 1823. Vicentin, p. 83, pl. 5, fig. 15. Vicentin, Ronca.
- BOHINOXYAMUS**, Van Phels.
- 627.** *planulatus*, d'Arch., Agass., 1847, Cat. syst. p. 83. Biaritz.
- SALMACIS**, Agassiz.
- 628.** *Vandeneckei*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 55. Italie, Fontaine du Jarrier, montagne de la Palarea, comté de Nice.
- BOHINUS**, Linné.
- 629.** *Gravesii*, Des., Agass., 1847, Cat., p. 62. Retheuil (Aisne).
- CELOPLEURUS**, Agassiz.
- \*630.** *equis*, Agass., 1847, Catal. syst., p. 52. *Echinus equis*, Val., Enc. méth. zooph., pl. 140, fig. 7 et 8. Biaritz; Espagne.

**631. Agassizii**, d'Arch., Mém. Soc. géol. Fr., 2<sup>e</sup> série, 2, p. 265, pl. 7, fig. 2. Agass., 1847, Cat., p. 53. Biaritz.

**DIADEMA**, Gray.

**632. arenatum**, d'Arch., Agass., 1847, Cat. syst., p. 44. Biaritz.

**CIDARIS**, Lamarck.

**633. prionata**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 31. Biaritz.

**\*634. acicularis**, d'Arch., Agass., 1847, Cat. syst., p. 32. Biaritz.

**\*635. serrata**, d'Arch., Agass., 1847, Cat. syst., p. 32. Biaritz.

**\*636. semi-aspera**, d'Arch., Mém. Soc. géol. de France, 2, p. 201, pl. 7, fig. 18. Agass., 1847, Cat. syst., p. 32. Biaritz.

**\*637. subularis**, d'Arch., id., p. 201, pl. 7, fig. 17. Agass., 1847, Cat. syst., p. 31. Biaritz.

**ORENASTER**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 240.

**\*638. Castellanensis**, d'Orb., 1847. Espèce dont les pièces sont petites et pourvues tout autour d'une dépression en bordure. France, le Vit, près de Castellanne (Basses-Alpes).

**CONOCRINUS**, d'Orb., 1847. Genre voisin des *Bourgueticrinus*, mais sans pièces basales, comme les *Eugeniocrinus*.

**\*639. Thorenti**, d'Orb., 1847. *Bourgueticrinus Thorenti*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 200, pl. 5, fig. 20. Basses-Pyrénées, rocher du Goulet.

**PENTACRINUS**, Miller, 1821.

**\*640. didactylus**, d'Orb., M. S. d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 200, pl. 5, fig. 16, 17, 18. Biaritz, Vicentin, près Ronca.

## ZOOPHYTES.

**FLABELLUM**, Lesson, 1831. *Phyllodes*, Phillips, 1841.

**\*641. cuneatum**, Edwards et Haime, 1838, Ann. des Sc. nat., 9, p. 265. *Turbinolia cuneata*, Goldf., 1830, Germ., p. 53, pl. 15, fig. 9 (Exclus., pl. 37). Pyrénées.

**\*642. costatum**, Edwards et Haime, 1838, Ann. des Sc. nat., 9, p. 266. Bellardi, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 271, pl. 61, fig. 10. Nice, le Jarrier, la Palarea.

**\*643. Dufrenoyi**, Edwards et Haime, 1838, Ann. des Sc. nat., 9, pl. 269. *Turbinolia Dufrenoyi*, d'Arch., 1846, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 192, pl. 5, fig. 4 a, 5. *Turbinolia dentalina*, d'Arch., pl. 5, fig. 6. France, Port-des-Basques (Biaritz), Vicentin, Salseo.

**\*644. appendiculatum**, Bronn, 1838, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 269. *Turbinolia appendiculata*, Brongniart, 1823, Vicentin, p. 83, pl. 5, fig. 17. Vicentin, Ronca, val Sangonini.

**\*645. vaginale**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 270. *Turbinolia vaginalis*, Michelin, 1846, Icon. zoophyt., p. 271, pl. 63, fig. 3. Biaritz.

**646. Hohel**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 273. *Turbinolia cuneata*, var., Goldf., 1850, pl. 37. Vicentin.

**TROCHOCYATHUS**, Edwards et Haime, 1848.

**\*647. elongatus**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 305. Le Vit, près de Castellanne (B.-Alpes).

- \***648. Pyrenaicus**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 311. *Flabellum Pyrenaicum*, Michelin, 1846, Icon. zoophyt., p. 271, pl. 63, fig. 2. *Turbinolia calcar*, d'Arch., 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 192, pl. 5, fig. 1 a, 2, 3. Port-des-Basques (Biarritz).
- \***649. sinuosus**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 314. *Turbinolia sinuosa*, Brongniart, 1821, Vicentin, p. 40, pl. 6, fig. 17. *Turbinolia id.*, Michelin, 1846, pl. 62, fig. 1. France; Couiza (Aude), Nice, le Jarrier et la Palarea.
- 651. Alpinus**, Edwards et Haime, 1848. *Turbinolia id.*, Michelin, 1846, Icon. zoophyt., p. 268, pl. 61, fig. 6. La Palarea.
- 652. didyma**, Edwards et Haime, 1848, p. 333. *Turbinolia didyma*, Goldf., 1830, Petref., 1, p. 54, pl. 15, fig. 11. France, Provence.
- \***653. multistriatus**, Edwards et Haime, 1848? *Turbinolia multistriata*, Michelin, Icon. zooph., p. 209, pl. 61, fig. 8. Nice, le Jarrier, la Palarea.
- \***653'. bilobatus**, Edwards et Haime. *Turbinolia id.*, Michelin, pl. 61, fig. 7. France, Couiza.
- 654'. Thorenti**, d'Orb., 1849. Espèce large et courte, ovale. Fr., St-Pierre, près de Biarritz.
- SPHENOTROCHUS**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 240.
- 654". semi-granosus**, Edwards et Haime, 1848, id., 9, p. 245. *Turbinolia semi-granosa*, Mich., Icon., p. 151, pl. 43, fig. 2. Cuise-Lamotte (Oise).
- APLOCYATHUS**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 291.
- \***654". cyclolitoides**, d'Orb., 1847, M. S. *Trochocyathus id.*, Edw. et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 315. *Turbinolia id.*, Bellardi (non Michelin). Nice, la Palarea; Prov. de Kutch (Indes orientales).
- CERATOTROCHUS**, Edwards et Haime, 1848.
- \***655. exaratus**, Edwards et Haime, 1848? *Turbinolia exarata*, Michelin, 1846, Iconog. zooph., p. 267, pl. 61, fig. 3. Nice, la Palarea.
- PERISMILIA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 203.
- \***655'. bilobata**, d'Orb., 1847. *Turbinolia bilobata*, Michelin, 1846, pl. 62, fig. 1. *Montivaltia id.*, Edwards, 1848. Nice, montagne du Jarrier.
- FUNGINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 91.
- \***656. Perezii**, d'Orb., 1847. *Cyclotites Borsoni*, var., Michelin, 1846, p. 266, pl. 61, fig. 2 (non pl. 8, fig. 4). Piémont, la Palarea.
- \***657. Niciensis**, d'Orb., 1847. *Fungia Niciensis*, Michelin, pl. 61, fig. 1. Nice, Palarea.
- \***658. Braunii**, d'Orb., 1847. *Antophyllum id.*, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 272, pl. 63, fig. 9. Couiza (non Cary, qui est de l'étage salunien).
- LASMOPHYLLIA**, d'Orb., 1847. Voy. t. 1, p. 208.
- \***659. corniculum**, d'Orb., 1847. *Turbinolia id.*, Michelin, 1846, Icon. zoophyt., p. 267, pl. 61, fig. 4. Peut-être doit-on y réunir le *T. Hemisphaeria*, Michelin, pl. 61, fig. 5, la forme plus ou moins large n'étant pas toujours un caractère spécifique dans les polypiers. Nice, le Jarrier, la Palarea.
- BALANOPHYLLIA**, Scales wood, 1844.

\***660. geniculata**, Edwards et Haime, 1848. *Caryophyllia geniculata*, d'Archiac, 1846, Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 193, pl. 5, fig. 7 a. Basses-Pyrénées, Port-des-Basques.

**OCULINA**, Lamarck, 1816.

**661. incertaf**, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 275, pl. 63, fig. 11. Biaritz.

**SIDERASTREA**, Edwards et Haime, 1849.

**661'. funesta**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 1849, p. 143, n. 10. *Astrea id.*, Brongniart, 1823, Terr. trap. du Vicent, p. 84, pl. 5, fig. 16. Ronca.

**PRIONASTREA**, Edwards et Haime, 1849.

**662. Callaudi**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1845, Iconog. zoophyt., p. 273, pl. 63, fig. 5. Nice, le Jarrier, la Palarea.

\***664. crista**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1845, Iconogr. zoophyt., p. 162, pl. 44, fig. 7. Cuise-Lamotte, Thury-sous-Clermont.

**STEPHANOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\***665. elegans**, d'Orb., 1847. *Porites elegans*, Leymerie, 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 358, pl. 13, fig. 1, 2. Coustouge, Couiza.

**ENALLASTREA**, d'Orb., 1847. Ce sont des *Astrea* dendroïdes, rameuses, à columelle styloïforme; l'intervalle des calices granuleux.

\***666. distans**, d'Orb., 1847. *Astrea distans*, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, 2<sup>e</sup> part., t. 1, p. 358, pl. 13, fig. 6. Michelin, pl. 63, fig. 7. Couiza, Coustouge, Dax.

\***667. contorta**, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Leym., 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 358, pl. 13, fig. 5. Fonjoncouse.

**GONIARÆA**, d'Orb., 1849. Calices hexagones en contact les uns avec les autres, à parois élevées, cloisons très-marquées; peut-être des palis. Ensemble dendroïde.

\***668. elegans**, d'Orb., 1847. *Alveopora elegans*, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 276, 63, fig. 6 (non *porites elegans*, Leymerie). Couiza.

**RHYPIDOGYRA**, Edwards et Haime, 1848.

**669. Micheliniana**, d'Orb., 1847. *Lobophyllia id.*, Leym., Mém. de la Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 1, p. 358, pl. 13, fig. 3. Fonjoncouse.

**CERIOFORA**, Goldfuss, 1830.

\***670. sublaevigata**, d'Archiac, 1836, Mém. Soc. géol., 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 194, pl. 5, fig. 8. Rocher du Goulet (Biaritz).

**VIRGULARIA**, Lamarck, 1816.

\***671. Alpina**, d'Orb., 1847. Belle espèce dont la tige testacée est comprimée, quadrangulaire et presque canaliculée. France, le Vit, près de Castellanne (B.-Alpes).

#### FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**ORBITOIDES**, d'Orb., 1847. Coquille discoïdale, convexe des deux côtés, formée d'une seule rangée de loges autour du disque; test fortement encroûté extérieurement au milieu.

\***672. papyracea**, d'Orb., 1847. *Nummulites idem*, Boubée, 1832, Bull. de la Soc. géol., 2, p. 445. *Orbitolites Prattii*, Michelin, 1846,

Icon. zooph., p. 278, pl. 63, fig. 14. *Orbitolites submedia*, d'Archiac, 1846, Mém. de la Soc. géol., 2, p. 194, pl. 6, fig. 6. France, Gensac, St-Gaudens, Boulogne (H.-Garonne), Biaritz (Pyrénées-Orientales), Annot (B.-Alpes), Brasoempouy, près de Hagetmau (Landes), env. de Mauléon, canton de Castelnomagnac (H.-Pyrénées), le Vit, près de Castellanne (B.-Alpes).

**ORBITOLITES**, Lamarck, 1801.

- \***673. elliptica**, Michelin, 1846, Icon. zooph., p. 277, pl. 61, fig. 11. Nice, le Jarrier, près de la Palarea, le Vit, près de Castellanne (B.-Alpes).

**NUMMULITES**, Lamarck.

- 674. globularia**, Lam., 1822, Anim. sans vert., 7, p. 629. France, Retheuil.

- \***675. scabra**, Lamarck, 1822, Anim. sans vert., p. 629. *Nummularia acuta*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc., 5, p. 329, pl. 24, fig. 13. Soissons (Aisne), Biaritz (B.-Pyrénées), Indes orientales, province de Cutch, Luckput, Scinde (cap. Vicary).

- \***676. nummularia**, d'Orb., 1847. *Camerina nummularia*, Bruguière, 1791, 1, p. 400. *N. complanata*, Lamarck, 1822, Anim. sans vert., 7, p. 630. *N. millecaput*, Boubée, 1832, Mag. de zoologie, pl. 15. *N. polygiratus*, Desh., 1838, Mém. de la Soc. géol., 3, pl. 5, fig. 17-19. *N. irregularis, distans, placentula*, Desh., id., pl. 5, fig. 15, 16-20-22, pl. 6, fig. 8, 9. Nous plaçons sous ce nom les grandes Nummulites, minces et ondulées sur les bords. Pyramides d'Egypte; Espagne, Columbres, près d'Oviedo; Crimée, Vicentin, Ronca; France, Bastennes, Gamarde, près de Dax (Landes), Biaritz (Basses-Pyrénées), St-Sever, St-Paul du Var, St-Vallier (Var), Laon (Aisne), Montgaillard (H.-Pyrénées), Indes orientales, Scinde (Cap. Vicary), Hymalaya, Hydrabad (cap. Blagrane).

- \***677. planulata**, d'Orb., 1825, Tab. des Céphal., p. 130, n. 4, Modèles, n. 87. *N. atacicus*, Leym., 1846, Mém. de la Soc. géol., 1, p. 358, pl. 13, fig. 13. *Lenticulites planulata*, Lamarck, 1822, 7, p. 619. *N. Biaritzania*, d'Archiac, 1845, Mém. de la Soc. géol., 2, p. 191. France, Soissons (Aisne), Cuise-Lamotte, Liancourt (Oise), Couiza (Aude), Biaritz (B.-Pyrénées), le Vit, près de Castellanne (B.-Alpes), St-Palais (Charente-Inférieure), Nice, Fontaine du Jarrier.

- \***678. nummiformis**, DeFrance, Fortis, Oryctog. de l'Italie, 2, pl. 1, fig. p-t et pl. 4, fig. 3. Brongniart, 1823, Vicentin, p. 51. Ronca.

- \***679. lenticularis**, d'Orb., 1825. *Nautilus lenticularis*, Fichtell et Moll., var. b, p. 56, pl. 7, fig. a, b. Espèce tuberculeuse. Autriche, Bats.

- \***680. spissa**, DeFrance, 1825, Dict. des Sc. nat., 35, p. 225. *N. crassa*, Boubée, 1831, Bull. de nouv. géol. *N. levigata*, Pusch, 1837, p. 163, pl. 12, fig. 16. *N. obtusa*, Sow., ? 1837, Trans. geol. of Lond., 5, p. 329, pl. 24, fig. 14. *N. globulus*, Leym., 1846, Mém. de la Soc. géol., 1, p. 359, pl. 13, fig. 14. France, St-Vallier (Var), Biaritz (B.-Pyrénées), Bastennes, Mouguerre (Landes), Couiza (Aude); Espagne, Columbres, près d'Oviedo; Autriche, Bats; Pologne, Kosci-

lisko, Zakopane, Vatra, Indes orientales, province de Cutch, Wagé-Kepudda, Hymalaya, Hydrabad.

- \***681. rotula**, Gratteloup, M. S. Magnifique espèce, remarquable par la dépression marquée qu'elle montre au centre indépendamment de rayons indistincts, interrompus de sa surface. France, Petit-Sarrail, Gamarde, Gibret, près de Montfort, Donzacq, près de Bastennes (Landes, partie inférieure des terrains tertiaires); chaîne de l'Hymalaya, Hydrabad; Indes orientales, cap Blaggrave et Smith.

- 682. mamilla**, d'Orb., 1847. *Nautilus mamilla*, Fichtell et Moll., 1803, pl. 6, fig. a, b, c, d. *N. rotularis*, Desh., 1838, Mém. de la Soc. géol. de France, 3, p. 68, pl. 6, fig. 10, 11. Autriche; Crimée.

**ASSILINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.

- \***683. depressa**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 130, n. 2. *Nummulites planospira*, Boubée, Bull. des nouv. gisements de France, 1<sup>re</sup> liv., p. 6, d'Archiac, 1846, Mém. de la Soc. géol. de France, 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 195. Espèce très-aplatie, à spire apparente. France, bords de l'Adour, Bastennes, Mouguerre (Landes), Gensac, entre Biaritz et Bidart (B.-Pyrénées); Espagne, Columbres, près d'Oviedo, Hymalaya, Hydrabad (cap Blaggrave).

- \***684. undata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 130, n. 3. Espèce onduleuse. Couiza (Aude).

- \***685. exponens**, d'Orb., 1847. *Nummularia exponens*, Sow., 1834, Trans. geol. Soc. of London, 2<sup>e</sup> série, 5, p. 719, pl. 61, fig. 14 a, e. Hymalaya, Hydrabad (cap Blaggrave), Indes, prov. de Cutch, Luckput Bunder.

**OPEROULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.

- \***686. Thouini**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 115, n. 3. Espèce pourvue de bourrelets extérieurs. Couiza, Montolieu.

- \***687. ammonca**, Leymerie, 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 359, pl. 13, fig. 11 a, b. Couiza, Bize (Aude), Biaritz (Basses-Pyrénées); Egypte (cap Newbold).

- \***688. subgranulosa**, d'Orb., 1847. *O. granulosa*, Leymerie, 1846, Mém. Soc. géol. de France, t. 1, p. 359, pl. 13, fig. 12 (non Michelotti, 1844). France, Couiza, Bize.

**ALVEOLINA**, Bosc, 1808. Voy. p. 185.

- \***689. melo**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 140, n. 2. *Nautilus melo*, Ficht. et Moll., p. 118, pl. 24; Foraminifères de Vienne, pl. 7, fig. 15, 16. France, Couiza, Montolieu (Aude); Autriche, Steinfeld, Grusback (Hongrie), Missdorf; Indes orientales, Scinde (cap Vicary).

- \***690. ovoidea**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 140, n. 3, Deluc, Journ. de Phys., an. 10, pl. 1, fig. 11, 12. *Al. subpyrenaica*, Leymerie, 1846, Mém. de la Soc. géol., 1, p. 359, pl. 13, fig. 9, 10. France, Montolieu, Couiza; Indes orientales, Scinde (cap Vicary).

- \***691. oblonga**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 140, n. 4, Parkinson, pl. 10, fig. 28-31. *Fasciolites elliptica*, Sow., 1837, Trans. geol. Soc., 5, p. 329, pl. 24, fig. 17. France, Soissons (Aisne), Cuise-Lamotte, Meauriau-Mont, Pierrefonds (Oise), Couiza (Aude); Indes orientales, Baboa-hill, Wagé-Ké-Pudda (prov. de Cutch).

**ROTALIA**, Lamarck.

- \***692. Suessionensis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 107.



n. 23. Espèce plus convexe en dessous qu'en dessus. Soissons, Cuise-Lamotte, Trosly. Breuil (Oise).

- \*693. *consobrina*, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *R. lavis*, mais à loges bien plus grandes. Soissons.

#### AMORPHOZOAIRES.

**GUETTARDIA**, Michelin, 1844.

- \*694. *Thiolati*, d'Archiac, 1846, *Mém. Soc. géol.*, 2<sup>e</sup> série, t. 2, p. 197, pl. 5, fig. 15 et pl. 8, fig. 5-7. *Guettardia stellata*, Mich., 1844, *Ic. zooph.*, pl. 30, fig. 6 (exclus. fig. 1-5). Rocher du Goulet, Biaritz.

## VINGT-CINQUIÈME ÉTAGE : — PARISIEN.

(A. — PARTIE INFÉRIEURE.)

---

### MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**SEPIA**, Linné, d'Orb., Moll. viv. et foss., 1, p. 261.

**1. sepioidea**, d'Orb., Paléont. univ., pl. 7, fig. 4-8, Terr. tertiaires, pl. 1, fig. 4-8. Nous y réunissons les *S. Cuvieri*, *Longispina*, *Longirostris* et *Blainvillei*, Desh., France, Chaumont, Vivray (Oise), St-Germain, Morierval, Marquemont, Parnes, Paris, Grignon, Courtagnon, Valmondois, Auvers, Tancrou, Mouchy-le-Châtel; Belgique, Boitsfort, Assche, Jette, Foret, Nécle, Gand.

**BELOPTERA**, Desh., d'Orb. Voy. p. 309.

**2. belemnitoidea**, Blainville, d'Orb., Paléont. univ., pl. 2, fig. 1-4. France, Grignon, le Vivray, Parnes, Chaumont, Mouchy (Oise); Belgique, Laeken.

**NAUTILUS**, Breynius, 1732. Voy. vol. 1. p. 52.

**3. regalis**, Sowerby, 1822, Min. Conch., 4, p. 77, pl. 355. *N. Lamarckii*, Desh., 1837, n. 2, pl. 100, fig. 1. *N. Burtini*, Galeotti, 1837. Nyst., 1843, pl. 47, fig. 1, env. de Noyon, Babeuf, Lagny, Courcelles-les-Gisors (Oise), Grignon, Parnes, Courtagnon; Angleterre, Islington, Chalk; Belgique, Bruxelles, Melsbroeck, Saventhem, Loo, Woluwe-St-Étienne, Dieghem, Boitsfort, Affligem, Louvain, Gand, Etiochove, près d'Anvers.

**4. umbilicaris**, Desh., 1837, n. 3, pl. 99, fig. 1-2. Frétoy, Mouchy-le-Châtel (Oise); Parnes, Grignon.

**5. imperialis**, Sowerby, 1818, Min. Conch., 1, p. 9, pl. 1, fig. 1, 2. Angleterre, Sheppy, Highgate.

**6. centralis**, Sow., 1818, Min. Conch., 1, p. 9, pl. 1, fig. 3-5. Angleterre, Barton, Richmond, Sheppy.

**MEGASIPHONIA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 309.

**7. zigzag**, d'Orb., 1847. *Nautilus zigzag*, Sow., Min., Conch., pl. 1, fig. 4, Desh., 1824, Paris, 2, p. 765, pl. 100, fig. 2, 3. Nyst., 1843, pl. 46, fig. 4. France, Houdan; Angleterre, Londres, Highgate et Sheppy.

**8. Alabamensis**, d'Orb., 1847. *Nautilus Alabamensis*, Morton, 1834, *Syn.*, pl. 18, fig. 3. États-Unis (Alabama), près de Clairborne.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**HELIX**, Linné, 1758.

**10. Ramondii**, Marcel de Serres, environs de Narbonne (Aude), St-André de Meouille (Basses-Alpes).

**11. Astierii**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, plus petite, aplatie sur la columelle. France, Gévaudan et Barrême (Basses-Alpes).

**BULIMUS**, Bruguière, 1791.

**12. tenui-striatus**, Wetherell, 1846, London Geol. Journ., p. 20, fig. 1. Angleterre, London Clay.

**\*13. Alpinus**, d'Orb., 1847. Grosse espèce ovale, voisine de l'*Yhemastomus*, mais plus allongée. St-André-de-Meouille (Basses-Alpes).

**CYCLOSTOMA**, Lamarck, 1801.

**\*15. mumia**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 115, n. 5, et t. 8, pl. 37, fig. 1, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 76, pl. 7, fig. 1, 2, et pl. 8, fig. 18-21. Grignon, Maule, Parnes, P. S., la Chapelle près Senlis, St-Ouen, Valmondois, Mantes, Ermenonville, Mortefontaine.

**16. inflata**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 78, pl. 7, fig. 8, 9. Maulette près Houdan.

**PALUDINA**, Lamarck, 1822.

**\*17. Desmaresti**, Prevost, Desh., n. 5, pl. 115, fig. 13-14. Beaurains, Cuvilly, Lattainville (Oise).

**PALUDESTRINA**, d'Orb., 1837. Voy. p. 300.

**\*18. globulus**, d'Orb., 1847. *Paludina globulus*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 132, pl. 15, fig. 21, 22. Maulette près Houdan, Arsy, Babœuf, Ognolles, Parnes (Oise).

**\*19. nana**, d'Orb., 1847. *Paludina nana*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 132, pl. 15, fig. 17, 18. Grignon, Chaumont, Parnes, P. S. Senlis, Ermenonville.

**\*20. lævigata**, d'Orb., 1847. *Bulimus lævigatus*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 62, pl. 8, fig. 14, 15. Mouchy, Vaudancourt (Oise).

**\*21. sextonus**, d'Orb., 1847. *Bulimus sextonus*, Lamck., Ann. du Mus., t. 4, p. 292, n. 6, et t. 8, pl. 59, fig. 8. Deshayes, 1824. Paris, 2, p. 61, pl. 7, fig. 41, 42. Grignon, Villiers, Valmondois, Parnes.

**\*22. macrostoma**, d'Orb., 1847. *Paludina macrostoma*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 131, pl. 15, fig. 23, 24. Parnes, Grignon, P. S. Mortefontaine.

**\*23. subulata**, d'Orb., 1847. *Paludina subulata*, Desh., n. 13, pl. 15, fig. 19-26. Chaumont (Oise), Grignon, P. S. Beauchamp.

**RISSOA**, Freminville, 1814. Voy. p. 183.

**\*30. turricula**, d'Orb., 1847. *Melania marginata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 430, n. 3, et t. 8, pl. 60, fig. 4, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 114, pl. 14, fig. 1-4, Lamk., Nyst., 1843, pl. 36, fig. 15. *Bulimus turricula*, Bruguière, 1792, p. 324. France, Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Liancourt, Mantes, la ferme de l'Orme. P. S. Dammery (Marne); Gomerfontaine, Ermenonville; Belgique, Rougecloître, St-Josse-ten-Noode, Groenendaël, Wilsbroeck, Assche, Afflighem.

**RISSOINA**, d'Orb., 1839. Voy. vol. 1, p. 297.

\***31. polita**, d'Orb., 1847. *Melania polita*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 116, pl. 14, fig. 20, 21. *Rissoa polita*, Desh., 1838. Mouchy-le-Châtel.

**32. clavula**, d'Orb., 1847. *Melania clavula*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 117, pl. 14, fig. 18, 19, *Rissoa clavula*, Desh., 1838, in Lam., 8, 486. France, Mouchy, Grignon.

\***33. cochlearella**, d'Orb., 1847. *Melania cochlearella*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 432, n. 10, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 117, pl. 14, fig. 13-17. Courtagnon, Grignon, la ferme de l'Orme, Parnes, Chaumont.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 2.

**35. acuta**, Sow., 1813, Min. Conch., t. 1, p. 49, pl. 16, fig. 3. Le Vevray (Oise); Angleterre, Londres, Barton-Cliff, Subbington; Belgique, Landen, Folx-les-Caves.

**36. semicostata**, Sow., 1813, Min. Conch., t. 1, p. 49, pl. 16, fig. 1. Angleterre, Londres, Barton, Subbington.

**37. interrupta**, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 149, pl. 577, fig. 3. Angleterre, Londres, Barton.

**38. undosa**, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 149, pl. 577, fig. 4. Angleterre, Londres, Barton.

**39. reticulata**, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 149, pl. 577, fig. 5. Angleterre, Londres, Barton.

**40. spirata**, Gallotti, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgique, p. 390, pl. 37, fig. 3. Belgique, Lacken, Jette, Gand.

**41. subcylindrica**, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgique, p. 392, pl. 38, fig. 5. Belgique, Lacken.

\***43. nassula**, Conrad, 1833, *S. planulata*, Lea. États-Unis, Alabama.

**44. sessilis**, Conrad, 1833, *S. carinata*, Lea. États-Unis. Alabama.

**45. striatula**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 198, pl. 25, fig. 6, 7, 8. Château-Rouge, près Beauvais, Parnes.

\***46. turritellata**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 199, pl. 23, fig. 15, 16. Grignon (Seine-et-Oise), Hauteville, près Valognes (Manche), Chaumont (Oise).

\***47. plicata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 215, n° 5, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 199, pl. 23, fig. 9, 10. Parnes, Grignon.

\***48. multilamella**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 196, pl. 22, fig. 16, 17. Parnes, Mouchy, Courtagnon.

\***49. decussata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 213, n° 3, t. 8, pl. 37, fig. 3. Desh., 1824, Paris, 2, p. 197, pl. 23, fig. 1, 3. Grignon, Parnes, Mouchy, près Houdan, Chaumont.

\***50. crista**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 213, n° 1, t. 8, pl. 37, fig. 5, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 2, p. 195, pl. 22, fig. 9, 10. Nyst., pl. 37, fig. 2. France, Mouchy, Grignon, P. S. Senlis, Chaumont; Belgique, Forêt, près de Bruxelles.

\***51. tenuilamella**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 195, pl. 22, fig. 11-14. France, Mouchy, Chaumont, Parnes.

**52. Francisci**, Caillat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine-et-Oise, p. 5, pl. 9, fig. 3. France, Grignon.

**TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 67.

- \*53. *sulcata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 216, n. 2, et t. 8, pl. 37, fig. 8, Desh., 1824, Paris, 2, p. 287, pl. 38, fig. 5-7. France, Grignon. Parnes, Mouchy, Courtagnon; Angleterre.
- \*54. *abbreviata*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 288, pl. 38, fig. 8, 9. Grignon (Seine-et-Oise), Parnes, Mouchy, Chaumont, Thury-en-Va-lois (Oise).
- \*55. *multisulcata*, Lam., Ann. du Mus., t. 4, p. 217, n. 5, Desh., 1824, Paris, 2, p. 288, pl. 38, fig. 10, 11, 12. Grignon, Beynes, Maule, Blaincourt, Mouchy (Oise); Belgique, Aeltre.
- \*56. *terebellata*, Lain., 1804, Desh., n. 11, pl. 35, fig. 3-4. *T. sulcata*, Sow., 1813, M. C., pl. 39. Grignon, Courtagnon, Chaumont, Mouchy-le-Châtel, Thury-sous-Clermont (Oise); Belgique, Rouge-Cloître, Groenendael.
- \*57. *semi-striata*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 282, pl. 40, fig. 22-24. Berchère, près Houdan.
- \*58. *intermedia*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 283, pl. 37, fig. 17, 18, pl. 38, fig. 3, 4. Parnes, Courtagnon, Chaumont, Aumont.
- \*59. *imbricata*, Lam., Ann. du Mus., t. 4, p. 216, n. 1, t. 8, pl. 37, fig. 7, Desh., 1824, Paris, 2, p. 271, pl. 35, fig. 1, 2; pl. 36, fig. 7, 8; pl. 37, fig. 9, 10; pl. 38, fig. 1, 2. Nyst., pl. 37, fig. 4. France, Grignon, Parnes, Chaumont, Mouchy, St-Félix; Belgique, Rouge-Cloître, St-Josse, Groenendael, Affligem, Melsbroeck, Assche.
- \*60. *carinifera*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 273, pl. 36, fig. 1, 2. France, Chaumont, Parnes, Mouchy, Houdan, Ponchon (Oise), Faudon (Hautes-Alpes), Diablerets (Suisse).
- \*61. *perforata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 218, n. 7. Anim. s. vert., t. 7, p. 563, n. 7. Grignon, Parnes, Mouchy, Blaincourt (Oise).
- \*62. *fasciata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 217, n. 4, t. 8, p. 37, Anim. s. vert., t. 7, p. 562. Desh., 1824, Paris, 2, p. 284, pl. 39, fig. 1-20, pl. 38, fig. 13, 14, 17, 18. Grignon, Beynes, Parnes, Mouchy, P. S., Gomerfontaine, Tancrou.
- \*63. *uniangularis*, Lam., Ann. du Mus., t. 4, p. 219, n. 9. Anim. s. vert., t. 7, p. 563, n. 9. Desh., 1824, t. 2, p. 281, pl. 40, fig. 28, 29. Grignon, Mouchy, Blaincourt, Parnes.
- \*64. *Bouyana*, d'Orb., 1847. Espèce à tours lisses, unis, pourvus supérieurement d'une saillie en côte. France, Faudon (Hautes Alpes).
- \*65. *unisulcata*, Lam., Ann. du Mus., t. 4, p. 218, n. 8. Anim. s. vert., t. 7, p. 563, n. 8. Desh., 1824, Paris, 2, p. 280, pl. 37, fig. 13, 14. Grignon, Mouchy, Gomerfontaine, Hermès.
- \*66. *ambigua*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 277, pl. 37, fig. 3, 4. Parnes, Hermès, Château-Rouge (Oise).
- \*67. *subula*, Desh., n. 8, p. 277, pl. 37, fig. 15-16. Parnes, Mouchy-le-Châtel (Oise).
- \*68. *elongata*, Sow., 1814, Min. Conch., t. 1, p. 109, pl. 51, fig. 2. Angl., Christchurch, Barton-Cliff (Hampshire).
- \*69. *conoides*, Sow., 1814, Min. Conch., t. 1, p. 109, pl. 51, fig. 1, 4. Angl., Barton-Cliff (Hampshire); Subbington.

**\*70. edita**, Sow., 1814, Min. Conch., t. 1, p. 109, pl. 51, fig. 7. Angl., Christchurch, Barton-Cliff (Hampshire).

**\*71. brevis**, Sow., 1814, Min. Conch., 1, p. 110, pl. 51, fig. 5. Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgique, p. 398. Belgique, Lacken, Forêt, Jette, Orp-le-Grand; Angl., Barton.

**\*74. melanoides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 219, n. 10, Desh., 1824, Paris, 2, p. 289, pl. 40, fig. 25-27. Grignon.

**\*75. Mortoni**, Conrad, 1833. *T. Carinata*, Lea. États-Unis, Alabama, Clayborne.

**\*76. obruta**, Conrad, 1833. *T. lineata*, Lea. États-Unis, Alabama, Clayborne.

**\*77. vetusta**, d'Orb., *Protovetusta*, Conrad, 1833. *Cerithium striatum*, Lea. États-Unis, Alabama.

**CHEMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.

**\*78. canicularis**, d'Orb., 1847. *Melania canicularis*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 431, n. 5. Anim. s. vert., t. 7, p. 545, n. 5. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 109, pl. 13, fig. 16, 17, 26, 27. Grignon, Parnes.

**\*79. lævigata**, d'Orb., 1847. *Melania lævigata*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 110, pl. 13, fig. 18, 19. Damerie, près Epernay, Gomerfontaine, Mouy, Thury-sous-Clermont (Oise).

**\*80. hordacea**, d'Orb., 1847. *Melania hordacea*, Lamk. Anim. s. vert., t. 7, p. 544, n. 4. Ann. du Mus., p. 431, n. 4. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 108, pl. 13, fig. 14, 15, 22, 23. Grignon, la ferme de l'Orme, Maulette, près Houdan, Pierrelaye, Beauchamp, Triel, P. S., Tancrou, Acy-en-Multien, Livillier, Valmondois, Betz.

**\*81. costellata**, d'Orb., 1847. *Melania costellata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 430, n. 1, et t. 8, pl. 60, fig. 2. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 113, pl. 12, fig. 5, 6, 9, 10. France, Faudon (Hautes-Alpes), Courtagnon, Parnes, Chaumont, Mouchy, Valognes, P. S. Ver (Oise), Suisse-les-Diablerets.

**\*82. fragilis**, d'Orb., 1847. *Melania fragilis*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 433, n. 11. Anim. s. vert., t. 7, p. 546, n. 11. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 112, pl. 13, fig. 6, 7. Grignon.

**EULIMA**, Risso, 1825. Voy. vol. 1, p. 116.

**\*83. Floridana**, d'Orb., 1847. *Bulimus floridanus*, Conrad, 1846, Amer. journ., p. 399. États-Unis, Tampa-Bay.

**\*84. nitida**, d'Orb., 1847. *Melania nitida*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 432, n. 8, et t. 8, pl. 60, fig. 6. Anim. s. vert., t. 7, p. 546, n. 8. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 110, pl. 13, fig. 10-13. Grignon, Parnes, Mouchy, Hauteville (Manche), Chaumont, Lattainville; San-Giusto, près Volterre, en Italie.

**\*85. distorta**, d'Orb., 1847. *Melania distorta*, Defr., Dict. des Sc. nat., t. 29, p. 468. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 111, pl. 13, fig. 24, 25. Paris, Chaumont, Monneville.

**TURBONILLA**, Risso, 1825.

**\*86. hordeola**, d'Orb., 1847. *Auricula hordeola*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 436, n. 5. Anim. s. vert., t. 7, p. 539, n. 5. Deshayes, 1824, 2, p. 68, pl. 6, fig. 21, 22. Grignon, Longmont, Hermes (Oise).

**\*87. miliola**, d'Orb., 1847. *Auricula miliola*, Lamk., Ann. du Mus.,

- t. 4, p. 435, n. 4. Anim. s. vert., t. 7, p. 539, n. 4. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 69, pl. 6, fig. 19, 20. Grignon.
- \*88. *acicula*, d'Orb., 1847. *Auricula acicula*, Lam., pl. 60, fig. 9. Desh., n. 8, p. 71, pl. 8, fig. 6, 7. France, Creil, Thury-s.-Clermont, Chaumont, Blaincourt (Oise).
- \*89. *spina*, d'Orb., 1847. *Auricula spina*, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 2, p. 71, pl. 8, fig. 10, 11. France, Parnes, Creil, Tiverny (Oise).
- NISO**, Risso, 1825. *Bonellia*, Deshayes, 1833.
- \*91. *terebellata*, d'Orb., 1847. *Bonellia terebellata*, Desh. *Bulinus id.*, Desh., n. 4, pl. 9, fig. 1, 2. Le Vivray, Chaumont, Uilly-Saint-Georges (Oise), Grignon.
- \*92. *umbilicata*, d'Orb., 1847. *Pyramidella terebellata*, Conrad, 1833 (non *terebellatus*, Lam.). *Pasithea umbilicata*, Lea. États-Unis, Alabama.
- PYRAMIDELLA**, Lamarck, 1796. Voy. p. 191.
- \*93. *terebellata*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 191, pl. 22, fig. 7, 8. *Auricula terebellata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 436, n. 7, et t. 8, pl. 60, fig. 10. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Houdan.
- ACTEON**, Montfort, 1810. Voy. p. 263.
- \*94. *simulatus*, Sow., 1834, M. C., p. 248. *Bulla simulata*, Brander, 1766, pl. 4, fig. 61. *Auricula simulata*, Sow., 1817, M. C., pl. 163, fig. 5-8. Angleterre, Barton, Highgate.
- \*95. *sulcatus*, d'Orb., 1847. *Tornatella sulcata*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 187, pl. 22, fig. 3, 4. Nyst., pl. 37, fig. 20. *Auricula sulcata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 434, n. 1, et t. 8, pl. 60, fig. 7. France, Grignon (Seine-et-Oise), Courtagnon (Marne), Mouchy, Parnes, Chaumont, St-Félix (Oise); Belgique, Rouge-Cloître, Mons.
- \*96. *subinflatus*, d'Orb., 1847. *Tornatella inflata*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 188, pl. 24, fig. 4, 5, 6 (non DeFrance, 1819). Grignon, Courtagnon, Mouchy, Ermenonville, Valognes (Manche); Belgique, Bruxelles.
- \*97. *conovuliformis?*, d'Orb., 1847. *Auricula conovuliformis*, Desh., n. 1, pl. 6, fig. 9-11. Les Groux, Mouchy, Uilly-St-Georges, Parnes (Oise).
- \*98. *crenulatus*, Sow., 1824, Min. Conch., t. 5, p. 87, pl. 460, fig. 1. Angleterre, Londres, Barton.
- \*99. *elongatus*, Sow., 1824, Min. Conch., t. 5, p. 87, pl. 460, fig. 3. *Tornatella elongata?* Nyst., 1843, Belgique, pl. 37, fig. 23. Angl., Londres, Barton; Belgique, Héreuthals?, Calloo, Stuyvenberg?
- \*100. *pomilius*, Conrad, 1833. *A. punctatus*, Lea. *Monoptygma elegans*, Lea. États-Unis, Alabama.
- \*101. *idoneus*, Conrad, 1833. *A. lineatus*. États-Unis, Alabama.
- \*102. *costellatus*, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \*103. *latus*, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \*104. *melanellus*, Lea, 1833. *A. pygmaeus*, Lea. États-Unis, Alabama.
- PEDIPES**, Adanson, 1757.
- \*105. *ovata*, d'Orb., 1847. *Auricula ovata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 435, n. 2, et t. 8, pl. 60, fig. 8. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 68,

pl. 6, fig. 12, 13. Grignon, Maule, Auffreville, près Mantes, P. S., Tancrou.

- \***106. Alpina**, d'Orb., 1847. Assez grosse espèce ovale, lisse, à trois dents écartées. France, Faudon (Hautes-Alpes).

**RINGICULA**, Deshayes, 1838.

- \***107. ringens**, d'Orb., 1847. *Auricula ringens*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 435, n. 5, et t. 8, pl. 60, fig. 11. Desh., 1824, Paris, 2, p. 72, pl. 8, fig. 16, 17. *R. buccinea*, Desh., 1838 (non Brocchi). Hauteville (Manche).

- 108. turgida**, d'Orb., 1847. *Auricula turgida*, Sow., 1817, Min. Conch., 2, p. 143, pl. 163, fig. 4. Angl., Londres, Highgate.

**VOLVARIA**, Lamarck, 1801.

- \***109. bulloides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 5, p. 29, n. 1. Anim. s. vert., t. 7, p. 364, n. 6. Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 712, pl. 95, fig. 4-6. Nysl., pl. 44, fig. 8. France, Parnes, Grignon, Mouchy, Courtagnon, Chaumont; Belgique, Rouge-Cloître, Groenendael, St-Josse.

**NATICA**, Adanson, 1757. Voy. vol. 1, p. 29.

- \***110. caepacea**, Lamk., Ann. du Mus., t. 5, p. 96, n. 3, et t. 8, pl. 62, fig. 5. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 168, pl. 22, fig. 5, 6. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Hauteville (Manche).

- \***111. patula**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 169, pl. 21, fig. 3, 4. *Ampullaria patula*, Lam. Sow., Min. Conch., pl. 284, fig. 2. France, Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Gomerfontaine; Angl., Londres, Barton.

- \***112. sigaretina**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 170, pl. 21, fig. 5, 6. Sow., pl. 479, fig. 3. *Ampullaria sigaretina*, Lam. Sow., 1821, Min. Conch., pl. 284, fig. 3. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy; Angleterre, Londres, Hampshire.

- \***113. canaliculata**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 170, pl. 21, fig. 9, 10. *Ampullaria canaliculata*, Lam., 1804. Grignon, Parnes, Mouchy, Ver, Liancourt; Belgique, les Haigas, Rouge-Cloître, St-Josse, Bruxelles.

- \***114. Grignonensis**, d'Orb., 1847. *N. acula*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 173, pl. 21, fig. 7, 8 (non *acuta*, Sow., 1821). Grignon, Lattenville, Bomonvillers, P. S., Senlis, Valmondois, Assy.

- \***115. depressa**, Sow., 1812, Min. Conch., 1, p. 19, pl. 5, fig. 5, 6. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 174, pl. 20, fig. 12, 13. *Ampullaria depressa*, Lam., 1804. Chaumont, Parnes, Beynes, Houdan, Vexin, Thury-sous-Clermont; Angleterre, East-Cows, île de Wight.

- \***116. Parisiensis**, d'Orb., 1850, *N. mutabilis*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 175, pl. 21, fig. 11, 12 (non *mutabilis*, Brander, 1766). Grignon, Beynes, Courtagnon, P. S., Senlis, Beauchamp, Valmondois, Tancrou, Monneville, Valognes, Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes) (suivant M. Deshayes), Suisse-les-Diablerets. Angl., île de Wight.

- \***117. sphaerica**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 176, pl. 20, fig. 14, 15. Les Groux, Parnes, Mouchy, Maulette.

- \***118. scalariformis**, d'Orb., 1847. *Ampullaria scalariformis*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 138, pl. 16, fig. 8, 9. Parnes (Oise).

- \***119. Parnensis**, d'Orb., 1847. *Ampullaria spirata*, Deshayes,



1824, Paris, 2, p. 138, pl. 16, fig. 10, 11 (non Sow., 1821). Grignon, Parnes, Mouchy, Mont-l'Évêque (Oise).

- \***120. acuminata**, d'Orb., 1847. *Ampullaria acuminata*, Lamk. D sh., 1824, Paris, 2, p. 139, pl. 17, fig. 9, 10. Grignon, la ferme de l'Orme, Parnes, Liancourt, Mouchy, les Groux.
- \***121. labellata**, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 5, p. 95, n. 1. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 164, pl. 20, fig. 3, 4. Grignon, Beynes, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Chaumont, Damerie, P. S., Beauchamp, Valmondois, Lizy-sur-Ourcq, Assy, Faudon, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes).
- \***122. epiglottina**, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 5, p. 95, n. 2, et t. 8, pl. 62, fig. 6. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 165, pl. 20, fig. 5, 6-11. Grignon, Parnes, Courtagnon, Mouchy, Gilocourt, Creil, Oignes (Oise), Ver, la Chapelle.
- 124. pygmæa**, d'Orb., 1847. *Ampullaria pygmæa*, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 75, p. 30, n. 1, t. 8, pl. 61, 6. Anim. s. vert., t. 7, p. 547, n. 1. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 141, pl. 17, fig. 15, 16. Grignon, Chaumont, Marquemont.
- \***125. mutabilis**, d'Orb., 1847. *Helix mutabilis*, Brander, 1766, p. 28, fig. 59 (exclus. 57, 58). *Ampullaria acuta*, Lam., 1804. Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 151, pl. 284, fig. 1. *Ampullaria Villemetti*, Desh., 2, p. 141, pl. 17, fig. 11, 12. Angleterre, Londres, env. de Christchurch; France, Grignon, Mouchy, Parnes, Lentilles.
- 126. ambulacrum**, d'Orb., 1847. *Ampullaria ambulacrum*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 4, p. 97, pl. 372. Angl., Londres, Hordwell, Muddiford, Subbington.
- \***127. glaucinoides**, Sow., 1832, Min. Conch., 1, p. 19, pl. 5. Angleterre, Highgate.
- 128. Hautoniensis**, Sow., 1804, Trans. Lin. Soc., vol. 7, pl. 2, fig. 10. *N. striata*, Sow., 1822, M. C., pl. 373. Angleterre, Barton, Herne-Bay, Bracklesham-Bay.
- 129. gigantea**, d'Orb., 1847. *Ampullaria gigantea*, Galeotti, Nyst., 1843, Coq. Tert. de Belgique, p. 407. Galeotti, 1837, Mém. acad. Brux., 12, p. 70 et 144, pl. 4, fig. 14. Bruxelles, Groenendael.
- 130. similis**, Sow., 1812, Min. Conch., t. 1, p. 19, pl. 5, fig. 3, 4. Angl., Londres, Highgate.
- \***131. subcæpacea**, d'Orb., 1847. Espèce très-voisine du *N. cæpacea*, à tours embrassants, comme dans cette espèce, mais bien plus déprimée. Faudon (Hautes-Alpes), St-André-de-Meouille (Basses-Alpes).
- \***132. Vapincana**, d'Orb., 1847. Grosse espèce voisine du *N. Vulcani*, mais plus ovale, à tours de spire plus saillants, légèrement striés en long. Faudon (Hautes-Alpes).
- \***133. Rouyana**, d'Orb., 1847. Petite espèce voisine, par son labre épais, en dedans, du *N. patula*, mais plus ovale et sans ombilic ouvert. Faudon, Ancelle, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes), Suisse-les-Diablerets.
- \***134. ætites**, Conrad, 1833. *N. gibbosa*, Lea. *N. semilunata*, Lea. États-Unis, Alabama.

\***135. eminula**, Conrad, 1833. *N. parva*, Lea. États-Unis, Alabama.

\***136. limula**, Conrad, 1833. *N. mamma*, Lea. États-Unis, Alabama.

**137. eborea**, Conrad, 1833. *Turbo naticoides*, Lea. États-Unis, Alabama.

**SIGARETUS**, Adanson, 1757.

\***138. canaliculatus**, Sow., 1823, Min. Conch., pl. 584. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 182, pl. 21, fig. 13, 14. Nyst., Belgique, pl. 39, fig. 4. France, Grignon, Chaumont, Courtagnon, Mouchy, P. S., Senlis, Tancrou, Valognes; Angleterre, Londres, Hordwell; Belgique, Bruxelles, St-Josse, Groenendael, Aeltre, Bruges, Bolbersberg.

**139. laevigatus**, Deshayes, 1824, 2, p. 183, pl. 23, fig. 5, 6. Grignon.

\***140. pellucidus**, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 2, p. 184, pl. 23, fig. 13, 14. France, Chaumont, Parnes (Oise).

\***141. bilix**, Conrad, 1833. *Natica striata*, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.

\***142. arctatus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**143. declivis**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**NERITA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 214.

\***144. mammaria**, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 5, p. 94, n. 3. Anim. s. vert., t. 7, p. 551, n. 3. Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 161, pl. 19, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, Mouchy-le-Châtel.

**145. sublineolata**, d'Orb., 1847. *Neritina lineolata*, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 152, pl. 19, fig. 7, 8 (non Lam., 1822). France, Houdan.

**146. elegans**, d'Orb., 1847. *Neritina elegans*, Deshayes, 1804, Paris, 2, p. 154, pl. 19, fig. 3, 4. France, Houdan.

\***147. tricarinata**, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 5, p. 94, n. 2, et t. 8, pl. 62, fig. 4. Deshayes, 1824, 2, p. 160, pl. 19, fig. 9, 10. Houdan, Valognes.

**148. globosa**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 29, pl. 424, fig. 1. Angl., Londres, Hampshire.

**149. concava**, Sow., 1823, Min. Conch., 4, p. 118, pl. 385, fig. 1-8. Angl., île de Wight, Highgate, Charlton.

**150. aperta**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 29, pl. 424, fig. 2-4. Angl., Londres, île de Wight, Barton.

\***151. granulosa**, Deshayes. Voir n. 1440. France, Faudon, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes).

**PILLEOLUS**, Sowerby.

**152. neritoides**, Desh., n. 1, pl. 17, fig. 17, 18. Parnes, Mouchy-le-Châtel, Mouy (Oise).

**PHORUS**, Montfort, 1810.

\***153. confusus**, d'Orb., 1847. *Trochus confusus*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 243, pl. 31, fig. 3, 4. Parnes, Mouchy, Valmondois.

\***154. parisiensis**, d'Orb., 1847. *Trochus agglutinans*, Lamk., Sow.; Desh., 1824, Paris, 2, p. 241, pl. 31, fig. 8-10 (non *agglutinans*, Linné, 1767). Grignon, Parnes, Mouchy, P. S., Valmondois, la Chapelle, Blaye (Gironde), Chaumont; Angl., Barton; Belgique, envir. de Bruxelles.

**155. extensus**, d'Orb., 1847. *Trochus extensus*, Sow., 1821, Min. Conch., pl. 278, fig. 2, 3. Angleterre, Highgate, île de Scheppey, et Barton.

**TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 64.

\***156. funiculosus**, Deshayes, 1824, Paris, 2, p. 234, pl. 27, fig. 4, 5. France, Parnes, Mouchy.

\***157. Lamarckii**, Desh., 1824, 2, p. 234, pl. 27, fig. 9, 10, 11. Beynes, Grignon, Maulette, Mouchy.

**158. subelatus**, d'Orb., 1847. *T. elatus*, Deshayes, 1824, 2, p. 235, pl. 29, fig. 5-8 (non Lam., 1822). Mouchy, Lattainville (Oise).

\***159. sulcatus**, Lamk., 1804. Desh., 1824, Paris, 2, p. 236, pl. 29, fig. 1-4. Grignon, Beynes, Mouchy, Parnes, les Groux, Lattainville.

\***160. crenularis**, Lamk., 1804. Desh., 1824, Paris, 2, p. 229, pl. 27, fig. 3; pl. 28, fig. 13-15. Grignon, Courtagnon (Marne), Parnes, Mouchy, Villy-St-Georges (Oise).

\***161. ornatus**, Lamk., 1804, Desh., 1824, 2, p. 230, pl. 27, fig. 1, 2; pl. 28, fig. 10-12. Grignon, Beynes, Parnes, Mouchy.

\***162. mitratus**, Desh., 1824, 2, p. 233, pl. 27, fig. 6, 7, 8, 12, 13, 14. Parnes, Mouchy, le Vivray, Hermes.

**164. Benettii**, Sow., 1814, Min. Conch., t. 1, p. 223, pl. 98, fig. 2. Angl., Londres, Barton.

**166. pygmaeus**, d'Orb., 1847. *Turbo pygmaeus*, Desh., 1824, 2, p. 256, pl. 33, fig. 16-18. Parnes, Lattainville, Gomerfontaine.

**166. Aurelius**, d'Orb., 1847. *Turbo laevigatus*, Desh., 1824, 2, p. 257, pl. 33, fig. 13-15 (non Gmel., 1789). Grignon, Chaumont.

**167. helicinoides**, d'Orb., 1847. *Turbo helicinoides*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 257, pl. 31, fig. 11-13. Parnes, Grignon, Mouchy, Courtagnon, Valognes.

**168. planorbularis**, d'Orb., 1847. *Turbo planorbularis*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 258, pl. 33, fig. 19-22. Houdan, Aumont.

**169. striatulus**, d'Orb., 1847. *Turbo striatulus*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 253, pl. 30, fig. 10-13. Vivray, près Chaumont.

\***170. Drusius**, d'Orb., 1847. *Turbo bicarinatus*, Desh., 1824, 2, p. 259, pl. 33, fig. 5-8 (non *bicarinatus*, Lam., 1805). Grignon, Parnes, Mouchy, Mouy.

\***171. Alpinus**, d'Orb., 1847. Espèce trochiforme, aussi haute que large, à tours de spire carénés, pourvus, du côté de l'ombilic, de cinq grosses et de cinq petites côtes. Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes).

**PITONELLUS**, Montfort, 1810. Voy. vol. 1, p. 64.

\***172. dubius**, d'Orb., 1847. *Helicina dubia*, Lamk., Ann. du Mus., t. 5, p. 91. Deshayes, 1824, 2, p. 58, pl. 6, fig. 14, 15. Grignon, Mouchy, Chaumont, P. S., Ermenonville.

**SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. vol. 1, p. 300.

\***173. plicatum**, Lamk., 1804. Desh., 1824, 2, p. 219, pl. 24, fig. 16-18. Sow., Min. Conch., pl. 524, fig. 2. Parnes, Grignon, Courtagnon, Mouchy, Château-Rouge, le Vivray, Chaumont, Valognes; Angl., Barton.

\***174. canaliculatum**, Lam., 1804. Desh., 1824, 2, p. 220, pl. 24,

- fig. 19-21. Sow., 1826, Min. Conch., p. 524, fig. 1. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, P. S., Valmondois, Mary, Betz; Angleterre, Barton.
- \***175. patulum**, Lamk., 1804. Desh., 1824, 2, p. 215, pl. 26, fig. 11-14; pl. 40, fig. 14-16. Sow., 1818, Min. Conch., pl. 11, fig. 1. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, le Vivray, Chaumont, Saint-Félix; Angl., Highgate.
- \***176. spiratum**, Lamk., 1804. Deshayes, 1824, 2, p. 216, pl. 26, fig. 5-7. Nyst., pl. 35, fig. 17. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, P. S., Valmondois; Belgique, Rouge-Clotire.
- 177. discoideum**, Sow., 1813, Min. Conch., 1, p. 35, pl. 11, fig. 2. Angl., Barton-Cliff.
- 178. Nystii**, Galeotti, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belg., p. 373, pl. 36, fig. 8. Belgique, Landen, Bruxelles, Lacken, Forêt, Uccle, Jette, St-Gilles, Loo, Gand, Groenendael, Melsbroeck, Assche, Afflighem, Orp-le-Grand.
- 180. grande**, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgique, p. 368, pl. 34, fig. 5. Bruxelles, Schaerbeck.
- 181. cancellatum**, Conrad, 1833. *S. cancellatum*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 182. syrtalis**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \***183. elaboratum**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \***184. alveatum**, Conrad, 1833. *S. bilineatum*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 185. funginum**, Conrad, 1833. *S. Henrici*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 186. Exacutum**, Conrad, 1833. *Delphinula plana*. Lea. États-Unis, Alabama.
- 187. ornatum**, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.
- 188. antrosum**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 189. scrobiculatum**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 190. stalagmium**, Conrad, 1833. *S. elegans*, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.
- 191. amœnum**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 192. pseudo-granulatum**, d'Orb., 1847. *S. granulatum*, Lea, 1833 (non Lam., 1822). États-Unis, Alabama.
- BIFRONTIA**, Deshayes, 1824.
- \***193. bifrons**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 222, pl. 24, fig. 23-25. Grignon, Parnes, Courtagnon, Mouchy.
- \***194. disjuncta**, Deshayes, 1824, 2, p. 223, pl. 26, fig. 21, 22. Grignon, Parnes, Courtagnon, Monneville.
- \***195. marginata**, Desh., 1824, 2, p. 224, pl. 26, fig. 19, 20. Grignon, Mouchy, Parnes, Valognes, Chaumont, les Groux, Acy; Belgique, Jette.
- \***196. serrata**, Deshayes, 1824, 2, p. 225, pl. 26, fig. 17, 18. Nyst., pl. 35, fig. 15. Grignon, Chaumont, Parnes, Courtagnon, Mouchy; Belgique, Aeltre.
- SERPULARIA**, Römer.
- \***197. spiruloides**, d'Orb., 1849. *Cyclostoma spiruloides*, Lamk.,

Ann. du Mus., t. 4, p. 114, n° 2. Deshayes, 1824, 2, p. 78, pl. 7, fig. 15, 16. Grignon.

**DELPHINULA**, Lamarck, 1804. Voy. vol. 1, p. 191.

\***198. spiruloides**, Deshayes, 1824, 2, p. 209, pl. 26, fig. 1-4. Grignon.

\***199. canalifera**, Lam., 1804, Desh., 1824, Paris, 2, p. 210, pl. 25, fig. 12-15. Grignon, Parnes, Mouchy, Lattainville.

\***200. Warnii**, Defr., Desh., 2, p. 204, pl. 24, fig. 12, 13. Château-Rouge, Ully-St-Georges, Mouchy-le-Châtel, Hauteville, près Valognes, Parnes.

**TURBO**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 5.

\***201. turbinoides**, d'Orb., 1847. *Delphinula turbinoides*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 207, pl. 34, fig. 15-18. Grignon, Chaumont, Mouchy, Parnes.

**202. Lamarckii**, d'Orb., 1847. *Delphinula striata*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 207, pl. 34, fig. 8, 9, 10, 11, 19, 20 (non *striatus*, Adams, 1795). Env. de Paris, Chaumont, Mouchy.

\***203. marginatus**, d'Orb., 1847. *Delphinula marginata*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 208, pl. 23, fig. 17-20. Grignon, Mouchy, Courtagnon, Parnes, Valognes.

\***204. sigaretiformis**, Desh., 1824, 2, p. 254, pl. 30, fig. 14-18. Parnes.

**205. subcalcar**, d'Orb., 1847. *Delphinula calcar*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 110, n° 1, et t. 8, pl. 36, fig. 1. Deshayes, 1824, 2, p. 203, pl. 23, fig. 11, 12 (non *Calcar*, Bronn, 1780). Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, P. S., Senlis.

\***206. subtrochiformis**, d'Orb., 1847. *Turbo trochiformis*, Desh., 1824, 2, p. 252, pl. 32, fig. 10, 11, pl. 40, fig. 36, 37 (non Brocchi, 1814). Beynes, Chaumont, le Vivray, Thiescourt.

**207. cornu-pastoris**, d'Orb., 1847. *Cyclostoma cornu-pastoris*, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 114, n. 1. Grignon, Lattainville.

**208. sculptus**, Sow., Min. Conch., pl. 395, fig. 2. Desh., 1824, 2, p. 262, pl. 30, fig. 19-22. Houdan, Mouchy-le-Châtel, Chaumont; Angl., Barton.

**209. Henrieti**, Caillat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine-et-Oise, p. 6, pl. 9, fig. 1. France, Grignon.

\***210. denticulatus**, Lamk., 1804, Desh., 1824, 2, p. 255, pl. 34, fig. 1-4. Grignon, Parnes, Mouchy, Lattainville.

**211. sulciferus**, Desh., 1824, 2, p. 255, pl. 33, fig. 1-4, pl. 40, fig. 38-41. Grignon, Parnes, Chaumont, Blaincourt.

**212. conicus**, d'Orb., 1847. *Delphinula conica*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 205, pl. 24, fig. 14, 15. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Hauteville (Manche), Lattainville.

**PHASIANELLA**, Lamarck, 1804. Voy. vol. 1, p. 67.

**213. turbinoides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 296, n° 1. Desh., 1824, 2, p. 265, pl. 40, fig. 1-4. Grignon, Parnes, Courtagnon, Mouchy, Damerie, Chaumont.

\***214. parisiensis**, d'Orb., 1847. *P. pullus*, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 49, n° 31. Deshayes, 1824, 2, p. 265, pl. 40, fig. 5-7 (non

*Pullus*, Gmelin, 1789). Grignon, Chaumont, Parnes, Uilly-Saint-Georges.

\***215. semi-striata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 297, n° 2. Desh., 1824, 2, p. 266, pl. 40, fig. 8-10. Grignon, Mouchy, Blaincourt, Hénonville.

**216. multisulcata**, Desh., 1824, 2, p. 267, pl. 38, fig. 19-21. Houdan.

**217. melanoides**, Desh., 1824, 2, p. 268, pl. 34, fig. 20-22. Houdan.

**218. tricostalis**, Desh., 1824, 2, p. 268, pl. 34, fig. 23-25. Houdan.

**PLEUROTOMARIA**, DeFrance, 1825. Voy. vol. 1, p. 7.

\***219. concava**, Desh., 1824, 2, p. 246, pl. 32, fig. 1-3. Mouchy-le-Châtel, Chaumont, le Vivray (Oise).

**SILIQUARIA**, Bruguière, 1791.

\***220. lima**, Lam., Anim. s. vert., n° 6. Chenu, Ill., p. 2, pl. 2, fig. 3. Uilly-St-Georges, Acy-en-Multien, Fosse-Martin (Oise).

**221. multistriata**, DeFr., Chenu, Illust., p. 3, pl. 2, fig. 2. Marquembourg, Hermes (Oise).

\***222. oclusa**, Chenu, Illust., p. 4, pl. 2, fig. 7. Parnes, Mouchy-le-Châtel (Oise).

**223. spinosa**, Lam., Anim. s. vert., n° 5, p. 585. Chenu, Illustr., p. 3, pl. 2, fig. 5. Chaumont, Uilly-St-Georges (Oise).

\***224. striata**, DeFrance, Dict., t. 49, p. 214. Chenu, Illustr., p. 4, pl. 2, fig. 10. Chaumont, Mouchy-le-Châtel, Acy-en-Multien (Oise).

\***225. vitis**, Conrad, 1833. *S. Claibornensis*, Lea, 1833. Etats-Unis, Alabama, Claiborne.

**CYPRÆA**, Linné, 1740.

**226. oviformis**, Sow., 1812, Min. Conch., t. 1, p. 17, pl. 4. Angl., Highgate.

**227. angystoma**, Desh., 1824, 2, p. 723, pl. 95, fig. 39, 40. Chaumont.

**228. crenata**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 728, pl. 94 bis, fig. 30-32. France, le Vivray, près Chaumont.

\***229. inflata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 116, n° 1, et t. 6, pl. 34, fig. 1. Desh., 1824, 2, p. 724, pl. 97, fig. 7, 8. Grignon, Parnes, Mouchy, Amblainville, Thury-sous-Chaumont.

\***230. elegans**, DeFr., Dict. des Sc. nat. art. Porcelaine. Desh., 1824, 2, p. 725, pl. 97, fig. 3-6. Grignon, Mouchy, Parnes, Acy et Hauteville (Manche), Chaumont, Faudon, Ancelle (Hautes-Alpes).

\***231. sulcosa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 116, n. 3. Desh., 1824, 2, p. 726, pl. 97, fig. 1, 2. *Cypræa dactylosa*, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 407, n. 13. Mouchy, Parnes, Acy-en-Multien.

**OVULA**, Bruguière, 1791.

**232. intermedia**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 718, pl. 95, fig. 34-36. France, Grignon, Beynes.

**MARGINELLA**, Lamarek, 1801.

\***233. eburnea**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 61, n. 1, et t. 6, pl. 44, fig. 9. Desh., 1824, 2, p. 707, pl. 95, fig. 14-16, 20-21. Grignon,

Parnes, Courtagnon, Mouchy, Ermenonville, Acy, le Tombray; Italie, Ronca ?

\***234. dentifera**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 61, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 707, pl. 94 bis, fig. 27-29. Grignon.

\***235. hordeola**, Desh., 1824, 2, p. 708, pl. 95, fig. 26-29. Grignon, Parnes, Lierville, Hénonville, Thury.

\***236. ovulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 61, n. 3, et t. 6, pl. 44, fig. 10. Desh., 1824, 2, p. 709, pl. 95, fig. 12, 13. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Vexin, Acy.

\***237. nitidula**, Desh., 1824, 2, p. 709, pl. 95, fig. 10, 11. Parnes.

\***238. angustoma**, Desh., 1824, 2, p. 710, pl. 95, fig. 22-25. France, Parnes, Grignon, Mouchy, Chaumont, St-Félix.

\***239. larvata**, Conrad, 1833. *M. ovata*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

**240. crassilabra**, Conrad, 1833. *M. anatina*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

\***241. constricta**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.

**242. humerosa**, Conrad, 1833. *M. crassilabra*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

**243. columba**, Lea, 1833. Etats-Unis, Alabama.

**OLIVA**, Lamarck, 1801.

\***244. nitidula**, Desh., 1824, 2, p. 741, pl. 96, fig. 19, 20. Grignon, B-ynes, Courtagnon (Marne), Parnes, Mouchy, Hénonville (Oise).

\***245. mitreola**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 23, n. 2, et t. 6, pl. 44, fig. 4, t. 16, p. 328, n. 4. Desh., 1824, 2, p. 742, pl. 96, fig. 21, 22. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Valmondois, Rougeville.

**246. Salisburyana**, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 159, pl. 288, fig. 2. Angl., Londres, Barton.

\***247. Alabamensis**, Conrad, 1833. *O. Greenoughii*, Lea. *O. dubia*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

\***248. Philippsii**, Lea, 1833. Etats-Unis, Alabama.

\***249. bombylis**, Conrad, 1833. *O. constricta*, Lea. *O. gracilis*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

**ANCYLLARIA**, Lamarck, 1801.

\***250. buccinoides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 16, p. 304, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 730, pl. 97, fig. 11-14. Grignon, Parnes, Mouchy, Maulette, Courtagnon, P. S., Valmondois, Betz, Tancrou, Valognes; Belgique; Angleterre, Barton.

\***251. glandina**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 731, pl. 96, fig. 1, 2. Courtagnon, Lattainville, P. S., Ver, Seulis.

\***252. canalifera**, Lamk., 1802, Anim. s. vert., t. 7, p. 439, n. 1. Desh., 1824, 2, p. 734, pl. 96, fig. 14, 15. *Ancyllaria turritella*, Sow., 1826, Min. Conch., pl. 39, fig. 1, 2. France, Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Assy; Angl., Barton.

\***253. olivula**, Lamk., Ann. du Mus., t. 16, p. 306, n. 4. Desh., 1824, 2, p. 734, pl. 96, fig. C, 7, 10, 11. *Ancilla olivula*, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 475. Grignon, Courtagnon, Mouchy, Vexin, Boucon-villers.

- \***254. dubia**, Desh., 1824, 2, p. 734, pl. 96, fig. 3, 4, 5, 8, 9. Grignon, Mouchy, Beauchamp, Acy, Vensigny, Ermenonville.
- \***256. aveniformis**, Sow., 1815, Min. Conch., t. 1, p. 225, pl. 99, fig. 1. Angl., Barton.
- \***257. turritella**, Sow., 1815, t. 1, p. 225, pl. 99, fig. 2. Barton.
- \***258. scamba**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- \***259. altilis**, Conrad, 1833. *Anolax gigantea*, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- \***260. subglobosa**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- \***261. lymneoides**, Conrad, 1833. *Monoptygma Alabamiensis*, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- \***261'. staminea**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- \***262. prætenuis**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- TEREBELLUM**, Lamarck, 1801.
- \***263. sopitum**, d'Orb., 1847. *Bulla sopita*, Brander, 1766, pl. 1, fig. 29. *Terebellum convolutum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 16, p. 301, n. 2; t. 6, pl. 44, fig. 3. Desh., 1824, 2, p. 737, pl. 95, fig. 32, 33. Sow., pl. 286. France, Grignon, Parnes, Mouchy, Valognes, Blaye (Gironde); Angleterre, Barton; Belgique, Forêt, Gand, Affligem.
- VOLUTA**, Linné, 1758. Voy. p. 154.
- \***264. harpula**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 478, n. 9 et t. 17, p. 78, n. 13; Desh., 1824, 2, p. 702, pl. 91, fig. 10, 11. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Valognes; Angl., Barton; Belgique, St-Josse-ten-Noode, Rougecloître.
- \***265. variculosa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 479, n. 13; t. 17, p. 79, n. 17. Desh., 1824, 2, p. 703, pl. 94, fig. 8, 9. Grignon, Mouchy, Lattainville.
- \***266. mitreola**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 479, n. 14 et t. 17, p. 80, n. 18; Desh., 1824, 2, p. 704, pl. 94 bis, fig. 12-14. Grignon, Lattainville, Parnes.
- \***267. mixta**, Nyst., 1843, Belgique, pl. 48, fig. 18. *Cochlea mixta*, Chemn., 1795, Conch., pl. 212, fig. 3010, 3011. *V. costaria*, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 1, p. 477, n. 5; t. 17, p. 76, n. 6. Desh., 1824, 2, p. 698, pl. 94, fig. 16, 17. Sow., pl. 290, fig. 1-4. Grignon (Seine-et-Oise), Mouchy, Parnes, Vexin, Villy (Oise); Anglet., Barton; Belgique, Bruxelles, Rougecloître, St-Josse, Grœnendaël.
- \***268. torulosa**, Desh., 1824, 2, p. 299, pl. 91, fig. 12-15. Parnes, Mouchy, Chaumont, Hénouville.
- \***269. lyra**, Lamk. Ann. du Mus., t. 1, p. 478, n. 6 et t. 17, p. 76, n. 7. Desh., 1824, 2, p. 685, pl. 92, fig. 3, 4. Parnes, Mouchy, Chaumont, P. S., Senlis.
- \***270. bulbula**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 478, n. 11. Desh., 1824, 2, p. 685, pl. 90, fig. 13, 14. Grignon, Courtagnon, Parnes, Vexin, St-Félix, Rets; Belgique, Rougecloître.
- \***271. lineolata**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 686, pl. 92, fig. 11, 12. Parnes, Mouchy.
- \***272. bicorona**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 478, n. 7 et t. 17, p. 76, n. 8. Desh., 1824, 2, p. 692, pl. 90, fig. 16, 17. Parnes, Chaumont, Thury (Oise).
- \***273. crenulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 478, n. 8 et t. 17,



p. 77, n. 9. Desh., 1824, 2, p. 693, pl. 93, fig. 7-9. Parnes, Grignon, Vicentin, val Sangonini.

\***274. mitrata**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 696, pl. 94, fig. 1, 2. Parnes, Mouchy, Lattainville, Chambors (Oise).

\***275. muricina**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 477, n. 4 et t. 17, p. 75, n. 5. Desh., 1824, 2, p. 697, pl. 91, fig. 18, 19; pl. 93, fig. 3, 4; pl. 94, fig. 3, 4. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Chaumont.

\***276. subturgidula**, d'Orb., 1847. *V. turgidula*, Desh., 1824, 2, p. 700, pl. 90, fig. 9, 10 (non Brocchi, 1814). Parnes, Courtagnon, Château-Rouge.

\***277. cythara**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 346, n. 1; *Voluta harpa*, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 476, et t. 17, p. 74, n. 1 (non Linné). Desh., 1824, 2, p. 681, pl. 90, fig. 11, 12. Grignon, Courtagnon, Parnes, Hattencourt, Hermes; Belgique, Bruxelles, Panisel, près de Mons; Anglet., Braklesham.

\***278. spinosa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 477, n. 2 et t. 17, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 690, pl. 92, fig. 7, 8. *Strombus spinosus*, Chemnitz, Sow., Min. Conch., pl. 115, fig. 2-4. *Conus spinosus*, Linné, 1758. Grignon, Courtagnon, Parnes, St-Félix; Anglet., Barton; Belgique, St-Josse-ten-Noode, St-Gilles, Forêt, Afflighem.

\***279. musicalis**, Chemnitz, 1795, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 477, n. 3, t. 6, pl. 43, fig. 7 et t. 17, p. 75, n. 3. Desh., 1824, 2, p. 695, pl. 94, fig. 17, 18. Grignon, Beynes, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Retz, Tancrou, Valmondois.

**280. suspensa**, Sow., 1816, Min. Conch., t. 2, p. 29, pl. 115, fig. 5. Angleterre, Barton.

**281. magnorum**, Sow., 1821, t. 3, p. 164, pl. 290, fig. 3. Barton.

**282. luctator**, Sow., 1816, 1823, t. 4, p. 134, pl. 397; pl. 115, fig. 1. Barton.

**283. nodosa**, Sow., 1823, t. 4, p. 135, pl. 399, fig. 2. Barton.

**284. geminata**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 136, pl. 398, fig. 1. Anglet., Londres, Lindhurst; France, env. de Paris.

**289. ventricosa**, DeFr., Desh., 1824, Paris, 2, p. 683, pl. 92, fig. 9, 10. Parnes, Courtagnon, Lattainville, Mouy.

\***290. Sayana**, Conrad, 1833, *V. Defrancii*, Lea, *V. gracilis*, Lea, *V. parva*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

\***291. petrosa**, Conrad, 1833, *V. Vanuxemi*, Lea. Etats-Unis, Alabama.

*N. B.* Plus trois espèces de *Voluta* d'Alabama, peut-être décrites sous les noms de *Turbinella*, *Pyruloides*, *Pratensis* et *Prisca*, Conrad.

**MITRA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 154.

\***292. citharella**, d'Orb., 1817. *Auricula citharella*, Desh., n. 6, p. 70, pl. 8, fig. 4, 5. Parnes, Mouchy (Oise), Grignon, Hauteville (Manche).

\***293. Delucii**, DeFr., Dict., t. 31, p. 493. Desh., n. 2, pl. 89, fig. 9, 10. Parnes, Gypseul, Liancourt (Oise).

\***294. elongata**, Lam., Desh., n. 1, pl. 89, fig. 7, 8. Vexin, Mouchy-le-Châtel, St-Félix (Oise).

\***295. monodonta**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 304, n. 2. Ann.

- du Mus., n. 2. Desh., 1824, Paris, 2, p. 671, pl. 88, fig. 24-26. Grignon, Parnes, Mouchy, Valognes.
- \***296. labratula**, Lamk., Ann. du Mus., n. 5. Anim. s. vert., t. 7, p. 325, n. 5. Desh., 1824, 2, p. 672, pl. 88, fig. 9, 10-18, 19. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Chaumont, St-Félix, le Tomberay.
- 297. labrosa**, Desh., 1830, 2, p. 672, pl. 88, fig. 20, 21. Mouchy, Chaumont, Parnes.
- \***298. subcostulata**, d'Orb., 1847. *M. costulata*, Desh., 1830, 2, p. 673, pl. 90, fig. 1, 2 (non Risso, 1826). Mouchy, Parnes, Marquemont.
- \***299. mutica**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 326, n. 12. Ann. du Mus., p. 60, n. 12. Desh., 1824, 2, p. 674, pl. 88, fig. 27, 28. Grignon, Lierville, Uilly-St-Georges.
- 300. subplicata**, Desh., 1824, 2, p. 675, pl. 89, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, le Vivray, Valmondois.
- \***301. raricosta**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 325, n. 6. Ann. du Mus., n. 6. Desh., 1824, 2, p. 675, pl. 88, fig. 11, 12. Parnes, Grignon, Hermes, Lattainville.
- \***302. crassidens**, Desh., 1824, 2, p. 676, pl. 90, fig. 3, 4-7, 8. Grignon, Mouchy, Lattainville.
- 303. obliquata**, Desh., 1824, 2, p. 677, pl. 89, fig. 3, 4; pl. 90, fig. 5, 9. Parnes, Mouchy, Marquemont.
- \***304. Parisiensis**, Desh., 1824, 2, p. 677, pl. 89, fig. 16, 17. Parnes, Mouchy.
- \***305. crebricosta**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 324, n. 1. Ann. du Mus., t. 2, p. 58, n. 1. Desh., 1824, Paris, 2, p. 666, pl. 89, fig. 21, 22. Parnes, Mouchy, Uilly (Oise), Faudon (H.-Alpes).
- 306. plicatella**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 324, n. 4. Ann. du Mus., n. 4 et t. 6, pl. 44, fig. 8. Desh., 1824, 2, p. 667, pl. 88, fig. 7, 8. Grignon, Parnes, Mouchy, Hauteville (Manche).
- \***307. fusellina**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 326, n. 10. Ann. du Mus., n. 10. Desh., 1824, 2, p. 667, pl. 89, fig. 18-20. Grignon, Parnes, Mouchy, P. S., Monneville, Ver (Oise).
- \***308. terebellum**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 325, n. 9. Ann. du Mus., n. 9. Desh., 1824, 2, p. 668, pl. 89, fig. 14, 15. Parnes, Grignon, Courtagnon, Mouchy, Chaumont, Aumont, P. S., Saint-Sulpice, Morte-Fontaine.
- \***309. marginata**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 324, n. 3. Ann. du Mus., n. 3 et t. 6, pl. 44, fig. 7. Desh., 1824, 2, p. 669, pl. 88, fig. 13, 14. Parnes, Grignon, Uilly, env. de Valognes.
- \***310. cancellina**, Lamk., Ann. du Mus., n. 8. Anim. s. vert., t. 7, p. 325, n. 8. Desh., 1824, 2, p. 669, pl. 88, fig. 15-17. Parnes, Grignon, P. S., Senlis, la Chapelle, Faudon (H.-Alpes).
- 311. graniformis**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 326, n. 11. Ann., n. 11. Desh., 1824, 2, p. 670, pl. 89, fig. 11-13. Parnes, Mouchy-le-Châtel, Chaumont.
- \***312. mixta**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 325, n. 7. Ann., p. 59, n. 7. Desh., 1824, 2, p. 670, pl. 88, fig. 22, 23-29, 30. Grignon, Parnes.

- 313. scabra**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 141, pl. 401. Angleterre, Londres, Barton.
- 314. parva**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 37, pl. 430, fig. 1. Anglet., Londres, Barton, Hants.
- 315. pumila**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 37, pl. 430, fig. 2. Anglet., Londres, Barton.
- 316. striatolata**, Desh., 1824, 2, p. 503, pl. 79, fig. 29, 30. France, Mouchy-le-Châtel.
- \***317. pactilis**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- \***318. perexilis**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- 319. fusoides**, Lea, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- CANCELLARIA**, Lamarck, 1801.
- \***320. costulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 63, n. 1 et t. 6, pl. 44, fig. 11. Desh., 1824, 2, p. 499, pl. 79, fig. 22, 23. Parnes, Courtagnon, Mouchy, la Chapelle.
- \***321. granifera**, Desh., 1824, 2, p. 500, pl. 79, fig. 34, 35. Grignon, Parnes, Chaumont.
- 322. elegans**, Desh., 1824, 2, p. 502, pl. 79, fig. 24-26. Grignon, Parnes, P. S., Senlis, Monneville.
- \***323. evulsa**, Sow., Min. Conch., pl. 361, fig. 2-4. Desh., 1824, 2, p. 503, pl. 79, fig. 27, 28. Grignon, Senlis, Ermenonville; Anglet., Barton.
- 324. læviscula**, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 84, pl. 361, fig. 1. Angl., Londres, Barton, Highgate, Lyndhurst.
- 325. volutella**, Lam., Ann. du Mus., t. 2, p. 63, n. 2, Anim. s. vert., t. 7, p. 117, n. 7; Desh., 1824, 2, p. 504, pl. 79, fig. 19-21. Grignon.
- 327. quadrata**, Sow., 1822, Min. Conch., 4, p. 83, pl. 360. Angl., Barton.
- 331. gemmata**, Conrad, 1833. *C. Babylonica*, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- \***332. alveata**, Conrad, 1833. *C. sculptura*, Lea, *C. tessellata*, Lea, *C. elevata*, Lea, *C. costata*, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- CONUS**, Linné, 1758.
- 333. turritus**, Lamk., 1804, Desh., 1824, 2, p. 748, pl. 98, fig. 5, 6. Parnes, Courtagnon, Mouchy, Lattainville.
- \***334. lineatus**, Brander, 1766. *C. stromboides*, Lamk., Ann. du Mus., t. 15, p. 442, n. 9 et t. 7, pl. 15, fig. 2. Desh., 1824, 2, p. 749, pl. 98, fig. 15, 16. France, Grignon, Beynes, Parnes, Gomerfontaine, Faudon (H.-Alpes).
- \***335. antediluvianus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 15, p. 441, n. 7, Anim. s. vert., t. 7, p. 529, n. 7. Desh., 1824, 2, p. 749, pl. 98, fig. 13, 14. Parnes, Mouchy, Courtagnon, Vaudancourt, Hermes.
- \***336. deperditus**, Brug., Enc. méth. vers., t. 1, p. 691, n. 80, pl. 337, fig. 7. Desh., 1824, 2, p. 745, pl. 98, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, Courtagnon, Mouchy, Marquemont; Belgique, Rougeclotire, St-Josse-ten-Noode, Groenendael.
- \***337. diversiformis**, Desh., 1824, 2, p. 747, pl. 98, fig. 9-12. Parnes, Mouchy, Hermes, St-Félix (Oise).

**337'. concinnus**, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 180, pl. 302, fig. 2. Angl., Londres, Barton, Highgate.

**338. dormitor**, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 179, pl. 301. Angl., Londres, Muddiford, Barton.

**\*339. sauridens**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.

**STROMBUS**, Linné, 1758. Voy. p. 132.

**\*340. Bartonensis**, Sow. *Murex Bartonensis*, Sow., 1813, M. C., 1, p. 75, pl. 34, fig. 2. *S. ornatus*, Desh., 1824, 2, p. 628, pl. 85, fig. 3-5. Grignon, Mouchy, Uilly-St-Georges, Chaumont; Anglet., Barton-Cliff.

**\*341. canalis**, Lamk.; Bull. de la Soc. phil., n. 25, fig. 5; Ann. du Mus., t. 2, p. 219 et t. 6, pl. 45, fig. 2, Anim. s. vert., t. 7, p. 213, n. 33. Desh., 1824, 2, p. 629, pl. 84, fig. 9-11. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Chaumont. Elle est très-voisine d'une espèce d'Alabama (Etats-Unis).

**ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801, p. 71.

**\*342. ampla**, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belg., p. 556, pl. 43, fig. 5. *Strombus amplus*, Brander, 1766, Foss. hant., p. 6, fig. 76. *Rostellaria macroptera*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 220, n. 1. Desh., 1824, 2, p. 620, pl. 83, fig. 1; pl. 84, fig. 1; pl. 85, fig. 10. Sow., 1821, M. C., pl. 299. Parnes, Chaumont, Grignon; Angl., Barton, Highgate; Belg., env. de Bruxelles, Groenendael, St-Gilles, Forêt.

**\*343. columbaria**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 220, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 621, pl. 83, fig. 5, 6. Grignon, Parnes, Mouchy, Houdan; Belgique, Affligem.

**344. fissurella**, Lamk., 1803, Ann., p. 221, n. 3, Anim. s. vert., p. 196, n. 6. Desh., 1824, 2, p. 622, pl. 83, fig. 2-4; pl. 84, fig. 5, 6. Nyst., pl. 42, fig. 6. *Stronicus fissurella*, Linné. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon. P. S., Senlis, Valmondois, Valognes; Angleterre, Londres; Belgique, Groenendael, Beersel, St-Gilles, Louvain, Forêt, Gand, Rougecloître, St-Josse, Affligem.

**345. lucida**, Sow., 1815, Min. Conch., t. 1, p. 203, pl. 91, fig. 1-3. Angl., Highgate, Londres, Hampstead.

**346. rimosa**, Sow., 1815, Min. Conch., t. 1, p. 203, pl. 91, fig. 4-6. *Murex rimosus*, Brander, 1766, p. 29. France, Grignon; Angl., Londres, Barton-Cliff.

**\*347. velata**, Conrad, 1833. R. *Lamarckii*, Lea. Etats - Unis, Alabama.

**\*348. laqueata**, Conrad, 1833. R. *Cuvieri*, Lea. Etats - Unis, Alabama.

**CHENOPUS**, Philipps, 1837.

**\*349. Sowerbii**, Sow., 1835, Index, 6, p. 248. Nyst., 1843, Belgique, pl. 44, fig. 4. *Rostellaria Parkinsoni*, Sow., 1827, pl. 558, fig. 3 (exclus., syn.) Angl., Macdenhead, Bognor, Hedgerley, Walford.

**PLEUROTOMA**, Lamarck, 1801.

**\*350. terebralis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 266, n. 20. Desh., 1824, 2, p. 455, pl. 62, fig. 14-16. Grignon, Beynes, Parnes, Mouchy.

**\*351. undata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 167, n. 9; Desh., 1824, 2, p. 456, pl. 63, fig. 11-13; pl. 64, fig. 21-23. Parnes, Grignon, Mouchy, Courtagnon, Chaumont.

- \***352. bicatena**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 168, n. 12. Desh., 1824, 2, p. 457, pl. 65, fig. 15-17 ; pl. 63, fig. 27-29. Grignon, Beynes, Parnes, Mouchy, Autreval, Chaumont.
- \***353. uniserialis**, Desh., 1824, 2, p. 458, pl. 63, fig. 1, 2, 3. Mouchy, Parnes, Chaumont, Château-Rouge (Oise).
- \***354. acutangularis**, Desh., 1824, 2, p. 459, pl. 64, fig. 24, 25. France, Chaumont, Parnes.
- \***355. curvicosta**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 169, n. 16; Deshayes, 1824, 2, p. 460, pl. 63, fig. 4, 5, 6. Grignon, Beynes, Parnes, P. S., Senlis.
- 356. brevicula**, Desh., 1824, 2, p. 461, pl. 63, fig. 7-10. Grignon, Parnes, Mouchy-le-Châtel.
- 357. rugosa**, Desh., 1824, 2, p. 486, pl. 66, fig. 20-22. Parnes.
- 358. mitreola**, Desh., 1824, 2, p. 485, pl. 68, fig. 16-18. Beynes, Marquemont, Ponchon (Oise).
- \***359. inflexa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 267, n. 22. Desh., 1824, 2, p. 475, pl. 66, fig. 11-13 ; pl. 67, fig. 12-14. Grignon, Mouchy, P. S., Ver (Oise).
- \***360. sulcata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 169, n. 15. Desh., 1824, 2, p. 476, pl. 67, fig. 18-21. Grignon, la ferme de l'Orme, P. S., Chavançon.
- \***361. granulata**, Lamk., Ann. du Mus., p. 266, n. 21 et t. 7, pl. 13, fig. 4. Desh., 1824, 2, p. 476, pl. 67, fig. 1-3. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon.
- 362. striarella**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 267, n. 24. Desh., 1824, 2, p. 477, pl. 67, fig. 28-30. Grignon, Parnes.
- \***363. decussata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 267, n. 25. Desh., 1824, 2, p. 470, pl. 64, fig. 3-7. Grignon, Mouchy.
- \***364. turrella**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 267, n. 23. Desh., 1824, 2, p. 471, pl. 64, fig. 17-20. Grignon, Parnes, Moqueville, Creil.
- 365. nodularis**, Desh., 1824, 2, p. 493, pl. 66, fig. 23-25. Grignon, Parnes, Lattainville.
- \***366. plicata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 169, n. 14. Desh., 1824, 2, p. 487, pl. 66, fig. 17-19. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon.
- \***367. costellata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 168, n. 13. Desh., 1824, 2, p. 488, pl. 66, fig. 14-16. Grignon, Chaumont, Parnes.
- 368. carinata**, Defr., Desh., 1824, 2, p. 489, pl. 66, fig. 26-29. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont.
- \***369. pseudoharpula**, d'Orb., 1847. *P. harpula*. Desh., 1824, 2, p. 490, pl. 67, fig. 22-24 (non Brocchi, 1814). Grignon, Mouchy.
- \***370. simplex**, Desh., 1824, 2, p. 490, pl. 68, fig. 10-12. Grignon, la ferme de l'Orme, Lierville.
- \***372. polygona**, Desh., 1824, 2, p. 472, pl. 65, fig. 24-26. Beynes, Grignon, Courtagnon, Monneville.
- 373. granifera**, Desh., 1824, 2, p. 473, pl. 65, fig. 27-29. Beynes, Parnes.
- \***374. crenulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 168, n. 11, Anim. s. vert., t. 7, p. 99, n. 16. Desh., 1824, 2, p. 473, pl. 65, fig. 8-10. Grignon, Mouchy, Gillocourt.

- \*375. *unifascialis***, Deshayes, 1824, 2, p. 445, pl. 70, fig. 12, 13. Grignon.
- \*376. *subdecussata***, Desh. 1844, 2, p. 446, pl. 70, fig. 1, 2. Courtagnon, Damerie, Marquemont, Hénonville, Uilly-St-Georges (Oise).
- 377. *cincta***, Desh., 1824, 2, p. 447, pl. 69, fig. 3, 4. Beynes.
- \*378. *filosa***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 164, n. 1. Desh., 1824, 2, p. 448, pl. 68, fig. 25, 26? Grignon, Parnes, Mouchy, Marquemont, Courtagnon, Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes).
- 379. *pyrulata***, Deshayes, 1824, 2, p. 449, pl. 66, fig. 1, 2, 3. Parnes.
- \*380. *transversaria***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 166, n. 6. Deshayes, 1824, 2, p. 450, pl. 62, fig. 1, 2. Parnes, Grignon, Chaumont.
- \*381. *catenata***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 166, n. 7. Desh., 1824, 2, p. 451, pl. 62, fig. 11-13. Parnes, Mouchy, Marquemont.
- \*382. *dentata***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 167, n. 8, et t. 1, pl. 13, fig. 1. Desh., 1824, 2, p. 452, pl. 62, fig. 3, 4, 7, 8. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, P. S., la Chapelle, près Senlis, Valmondois, Ver; Etats-Unis, Claiborne (Alabama).
- 383. *brevicauda***, Deshayes, 1824, 2, p. 453, pl. 52, fig. 9, 10. Parnes, Mouchy, Courtagnon, Hénonville.
- 384. *angulosa***, Desh., 1824, 2, p. 478, pl. 67, fig. 4-7. Mouchy, Grignon, Thury-sous-Chaumont.
- \*385. *margaritula***, Desh., 1824, 2, p. 479, pl. 67, fig. 8-11. Grignon, Parnes, Mouchy.
- 386. *fragilis***, Deshayes, 1824, 2, p. 480, pl. 67, fig. 25-27. Grignon.
- 387. *dubia***, Deffr., Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 481, pl. 67, fig. 12-14. France, Grignon, Mouchy.
- 388. *obliterata***, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 481, pl. 67, fig. 15-17. France, Grignon, Parnes, Mouchy.
- 389. *nana***, Desh., 1824, 2, p. 482, pl. 68, fig. 19-22. Parnes.
- \*390. *labiata***, Desh., 1824, 2, p. 438, pl. 68, fig. 23, 24. Parnes, Mouchy-le-Châtel, Marquemont, Faudon, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes).
- 391. *elongata***, Desh., 1824, 2, p. 439, pl. 69, fig. 19, 20. France, Grignon, Parnes, Mouchy.
- \*392. *glabrata***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 184, n. 4. Desh., 1824, 2, p. 439, pl. 69, fig. 7, 8. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont.
- \*393. *furcata***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 169, n. 17. Desh., 1824, 2, p. 464, pl. 65, fig. 21-23, pl. 63, fig. 23-26. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon.
- \*394. *lineolata***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 165, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 440, pl. 69, fig. 11-14. Grignon, Courtagnon, Parnes, Faudon (Hautes-Alpes).
- \*395. *marginata***, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 166, n. 5. Desh., 1824, 2, p. 442, pl. 70, fig. 6, 7, 10, 11. Parnes, Grignon, Mouchy.

- 396. semi-striata**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 443, pl. 69, fig. 5, 6. France, Parnes, Mouchy.
- 397. bistriata**, Desh., 1824, 2, p. 444, pl. 70, fig. 3, 4, 5. Parnes, Mouchy-le-Châtel, Hénonville.
- 398. nodulosa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 170, n. 18. Desh., 1824, 2, p. 466, pl. 65, fig. 11-14. Grignon, Parnes, Courtagnon, Lattainville.
- 399. multicostata**, Desh., 1824, 2, p. 466, pl. 64, fig. 8-13. Chaumont.
- 400. plicatilis**, Desh., 1824, Paris, 2, p. 463, pl. 63, fig. 20-22. France, Parnes, Mouchy.
- 401. subangulata**, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 2, p. 444, pl. 70, fig. 8, 9. Mouchy-le-Châtel, Parnes.
- 404. clavicularis**, Lam., Desh., n. 2, pl. 69, fig. 9-10, 15-18. Grignon, Mouchy, Parnes, St-Félix, Acy-en-Multien (Oise).
- 406. subrostrata**, d'Orb., 1847. *P. rostrata*, Sow., 1816, Min. Conch., pl. 146, fig. 3 (non *Murex rostratus*, Brander, 1766). Angl., Barton.
- 407. attenuata**, Sow., 1826, Min. Conch., t. 2, p. 103, pl. 149, fig. 1. Angl., Londres.
- 408. exorta**, Sow., 1826, Min. Conch., t. 2, p. 103, pl. 146, fig. 2. *Murex exortus*, Brander, 1766, fig. 32. Angleterre, Londres, Barton.
- 409. colon**, Sow., 1826, Min. Conch., t. 2, p. 103, pl. 146, fig. 7-8. Angl., Londres, Barton-Cliff.
- 410. fusiformis**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 119, pl. 387, fig. 1. Angl., Londres, Highgate.
- 411. brevirostrum**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 119, pl. 387, fig. 2. Angl., Londres, Muddiford.
- 412. laevigata**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 119, pl. 387, fig. 3. Angl., Londres, Muddiford, Highgate.
- 413. turbidus**, Morris, 1843. *Murex turbidus*, Brander, 1766, pl. 2, fig. 31. Angl., Barton.
- 414. comma**, Sow., 1826, Min. Conch., t. 2, p. 103, pl. 146, fig. 5. Angl., Londres, Stubbington.
- 420. acuminata**, Sow., 1826, Min. Conch., 2, p. 105, pl. 146, fig. 4. Angl., Highgate.
- 423. semi-colon**, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 106, pl. 146, fig. 6. Stubbington.
- 430. subinterrupta**, d'Orb., 1847. *P. interrupta*, Sow. *Murex interruptus*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 181, pl. 304 (non Brocchi, 1814). Angleterre, Londres.
- 431. elabora**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 432. tabulata**, Conrad, 1833. *P. calata*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 433. alternata**, Conrad, 1833. *P. Lesuerii*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 434. Beaumontii**, Lea. États-Unis, Alabama.
- 435. depygis**, Conrad, 1833. *P. Londauii*, Lea. États-Unis, Alabama.

- 436. nupera**, Conrad, 1833. *P. Desnoyersii*, Lea ; *P. Hæninghausii*, Lea ; *P. rugosa*, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- 437. parviuscula**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- 438. proruta**, Conrad, 1833. *Fusus prorutus*, Conrad. *F. parvus*, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- 439. biseriata**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- 440. acutirostra**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- 441. torticosta**, Conrad, 1833. Etats-Unis, Alabama.
- FUSUS**, B ugnière, 1791.
- \*442. funiculosus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 318, n. 22. Desh., 1824, 2, p. 516, pl. 72, fig. 5, 6. Parnes, Grignon, Courtagnon, Mouchy, Lattainville.
- \*443. decussatus**, Desh., 1824, 2, p. 517, pl. 72, fig. 8, 9. Berchère, près Houdan, Parnes, Chaumont, Amblainville.
- 444. gothicus**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 513, pl. 74, fig. 9, 10. Fian e, Parnes, Mouchy.
- \*445. rugosus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 316, n. 1, pl. 46, fig. 1. Desh., 1824, 2, p. 519, pl. 73, fig. 4, 5, 6, 7, 10, 11. Grignon, Mouchy, Parnes, Hermes, Courtagnon, Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes).
- \*446. angulatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 386, n. 20. Desh., 1824, 2, p. 520, pl. 74, fig. 11, 12, 4, 5. Mouchy, Parnes, Grignon, Beynes, Azy.
- \*447. tuberculosus**, Desh., 1824, 2, p. 522, pl. 73, fig. 14, 15. Parnes, Mouchy, Uilly-St-Georges.
- \*448. longævus**, Lam., 1803; *Murex longævus*, Brander, 1766, fig. 17, 18. Desh., 1824, 2, p. 523, pl. 74, fig. 18-21. Nyst., pl. 39, fig. 20. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Courtagnon ; Barton, en Angleterre ; Belgique, Lovenjoul, près de Louvain.
- \*449. serratus**, Desh., 1824, 2, p. 513, pl. 75, fig. 12, 13. Parnes, Mouchy.
- \*450. scalarinus**, Desh., 1824, 2, p. 574, pl. 73, fig. 27, 28. Parnes. Mouchy-le-Châtel.
- 451. incertus**, Desh., 1824, 2, p. 537, pl. 71, fig. 1, 2. Parnes, Mouchy, Hermes.
- \*452. intortus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 318, n. 8 ; t. 6, pl. 46, fig. 4. Desh., 1824, 2, p. 538, pl. 73, fig. 4, 5, 10, 11, 14, 15. Grignon, Beynes, Courtagnon, Chaumont, Parnes, Mouchy.
- \*453. squamulosus**, Desh., 1824, 2, p. 540, pl. 73, fig. 6, 7. Beynes, Uilly-St-Georges (Oise).
- \*454. crassicosatus**, Desh., 1824, 2, p. 544, pl. 72, fig. 1, 2. France, Parnes, Chambors (Oise).
- \*455. obliquatus**, Desh., 1824, 2, p. 542, pl. 74, fig. 13, 14. France, Parnes, Chaumont, le Vivray.
- 456. Lamarckii**, Defr., Desh., 1824, 2, p. 543, pl. 94 bis, fig. 3-5. Grignon.
- \*457. muricoides**, Desh., 1824, 2, p. 561, pl. 71, fig. 3, 4. Grignon, Beynes, Mouchy, Parnes, Chaumont.
- \*458. costulatus**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 135, n. 7. Desh., 1824, 2, p. 562, pl. 75, fig. 16, 17. Beynes, Grignon, Betz, Parnes.



- \* **459. maximus**, Desh., 1824, 2, p. 526, pl. 71, fig. 11, 12. Chaumont, Marquemont (Oise).
- 460. conjunctus**, Desh., 1824, 2, p. 527, pl. 70, fig. 16, 17. Parnes, Mouchy, Chaumont, Bouconvillers (Oise).
- \* **461. Noe**, Lamk., 1802; Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 316, n. 2, pl. 46, fig. 2; Desh., 1824, 2, p. 528, pl. 75, fig. 8, 9-12, 13. *Murex Noe*, Chemnitz. 1795, pl. 212, fig. 2096, 2097. Faudon (H.-Alpes), Grignon, Courtagnon, Château-Thierry, Parnes, Chaumont, Lamery, Belgique, Rougecloître, St-Josse; Vicentin, Ronca, Le Jarrier.
- \* **462. breviculus**, Desh., 1824, 2, p. 530, pl. 72, fig. 3, 4. Parnes, Chaumont, Mouchy.
- \* **463. abbreviatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, n. 10; Deshayes, 1824, 2, p. 550, pl. 76, fig. 10-12. Grignon, la ferme de l'Orme, Beyne.
- \* **464. variabilis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 388, n. 32; Desh., 1824, 2, p. 551, pl. 94 bis, fig. 9-11. Grignon, la ferme de l'Orme.
- \* **465. laevigatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, n. 27; Desh., 1824, 2, p. 547, pl. 72, fig. 15-17. Grignon, Parnes, Mouchy.
- \* **466. hordeolus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 318, n. 7; Desh., 1824, 2, p. 548, pl. 94 bis, fig. 6-8. Grignon.
- \* **467. heptagonus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 220, n. 23; Desh., 1824, 2, p. 534, pl. 71, fig. 9, 10. Parnes, Mouchy, Chaumont, Marquemont.
- \* **468. subulatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 313, n. 6; Desh., 1824, 2, p. 535, pl. 76, fig. 13-15. Grignon, Mouchy.
- \* **469. coronatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 319, n. 16; Desh., 1824, 2, p. 575, pl. 74, fig. 15-17. Grignon, Parnes, Chaumont, Valmondois.
- 470. textillosus**, Desh., 1824, 2, p. 576, pl. 82, fig. 17-19. Parnes, Chaumont, Mouchy, Neuville Bosc (Oise).
- \* **471. polygonus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 319, n. 9; Desh., 1824, 2, p. 563, pl. 71, fig. 5, 6. Grignon, Beyne, Houdan, Monneville, P. S. La Chapelle, près Senlis, Valmondois, Ermenonville.
- 472. bicarinatus**, Desh., 1824, 2, p. 564, pl. 76, fig. 3, 4. Beyne, Parnes.
- \* **473. excisus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 319, n. 11; Desh., 1824, 2, p. 556, pl. 74, fig. 6-8. Grignon, la ferme de l'Orme, Lattainville; Barton, en Angleterre.
- 474. clathratus**, Desh., 1824, 2, p. 557, pl. 94 bis, fig. 21-23. Grignon.
- \* **475. scalarioides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 319, n. 15; Desh., 1824, 2, p. 544, pl. 74, fig. 1-3; pl. 75, fig. 1-3. Grignon, Parnes, Chaumont, Mouchy, Courtagnon.
- \* **476. minutus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 319, n. 12; Desh., 1824, 2, p. 552, pl. 94 bis, fig. 18-20. Grignon, Uilly-St-Georges.
- \* **477. bulbus**, d'Orb., 1847. *Murex bulbus*, Chemnitz, 1795, Conch. cub., 11, p. 278, pl. 212, fig. 3000, 3001. *F. bulbiformis*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 387, n. 26; Desh., 1824, 2, p. 570, pl. 78, fig. 5-10 et 15-18. France, Grignon, Courtagnon, Mouchy, Anesmont, Le Tomberay, Orrouy, Valognes (Manche); Anglet., Barton.

- \*478. *aciculatus*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 318, n. 5 et t. 6, pl. 46, fig. 6; Desh., 1824, 2, p. 514, pl. 71, fig. 7, 8. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon; Barton, en Angleterre.
479. *tenuis*, Desh., 1824, 2, p. 555, pl. 76, fig. 19-21. Grignon, Lattainville.
- \*480. *sublævigatus*, d'Orb., 1847. *Pyrula lævigata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 390, n. 1, et t. 6, pl. 46, fig. 7; Desh., 1824, 2, p. 579, pl. 78, fig. 3, 4-11-14 (non n. 465). Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, P. S. Valmondois, Tancrou, Betz, la Chapelle, près Senlis, Monneville.
- \*481. *subcarinatus*, d'Orb., 1847. *Pyrula subcarinata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 390, n. 2; Desh., 1824, 2, p. 580, pl. 79, fig. 16, 17. Grignon, Houdan, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Valmondois, Mont-Lévêque, Monneville (Oise), Faudon (H.-Alpes).
482. *errans*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 139, pl. 400. *Strombus errans*, Brander, 1766, pl. 2, fig. 48; Nyst., pl. 39, fig. 22. Angl., Londres, Barton, Hordwell; Belgique, Bruxelles, Groenendael.
- 482'. *antiquus*, d'Orb., 1847. *Murex antiquus*, Brander, 1766, fig. 74. *F. regularis*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 27, pl. 423, fig. 1; pl. 187, fig. 2. Angl., Londres, Barton.
483. *complanatus*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 27, pl. 423, fig. 2. Angl., Londres, Highgate.
- 483'. *lima*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 27, pl. 423, fig. 4. Angl., Londres, Barton, Highgate.
484. *porrectus*, d'Orb., 1847. *Murex porrectus*, Brander, 1766, fig. 36. *F. acuminatus*, Sow., 1820, Min. Conch., t. 3, p. 131, pl. 274, fig. 1-3. Angl., Londres, Hordwell.
485. *asper*, Sow., 1820, Min. Conch., t. 3, p. 131, pl. 274, fig. 4-7. Angl., Londres, Hordwell.
486. *bifasciatus*, Sow., 1819, Min. Conch., t. 3, p. 49, pl. 228. Angl., Londres, Highgate.
490. *coniferus*, Sow. *Murex coniferus*, Sow., 1818, Min. Conch., t. 2, p. 195, pl. 187, fig. 1. Angl., Highgate, Londres.
- \*494. *turgidus*, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgiq., p. 498; *Murex turgidus*, Brand., 1766, foss. hant., p. 26, pl. 4, fig. 51, *Fusus ficulneus*, Lam., 1804; Desh., 1824, 2, p. 572, pl. 73, fig. 21-26. *Murex ficulneus*, Chemnitz, 1795, Conch. cub., 11, p. 301, pl. 212, fig. 3004, 3005. Parnes, Grignon, Courtagnon, P. S. La Chapelle, près Senlis, Lisy-sur-Ourcq, Valmondois, Betz, Tancrou; en Angleterre, Londres, Hordwell; Belgique, Bruxelles, Groenendael, Rougecloître, Saint-Josse-Afflighem.
496. *tuberosus*, Sow. *Murex tuberosus*, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 151, pl. 578, fig. 4; pl. 229, fig. 1. Angl., Malton, Nuneham.
497. *carinella*, Sow. *Murex carinella*, Sow., 1818, Min. Conch., t. 2, p. 195, pl. 187, fig. 3, 4. Angl., Londres, Barton, Primerose.
498. *trilineatus*, Sow. *Murex trilineatus*, Sow., 1813, M. Conch., t. 1, p. 79, pl. 35, fig. 4, 5. Angl., Brentford, Highgate.
499. *curtus*, Sow. *Murex curtus*, Sow., 1818, Min. Conch., t. 2, p. 225, pl. 199, fig. 5. Angl., Londres, Highgate.

- 500. desertum**, Morris, 1843. *Buccinum desertum*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 14, pl. 415, fig. 1. Angl., Londres, Barton.
- 501. canaliculatus**, Morris, 1843. *Buccinum canaliculatum*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 14, pl. 415, fig. 2. Anglet., Barton, Mud-diford.
- 502. lavatus**, Morris, 1843, *Buccinum lavatum*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 10, pl. 412, fig. 3, 4. Angl., Barton.
- \*503. Altilis**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 504. stamineus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \*505. bellus**, Conrad, 1833. *F. crebissimus*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 506. limulus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \*507. Cooperii**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 508. raphanoides**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \*509. ornatus**, Lea, 1833. *F. acutus*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 510. salebrosus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 511. symmetricus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 512. trabeatus**, Conrad, 1833. *F. bicarinatus*, Lea. États-Unis, Alabama.
- \*513. papillatus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 514. inauratus**, Conrad, 1833. *F. Fittonii*, Lea. États-Unis, Alabama.
- \*515. thoracicus**, Conrad, 1833. *F. decussatus*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 516. irrasus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 517. protextus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 518. ranelloides**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 519. thalloides**, Conrad, 1833. *F. pulcher*, Lea. États-Unis, Alabama.
- FYRULA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.
- \*520. elegans**, Lamk., 1803. Ann. du Mus., t. 2, p. 391, n° 4. Anim. s. vert., t. 7, p. 572, n° 4. Desh., 1824, 2, p. 581, pl. 79, fig. 7, 8. *Fusus Greanwoddii*, Sow., 1825, M. C. pl. 498. France, Mouchy, Chaumont, Grignon, Beyne, P. S. Valmondois. Rouge-Cloître, près de Bruxelles.
- \*521. nexilis**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 582, pl. 79, fig. 5-7; Sow., pl. 331. *Murex nexilis*, Brander. France, Beyne, Parnes, Grignon, Senlis, la Chapelle; Angleterre, Barton.
- \*522. tricarinata**, Lam., Desh., pl. 79, fig. 1-4. Chaumont, Parnes, Mouchy-le-Châtel (Oise).
- \*523. penita**, Conrad, 1833. *P. cancellata*, Lea. Espèce on ne peut plus voisine du *P. tricarinata*. États-Unis, Alabama.
- \*524. elegantissima**, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.
- FASCIOLARIA**, Lamarck, 1801.
- 525. funiculosa**, Desh., 1824, 2, p. 508, pl. 79, fig. 12, 13. Beyne.
- \*527. uniplicata**, d'Orb., 1847. *Fusus uniplicatus*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 385, n° 21, t. 6, pl. 46, fig. 3. Desh., 1824, 2, p. 536, pl. 96 bis, fig., 1, 2. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon.
- MUREX**, Linné, 1758.
- \*528. tricarinatus**, Lamk., Anim. sans vert., t. 7, p. 177, n° 68.

- Ann., p. 223, n° 2. Desh., 1824, 2, p. 597, pl. 82, fig. 7-10, Sow., pl. 416, fig. 1. France, Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Aumont (Oise). Angleterre, Barton.
- 529. tricarinoides**, Desh., 1824, 2, p. 598, pl. 82, fig. 11, 12. France, Parnes, Mouchy.
- 530. contabulatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 223, n° 3. Desh., 1824, 2, p. 595, pl. 82, fig. 5, 6. Grignon, Parnes, Mouchy, Lattainville, Ully-St-Georges (Oise).
- \*531. tripteroides**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 177, n° 67. Desh., 1824, 2, p. 595, pl. 82, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon.
- \*531'. frondosus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 224, n° 6 et t. 6, pl. 45, fig. 7. Desh., 1824, 2, p. 591, pl. 82, fig. 20-25. Sow., M. C. pl. 416, fig. 3. Grignon, Parnes, Mouchy.
- 532. subdistortus**, d'Orb., 1847. *M. distortus*, Desh., 1824, 2, p. 599, pl. 82, fig. 15, 16 (non Brocchi 1814). Beyne, près Grignon.
- \*533. calcitrapa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 233, n° 4. Desh., 1824, 2, p. 588, pl. 81, fig. 26, 27. Grignon, Mouchy, Parnes, Courtagnon, Chambors.
- \*534. crispus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 224, n° 5. Desh., 2, p. 589, pl. 81, fig. 7-12. Grignon, Beyne, Parnes.
- 535. hispidus**, Sow., 1823. Min. Conch., t. 5, p. 15, pl. 416, fig. 2. Barton.
- 536. suberistatus**, d'Orb., 1847. *M. cristatus*, Sow., 1819, Min. Conch., t. 3, p. 52, pl. 230, fig. 1, 2 (non Brocchi 1814). Highgate.
- 537. subcoronatus**, d'Orb. 1847. *M. coronatus*, Sow., 1819, Min. Conch., t. 3, p. 52, pl. 230, fig. 3 (non Born. 1780). Highgate.
- 538. defossus**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 9, pl. 411, fig. 1. Angleterre, Londres, Hordwell.
- 542. engonatus**, Conrad, 1833. *Fusus sexangulus*, Conrad. États-Unis, Alabama.
- 543. Conradi**, d'Orb., 1847. *M. Mantelli*, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 544. Vanuxemi**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- TIPHIS**, Montfort, 1810.
- \*545. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *Murex pungens*, Brander, 1776, fig. 82. *Murex fistulosus*, Desh., 1824, 2, p. 605, pl. 80, fig. 1-3 (non Brocchi, Conch. foss. subap., t. 2, p. 394, n° 11, pl. 7, fig. 12; non Sowerby). France, Mouchy, Monneville. Angleterre, Barton.
- 546. tubifer**, d'Orb., 1847. *Murex tubifer*, Desh., 1824, 2, p. 603, pl. 82, fig. 26, 27, pl. 80, fig. 4, 6. Brug, Journ. d'hist. nat., t. 1, p. 28, pl. 2, fig. 34. *Murex fistulosus*, Sow., pl. 189, fig. 1, 2. Grignon, Courtagnon, Parnes, Chaumont, Mouchy; Angleterre, Barton, Highgate.
- 547. muticus**, Morris, 1847. *Murex muticus*, Sow., M. Conch., pl. 189, fig. 6, 7. Angleterre, Barton.
- 548. Pungens**, Morris 1843. *Murex pungens*, Brander, 1766, fig. 81 (exclus. fig. 82) *Murex tubifer*, Sow., Min. Conch., pl. 189, fig. 3, 8. Angl., Barton, Hants.

**549. gracilis**, Conrad, 1833. *Murex alternata*, Lea. États-Unis, Alabama.

**TRITON**, Montfort, 1810.

**550. multigraniferum**, Desh., 1824, 2, p. 612, pl. 80, fig. 19-21. Grignon, Beyne, Amblainville.

**551. nodularium**, Lam. *Murex nodularius*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 226, n° 15. Desh., 1824, 2, p. 613, pl. 80, fig. 39, 40. Grignon, Lattainville, Parnes, Uilly (Oise).

**552. biefuctum**, Desh., 1824, 2, p. 614, pl. 80, fig. 33-35. France, Grignon, Parnes, Chaumont, Lattainville.

**553. reticulosum**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 575, n° 11. Desh., 1824, 2, p. 615, pl. 80, fig. 30-31. *Murex reticulosum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 226, n° 16. Grignon, Parnes, Mouchy, Uilly.

**554. planicostatum**, Desh., 1824, 2, p. 616, pl. 80, fig. 25-29. France, Parnes, Mouchy.

**555. pyraister**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 575, n° 8. Desh., 1824, 2, p. 616, pl. 80, fig. 36-38. *Murex pyraister*, Lamk. Ann. du Mus., t. 2, p. 225, n° 11. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Uilly.

**556. colubrinum**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 610, pl. 80, fig. 22-24. Grignon, Beyne, Chaumont, Parnes, Hornies, Mouchy.

**557. turriculatum**, Desh., 1824, 2, p. 608, pl. 80, fig. 7-9. Grignon, Mantes, Mouchy, le Vivray, Lattainville.

**558. striatulum**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 612, pl. 80, fig. 13-15. Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 574, n° 7. *Murex striatulus*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 225, n° 9, t. 6, pl. 45, fig. 5. Grignon, Mouchy.

**559. viperinum**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 611, pl. 80, fig. 16-18. Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 517, n° 2. *Murex viperinus*, Lam., Ann., t. 2, p. 226, n° 14. Grignon, Parnes, Mouchy, Lattainville.

**560. argutum**, Sow., 1823, Min. Conch., 4, p. 59, pl. 344. Barton.

**CERITHIUM**, Adanson. 1757. Voy. vol. 1, p. 196.

**561. giganteum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 439, n° 57, t. 7, pl. 14, fig. 1. Desh., 1824, 2, p. 300, pl. 42, fig. 1, 2. Sow., pl. 188, fig. 2. Grignon, Beyne, Courtagnon, Montmirail, Mouchy, Parnes, Damery, Pont-St-Maxence, Creil, Chaumont; Angl., Barton; Belgique, Afflighem.

**562. serratum**, Lam., Ann. du Mus., t. 3, p. 271, n° 3. Desh., 1824, 2, p. 303, pl. 41, fig. 3, 4. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Houdan, Damery, P. S. Acy.

**563. denticulatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 274, n° 11. Desh., 1824, 2, p. 303, pl. 47, fig. 1, 2. Beyne, Grignon, Liancourt, Cavergnon.

**564. contiguum**, Desh., 1824, 2, p. 304, pl. 47, fig. 3, 4. Chambois, près Magny. Mouy, Acy.

**565. perforatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 436, n° 44 et t. 7, pl. 14, fig. 2. Desh., 1824, 2, p. 399, pl. 58, fig. 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23. *Cerithium acicula*, Lam., Ann. du Mus., t. 3, p. 437, n° 48. Parnes, Mouchy, Grignon, Chaumont, Chapelle.

- \***566. textile**, Desh., 1824, 2, p. 400, pl. 58, fig. 24-26. France, Grignon, Parnes.
- \***567. terebrale**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 437, n° 49. Desh., 1824, 2, p. 401, pl. 56, fig. 29-31. Grignon, Courtagnon, Mouchy, P. S. Crepy, Cuvergnon.
- \***568. crispum**, Def., Desh., 1824, 2, p. 406, pl. 59, fig. 21-23. France, Beyne, Grignon, Mouy, P. S. Manneville.
- 569. Duchasteli**, Desh., 1824, 2, p. 407, pl. 59, fig. 15-17. La ferme de l'Orme, près Grignon.
- \***570. quadrifidum**, Desh., 1824. Env. de Paris, 2, p. 396, pl. 55, fig. 18-20. France, Grignon, Parnes.
- 571. sinistrorsum**, Desh., 1824, 2, p. 396, pl. 56, fig. 21-28. Grignon, Valmondois, Lattainville, Parnes, Uilly.
- \***572. inversum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 438, n° 50. Desh., 1824, 2, p. 397, pl. 56, fig. 15-20. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Hermes.
- \***573. umbilicatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 436, n° 43. Deshayes, 1824, 2, p. 398, pl. 58, fig. 7-10. Grignon, Mouchy.
- \***574. lamellosum**, Brug., Enc. method., t. 1, p. 488, n° 22. Desh., 1824, 2, p. 370, pl. 44, fig. 8, 9. Grignon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Chaumont.
- \***575. rugosum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 439, n° 56. Desh., 1824, 2, p. 371, pl. 44, fig. 10, 11. Parnes, Grignon, Beyne.
- \***576. substriatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 352, n° 41. Desh., 1824, 2, p. 372, pl. 54, fig. 25, 26. Maulette, près Houdau.
- \***577. unisulcatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 440, n° 59. Desh., 1824, 2, p. 384, pl. 57, fig. 14-16. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Senlis, Ver, Ermenonville.
- 578. melanoides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 438, n° 51. Desh., 1824, 2, p. 384, pl. 55, fig. 15-17. Parnes, Grignon, Gomersfontaine.
- \***579. spiratum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 351, n° 39. Desh., 1824, 2, p. 379, pl. 46, fig. 3, 4. Parnes, Chaumont, Hermes, Uilly.
- \***580. bacillum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 346, n° 22. Desh., 1824, 2, p. 394, pl. 56, fig. 3-6. France, Beyne.
- \***581. decussatum**, Defr., Desh., 1824, 2, p. 381, pl. 46, fig. 1, 2. France, Parnes, Chaumont.
- \***582. nudum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 440, n° 58. Desh., 1824, 2, p. 382, pl. 48, fig. 17, 20. Grignon, Parnes, Chaumont, Mouchy, Courtagnon.
- \***583. Bonelli**, Desh., 1824, 2, p. 319, pl. 50, fig. 21, 23. Beyne, Grignon, Lattainville, Parnes, Ancy, Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes).
- 584. Blainvillei**, Desh., 1824, 2, p. 320, pl. 50, fig. 11, 13. France, Houdan, Mary, Acy.
- \***585. thiara**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 274, n. 14. Desh. 1824, 2, p. 315, pl. 44, fig. 12, 13, 17, 18, 19; pl. 48, fig. 21, 22. France, Grignon, Beyne, Mouchy, Blaincourt, Gomersfontaine.
- \***586. hexagonum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 271, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 321, pl. 45, fig. 4, 5. *Murex hexagonus*, Chemnitz,

- 1788, 10. pl. 168, fig. 1554, pl. 48, fig. 15, 16. *Murex angulatus*, Brander, 1766, fig. 46. *Murex pyramidalis*, Sow., Min., Conch., pl. 127, fig. 1. Grignon, Beyne, Houdan, Courtagnon; Angleterre, (Barton, Saint-Bonnet, Faudon (Hautes-Alpes); Suisse, (les Diablerets, près de Bex.
- \*587. *angulosum*, Lamk., Ann. du Mus., p. 273, n. 8. Desh., 1824, 2, p. 418, pl. 45, fig. 3; pl. 48, fig. 6, 7; pl. 49, fig. 6, 8. Liancourt, Acy, Grignon, Courtagnon. P. S. La Chapelle, près Senlis, Valmondois, Acy.
- \*588. *Vapincense*, d'Orb., 1847. Espèce courte, conique, ornée de côtes longitudinales arquées et d'un sillon transversal près de la suture des tours. France, Faudon (Hautes-Alpes).
- \*589. *labiatum*, Desh., 1824, 2, p. 313, pl. 47, fig. 10, 12. France, Damery, Lattainville.
590. *Leufroyi*, Mich., Desh., 1824, env. de Paris, 2, p. 380, pl. 57, fig. 23, 24. France, Chaumont, Parnes.
- \*591. *Larva*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 392, pl. 58, fig. 11-13. Grignon, Parnes, Ully (Oise).
- \*592. *Gravesii*, Desh., 1824, 2, p. 310, pl. 47, fig. 15, 24, 25. Maulle, Chambors, près Parnes, Chaumont, Lattainville.
- \*593. *cinctum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 345, n. 17. Desh., 1824, 2, p. 388, pl. 49, fig. 12-14. Grignon, Beyne, Courtagnon, Parnes, Lattainville.
594. *fragile*, Desh., 1824, 2, p. 363, pl. 54, fig. 16-21. Parnes, Grignon, Mouchy, Lattainville.
595. *cuspidatum*, Desh., 1824, 2, p. 373, pl. 57, fig. 8-10. Beyne. P. S. Bouconvillers, Monneville, Acy.
- \*597. *multispiratum*, Desh., 1824, 2, p. 391, pl. 56, fig. 9-14. Grignon.
- \*598. *echinoides*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 276, n. 7. Desh., 1824, 2, p. 346, pl. 46, fig. 5-10. Grignon, Houdan, Beyne, Courtagnon, Parnes, Blaincourt. P. S. Damery.
- \*599. *semicoronatum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 344, n. 16. Desh., 1824, 2, p. 306, pl. 50, fig. 1, 2. Grignon, Beyne, Courtagnon, Parnes.
- \*600. *lapidum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 350, n. 37, et t. 7, pl. 13, fig. 5. Desh., 1824, 2, p. 421, pl. 60, fig. 21-24. Grignon, Courtagnon, Chambors, Valmondois.
- \*601. *calcitrapoides*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 274, n. 10. Desh., 1824, 2, p. 347, pl. 46, fig. 18, 19, 23. Grignon, Courtagnon, Beyne, Aumont, Chambors.
- \*602. *confuens*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 345, n. 20. Desh., 1824, 2, p. 407, pl. 55, fig. 12-14. Grignon, Lattainville, Mouy.
603. *filiferum*, Desh., 1824, 2, p. 377, pl. 49, fig. 15, 16. France, Ully-St-George, près Mouchy.
- \*604. *subpunctatum*, Desh., 1824, 2, p. 409, pl. 60, fig. 1-3. Grignon, Houdan, le Vivray, Liancourt, Mouy.
- \*605. *neglectum*, Desh., 1824, 2, p. 386, pl. 56, fig. 1, 2. Beyne, Grignon, Mouy.
- \*606. *interruptum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 270, n. 1 et

- t. 7, pl. 13, fig. 6. Desh., 1824, 2, p. 417, pl. 45, fig. 1, 2. Beyne, Lattainville, Parnes.
- \***607. catenatum**, Desh., 1824, 2, p. 419, pl. 59, fig. 13, bors, près Magny, Liancourt, St-Pierre.
- \***608. cristatum**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 420, pl. 44 pl. 60, fig. 10, 11. Grignon, près Magny, Arras, Parnes, (
- \***609. acutidens**, Desh., 1824, 2, p. 427, pl. 61, fig. 17 chy-le-Châtel.
- \***610. Prevosti**, Desh., 1824, 2, p. 348, pl. 46, fig. 16, 22. La ferme de l'Orme, Grignon, Beyne, Liancourt.
- \***611. emarginatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 4 Desh., 1824, 2, p. 332, pl. 45, fig. 12, 13. Grignon, Beyn ville, Parnes.
- \***612. muricoides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 349, n. 1824, 2, p. 426, pl. 61, fig. 13-16. Grignon, Beyne, Houd
- \***614. clavus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 346, n. 1824, 2, p. 391, pl. 58, fig. 4, 5, 6, 14, 15, 16. Grignon, Pa chy, Mouy.
- 615. multinedosum**, Desh., 1824, 2, p. 357, pl. 53, 4 18. Beyne, Grignon.
- \***616. quadrisulcatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 4 Desh., 1824, 2, p. 395, pl. 55, fig. 21-23. Grignon, Mouchy-Chaumont, Uilly.
- 617. imperfectum**, Desh., 1824, 2, p. 365, pl. 57, France, Parnes, Mouchy, Chaumont.
- \***618. echinulatum**, Desh., 1824, 2, p. 369, pl. 55, France, Parnes, Mouchy, Chaumont.
- \***619. subulatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 350, n. 1824, 2, p. 364, pl. 53, fig. 19-21. *Cerithium costulatum* Anim., s. vert., t. 7, p. 84, n. 36. Grignon, Mouy, Mar Parnes.
- \***620. cancellatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 4, p. 41 Desh., 1824, 2, p. 358, pl. 53, fig. 26-29. Grignon, Parnes gnon, Mouchy, Mouy.
- \***621. semi-granulosum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3 n. 46. Desh., 1824, 2, p. 360, pl. 54, fig. 3-6. *Cerithium suby* Lamk. Anim., s. vert., t. 7, p. 86, n. 47. Faudon, St-Bonnet Alpes), Grignon, Beyne, Mouchy, Senlis, Monneville.
- 622. acicula**, Lamk., Desh., n. 108, pl. 58, fig. 21-23, Hermes, Mouchy-le-Châtel (Oise).
- 623. geminatum**, Sow. 1816, t. 2, p. 61, pl. 127, fig. 2 Cliff.
- 624. dubium**, Sow. 1816. Min. Conch. t. 2, p. 107, pl. 14 Angleterre, Subbington, Londres.
- \***627. diaboli**, Brongniart, 1823. Vicentin, p. 72, pl. 6, France, St-André-de-Meouvile (Basses-Alpes), Montagne de rets, près Bex, vallée du Rhône.
- 628. solitarium**, Conrad., 1833. États-Unis, Alabama.
- 629. decisum**, Conrad., 1833. *Fusus decisus*, Conrad. Éta Alabama.



**630. sagenula**, Conrad., 1833. États-Unis, Alabama.

**BUCCINUM**, Linné, 1758. Voy. p. 134.

\***631. bistratum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 165, n. 5, et t. 6, pl. 44, fig. 12. Desh., 1824, 2, p. 648, pl. 86, fig. 11-13. Grignon, Mouchy.

\***632. substriatulum**, d'Orb., 1847. *B. striatulum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 164, n. 2. Desh., 1824, 2, p. 649, pl. 94 bis, fig. 24-26 (non Muller, 1774). Grignon.

**633. subintermedium**, d'Orb., 1847. *B. intermidum*, Desh., 1824, 2, p. 649, pl. 87, fig. 1-3, (non Brocchi 1814). Grignon, Parnes, Lattainville, Hermes, Mouchy.

\***634. subdecussatum**, d'Orb., 1847. *B. decussatum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 165, n. 4. Desh., 1824, 2, p. 650, pl. 87, fig. 4-6, (non Born, 1780). Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Lattainville.

\***635. stromboides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 164, n. 1. Desh., 1824, 2, p. 647, pl. 86, fig. 8-10. Grignon, Courtagnon, Montmirail, Parnes, Mouchy.

**636. junceum**, Sow., 1822. Min. Conch., t. 4, p. 103, pl. 375, fig. 1. Angleterre, Londres, Barton, Highgate; France, Paris.

**639. sagemum**, Lea. *Nassa cancellata*, Lea. *Nassa sagemum*, Conrad. États-Unis, Alabama.

**BUCCINANOPS**, d'Orb., 1839. Voy. p. 303.

\***640. prorsum**, d'Orb., 1847. *Buccinum prorsum*, Conrad., 1833. États-Unis, Alabama.

\***641. amœnum**, d'Orb., 1847. *Buccinum amœnum*, Conrad., 1833. *Terebra gracilis*, Lea., 1833. États-Unis, Alabama.

**SULCOBUCCINUM**, d'Orb., 1847. Voy. p. 303.

\***642. obtusum**, d'Orb., 1847. *Buccinum obtusum*. Desh., 1824, 2, p. 657, pl. 88, fig. 1-2. France, Chaumont.

**MONOCEROS**, Lamarck, 1809.

\***643. armigera**, Conrad., 1833. *Melongenella armigera*, Conrad., *Fusus Taitii*, Lea. États-Unis, Alabama.

\***644. vetusta**, Conrad., 1833. *M. pyruloides*, Lea. *M. fusiformis*, Lea. États-Unis, Alabama.

**TREBERA**, Lamarck, 1801.

\***645. plicatula**, Lam., Desh., n. 1, pl. 87, fig. 25, 26. Mouchy, Chaumont, Lierville, Ancy-en-Mulcien (Oise), Parnes, Grignon, Courtagnon.

**646. perlata**, Conrad, 1833. *T. venusta*, Lea. États-Unis, Alabama.

\***647. costata**, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.

**NARPA**, Lamarck, 1801.

\***648. mutica**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. 167, n. 1, et t. 6, pl. 44, fig. 14. Desh., 1824, 2, p. 649, pl. 86, fig. 14, 15. Grignon, Parnes, Mouchy, Valescourt, Uilly.

**NORIO**, Montfort, 1810. *Cassidaria*, Lamarck, 1811.

\***650. textilius**, d'Orb., 1847. *Cassidaria textiliosa*, Desh., 1824, 2, p. 635, pl. 85, fig. 14-16. France, Parnes, Mouchy (Oise).

- \***651. funiculosus**, d'Orb., 1847. *Cassidaria funiculosus*, 1824, 2, p. 636, pl. 85, fig. 6, 7. Courtagnon, Parnes (Oise).
- \***652. nodosus**, d'Orb., 1847. *Cassidaria nodosa*, Nyst., 1 tert. de Belgiq., p. 563. *Buccinum nodosum*, Brand., 1766, F frontisp., fig. 131, p. 43, n. 181. *C. carinata*, Lam., Ann. t. 2, p. 169, n. 3. Desh., 1824, 2, p. 633, pl. 85, fig. 8, 9; pl. Sowerby, pl. 6, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, Courtagnon, C Mouchy, Valmondois, Tancrou, Betz, Cuvergnon; Belg., Groenendael, Rouge-Cloître, St-Josse, St-Gilles, Boisfort Afflighem, Melsbroeck; Angleterre, Barton, Highgate.
- \***653. ambiguus**, d'Orb., 1847. *Buccinum ambiguum*, Bran pl. 4, fig. 5. *Cassis striata*, Sow., 1812, M. C., 1, p. 24, pl infér. droite. Angl., Highgate.
- CASSIS**, Bruguière, 1791.
- \***654. harpeformis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 2, p. Desh., 1824, 2, p. 638, pl. 86, fig. 3-6. Grignon, Courtagnon Parnes, Hermes, Lattaincourt.
- \***655. cancellata**, Lamk. Ann. du Mus., t. 2, p. 169, n. 1824, 2, p. 639, pl. 86, fig. 1, 2. *Cassidaria cancellata*, Lam s. vert., t. 7, p. 217, n. 6. Parnes, Chaumont, Liancourt, (Oise).
- \***656. Taitii**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- \***657. nuperus**, Conrad, 1833. *Buccinum Sowerbyi*, La Unis, Alabama.
- \***658. brevicostatus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama
- CREPIDULA**, Lamarck, 1801.
- \***659. lirata**, Conrad, 1833, *C. cornu-aristis*, Lea. États-l bama.
- \***660. dumosa**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- CAPULUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 31.
- \***661. squammæformis**, d'Orb., 1847. *Pileopsis squammæformis*, Desh., 1824, 2, p. 27, pl. 3, fig. 11, 12. *Patella squammæformis* Ann. du Mus., t. 1, p. 311, n. 9. *Pileopsis squammæformis* Anim. s. vert., t. 6, 2<sup>e</sup> part., p. 19, n. 8. *Pileopsis opercular* 1824. Env. de Paris, 2, p. 28, pl. 3, fig. 8, 9, 10. (Variété dé par le mode d'habitation dans les coquilles.) Parnes, Cl Mouchy. P. S. la Chapelle, près de Senlis, Acy.
- \***662. elegans**, d'Orb., 1847. *Pileopsis elegans*, Desh., 1824, pl. 3, fig. 16, 17, 18, 19. Mouchy, les Gueux, Hermes, (Oise).
- \***663. retortellus**, d'Orb., 1847. [*Pileopsis retortella*, Des 2, p. 26, pl. 2, fig. 17, 18. *Patella retortella*, Lamk., 1804, Mus., 1, p. 311, n. 7. *Pileopsis retortella*, ibid., Anim. s. 2<sup>e</sup> part., p. 19, n. 6. Grignon, Mouchy, Chaumont, Parnes.
- \***664. spirirostris**, d'Orb., 1847. *Pileopsis spirirostris*, Des 2, p. 26, pl. 3, fig. 13, 14, 15. *Patella spirirostris*, Lamk., 18 du Mus., t. 1, p. 311, n. 6. Vélins, n. 1, fig. 18. *Pileopsis spi* Lamk., Anim. s. vert., t. 6, 2<sup>e</sup> part., p. 19, n. 5. Grignon, Chaumont, Mouchy, Uilly.
- \***665. cornu-copie**, d'Orb. *Pileopsis cornu-copie*, Desh.,

- p. 23, pl. 2, fig. 13-16. Nyst., 1843, pl. 35, fig. 10. *Patella cornu-copiae*, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 1, p. 311, n. 5, et t. 6, pl. 43, fig. 4. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Courtagnon, Montmirail, Hauteville, près Valognes; Angl., Hallywels? Belgique, Kreygelberg.
- \*666. *dilatatus*, d'Orb., 1847. *Patella dilatata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 311, n. 4, t. 6, pl. 43, fig. 2 et 3. *Pileopsis dilatata*, Desh., 1824, t. 2, p. 24, pl. 2, fig. 19-21. (Peut-être variété du *C. cornu-copiae*.) Grignon, Parnes, Valmondois.
- \*667. *pennatus*, d'Orb., 1847. *Pileopsis pennata*, Desh., 1824, 2, p. 27, pl. 3, fig. 5; 6, 7. *Patella pennata*, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 1, p. 311, n. 8. Houdan, Chaumont, Henonville (Oise).
668. *variabilis*, d'Orb., 1847. *Pileopsis variabilis*, Galeotti, 1837, Mém. Coust. géol. prov. de Brab., Mém. acad. Brux., 12, p. 49 et 149, pl. 3, fig. 8. Nyst., 1843, Coq. tert. de Belg., p. 356, pl. 35, fig. 9. Belgique, Bruxelles, Melsbroeck, Forêt.
669. *pygmaeus*, d'Orb., 1847. *Hipponix pygmaea*, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.
- INFUNDIBULUM**, Montfort, 1810. Voy. p. 282.
- \*670. *trochiforme*, Conrad, 1833. *Calyptrea trochiformis*, Lamk., 1802, Anim. s. vert., t. 7, p. 558, n. 9. Desh., 1824, t. 2, p. 30, pl. 4, fig. 1, 2, 3. *Infundibulum echinulatum*, Sow., 1815, Min. Conch., n. 18, pl. 97, fig. 2. *I. spinulosum*, Sow., pl. 97, fig. 6. *I. tuberculatum*, Sow., pl. 97, fig. 4, 5. Grignon, Parnes, Valmondois, la Chapelle, près Senlis, Beauchamp; Angleterre, Barton, Plunstedt, Londres; Belgique, Louvain, Afflighem; États-Unis, Alabama, Claiborne.
- \*671. *lamellosum*, d'Orb., 1849. *Calyptrea lamellosa*, Deshayes, 1824, t. 2, p. 32, pl. 4, fig. 5, 6, 7. France, Parnes, Mouchy, Gomerfontaine, St-Félix.
672. *crepidulare*, d'Orb., 1847. *Calyptrea crepidularis*, Lamk., Ann. du Mus., 1, p. 385, n. 2. Vélins du Mus., n. 1, fig. 24. Desh. 1824, 2, p. 32, pl. 4, fig. 16, 17, 18. France, Grignon.
673. *obliquum*, Sow., 1815, Min. Conch., t. 1, p. 219, pl. 97, fig. 1. Angl., Londres, Brakenhurst, Barton.
675. *laevigatum*, d'Orb., 1847. *Calyptrea laevigata*, Desh., Paris, pl. 4, fig. 8 (non Lam.). France, Parnes, Mouchy.
- FISSURELLA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 126.
- \*676. *costaria*, Deshayes, 1824, 2, p. 20, pl. 2, fig. 10, 11, 12. Grignon.
677. *squamosa*, Desh., 1824, 2, p. 21, pl. 2, fig. 1, 2, 3. France, le Vivray, Chaumont, Mouchy.
- \*678. *labiata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 312, n. 4. Vélins du Mus., n. 1, fig. 19, 20. Desh., 1824, 2, p. 21, pl. 2, fig. 4, 5, 6. Maulle, Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Lattainville.
679. *Parisiensis*, d'Orb. 1847. *F. graeca*, Lamk., 1804, Anim. s. vert., t. 6, 2<sup>e</sup> part., p. 11, n. 4. Desh., 1824, 2, p. 19, pl. 2, fig. 7, 8, 9 (exclus. localités). Grignon.
- \*680. *tenebrosa*, Conrad, 1833. *F. Claibornensis*, Lea. États-Unis, Claiborne (Alabama).
- EMARGINULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 197.
- \*681. *radiola*, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 384, n. 3. Deshayes,

- 1824, 2, p. 16, pl. 1, fig. 25, 29, 33. France, Parnes, Mouchy, Liancourt, le Vivray, Chaumont.
- 682. clypeata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 384, n. 2, et t. 6, pl. 43, fig. 5. Desh. 1824, 2, p. 17, pl. 1, fig. 20-24. Grignon.
- 683. clathrata**, Deshayes, 1824, t. 2, p. 17, pl. 1, fig. 26-28. Parnes.
- 684. costata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 384, n. 2, et t. 6, pl. 43, fig. 6. Desh., 1824, 2, p. 18, pl. 1, fig. 30-32. Grignon, Mouchy, Lattainville, Henonville.
- 685. elegans**, Defr., Dict. des Sc. nat., t. 14, p. 382. Desh., 1824, 2, p. 16, pl. 3, fig. 1-4. Parnes, Mouchy, les Groux.
- 686. elongata**, Defr., Dict., t. 14, p. 383. Gomerfontaine, Parnes (Oise).
- 687. arata**, Conrad, 1833. États-Unis, Claiborne (Alabama).
- HELICION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.
- 688. Duclosii**, d'Orb., 1847. *Patella Duclosii*, Desh., 1824, 2, p. 9, pl. 1, fig. 8-13. Parnes.
- 689. elongatus**, d'Orb., 1847. *Parmaphorus elongatus*, Deshayes, 1824, 2, p. 13, pl. 1, fig. 15-18. *Patella elongata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 310, et t. 6, p. 43, fig. 1. Grignon, Mouchy, Halaincourt, Parnes, P. S. Valmondois, la Chapelle, près Senlis. C'est un *Helcion*, et non un *Parmaphorus*.
- 690. angustus**, d'Orb., 1847. *Parmaphorus angustus*, Desh., 1824, 2, p. 14, pl. 1, fig. 16, 17. Grignon, Mouchy.
- 691. striatus**, d'Orb., 1847. *Patella striata*, Sowerby, 1823, Min. Conch., t. 4, p. 123, pl. 389. Angl., Londres, Stubbington ; France, Hauteville (Manche).
- CHITON**, Linné, 1758.
- 692. Grignonensis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 309. Vélins du Mus., n. 1, fig. 6, 7, 8. Grignon, Ully, Lattainville.
- 693. antiquus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- DENTALIUM**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 73.
- 694. acuminatum**, Deshayes, Monogr., n. 35, pl. 3, fig. 19, 20. Parnes, Mouchy, Monneville (Oise).
- 695. bicarinatum**, Desh., Mon., n. 26, pl. 4, fig. 16, 17. Parnes, Mouchy-le-Châtel (Oise).
- 696. brevisium**, Desh., Mon., n. 29, pl. 3, fig. 13-14. Nyst., p. 344. Châteaurouge (Oise) ; Belgique, Jette, Bruxelles.
- 698. duplex**, Defr., Desh., Mon., n. 25, pl. 4, fig. 9, 10. Chaumont, Parnes, Neuvillebosc, Monneville (Oise).
- 699. subeburneum**, d'Orb., 1847. *D. eburneum*, Desh., Monogr., n. 33, pl. 3, fig. 8-11 (non Linné, 1767). Chaumont, Halaincourt, Acy-en-Mulcien (Oise).
- 700. pseudo-entalis**, Lamarck, Deshayes, Mon., n. 17, pl. 1, fig. 21. Grignon.
- 701. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *D. semi-striatum*, Desh., 1826, Mon., n. 31, pl. 3, fig. 15, 16 (non Turton, 1819). Chaumont, Parnes, Mouchy-le-Châtel, Senlis (Oise).
- 702. strangulatum**, Desh., Mon., n. 39, pl. 2, fig. 18. Chaumont, Pierrefonds, Acy-en-Mulcien (Oise).

- \*703. substriatum**, Desh., Mon., n. 30, pl. 4, fig. 1, 2. Nyst., p. 344, Chaumont, Ullly-Saint-Georges, Lierville (Oise), Faudou (Hautes-Alpes); Belgique, Jette, près de Bruxelles (d'après M. Deshayes).
- \*704. sulcatum**, Lam., Desh., Mon., n. 9, pl. 4, fig. 15. Chaumont, Ancy-en-Mulcien (Oise).
- \*705. striatum**, Sow., 1814, Min. Conch., 1, p. 159, pl. 70, fig. 4. Angl., Hordwell et Barton-Cliff.
- \*707. nitens**, Sow., 1814, Min. Conch., 1, p. 159, pl. 70, fig. 1, 2. Angl., Highgate.
- \*708. thalloides**, Conrad, 1833. *D. alternatum*, Lea. États-Unis, Alabama.
- BULLA**, Linné, 1758.
- \*709. ovulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 221, n. 1, et t. 8, pl. 59, fig. 2. Desh., 1824, 2, p. 39, pl. 5, fig. 13, 14, 15. Grignon, Courtagnon, Mouchy, Chaumont.
- \*710. cylindroides**, Deshayes, 1824, 2, p. 40, pl. 5, fig. 22, 23, 24. Parnes, Grignon, Mouchy, Chaumont, Hauteville (Manche), P. S. Ermenonville.
- \*711. lævis**, Defr., Dict. des Sc. nat., t. 5, Suppl., n. 2. Desh., 1824, 2, p. 40, pl. 5, fig. 25, 26. Grignon, Houdan, Mouy, Henonville.
- \*712. globulus**, Deshayes, 1824, 2, p. 40, pl. 5, fig. 33, 38, 39. La ferme de l'Orme.
- \*713. conulus**, Desh., 1824, 2, p. 41, pl. 5, fig. 34-36. Grignon, Parnes, Mouchy, Houdan, Thury.
- \*714. Brugueri**, Desh., 1836, Anim. s. vert., 7, p. 680, *B. cylindrica*, Brug., Dict. encycl., p. 371, n. 1 (non espèce vivante). Desh., 1824, 2, p. 42, pl. 5, fig. 10, 11, 12. Grignon, Parnes, Courtagnon, Hauteville (Manche); Belgique, Rouge-Cloltre, Saint-Josse-ten-Noode.
- \*715. coronata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 222, n. 4, et t. 8, pl. 59, fig. 4. Desh., 1824, 2, p. 42, pl. 5, fig. 18, 19, 20. Grignon, Hauteville, Pouchon, Chaumont, Gypseuil.
- \*716. plicata**, Deshayes, 1824, 2, p. 43, pl. 5, fig. 31, 32, 33. Mouchy.
- \*717. striatella**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 221, n. 2, et t. 8, pl. 59, fig. 3. Desh., 1824, 2, p. 43, pl. 5, fig. 7, 8, 9. Grignon, Chaumont. P. S. la Chapelle, près Senlis.
- \*718. constricta**, Sow., 1824, Min. Conch.; 5, p. 96, pl. 464, fig. 2. Londres, Barton.
- \*719. Sowerbyi**, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgique, p. 456; pl. 39, fig. 8. Belgique, Lacken, environs de Bruxelles; Angleterre, Barton, Hordwell.
- \*720. subfilosa**, d'Orb., 1847. *B. filosa*, Sow., 1824, Min. Conch., t. 5, p. 95, pl. 364, fig. 4 (non Schum., 1807). Angl.
- \*721. elliptica**, Sow., 1824, t. 5, p. 95, pl. 464, fig. 6. Barton.
- \*722. subacuminata**, d'Orb., 1847. *B. acuminata*, Sow., 1824, Min. Conch., t. 5, p. 95, pl. 464, fig. 5 (non Brug., 1791). Londres, Barton, Hordwell.

**723. petrosa**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399. En Ballast-Point, Tampa-Bay.

**724. galba**, Conrad, 1833. *B. St-Hilairei*, Lea. États-Uni SCAPHANDER, Montfort, 1810.

**725. attenuata**, d'Orb., 1847. *Bulla attenuata*, Sow., 1815. Conch., t. 5, p. 95, pl. 464, fig. 3. Angl., Londres, Hordwell LOBARIA, Muller, 1741. *Philine*, Ascanius, 1772. *Bullæa*, 1801.

**726. striata**, d'Orb., 1847. *Bullæa striata*, Desh., 1824, pl. 5, fig. 1, 2, 3. Grignon, Mouchy, Lattainville, Uilly.

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**OLAVAGELLA**, Lamarck, 1807, p. 157.

**727. echinata**, Lamk., Deshayes, 1824, 1, p. 9, pl. 1, fig. 1. *Fistulana echinata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 429, n° 1, pl. 43, fig. 9. *Fistulana tibialis*, Lam., Desh., pl. 1, fig. 6, 10 Grignon, Courtagnon. Blaye.

**728. cristata**, Lamk., Anim. s. v., t. 5, p. 432, n° 2. 1824, 1, p. 10. France, Grignon.

**729. Lodoyska**, Caillat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine p. 1, pl. 9, fig. 9. France, Grignon.

**TEREDO**, Linné, 1758.

**730. Burtini**, Desh., Trait. Conch., 1, p. 59. Burtin Bruxel., p. 114, pl. 27, fig. 6. France, Babeuf, Chaumont, (Oise).

**731. antinautæ**, Sow., 1815, Min. Conch., t. 1, p. 231, Angl., Highgate.

**SOLEN**, Linné, 1758. Voy. p. 135.

**732. subvaginoides**, d'Orb., 1847. *S. vaginoides* Desh., 1815. Bl., Lam., 1818), *S. vaginalis*, Desh., 1847. *S. vagina*, Lam. du Mus., t. 7, p. 427, n° 1, et t. 12, pl. 43, fig. 3. Desh., p. 25, pl. 2, fig. 20, 21. *S. ambiguus*, Desm., 1832 (non Blainv Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont. P. S. Valmondois; B Bruxelles).

**733. fragilis**, Lamk., Desh., 1824, 1, p. 26, pl. 4, fig. 3, Ann. du Mus., t. 7, p. 428, n° 2, t. 12, pl. 43, fig. 2. Grignon, de l'Orme.

**734. affinis**, Sow., 1812, Min. Conch., t. 1, p. 15, pl. 3. Highgate.

**PANOPEA**, Menard, 1807. Voy. vol. 1, p. 164.

**735. subintermedia**, d'Orb., 1847. *Panopea Faujasi*, Sow. M. Conch., p. 212, pl. 602. *P. intermedia*, Goldf., 1839, Pe p. 275, pl. 158, fig. 6. (Non *Mya intermedia*, Sow., 1814, Min. 1, p. 178, pl. 76, fig. 1.) Angleterre, Bognor; Allem., Bündelsdorf.

**736. oblata**?, d'Orb., 1847. *Lutraria oblata*, Sow., 1824. Conch., t. 5, p. 66, pl. 534, fig. 3. Angleterre, Bognor.

**PHOLADOMYA**, Sow., 1826. Voy. vol. 1, p. 73.

- 737. margaritacea**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 3, p. 175, pl. 297, fig. 1-3. Angleterre, Londres, baie de Bogwell, dans l'île de Thanet.
- 738. Koninckii**, Nyst., 1843, p. 50, pl. 1, fig. 9. Belgique, Laudon, env. de Liège, la montagne de Flénu, Jemmapes, et Tournay, Frasnes-les-Buisseval, bois de Martinon.
- GASTROCHENA**, Spengler, 1783. Voy. vol. 1, p. 275.
- \*739. elongata**, d'Orb., 1847. *Fistulana elongata*, Deshayes, 1824, 1, p. 15, pl. 4, fig. 17, 18, 19. Grignon; États-Unis, Alabama (d'après M. Conrad).
- \*740. ampullaria**, d'Orb., 1847. *Fistulana ampullaria*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 428. Desh., 1824, 1, p. 15, pl. 1, fig. 17, 18, 20, 21. Grignon, Parnes, Mouchy, Amblainville.
- SAXICAVA**, Fleureau, 1802.
- 741. Grignonensis**, Deshayes, 1824, 1, p. 64, pl. 9, fig. 18, 19. Grignon.
- SOLECURTUS**, Blainville, 1824. Voy. p. 75.
- \*742. appendiculatus**, d'Orb., 1847. *Solen appendiculatus*, Lamk.; Ann. du Mus., t. 7, p. 228, n° 5, t. 12, pl. 43, fig. 4. Deshayes, 1824, 1, p. 27, pl. 4, fig. 5, 6. Grignon, Mouchy, Houdan, Chaumont, Hadancourt.
- 743. effusus**, d'Orb., 1847. *Solen effusus*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 428, n° 3, t. 12, pl. 43, fig. 1. Deshayes, 1824, 1, p. 27, pl. 2, fig. 24, 25. Grignon, Mouchy-le-Châtel, Hermes.
- \*744. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *Solen strigillatus*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 428, n° 4, t. 12, pl. 43, fig. 5 (non Linné). Desh., 1824, 1, p. 27, pl. 2, fig. 22, 23. (*Solen Parisiensis*, Desh.) Mouchy, St-Germain, Parnes, Hermes.
- \*745. ovalis**, d'Orb., 1847. *Solen ovalis*, Desh., 1824, 1, p. 28, pl. 2, fig. 26, 27. Maulette, près Houdan, Mouchy, Château-Rouge.
- 746. Hollowaysii**, d'Orb., 1847. *Sanguinolaria Hollowaysii*, Sow., 1817, Min. Conch., t. 2, p. 133, pl. 159. Angleterre, Londres, Bricklesome.
- 747. compressus**, d'Orb., 1847. *Sanguinolaria compressa*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 91, pl. 462. Londres, Barton.
- LEGUMINARIA**, Schumacher, 1817. Voy. p. 158.
- 748. papyracea**, d'Orb., 1847. *Solen papyraceus*, Desh., 1824, 1, p. 26, pl. 2, fig. 18, 19. Mouchy.
- MACTRA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 216.
- \*749. semisulcata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 412, et t. 9, pl. 20, fig. 3. Desh., 1824, 1, p. 31, pl. 4, fig. 7-10. Grignon, Parnes, Houdan, Chaumont. P. S. Valmondois, la Chapelle, près Luzarches; Belgique, Louvain, etc.
- \*750. prætenuis**, Conrad, 1833. *M. Alabamensis*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 751. decisa**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 752. parilis**, Conrad, 1833. *M. pygmaea*, Lea. États-Unis, Alabama.
- ARCOPAGIA**, Brown, 1827. Voy. p. 75.
- 753. elegans**, d'Orb., 1847. *Tellina elegans*, Deshayes, 1824, 1, p. 78, pl. 11, fig. 7, 8. Mouchy, Chambors, Lattainville.

- \***754. sinuata**, d'Orb., 1847. *Tellina sinuata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 233, n° 4, et t. 12, pl. 40, fig. 8. Deshayes, 1824, 1, p. 79, pl. 11, fig. 15, 16. Grignon, Mouchy; Belgique, abbaye d'Aflighem.
- \***755. patellaris**, d'Orb., 1847. *Tellina patellaris*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 232, n° 1, et t. 12, pl. 41, fig. 90. Deshayes, 1824, 1, p. 77, pl. 11, fig. 5, 6, 13, 14. Grignon, Mouchy, Parnes, Liancourt.
- 756. erycinoides**, d'Orb., 1847. *Tellina erycinoides*, Deshayes, 1824, 1, p. 78, pl. 11, fig. 11, 12. Parnes, Mouchy, Chaumont, Gomerfontaine.
- \***757. carinulata**, d'Orb., 1847. *Tellina carinulata*, Lam., Ann. du Mus., t. 7, p. 232, n° 3. Deshayes, 1824, 1, p. 83, pl. 13, fig. 1, 2. Grignon, la ferme de l'Orme, Mouchy, Château-Rouge.
- 758. corbisoides**, d'Orb., 1847. *Tellina corbisoides*, Caillat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine-et-Oise, p. 3, pl. 9, fig. 8. Grignon.
- 759. pustula**, d'Orb., 1847. *Tellina pustula*, Desh., 1824, 1, p. 85, pl. 13, fig. 9, 10, 11. Mouchy-le-Châtel.
- 760. lamellosa**, d'Orb., 1847. *Tellina lamellosa*, Desh., n° 9, pl. 12, fig. 3, 4. Chaumont, les Groux. P. S. Valmondois.
- \***761. alta**, d'Orb., 1847. *Tellina alta*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399 (pl. 4, fig. 10). Con., Foss. Shells of Tert. form., p. 41. États-Unis, Claiborne, Alabama.
- 762. Branderi**, d'Orb., 1847. *Tellina Branderi*, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 143, pl. 402, fig. 4. Londres, Barton.
- 763. Hantoniensis?**, d'Orb., 1847. *Tellina Hantoniensis*, Edwards, 1847, London Geolog. Journ., p. 45, pl. 10, fig. 1. Barton.
- 764. obovata?**, d'Orb., 1847. *Tellina obovata*, Edwards, 1847, London Geolog. Journ., p. 49, pl. 11, fig. 2. Barton.
- TELLINA**, Linné, 1758. Voy. vol. 1, p. 275.
- \***766. rostralis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 234, n° 6, et t. 12, pl. 41, fig. 10. Deshayes, 1824, 1, p. 80, pl. 11, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, Chaumont, Liancourt, Mouchy.
- \***767. tenuistria**, Deshayes, 1824, 1, p. 80, pl. 11, fig. 9, 10; pl. 12, fig. 5, 6. Chaumont, Parnes, le Vivray, Henonville, Mouy; Angl., Barton.
- \***768. scalaroides**, Lam., Ann. du Mus., t. 7, p. 233, n° 2, et t. 12, pl. 41, fig. 7. Deshayes, 1824, 1, p. 81, pl. 12, fig. 9, 10. Edwards, Lond. Geol. Journ., pl. 10, fig. 4. Grignon, Chaumont, Parnes. P. S. Senlis; Angleterre, Barton.
- \***769. biangularis**, Deshayes, 1824, 1, p. 82, pl. 12, fig. 1, 2. Parnes, Liancourt.
- \***770. rostralina**, Deshayes, 1824. Env. de Paris, 1, p. 82, pl. 12, fig. 13, 14, 15. Grignon, Parnes, Chaumont, le Tomberay.
- \***771. donacialis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 233, n° 5. Desh., 1824, 1, p. 83, pl. 12, fig. 7, 8, 11, 12. Edwards, London, pl. 11, fig. 6. Grignon, Parnes, Mouchy, la Chapelle, près Senlis; Angl., Barton.
- \***772. corneola**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 234, n° 7. Deshayes, 1824, 1, p. 84, pl. 14, fig. 4, 5. Grignon, Maulle.



- 773. tellinoides**, d'Orb., 1847. *Erycina tellinoides*, Desh., n° 8, pl. 6, fig. 10-12. Chaumont, Parnes, Ponchon, Thury-sous-Clermont.
- 775. subtenuistria**, d'Orb., 1847. *Erycina tenuistria*, Desh., n° 6, pl. 6, fig. 7-9 (non n° 767). Mouchy-le-Châtel, Hadancourt-le-Haut-Clocher (Oise).
- 776. filosa**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 143, pl. 402, fig. 2. Edwards, 1847, Lond. geol. Journ., p. 46, pl. 10, fig. 2. Londres, Barton.
- 777. ambigua**, Sow., 1823, Min. Conch., 4, p. 144, pl. 403. Londres, Barton.
- 778. rhomboidalis**, Edwards, 1847, London Geol. Journ., p. 46, pl. 10, fig. 3. Angl., Barton.
- 779. lunulata**, Desh., Edwards, 1847, London Geol. Journ., p. 49, pl. 11, fig. 3. Angl., Barton.
- 780. tumescens**, Edwards, 1847, Lond. Geol. Journ., p. 50, pl. 11, fig. 4. Angl., Barton.
- 783. subconcinna**, d'Orb., 1847. *T. concinna*, Edwards, 1847, id., p. 48, pl. 11, fig. 1. (Non Phillips, 1844.) Barton.
- \*784. subplana**, d'Orb., 1847. *T. plana*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 400, pl. 4, fig. 6. (Non Donovan, 1799.) *Egeria plana*, Lea, Cont. to Geol., p. 54, pl. 1, fig. 25. Claiborne, Alabama.
- 785. Ravenelli**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 400, pl. 5, fig. 1. États-Unis, Claiborne, Alabama.
- 786. Scandula**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 400, pl. 4, fig. 8. Con., Journ. Acad. nat. Sc., vol. 7, p. 132. États-Unis, Claiborne, Alabama.
- 787. ovalis**, Conrad, 1833. *Egeria ovalis*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 789. Sillimani**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399, pl. 4, fig. 9. États-Unis, Claiborne, Alabama.
- 790. papyria**, Conrad, 1846, id., p. 399, pl. 4, fig. 7. Con., Foss., Shells of Tert. Form., p. 41. Claiborne.
- 791. subfilosa**, d'Orb., 1847. *Psammobia filosa*, Conrad, 1833 (non Sow., 1823). Alabama.
- 792. eborea**, d'Orb., 1847. *Psammobia eborea*, Conrad, 1833. Alabama.
- AMPHIDESMA**, Lamarck, 1819.
- 793. linosa**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 397, pl. 4, fig. 2. Foss. Shells of Tert. form., p. 42. Claiborne.
- 794. tellinula**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 397, pl. 4, fig. 5. Claiborne.
- 795. profunda**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- DONAX**, Linné, 1758.
- \*796. tellinella**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 230, n° 3, et t. 12, pl. 41, fig. 2. Deshayes, 1824, 1, p. 111, pl. 18, fig. 9-11. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Chaumont, Hadancourt.
- \*797. nitida**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 231, n° 4, et t. 12, pl. 41, fig. 6. Deshayes, 1824, 1, p. 112, pl. 18, fig. 3, 4. Grignon, Damerie, Aumont, Monneville; Belgique, Rouge-Cloître.

\***799. limatula**, Conrad, 1833. *Egeria triangulata*, Lea. *E. dii*, Lea. États-Unis, Alabama.

**800. fragilis**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**LEDA**, Schumacher, 1817. Voy. vol. 1, p. 11.

\***801. striata**, d'Orb., 1847. *Nucula striata*, Lam., Desl. pl. 42, fig. 4-6. Goldf., pl. 125, fig. 15. Nyst., 1843. Belg. pl. 17, fig. 4. France, Chaumont, Parnes, Mouchy, Thury-s mont (Oise); Allemagne, Streitberg; Belgique, Forêt, Je vain.

**802. glaberrima**, d'Orb., 1847. *Nucula glaberrima*, Goldf., 1838, Petref., 2, p. 157, pl. 125, fig. 14. Allemagne berg.

**803. pygmæa**, d'Orb., 1847. *Nucula pygmæa*, Münster, Goldf. Petref., 2, p. 157, pl. 125, fig. 17. Streitberg.

**804. inflata**, d'Orb., 1847. *Nucula inflata*, Sow., 1827, Min. 6, p. 103, pl. 554, fig. 2. Angleterre, Londres, Highgate.

**805. amygdaloides**, d'Orb., 1847. *Nucula amygdaloides*, 1827, Min. Conch., 6, p. 103, pl. 554, fig. 4. Angl., Hyde-Park, James-Park, Southend.

**806. tellinula**, d'Orb., 1847. *Nucula tellinula*, Conrad. Amer. Journ., p. 340. États-Unis, Ballast-Point, Tampa-Bay.

\***807. Deshayesiana**, d'Orb., 1847. *Nucula Deshayesiana*, Nyst., 1848, Coq. Tert. de Belgiq., p. 221, pl. 15, fig. 8. Baesele.

**808. Galeottiana**, d'Orb., 1847. *Nucula Galeottiana*, Nyst. Coq. Tert. de Belgiq., p. 223, pl. 18, fig. 3. *N. mucronata*, 1837. (Non *N. mucronata*, Sow.) Belgique, Bruxelles, Lacke Forêt, Louvain; France, Courtagnon.

N. B. Plus quatre espèces d'Alabama (États-Unis), sans doute sous le nom de *Nucula*, par M. Conrad.

\***809. Rouyana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *L. striata* plus épaisse, plus rostrée et plus excavée sur la région anale. Faudon (Hautes-Alpes).

**PETRICOLA**, Lamarck, 1801.

**810. elegans**, Desh., n° 1, pl. 10, fig. 1-2. Lattainville, G. Ponchon (Oise), P. S. Valmondois.

\***811. coralliophaga**, Desh., 1824, 1, p. 68, pl. 10, fig. 1. Chaumont.

**VENUS**, Linné, 1758. Voy. p. 15.

\***812. multisulcata**, d'Orb., 1847. *Cytherea multisulcata*, 1824, 1, p. 133, pl. 21, fig. 14, 15. Chaumont.

\***813. sulcataria**, Nyst., 1843. *Cytherea sulcataria*, Desh. 1, p. 133, pl. 20, fig. 14, 15. Parnes, Chaumont, Sandecour Acy.

\***814. nitidula**, Nyst., 1843. *Cytherea nitidula*, Lamk. du Mus., t. 7, p. 133, n° 3, et t. 12, pl. 40, fig. 1, 2. Desh., 1 p. 134, pl. 21, fig. 3-6. Nyst., pl. 13, fig. 2. France, Grignon, C gnon, Parnes, Mouchy, Chaumont. P. S. La Chapelle, près Acy, Valmondois; Belgique, Rouge-Cloître, Jette, Aeltere.

- \***815. lunularia**, Desh., 1824, 1, p. 135, pl. 23, fig. 6, 7. Mouchy-le-Châtel, Uilly. P. S. Acy, la Chapelle.
- \***816. turgidula**, Deshayes, 1824, 1, p. 143, pl. 23, fig. 14, 15. Houdan, Blaincourt. P. S. Ermenonville, Versigny (Oise), Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes).
- \***817. solida**, Deshayes, 1824, 1, p. 144, pl. 25, fig. 3, 4. Blaincourt, Varenfroy, P. S. Acy-en-Mulitien, Aumont, Ermenonville.
- \***818. texta**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 130, n° 4, et t. 12, pl. 40, fig. 7. Desh., 1824, 1, p. 144, pl. 22, fig. 16-18. Grignon, Parnes, Mouchy, Liancourt, Chaumont.
- \***819. scobinellata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 130, n° 75, et t. 9, pl. 32, fig. 8. Deshayes, 1824, 1, p. 145, pl. 22, fig. 19-21. Grignon, Parnes, Mouchy, le Tomberay.
- 820. puellata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 130, n° 6. Desh., 1824, 1, p. 145, pl. 25, fig. 5, 6. Grignon, la ferme de l'Orme, Liancourt, P. S. Villemetrie, Ermenonville.
- \***821. obliqua**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 129, n. 3, et t. 9, pl. 32, fig. 7. Desb., 1824, 1, p. 146, pl. 23, fig. 16, 17. Grignon, Mouchy, Russy.
- \***822. semisulcata**, d'Orb., 1847. *Cytherea semisulcata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 133, n. 2, et t. 12, pl. 40, fig. 3. Desh., 1824, 1, p. 140, pl. 20, fig. 5 et pl. 21 fig. 1, 2. Grignon, Plaisir, Parnes, Chaumont, Haute-Ville (Manche).
- 823. laevigata**, Nyst., 1843. *Cytherea laevigata*, Desh., 1824, 1, p. 128, pl. 20, fig. 12, 13. Nyst., pl. 13, fig. 1. Grignon, Courtagnon, Parnes, Houdan, Mouchy. P. S. Beauchamp, Valmondois, Tancrou, Lisy, la Chapelle, près Senlis, Acy-en-Mulicien; Belgique, Gand, Aeltre, affligem, près de Bruxelles.
- \***824. suberycinoides**, Nyst., 1847. *Cytherea suberycinoides*, Desh., 1824, 1, p. 129, pl. 22, fig. 8, 9. Nyst. Belgique, p. 11, fig. 4. France, Mouchy, Acy-en-Mulitien, le Tomberay; Belgique, Aeltre, Rouge Clotre, Rodemberg.
- \***825. striatula**, d'Orb., 1847. *Cytherea striatula*, Desh., 1824, 1, p. 129, pl. 20, fig. 10, 11. France, Grignon, Amblainville, Mouy, Blaincourt, P. S. Beauchamp, Valmondois, Acy.
- \***826. tellinaria**, d'Orb., 1847. *Cytherea tellinaria*, Lam., Ann. du Mus., t. 7, p. 135, n. 6 et t. 12, pl. 40, fig. 4. Deshayes, 1824, 1, p. 130, pl. 22, fig. 4, 5. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont. P. S., Valmondois, Morte-Fontaine.
- \***827. elegans**, Sow., Min. conch., pl. 422, fig. 3. *Cytherea elegans*. Lam., Ann. du Mus., t. 7, p. 134, n. 7 et t. 12, pl. 40, fig. 8. Desh., 1824, 1, p. 132, pl. 20, fig. 8, 9. Grignon, Courtagnon, Damerie, Parnes, Chaumont, Houdan, Plaisir, P. S. Ermenonville, Pierrelaye, Beauchamp, Acy-en-Mulitien, Valmondois; Angleterre, Londres.
- \***828. deltoidea**, d'Orb., 1847. *Cytherea deltoidea*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 125, n. 8. Desh., 1824, 1, p. 131, pl. 20, fig. 6, 7 et pl. 22, fig. 12, 13. Grignon, Maulette, près Houdan. P. S. Damerie, Morte-Fontaine.
- \***829. corbulina**, d'Orb., 1847. *Cytherea corbulina*, Lamk., Ann.

du Mus., t. 7, p. 185, n. 9. Desh., 1824, 1, p. 138, pl. 23, f. Grignon, Lattainville, Chaumont, Thury.

\***830. globulosa**, d'Orb., 1847. *Cytherea globulosa*, Desha 1, p. 137, pl. 21, fig. 9, 10, 11. Chaumont, Grepseuil, Hermet St-Bonnet (Hautes-Alpes).

**831. polita**, Nyst., 1843, *Cytherea polita*, Lamk., Ann. t. 7, p. 134, n. 4. Anim. s. vert, 5, p. 582, n. 6. Desh., 1 139, pl. 23, fig. 3, 4, 5. France, Houdan, Parnes, Chaum Acy, Valmondois ; Belgique, Rougecloître.

**832. transversa**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 25, pl. Barton.

**833. pectinifera**, Sowerby, 1823, t. 5, p. 25, pl. 4. Barton.

**835. Merae**, Brander, 1766. pl. 8, fig. 104. *V. incrassata*, 1817, M. C., 2, p. 126, pl. 155, fig. 1, 2; Angleterre, Hamp merton.

**838. Solandrii**, Sow., 1833, Min. Conch., 6, p. 242. N Belgique, p. 170. *V. limonata*, Sow., 1823, pl. 422, fig. 2 Jette, env. de Bruxelles ; Angl., Barton.

\***839. penita**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399. États-last-Point, Tampa-Bay.

\***840. floridana**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 340. États Ballast-Point, Tampa-Bay.

\***841. subelegans**, d'Orb., 1847, *Erycina elegans*, Desh., n fig. 13-15 (non n. 827). Liancourt, Saint-Pierre, Bouconvi (Oise).

\***842. oblonga**, d'Orb., 1847. *Cypricardia oblonga*, Desha 1, p. 185, pl. 31, fig. 3, 4 (cette espèce a un sinus palléal, et ne peut être une *cypricardia*). Chaumont, Parnes, Mouchy.

\***843. Alpina**, d'Orb., 1847. *Unio alpina*, Mathéron, 184 p. 170, pl. 24, fig. 6, 7; elle a un sinus palléal, et n'est pas, un *unio*. Elle est voisine de la précédente. France, Ancelles Alpes).

\***844. Bonnetiana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente mais plus large et plus rugueuse. France, Saint-Bonnet Alpes).

**845. perovata**, d'Orb., 1847. *Cytherea perovata*, Conrad, comis, Lea. États-Unis, Alabama.

\***845. æquorea**, d'Orb., 1849. *Cytherea æquorea*, Conrad, hydii, Lea. États-Unis, Alabama.

**846. Mortoni**, d'Orb., 1847, *Cytherea Mortoni*, Conrad, 183 Unis, Alabama.

\***847. discoidalis**, d'Orb., 1847. *Cytherea discoidalis*, Conrad C. trigonata, Lea. États-Unis, Alabama.

**848. Poulsoni**, d'Orb., 1847, *Cytherea Poulsoni*, Conrad, globosa, Lea, États-Unis, Alabama.

\***849. subcrassa**, d'Orb., 1847. *Cytherea subcrassa*, Lea, 183 Unis, Alabama.

**850. Nuttali**, d'Orb., 1847, *Cytherea nuttali*, Conrad, 1833 Unis, Alabama.

**GRATELOUPIA**, Demoulins, 1828.

\***851. hydana**, d'Orb., 1847. *Cytherea hydana*, Conrad. *Grateloupia Moulinsii*, Lea. États-Unis, Alabama.

**CYCLAS**, Bruguière, 1791. Voy. p. 60.

\***852. cycladiformis**, d'Orb., 1847. *Cyrena cycladiformis*, Desh., 1824, 1, p. 121, pl. 19, fig. 7, 8, 9. Houdan, Damerie, la ferme de l'Orme, Grignon.

**853. subdepressa**, d'Orb., 1847. *Cyrena depressa*, Desh., 1824, 1, p. 121, pl. 18, fig. 16, 17, 18 (non Lam., 1818). Houdan, Maule, Vaugirard, Parnes.

\***855. Vapincana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine des *C. cuneiformis*, *cyrena*, mais facile à distinguer par une carène qui circonscrit la région anale. France, St-Bonnet (Hautes-Alpes). (Cette espèce avait été indiquée à tort comme l'analogue du *C. cuneiformis*, par M. Deshayes. La Doucette, Statistique des Hautes-Alpes, p. 565).

\***856. Bouyana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de la précédente, mais bien plus allongée sur la région anale. France, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes).

\***857. Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine des deux précédentes, mais plus renflée, plus courte, et bien plus prolongée sur la région buccale. France, St-Bonnet (Hautes-Alpes).

**CORBULA**, Bruguière, 1791. Voy. v. 1, p. 275.

\***858. exarata**, Desh., 1824, 1, p. 48, pl. 7, fig. 4-7 et pl. 8, fig. 4. Mouchy, Saint-Félix, Château-Rouge, le Vivray, Parnes, Ully.

\***859. gallica**, Lam., Ann. du Mus., t. 8, p. 466, n. 1. Desh., 1824, 1, p. 49, pl. 7, fig. 1, 2, 3. Grignon, Parnes, Fontenai-St-Pères, près Mantes. P. S. Beauchamp, la Chapelle, près Senlis, Tancrou, Ermenonville, Valmondois, Ver.

\***860. Anatina**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 468, n. 6. Desh., 1824, 1, p. 50, pl. 7, fig. 10, 11, 12. Grignon, Houdan, la ferme de l'Orme. P. S. Senlis.

**861. cochlearella**, Desh., 1824, 1, p. 58, pl. 9, fig. 6, 7, 8. Parnes, Grignon.

\***862. cancellata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 468, n. 8. Desh., 1824, 1, p. 58, pl. 9, fig. 9, 10. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont.

**863. radiata**, Deshayes, 1824, 1, p. 58, pl. 9, fig. 11, 12. Grignon; Belgique, Bruxelles.

\***864. faba**, Desh., 1824, 1, p. 56, pl. 8, fig. 5, 6, 7. Grignon, la ferme de l'Orme.

**865. nidita**, Desh., 1824, 1, p. 57, pl. 8, fig. 39, 40, 41. La ferme de l'Orme, Damerie.

\***866. minuta**, Desh., 1824, 1, p. 55, pl. 8, fig. 31-35. Senlis, Assy, Grignon, Parnes, Houdan, Pierre-Laye, Beauchamp, Valmondois.

\***867. rugosa**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 467, n. 2. Desh., 1824, 1, p. 51, pl. 7, fig. 16, 17, 22. Grignon, Parnes, Houdan.

\***868. rostrata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 467, n. 5. Deshayes, 1824, 1, p. 55, pl. 8, fig. 21-25. Grignon, Chaumont, Mouchy.

\***869. striata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 467, n. 3. Deshayes,

- 1824, 1, p. 53, pl. 8, fig. 1, 2, 3, et pl. 9, fig. 1-5. Grignon, Valmondois, Assy-en-Mulitien; Belgique, Bruxelles.
- 870. umbonella**, Desh., 1824, 1, p. 53, pl. 7, fig. 18, 19. dois, Monneville, Acy, le Tomberay.
- \*871. subcomplanata**, d'Orb., 1847. *C. complanata*, Desh., pl. 7, fig. 8, 9, 13-15 (non Sow., 1822). Acy-en-Mulitien, Fontenay, Senlis, Le Tomberay (Oise).
- 872. fragilis**, d'Orb., 1847. *Erycina fragilis*, Lamk., Ann. t. 6, p. 413, n. 5. Desh., 1824, 1, p. 40, pl. 6, fig. 4, 5, 6. G. ferme de l'Orme, Mouchy, Baron.
- 873. globosa**, Sow., 1818, Min. Conch., 3, p. 13, pl. 2. Londres, Highgate.
- 874. subrevoluta**, d'Orb., 1847. *C. revoluta*, Sow., 1. Conch., 3, p. 13, pl. 209, fig. 8-13 (non Brocchi, 1814). Bart.
- 877. pisum**, Sow., 1818, M. C., 3, p. 15, pl. 209, fig. 4. l.
- 1879. abbreviata**, d'Orb., 1847. *Nucula abbreviata*, Goldf., Petref., 2, p. 157, pl. 125, fig. 18. Streitberg.
- \*880. Alabamiensis**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 398. Cont. to Geol., p. 45, pl. 1, fig. 12, decemb. 1833. Claiborne.
- \*881. oniscus**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 398 (pl. Con., Silliman's Amer. Journ. of Sciences, t. 23, p. 542, J. Lea; Cont. to Geol., pl. 1. Claiborne, Alabama, Washita riveriana).
- \*882. subnasuta**, d'Orb., 1847. *C. nasuta*, Conrad, 1846, Journ., p. 398, pl. 4, fig. 4. Con. foss. Shells of Tert. Form. Aug., 1833 (non Sow., 1833). États-Unis, Alabama.
- SPHENIA**, Turton.
- \*883. argentea**, d'Orb., 1847. *Corbula argentea*, Lamk., Mus., t. 8, p. 467, n. 7. Desh., 1824, 1, p. 56, pl. 8, fig. 26-30. Chaumont, Marquemont.
- \*884. dispar**, d'Orb., 1847. *Corbula dispar*, Desh., 1824, pl. 8, fig. 36, 37, 38. Parnes.
- PANDORA**, Bruguière. 1791.
- \*885. Defranchii**, Desh., 1824, 8, p. 61, pl. 9, fig. 15, 16, gnon, Parnes; Belgique, Bruxelles.
- ASTARTE**, Sow., 1818, Voy. t. 1, p. 216.
- 886. rugatus**, Sow., 1821, Min. Conch., t. 4, p. 13, pl. 31. Londres, Highgate.
- 890. Nystiana**, Kickx., Nyst., 1843, Belg., p. 156, pl. 6. Lacken, Jette, env. de Bruxelles.
- 892. inaequilatera**, Nyst., 1843, Belg., p. 154, pl. 6, fig. 1. don, Folx-les-Caves.
- \*893. tellinoides**, Conrad, 1833. *A. Niklinii*, Lea. *A. sulcata*, États-Unis, Claiborne (Alabama).
- CRASSATELLA**, Lamarck, 1801, Voy. p. 77.
- \*894. ponderosa**, Nyst., 1843, *Venus ponderosa*, Chemn. Conch., 7, pl. 69. *Crassatella tumida*, Lam., 1805, Ann. du Mus., p. 408; t. 9, pl. 20, fig. 7; Desh., 1824, 1, p. 33, pl. 3, fig. 10,

- gnon, Courtagnon, Parnes, Mouchy, Château-Thierry, Montmirail, Salency ; Belgique, Les grès de Rouge-Cloître, Bruxelles.
- \*895. *sulcata*, Sow., pl. 345, fig. 1. *Tellina sulcata*, Brander, 1766, pl. 7, fig. 69, 70. *C. lamellosa*, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 6, p. 410, n. 3, et t. 9, pl. 20, fig. 4 ; Desh., 1824, 1, p. 35, pl. 4, fig. 15, 16. Grignon, Parnes, Mouchy, Vivray, Hermes, Chaumont ; Anglet., Barton.
- \*896. *trigonata*, Lamk., Desh., 1824, 1, p. 36, pl. 3, fig. 4, 5, *Crassatella triangularis*, Lam., Ann. du Mus., t. 6, p. 411, et t. 9, pl. 20, fig. 6. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Belgique, Bruxelles.
- \*897. *compressa*, Lam., Ann. du Mus., t. 6, p. 410, n. 4, et t. 9, pl. 30, fig. 5 ; Desh., 1824, 1, p. 37, pl. 3, fig. 8, 9, et pl. 5, fig. 3, 4. Grignon, Courtagnon, Chaumont.
- \*898. *gibbosula*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 410, n. 5 ; Deshayes, 1824, 1, p. 37, pl. 5, fig. 5, 6, 7. Houdan, Chaumont, Leivray, Sandecourt, Boury, Parmes.
- \*899. *sinuosa*, Deshayes, 1824, 1, p. 38, pl. 5, fig. 8, 9, 10. Chaumont, Monneville, Gilocourt, Boury.
- \*900. *tenui-stria*, Deshayes, 1824, 1, p. 38, pl. 5, fig. 13, 14. Chaumont, Hénonville.
901. *laevigata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 411 ; Desh., 1824, 1, p. 39, pl. 5, fig. 11, 12. Grignon, Lattainville, Hermes, Hénonville.
- \*902. *rostrata*, Deshayes, 1824, 1, p. 35, pl. 3, fig. 6, 7. Parmes, Blaincourt, Mouchy, Monneville.
903. *plicata*, Sow., 1822, Min. Conch., 4, p. 62, pl. 345 ; Nyst., 1843, Coq vert de Belgiq., p. 85, pl. 4, fig. 3. Belgique, Bruxelles, Gand, Aeltre, Bruges ; Anglet., Parteylodge.
- †904. *landinensis*, Nyst., 1843, Coq tert. de Belgiq., p. 84. Belgique, Lauden.
906. *Nystiana*, d'Orb., 1847. *Crassatella tenuistria*, Nyst., 1843, coq. tert. de Belgiq., p. 86, pl. 4, fig. 4 (non Deshayes, 1824). Belgique, Lacken, Jette, Everlé, près Louvain, France, Chaumont.
- \*907. *snbrhomboidea*, d'Orb., 1847. *C. Rhomboidea*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 396, pl. 3, fig. 5 (non d'Archiac, 1846). Etats-Unis, Orangeburg (Sud Caroline).
908. *palmula*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 396, pl. 4, fig. 1. Etats-Unis, Malborough, Prince George, Maryland.
- \*909. *alta*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 395, Con. foss. Schells of tert. form., pl. 31, fig. 7. Etats-Unis, Claiborne (Alabama).
- \*910. *protecta*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399, Con. foss. Schells. of tert. form., p. 22, pl. 8, fig. 2. Etats-Unis. Claiborne, Alabama.
- \*911. *alseformis*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 396, Con. Journ.. Acad. sc., vol. 6, p. 228, pl. 10, fig. 1. Etats-Unis, Piscataway, Prince George, Maryland.
- CARDITA, Bruguière, 1791. Voy. p. 77.
- \*912. *asperula*, d'Orb., 1847. *Venericardia asperula*, Desh., 1824, 1, p. 155, pl. 26, fig. 3, 4. Chaumont, Château-Rouge.
- \*913. *planicosta*, Desh., 1830, *Venericardia planicosta*, Lamk.,

- Ann. du Mus., t. 7, p. 55, et t. 9, pl. 31, fig. 10; Desh., 1824, 1, pl. 24, fig. 1-3; Sow., 1814, M. C., 1, p. 107, pl. 50; Nyst., pl. 17, fig. 1. Grignon, Courtagnon, Parnes, Houdan, Mouchy, convilliers. P. S. Acy-en-Multien, Pierrefond, Valmondois, E ville (Manche); en Angleterre, dans le Hampshire, Stubbins Belgique, Gand, Aeltre, Afflighem, Jette, Louvain, Roodenberg d'Ypres; Etats-Unis, Alabama, Claiborne.
- \***914. squamosa**, *Venericardia squamosa*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 59, n. 8, et t. 9, pl. 32, fig. 4; Desh., 1824, 1, p. 157, fig. 9, 10, 11. Grignon, Blaincourt, Mouy. P. S. Le Tombermenonville.
- \***915. elegans**, Nyst., 1843. *Venericardia elegans*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 59, n. 10, et t. 9, pl. 32, fig. 8; Desh., 1824, 1, pl. 26, fig. 14, 15, 16. Grignon, Parnes; Belgique, Forêt, La Jette, Bruxelles, Gand, Aeltre, Rouge-Clotire.
- 916. Calcitrapoides**, d'Orb., 1847. *Venericardia aculeata*, 1824, 1, p. 158, pl. 26, fig. 12, 13. *Cardium calcitrapoides*, 1804, Ann. du Mus., 9, pl. 20, fig. 8 (non Poli). Grignon, M Hauteville, Gourbeville (Manche).
- \***917. decussata**, Nyst., 1843. *Venericardia decussata*, 1 Ann. du Mus., t. 7, p. 59, n. 9, et t. 9, pl. 32, fig. 5; Nyst., fig. 3; Desh., 1824, 1, p. 159, pl. 24, fig. 7, 8. France, Parnes, Mouchy, Grignon, Courtagnon, Chaumont, Henonville; Belgique, près de Bruges.
- \***918. mitis**, d'Orb., 1847. *Venericardia mitis*, Lamk., Avert., t. 5, p. 611, n. 6; Desh., 1824, 1, p. 155, pl. 25, fig. Parnes, Chaumont, Mouy, P. S. Valmondois, Ermenonville.
- \***919. imbricata**, Blainv., 1825, *Venericardia imbricata*, 1 Ann. du Mus., t. 7, p. 56, n. 3, et t. 9, pl. 32, fig. 1; Desh., 1 p. 152, pl. 24, fig. 4, 5; Nyst., 1843, p. 209. Grignon, Liai Parnes, Mouchy, Mouy, St-Félix, Courtagnon, Orglandes (Ma Belgique, Bruxelles, Gand.
- \***920. acuticostata**, Desh., 1830. *Venericardia acuticostata*, 1 Ann. du Mus., t. 7, p. 57, n. 4; Deshayes, 1824, 1, p. 153, fig. 7, 8; Nyst., 1843, pl. 16, fig. 6? Grignon, la ferme de l' St-Félix, Chaumont, Courtagnon, Gilocourt; Belgique, Aeltre de Bruges.
- \***921. angusticostata**, *Venericardia angusticostata*, Desh., 1, p. 153, pl. 27, fig. 5, 6. Grignon, Chaumont, Mouchy, Parnes La Chapelle, près Senlis, Beauchamp, Pontoise.
- 922. deltoidea**, *Venericardia deltoidea*, Sow., 1820, Min. C t. 3, p. 106, pl. 259, fig. 1. Londres, Lindhurst dans le Hampsb
- 923. subcarinata**, d'Orb., 1847. *Venericardia carinata*, Sow. Min. Conch., t. 3, p. 106, pl. 259, fig. 2 (non Brug., 1789). Le Stubbington.
- \***927. alticostata**, Conrad, 1833. *Venericardia transversa*, L Sillimani, Lea. Etats-Unis, Alabama.
- \***928. rotunda**, Conrad, 1833. *Venericardia rotunda*, Lea. Unis, Alabama.
- \***929. parva**, Conrad, 1833. *Venericardia parva*, Lea. Etats



**CYPRINA**, Lamarck, 1812. Voy. t. 1, p. 173.

\***931. trigona**, d'Orb., 1847. *Cyrena trigona*, Desh., n. 2, pl. 19, fig. 16, 17. Jonquières, Babeuf, Cuvilly, Grandfresnoy, le Vivray, Le Tomberay (Oise).

**932. pisum**, d'Orb., 1847. *Cyrena pisum*, Desh., 1824, 1, p. 117, pl. 19, fig. 10-13. France, Houdan.

**933. obliqua**, d'Orb., 1847. *Cyrena obliqua*, Desh., 1824, 1, p. 122, pl. 19, fig. 5, 6. France, Maule.

**CYPRICARDIA**, Lamarck, 1801.

**935. carinata**, Desh., 1824, Env. de Paris, 1, p. 186, pl. 31, fig. 1, 2. France, Chaumont, le Vivray.

\***936. pectinifera**, Morris, 1843; Nyst., 1843, Belgiq., p. 202, pl. 11, fig. 8. *Venus pectinifera*, Sow., 1823, Min. Conch., 5, p. 26, pl. 422, fig. 4. *Cardita pectinifera*, Galeotti. Lacken, Forêt, Jette, Gand, Folx-les-Caves; Anglet., Barton.

**HYCINA**, Lamarck, 1805.

\***937. radiolata**, Lam., Ann. du Mus., t. 6, pl. 418, n. 11, et t. 9, pl. 31, fig. 8; Desh., 1824, p. 41, pl. 6, fig. 1, 2, 3. Grignon, Mouchy, Gomerfontaine.

**939. orbicularis**, Desh., 1824, env. de Paris, 1, p. 43, pl. 6, fig. 27, 28, 29, 30. France, Parnes, Chaumont.

\***940. obscura**, Lam., Ann. du Mus., t. 6, p. 414, n. 9, et t. 9, pl. 31, fig. 9; Desh., 1824, 1, p. 44, pl. 6, fig. 26. Grignon.

\***941. pellucida**, Lam., Ann. du Mus., t. 6, p. 413, n. 2; Desh., 1824, 1, p. 43, pl. 6, fig. 19, 20, 21. Parnes, Ponchon, Monneville.

**942. nitida**,? Caillat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine-et-Oise, p. 2, pl. 9, fig. 6. France, Grignon.

**943. obliqua**,? Caillat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine-et-Oise, p. 3, pl. 9, fig. 5. France, Grignon.

**LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.

\***945. gigantea**, Desh., 1824, 1, p. 91, pl. 15, fig. 11, 12. Parnes, Mouchy, Liancourt, Chaumont, Delincourt.

\***946. mutabilis**, Lam., Anim. s. vert., t. 5, p. 540, n. 4; Desh., 1824, 1, p. 92, pl. 14, fig. 6, 7. Grignon, Chaumont, Acy; Belgique, Assche, Afflighem, Leurgat, Uccle.

\***947. gibbosula**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 239, et t. 12, pl. 42, fig. 8; Desh., 1824, 1, p. 93, pl. 15, fig. 1, 2. Grignon, Parnes, Mouchy. P. S. Pierrelage, Beauchamp, Triel, la Chapelle, près Senlis, Valmondois.

\***948. renulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 239, n. 7, et t. 12, pl. 42, fig. 7; Desh., 1824, 1, p. 93, pl. 15, fig. 3, 4. Parnes, Grignon, Houdainville.

\***949. bipartita**, DeFrance, Dict. des Sc. nat., t. 27, p. 276; Desh., 1824, 1, p. 98, pl. 16, fig. 7-10. Parnes, Grignon, Chaumont, Le Tomberay.

\***950. concentrica**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 238, et t. 12, pl. 42, fig. 4; Desh., 1824, 1, p. 98, pl. 16, fig. 11, 12. Grignon, Parnes, Chaumont, Mouchy, Lattainville, Valognes, Acy; Belgique, Rouge-Clotre, Tew-Noodi.

\***951. ambigua**, DeFrance, Dict. des Sc. nat., t. 27, Desh., 1824, 1,

- p. 102, pl. 17, fig. 7. Chaillot, près Paris, Hauteville, près Va Belgique, Bruxelles.
- 952. scalaris**, Desh., 1824, 1, p. 96, pl. 15, fig. 7, 8. La fe l'Orme, Grignon, Parnes, Liancourt, Château-Rouge.
- 953. obliqua**, d'Orb., 1847. *Donax obliqua*, Lamk., Ann. du t. 7, p. 231, n. 6, et t. 12, pl. 41, fig. 4; Desh., 1824, 1, p. 110 fig. 5, 6. Grignon, la ferme de l'Orme, Liancourt.
- 954. Menardi**, Desh., 1824, 1, p. 94, pl. 16, fig. 13, 14. M près Houdan.
- \*955. elegans**, Defr., Dict. des Sc. nat., t. 27; Desh., 1 p. 104, pl. 14, fig. 10, 11. Parnes, Grignon. P. S. Valmond Chapelle, près Senlis.
- \*956. albella**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 240, n. 8, et pl. 42, fig. 6; Desh., 1824, 1, p. 95, pl. 17, fig. 1, 2. France, G Maulette, près Houdan, Halaincourt, Mouy, Acy, Senlis.
- \*957. pulchella**, Agassiz, 1845, Icon. des Coq. tert., p. 64. *varicata*, Lamk., 1804, Ann. du Mus., t. 7, p. 239 (non Linné hayes, 1824, 1, p. 105, pl. 14, fig. 8, 9; Sow., Min. Conch., 1 France, Grignon, Parnes, Houdan, Valmondois, Acy, Mouch gletterre, Hordwell.
- 958. callosa**, Desh., 1824, 1, p. 96, pl. 17, fig. 3, 4, 5. G Beyne, Chaumont, Acy, La Chapelle.
- \*959. Fortisiana**, Defr., Dict. des Sc. nat., t. 27; Desh., 1 p. 102, pl. 17, fig. 10, 11. Beyne, Parnes, Chambors, Serans, nonville.
- 960. mitis**, Sow., 1827, Min. Conch., 6, p. 107, pl. 557, fig. gletterre, Londres, Barton; Belgique, Bruges, Aeltre.
- 962. Volderiana**, Nyst., 1843, Belgiqu., p. 122, pl. 6, Bruxelles, Wavre, Gobertange, Lovenjoul.
- 963. hyatelloides**, Galeotti, 1837, p. 157, n. 143, pl. 4, f *L. Galeottina*, Nyst., 1843, Belgiqu., p. 133, pl. 6, fig. 10. La Bruxelles, Lacken, Forêt, Jette, Assche? Orp-le-Grand.
- \*965. modesta**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 403, pl. 4, 1 Etats-Unis, Claiborne, (Alabama).
- \*966. subvexa**, Conrad, 1846, foss. Schells of tert. form., 1 Amer. Journ., p. 403, pl. 4, fig. 14. Claiborne.
- \*967. alveata**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 402, pl. 4, f Conr., foss. Schells of tert. form., p. 40, nov., 1, 1833. *L. l* Lea; Cont. to geol., pl. 1, fig. 32, déc., 1833. Claiborne.
- \*968. carinifera**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 402, pl. 4, 1 Conr., foss. Schells of tert. form., pl. 40, nov., 1, 1833. *L. co* Lea; Cont. to geol., pl. 1, fig. 29, déc., 1833. Claiborne.
- 969. pumilia**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 402, pl. 4, f Conr., foss. Schells of tert. form., p. 40, nov., 1, 1833. *L. imp* Lea; Cont. to geol., pl. 1, fig. 30, déc., 1833. Claiborne (Alaba
- 969'. angulata**, d'Orb., 1847. *Azinus angulatus*, Sow., 1831, Conch., 4, p. 11, pl. 315. Angl., Islington.
- 972. dolabra**, Conrad, 1833. *Astarte recurva*, Lea. Etats-Alabama.

- 973. pandata**, Conrad, 1833. *L. compressa*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 974. symmetrica**, Conrad, 1833. *L. rotunda*, Lea. États-Unis, Alabama.
- 975. papyracea**, Lea, 1833. États-Unis, Alabama.
- CORBIS**, Cuvier, 1817. Voy. t. 1, p. 279.
- 976. lamellosa**, Lamk., Desh., 1824, 1, p. 88, pl. 14, fig. 1, 2, 3. *Lucina lamellosa*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 237, n. 1, et t. 12, pl. 42, fig. 3; Conrad, Amer. Journ., 1846, pl. 4, fig. 16. Grignon, Courtaignon, Parnes, Mouchy, Aumont; États-Unis, Claiborne, Alabama (M. Conrad); Belgique, Afflighem, Gand.
- \*977. pectunculus**, Lamk., Anim. s. vert, t. 5, p. 537, n. 3 (non Deshayes). France, Valognes.
- \*978. undata**, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 401, pl. 4, fig. 11; Con., foss. Schells of tert. form., p. 40. *C. distans*, Con., ib. (Immature shell). États-Unis, Claiborne, (Alabama).
- \*979. subpectunculus**, d'Orb., 1847. *C. pectunculus*, Desh., 1824, Paris, p. 87, pl. 13, fig. 3-6 (non *Pectunculus*, Lamarck, 1818). Elle a les côtes plus rapprochées et autrement disposées. Parnes, Chaumont, les Boves, Uilly (Oise).
- \*980. dubia**, d'Orb., 1848. *Psammobia dubia*, Desh., 1824, 1, p. 76, pl. 10, fig. 13, 14. C'est une Corbis, sans dents latérales. France, Parnes.
- 981. distans**, Conrad, 1833, États-Unis, Alabama.
- CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.
- \*982. porulosum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 341, n. 1, et t. 9, pl. 19, fig. 9; Desh., 1824, 1, p. 169, pl. 30, fig. 1-4. Courtaignon, Parnes, Houdan. P. S. Beauchamp, Damerie, Senlis, Valmondois, Acy; Anglet., Barton; Belgique, Jette, Lacken, Assche, Aeltre, Gand, Rouge-Cloître, St-Josse-ten-Noode, Louvain, Afflighem, Edelaer, Roodenberg, près d'Ypres, Groenendaël.
- \*983. gratum**, Defr., Desh., 1824, 1, p. 165, pl. 28, fig. 3, 4, 5. Mouchy, Château-Rouge, Hermes, Parnes.
- \*984. Parisiense**, d'Orb., 1847. *C. discors*, Lamk., 1805, Ann. du Mus., t. 6, p. 341, n. 1, et t. 9, pl. 19, fig. 10; Desh., 1824, envir. de Paris, 1, p. 166, pl. 28, fig. 8, 9 (non Montagu, 1803). Grignon, Chaumont, Parnes, Mouchy. P. S. Senlis, Valmondois.
- \*985. asperulum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 345, n. 3, et t. 9, pl. 19, fig. 7; Desh., 1824, 1, p. 167, pl. 27, fig. 7, 8, et pl. 30, fig. 13, 14. Grignon, Parnes, Mouchy, Chaumont, Ponchon, Neuville-bosc.
- \*986. sublima**, d'Orb., 1847. *C. lima*, Lamk., 1805, Ann. du Mus., t. 6, p. 344, n. 7, et t. 9, pl. 20, fig. 2; Desh., 1824, 1, p. 167, pl. 27, fig. 1, 2 (non Gmelin, 1789). Grignon, Parnes, Chaumont, Lierville, Mouchy, Mouy.
- \*987. aviculare**, Desh., 1824, 1, p. 176, pl. 29, fig. 5, 6. *Cardita avicularis*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 340, et t. 9, pl. 19, fig. 6. *Hippopus avicularis*, Sow., Geneva of Shells, n. 13, fig. 2. Grignon, Chambors, Lattainville, Mouy, Uilly-St-George (Oise).

- \***988. cymbulare**, Lamk., *Anim. s. vert.*, t. 6, p. 19, n. 11; 1824, 1, p. 178, pl. 29, fig. 11, 12. Mouchy, Parnes, Mouy, Acy.
- 989. verrucosum**, Desh., 1824, 1, p. 173, pl. 29, fig. 7, 8. St-George, Chaumont, Parnes.
- 990. semistriatum**, Desh., 1824, 1, p. 174, pl. 29, fig. 9. Parnes, Mouchy. Chaumont, Acy.
- \***991. hypopœum**, Desh., 1824, 1, p. 164, pl. 27, fig. 3, 4. Chaumont, Parnes, Mouchy, Château-Rouge, le Vivray.
- 992. obliquum**, Lamk., *Ann. du Mus.*, t. 6, p. 341, n. 5, 6, pl. 29, fig. 1; Desh., 1824, 1, p. 171, pl. 30, fig. 7, 8, 11, 12. Grignon, Parnes, Courtagnon, Mouchy, P. S. Baron, Ver, Ermenonville, Beauchamp, Senlis, Valmondois.
- \***993. aviculinum**, Deshayes, 1824, 1, p. 179, pl. 33, fig. 1. Grignon.
- 994. turgidum**, Brander, Sow., 1822, *Min. Conch.*, t. 4, pl. 346, fig. 1. Anglet., Londres, Barton.
- 999. nitens**, Sow., 1813, *Min. Conch.*, t. 1, p. 41, pl. 14, Anglet., Highgate.
- 1000. semigranulosum**, Sow., Desh., n. 12, pl. 28, fig. 1. Anglet., Wandsworth, Barton.
- \***1001. Bouyanum**, d'Orb., 1847. Espèce voisine pour la forme du *C. porulosum*, mais ornée de côtes simples avec quelques tubercules. Faudon (Hautes-Alpes).
- ISOCARDIA**, Lamarck, 1799. *Voy.* t. 1, p. 132.
- 1002. parisiensis**, Desh., 1824, 1, p. 180, pl. 31, fig. 5. Heuvel, Mouchy, Fercourt.
- 1003. sulcata**, Sow., 1821, *Min. Conch.*, 3, p. 171, pl. 295, Angleterre, Londres, Islington.
- NUCULA**, Lamarck, 1801. *Voy.* t. 1, p. 12.
- \***1008. similis**, Sow., 1813, *Min. Conch.*, 2, p. 207, pl. 192, 4-10. *N. margaritacea*, Lamk., *Ann. du Mus.*, t. 6, p. 125, n. 9, pl. 18, fig. 3 (non Linné); Desh., 1824, 1, p. 231, pl. 36, fig. 20; Nyst., 1843, pl. 17, fig. 9. Grignon, Mouchy, Courtagnon, Chaumont, Valmondois, Senlis; en Angleterre, Barton; Belgique, Lacken, Audenarde.
- \***1009. subovata**, d'Orb., 1847. *N. ovata*, Desh., 1824, 1, p. 180, pl. 36, fig. 13, 14 (non Mantell, 1821, exclus. syn.). Mouchy, Heuvel, près Valognes, Lattainville, Hermes, Uilly, Chaumont.
- 1010. minima**, Sow., 1813, *Min. Conch.*, t. 2, p. 207, pl. 192, fig. 8, 9. Anglet., Londres, Barton.
- 1011. trigona**, Sow., 1818, t. 2, p. 207, pl. 192, fig. 5. Barton.
- \***1012. Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *N. similis*, plus épaisse et plus trigone. France, Faudon (H.-Alpes).
- 1016. lunulata**, Nyst., 1843, Belgiq., p. 231, pl. 18, fig. 4. Lac Forêt, Senlis.
- N. B.* Nous en connaissons encore plusieurs espèces d'Alabama Etats-Unis.
- NUCULINA**, d'Orb., 1845, *Paléont. française*, 3.
- \***1017. miliaris**, d'Orb., 1844, *Paléont. franç. Terr. crét.*

Desh., 1824, 1, p. 235, pl. 36, fig. 7, 8, 9. Mouchy, Grignon, Parnes.

**LIMOPSIS**, Sassy. Voy. t. 4, p. 280.

\***1018. granulata**, d'Orb., 1847. *Trigonocaelia granulata*, Nyst., 1834, *Pectunculus granulatus*; Lamarck, Desh., Descrip., 1. p. 227, pl. 35, fig. 4-6. France, Grignon, Mouchy; Belgique, environs de Bruxelles.

\***1019. deltoidea**, d'Orb., 1847. *Nucula deltoidea*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 126, n. 3, et t. 9, pl. 18, fig. 5; Desh., 1824, 1, p. 236, pl. 36, fig. 22-25. Parnes, Mouchy, Chaumont, Grignon, Courtagnon, Houdan. P. S. Beauchamp, Pontoise, Senlis, Valmondois, Acy en Multien.

**1020. auritoides**, d'Orb., 1847. *Trigonocaelia auritoides*, Galeotti, Nyst., 1843, Belg., p. 243, pl. 19, fig. 3. Galeotti et Nyst., 1835, Bull. acad. roy. de Brux., 2, n. 8, p. 290, n. 3. Lacken, Jette.

**1021. lima**, d'Orb., 1847. *Trigonocaelia lima*, Gal. et Nyst., 1843, coq. tert. de Belgiq. p. 246, pl. 19, fig. 5; Gal. et Nyst., 1835, Bull. acad. roy. de Brux., p. 348, n. 5, 6. Belgique, Lacken, Jette, Forêt.

\***1024. trigonella**, d'Orb., 1847. *Pectunculus trigonellus*, Conrad, 1833, *P. deltoidea*, Lea. États-Unis, Alabama.

**PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. p. 80.

\***1025. pulvinatus**, Lamk., 1805, Ann. du Mus., t. 6, p. 216, n. 2, et t. 9, pl. 18, fig. 9; Desh., 1824, 1, p. 219, pl. 35, fig. 15, 16, 17; Nyst., 1843, pl. 19, fig. 8. Parnes, Chaumont, Grignon, Mouchy, Courtagnon, Valmondois; Belgique, Zellick, Groenendael, Rouge-Cloître, Afflighem.

\***1026. dispar**, Defrance, Dict. des Sc. nat., Desh., 1824, 1, p. 223, pl. 35, fig. 7, 8, 9. Parnes, Chaumont, Mouchy, Valognes.

**1027. brevirostris**, Sow., 1824, Min. Conch., 5, p. 112, pl. 472, fig. 1. Londres, Bognor.

**1028. decussatus**, Sow., 1813, id., t. 1, p. 71, pl. 27, fig. 1. Highgate.

**1029. deletus**, Sow., 1835, Min. Conch., 6, p. 243. *Arca deleta*, Brander, 1766, pl. 7, fig. 97 (non Nyst.). *P. costatus*, Sow., 1813, M. Conch., t. 1, p. 71, pl. 27, fig. 2. Anglet., Hordwell-Cliff, Barton.

**1031. declivis**, Conrad, 1833. *P. minor*, Lea. États-Unis, Alabama.

**1032. decusus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**1033. corbuloides**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**1034. perplanatus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**1035. circulus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**1036. aviculoides**, Conrad, 1833. *P. obliqua*, Lea. États-Unis, Alabama.

**1037. idoneus**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.

**1038. stramineus**, Conrad, 1833. *P. Broderipii*, Lea. États-Unis, Alabama.

**MUCUNELLA**, d'Orb., 1847. Voy. Cours de Paléontol.

**1039. Nystii**, d'Orb., 1847. *stalagmium Nystii*, Galeotti, Nyst., 1843, coq. tert. de Belgiq., p. 238, pl. 18, fig. 6; Gal., 1837, Bull. acad., p. 184, n. 16. (Ce n'est pas un *Stalagmium*.) Belgique, Bruxelles.

- Lacken, Jette, Forêt, Uccle, Boisfort, St-Gilles, St-Josse-Die  
Asche, Gand, Groenenlael, Beersel, Booge-Cloutre.
- STALAGNIUM**, Conrad, 1833. [*Hypopars*, Lea, 1843.]
- \*1040. *margaritaceum*, Conrad, 1833. *Hypopars coctatus*  
États-Unis, Alabama.
- ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.
- \*1041. *biangulata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 219, n.  
t. 9, pl. 19, fig. 4; Deshayes, 1824, 1, p. 198, pl. 34, fig. 1-4  
gron, Chaumont, Courtagnon. P. S. Senlis.
- \*1042. *sculptata*, Deshayes, 1824, 1, p. 211, pl. 33, fig. 12,  
Chaumont.
- \*1043. *aligrama*, Deshayes, 1824, env. de Paris, 1, p. 212,  
fig. 15, 16, 17. France, la ferme de l'Orme, Chaumont, Le viv.
- \*1044. *scapulata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 221, n. 6,  
pl. 18, fig. 10, Deshayes, 1824, 1, p. 216, pl. 33, fig. 9, 10, 11  
gron, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Uilly, Aumont.
- \*1045. *Duchastell*, Deshayes, 1824, 1, p. 217, pl. 39, fig. 1,  
Grignon.
- \*1046. *quadriflora*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 221,  
et t. 9, pl. 19, fig. 1; Deshayes, 1824, 1, p. 203, pl. 34, fig. 1  
Nyst., Belgique, pl. 20, fig. 5. Grignon, Courtagnon, Parnes, Ma  
Lattainville. P. S. Senlis: Belgique, Forêt.
- \*1047. *planicosta*, Deshayes, 1824, 1, p. 204, pl. 32, fig.  
Mouchy, Parnes, P. S. Senlis, Valmondois.
- \*1048. *barbatula*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 219, n.  
t. 9, pl. 19, fig. 3; Deshayes, 1824, 1, p. 205, pl. 32, fig. 11, 12;  
Belgique, pl. 15, fig. 11. Parnes, Grignon, Chaumont, Courta  
Mouchy, Hermines; Belgique.
- \*1049.  *cucullaria*, Deshayes, 1824, 1, p. 205, pl. 33, fig. 1  
Parnes, Chaumont, le Vivray; Belgique, Aeltre.
- \*1050. *profunda*, Deshayes, 1824, 1, p. 207, pl. 32, fig. 3, 4.  
mont, Parnes, Mouchy.
- \*1051. *irregularis*, Deshayes, 1824, 1, p. 208, pl. 32, fig.  
Chaumont. P. S. Valmondois, Aey.
- \*1052. *granulosa*, Deshayes, 1824, 1, p. 208, pl. 32, fig. 1  
Parnes, Château-Rouge, Uilly-St-Georges.
- \*1053. *punctifera*, Deshayes, 1824, 1, p. 202, pl. 32, fig. 11  
France, Mouchy, Chaumont.
- \*1055. *interrupta*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 220, n. 5;  
hayes, 1824, 1, p. 213, pl. 32, fig. 19, 20. Courtagnon, Grignon,  
nes, Chaumont, Mouchy, St-Félix.
- \*1056. *cylindraca*, Deshayes, 1824, 1, p. 202, pl. 34, fig. 11  
14. Valmondois, le Vivray, Renonvillers.
- \*1057. *Lyelli*, Deshayes, 1824, 1, p. 200, pl. 34, fig. 9, 10, 11.  
mondois, Lattainville.
- \*1058. *angusta*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 220, n. 4, et  
pl. 19, fig. 4; Deshayes, 1824, 1, p. 201, pl. 32, fig. 15, 16. Grig  
Courtagnon, Mouchy, St-Félix, Parnes, Chaumont.
- \*1059. *laevigata*, Cailhat, 1834, Soc. des Sc. nat. de Seine-et-  
p. 4, pl. 9, fig. 7. France, Grignon.

- 1060.** *Branderi*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 135, pl. 276, fig. 1, 2. Angleterre, Londres, Barton.
- 1061.** *appendiculata*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 135, pl. 276, fig. 3. Angleterre, Londres, Barton.
- 1062.** *duplicata*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 5, p. 116, pl. 474, fig. 1. Angleterre, Londres, Hordwell.
- \*1066.** *cuculloidella*, Conrad, 1833, États-Unis, Alabama.
- 1067.** *rhomboidella*, Lea, 1833, États-Unis, Alabama.
- PIRNA**, Linné, 1758, Voy. t. 1, p. 135.
- 1068.** *affinis*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 4, p. 10, pl. 313, f. 2. Angleterre, Bognor et Highgate.
- 1069.** *arcuata*, Sow., 1821, Min. Conch., 2, p. 9, pl. 313, f. 3. Angleterre, Londres, Highgate.
- MYTILUS**, Linné, 1758, Voy. t. 4, p. 32.
- \*1071.** *subcarinatus*, d'Orb., 1847. *Modiola subcarinata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 222, n° 1; et t. 9, pl. 17, f. 10. Deshayes, 1824, 1, p. 256, pl. 39, f. 4, 5. Sow., M. C. 3417, pl. 210, f. 4. Grignon, Parnes, Château-Rouge, Ullly; Angleterre, Highgate.
- \*1072.** *sulcatus*, d'Orb., 1847. *Modiola sulcata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 222, n° 2; et t. 9, pl. 17, f. 11. Deshayes, 1824, 1, p. 258, pl. 39, f. 9, 10. Grignon, Maule, Parnes, Ullly, Amblainville, Lattainville.
- 1073.** *spathulatus*, d'Orb., 1847. *Modiola spathulata*, Deshayes, 1824, 1, p. 259, pl. 39, f. 11, 12, 13. Parnes, les Groux, Chambors, Ullly.
- 1075.** *acuminatus*, d'Orb., 1847. *Modiola acuminata*, Deshayes, 1824, 1, p. 262, pl. 40, f. 9, 10, 11. Vaugirard, Parnes, Jonquières, Moyvillers (Oise).
- 1076.** *pectiniformis*, d'Orb., 1847. *Modiola pectiniformis*, Deshayes, 1824, 1, p. 263, pl. 39, f. 14, 15, 16. Houdan.
- 1077.** *profundus*, d'Orb., 1847. *Modiola profunda*, Deshayes, 1, p. 264, pl. 41, f. 12, 13, 14. Parnes.
- \*1078.** *pectinatus*, d'Orb., 1847. *Modiola pectinata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 223, n° 3; et t. 9, pl. 17, fig. 12. Deshayes, 1824, 1, p. 259, pl. 39, f. 6, 7, 8, et pl. 41, f. 1, 2, 3. Parnes, Grignon, Mouy.
- 1079.** *rimosus*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 220, n° 1, et t. 9, pl. 17, f. 9. Deshayes, 1824, 1, p. 247, pl. 40, f. 3. Grignon, Courtagon, Chaumont.
- 1080.** *arcuatus*, d'Orb., 1847. *Modiola arcuata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 9, pl. 18, f. 1. Deshayes, 1824, 1, p. 265, pl. 40, f. 4, 5, 6. Grignon, Parnes, Mouchy, Ullly.
- 1081.** *elegans*, d'Orb., 1847. *Modiola elegans*, Sow., Min. Conch., 1, p. 31, pl. 9. Angleterre, Highgate, Richemond-Park, Bognor.
- LYTHODOMUS**, Cuvier, 1817.
- \*1083.** *cordatus*, d'Orb., 1847. *Modiola cordata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 9, pl. 18, f. 2. Deshayes, 1824, 1, p. 268, pl. 39, f. 17, 18, 19. Grignon, Parnes, Courtagon, Ponchon.
- 1083'.** *sublithophagus*, d'Orb., 1847. *Modiola lithophaga*, Lamk.,

- Anim. s. vert., t. 6, p. 115, n° 22. Desh., 1824, 1, p. 267, pl. 38, f. 10, 11, 12 (non Linné). Parnes.
- \***1084. angustus**, d'Orb., 1847. *Modiola angusta*, Deshayes, 1824, 1, p. 266, pl. 41, f. 6, 7, 8. Parnes, Mouchy, Lattainville.
- LYMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.
- \***1085. spathulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 463, n° 1. Deshayes, 1824, 1, p. 295, pl. 43, f. 1, 2, 3. Grignon, Courtagnon, Chaumont, le Vivray, Marquemont (Oise).
- \***1086. obliqua**, Lamk. *A. plicata*, Deshayes, 1824, 1, p. 298, pl. 43, f. 9, 10, 11. Nyst., 1843, Belgique, pl. 21, f. 5 (figure calquée sur celle de M. Deshayes). Grignon, Parnes, Mouchy-le-Châtel, Chaumont, Uilly; Belgique, Steenockersel?
- \***1087. dilatata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 464, n° 4. Desh., 1824, 1, p. 298, pl. 43, f. 15, 16, 17. Grignon, Parnes, Courtagnon, Châteaurouge.
- \***1088. bulloides**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 463, n° 3. Desh., 1824, 1, p. 299, pl. 43, f. 12, 13, 14. Parnes, Grignon, Mouchy, Courtagnon, Chaumont, Uilly.
- 1089. dumosa**, d'Orb., 1847. *Plagiostoma dumosum*, Morton. États-Unis, Alabama.
- AVICULA**, Klein, 1753. Voy. t. 1, p. 13.
- \***1090. trigonata**, Lamk., Anim. s. vert., t. 6, p. 150, n° 14. Desh., 1824, 1, p. 288, pl. 42, f. 7, 8, 9. Nyst., 1843, pl. 21, f. 3 (figure calquée). Grignon, Chaumont, Mouchy, St-Félix; Belgique, Jette.
- 1091. microptera**, Deshayes, 1824, 1, p. 290, pl. 43, f. 18, 19, 20. Chaumont, Parnes, la Chapelle.
- 1092. media**, Sow., 1812. Min. Conch., t. 1, p. 12, pl. 2. Angleterre, Highgate.
- \***1093. limula**, Conrad, 1833. *A. Claibornensis*, Lea. États-Unis, Alabama.
- PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 176.
- \***1093'. Francii**, Gervill., Goldf., 1836., Petref., 2, p. 406, pl. 108, f. 4. France, Hauteville.
- PECTEN**, Gualtieri, 1742. Voy. t. 1, p. 87.
- \***1094. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *P. imbricatus*, Deshayes, 1824, 1, p. 305, pl. 44, f. 16, 17, 18 (non Gmelin, 1789). Chaumont, Parnes, Liancourt, Mouchy.
- 1095. subornatus**, d'Orb., 1847. *P. ornatus*, Deshayes, 1824, 1, p. 306, pl. 44, f. 13, 14, 15 (non Lam., 1819). Grignon, Parnes, Mouchy.
- \***1096. mitis**, Deshayes, 1824, 1, p. 306, pl. 44, f. 10, 11, 12. Chaumont, Lattainville, Sandricourt.
- 1097. multicarinatus**, Deshayes, 1824, 1, p. 307, pl. 42, f. 17, 18, 19. Parnes, Salécourt.
- \***1098. tripartitus**, Deshayes, 1824, 1, p. 308, pl. 42, f. 14, 15, 16. Chaumont, le Vivray, Sandricourt. P. S. Senlis.
- \***1099. infumatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 553, n° 2. Deshayes, 1824, 1, p. 309, pl. 44, f. 8, 9. Grignon, Parnes, Chaumont, P. S. Senlis, Betz.
- \***1100. plebeius**, Lamk., Ann. du Mus., t. 5, p. 353, n° 1. Desh.,



- 1824, 1, p. 309, pl. 44, f. 1, 2, 3, 4. Nyst., pl. 22, f. 4. Grignon, Parnes, Mouchy, Mantes, Courtagnon, Valognes, Chaumont, Gomerfontaine; Belgique, Jette, Forêt, Necle, Saint-Gilles, Assche, Diehem, Vleurgat.
- \*1101. *solea*, Deshayes, 1824, 1, p. 302, pl. 42, f. 12, 13. Chaumont, le Vivray, St-Félix.
1102. *multistriatus*, Deshayes, 1824, 1, p. 304, pl. 41, f. 18-21, et pl. 44, f. 5-7. Chaumont, le Vivray, Parnes, Hénouville.
1103. *reconditus*. *Ostrea recondita*, Brander, 1766 (non *P. reconditus*, Sow.). Angleterre, Barton.
1104. *duplicatus*, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 145, pl. 575, f. 1-3. Angleterre, Londres, Richemond-Park.
1105. *carinatus*, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 145, pl. 575, f. 4. Angleterre, Londres, Barton, Hampshire.
1106. *subreconditus*, d'Orb., 1847. *Pecten reconditus*, Sow., 1827, Min. Conch., t. 6, p. 145, pl. 575, f. 5, 6 (non Brander). Angleterre, Stubbington et Barton.
1108. *subscabriusculus*, d'Orb., 1847. *P. scabriusculus*, Nyst., 1843. Belgiq., p. 296 (non Mathéron, 1843). France, Parnes, Chaumont, Blaye; Bruxelles.
1109. *corneus*, Sow., 1818, Min. Conch., 2, p. 1, pl. 204. Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgiq., p. 299, pl. 23, f. 1. Belgique, Bruxelles, Lacken, Jette, Forêt, Uccle, St-Gilles, Vleurgat, Dieghem, Rouge-Cloître, Assche, Boisfort, Melsbrock, St-Josse-Noode, Terbauk, près Louvain, Gand; Angleterre, Subbington.
1110. *sublævigatus*, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgiq., p. 298, pl. 24, f. 4. Belgique, Lacken.
- \*1112. *anatipes*, Morton, 1834, Synop. cret. group, p. 58, pl. 5, f. 4. États-Unis (Alabama), Claiborne.
- 1112'. *perplanus*, Morton, 1834, Synop. cret. group, p. 58, pl. 5, f. 5; pl. 15, f. 8. États-Unis (Alabama), Claiborne.
- \*1113. *Deshayesi*, Lea, 1833. *P. Lyelli*, Lea. États-Unis, Alabama.
- JANIRA**, Schumacher, 1817. Voy. p. 83.
1114. *Poulsoni*, d'Orb. *Pecten*, *id.*, Morton, 1834, Synops. cret. group., p. 59, pl. 19, f. 2. États-Unis (Alabama), Claiborne.
- SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.
- \*1115. *radula*, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 351, n° 1; et t. 14, pl. 23, f. 5. Deshayes, 1824, 1, p. 320, pl. 46, f. 4-5. Nyst., 1843, Belgique, pl. 25, f. 3. Grignon, Courtagnon, Mouchy, Valognes, Castel-Gomberto! Belgique, Assche.
1116. *rarispira*, Deshayes, 1824, 1, p. 321, pl. 46, f. 6-10. Nyst., pl. 25, f. 4. Chaumont, le Vivray, Marquemont; Belgique, Uccle, St-Gilles, Dieghem.
1117. *granulosus*, Deshayes, 1824, 1, p. 322, pl. 46, f. 11, 12. France, Chaumont, Mouchy, Gilocourt.
- PLICATULA**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 202.
1119. *elegans*, Deshayes, 1824, 1, p. 314, pl. 45, f. 11, 12, 13. Parnes, Hadancourt (Oise).

- \***1120.** *squamula*, Deshayes, 1824, 1, p. 313, pl. 45, f. 7. Groux près Chaumont.
- \***1121.** *flamentosa*, Conrad, 1838. *P. Mantelli*, Lea, Éta Alabama.
- ORAMA**, Linné, 1758. Voy. p. 170.
- 1122.** *subgigas*, d'Orb., 1847. *C. gigas*, Deshayes, 1824, 1, pl. 87, f. 5, 6 (non Linné, 1767). Parnes, les Groux, Cha Hénonville.
- \***1123.** *punctata*, Bruguière, 1789, Encycl., p. 392. *C. cal* Lam., Ann. du Mus., t. 8, p. 349 et t. 14, pl. 25, f. 4. De 1824, 1, p. 246, pl. 38, f. 5, 6, 7. Grignon, Mouchy, St-Félix mont, Parnes, Courtagnon, Larbroye.
- \***1124.** *squamosa*, Brander 1766, Sowerby, 1832, *M. Conc* 67, pl. 348. *C. lamellosa*, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 348, t. 14, pl. 28, f. 3. Deshayes, 1824, 1, p. 247, pl. 37, f. 1, 2. G Parnes, Mouchy, Chaumont, Courtagnon, St-Félix, Marqu Angleterre, Barton.
- 1125.** *sulcata*, Deshayes, 1824, 1, p. 250, pl. 38, f. 8, 9. Chaumont, Hénonville.
- OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.
- \***1126.** *flabellula*, Lamk., 1806., Ann. du Mus., t. 8, p. 164 et t. 14, pl. 20, f. 3. Deshayes, 1824, 1, p. 366, pl. 63, f. 5, 6, 7 Min. Conch., pl. 253, f. 7-9. Nyst., 1843, pl. 29, f. 3. Grignon tagnon, Chaumont, Parnes, Mouchy, Valmondois, Valognes; terre, Londres; Belg., Gand, St-Gilles, Uccle, Forêt, Jette, I Fleurgat, Beersel, Loo, Milsbrœck, Dieghem, Rouge-Cloître. Unis, Claiborne (Alabama).
- \***1127.** *subplicata*, Deshayes, 1824, 1, p. 345, pl. 48, f. 3. St-Félix.
- \***1128.** *plicata*, Deffr., Dict. des Sc. nat., t. 22, p. 26. De 1824, 1, p. 364, pl. 56, f. 7, 8.; pl. 63, f. 8, 9, 10. *O. elegans*, 1824; Paris, pl. 50, f. 7-9. Valmondois, Tancrou, Betz, Mom la Chapelle, Acy, Vellimetrier.
- \***1129.** *gigantica*, Brander, 1766, Foss. haut., p. 36, pl. 1 Nyst., 1843; Belgique, pl. 27, f. 1; pl. 28, f. 1. *O. latissima*, De 1824, 1, p. 336, pl. 52, 53, f. 1. Chaumont, Gilocourt, Valma Belgique, Crimée, Chapelle-St-Laurent, Afflighem, Melsbroeck gleterre, Barton, Hordwell.
- \***1130.** *cariosa*, Deshayes, 1824, 1, p. 337, pl. 54, f. 5, 6, f. 5-7. Nyst., pl. 25, f. 7. Belgique, Melsbrœck, Caelevoet, Uccle près de Louvain; France, Chaumont, Mouchy, le Parnes.
- 1131.** *profunda*, Deshayes, 1824, Env. de Paris, 1, p. 341, f. 4, 5. France, Chaumont, Bouconvillers.
- 1132.** *subarcuata*, Deshayes, 1824, 1, p. 342, pl. 59, f. France, Mouchy, Arrouy, Bourg.
- \***1133.** *deperdita*, d'Orb., 1847. *Vulsella deperdita*, Lamk., s. vert., t. 6, p. 222, n. 7. Deshayes, 1824, 1, p. 374, pl. 65, f. Grignon, Chaumont, Mouchy, le Vivray.
- \***1134.** *uncinata*, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 164, n. 1

- t. 14, pl. 22, f. 2. Deshayes, 1824, 1, p. 371, pl. 47, f. 7-11. Grignon.
- \***1135. cymbula**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 165, n. 17. Deshayes, 1824, 1, p. 367, pl. 53, f. 2, 3, 4, pl. 57, f. 8. Nyst., pl. 27, f. 2. Grignon, Parnes, Mouchy. P. S. le Tomberay, Acy, St-Gilles, Forêt, Fleurgat, Jette, Laeken, Assche, Gand ; Angleterre, Barton.
- \***1136. extensa**, Deshayes, 1824, 1, p. 358, pl. 56, f. 1, 2. Valmondois. Gilocourt, P. S. Acy.
- \***1137. deformis**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 164, n° 14. Deshayes, 1824, 1, p. 346, pl. 55, f. 7, 8. *O. mutabilis*, Desh., 1824. Paris, p. 344, pl. 56, f. 9, 10. Grignon, Houdan, Mouchy, Ponchon, Mouy, Ullly.
- 1139. dorsata**, Sow., 1825. Min. Conch., t. p. 144, pl. 489, f. 1, 2. Angleterre, Londres, Hordwell.
- ?**1141. virgata**, Goldf., Nyst., 1843. Coq. vert. de Belgiq., p. 323, pl. 28, f. 2. Belgique, St-Gilles, Uccle, Forêt, Vleurgat, Rouge-Cloître, St-Josse-ten-Noode, env. de Bruxelles, Assche, Melshroëck.
- \***1145. sellaeformis**, Conrad, 1833, Foss. shell., pl. 13 *O. radians*, Conrad. *O. semilunata*, Lea. *O. divaricata*, Lea. États-Unis, Alabama, Clayborne.
- 1146. Carolinensis**, Conrad, 1833. États-Unis, Alabama.
- 1147. Alabamiensis**, Lea, 1833. *O. Lingua-canis*, Lea. États-Unis, Alabama.
- ANOMYA**, Linné, 1758.
- \***1148. tenuistriata**, Deshayes, 1824, 1, p. 377, pl. 65, f. 7-11. Grignon, Parnes, Mouchy, Courtagnon, Montmirail. P. S. Senlis, Beauchamp, Valmondois, Tancrou, Assy, env. de Gand, de Bruxelles; Valognes; Londres.
- 1149. sublaevigata**, d'Orb., 1847. *A. laevigata*, Nyst., 1843. Belg., p. 311, pl. 24, f. 4, 5, 6 (non Sow., 1836). Bruxelles, Uccle, Forêt, St-Gilles, env. de Bruxelles, Assche, Boisfort, Campenhout, Rouge-Cloître, St-Josse-ten-Noode. Angleterre, Londres, Barton.
- 1150. substriata**, d'Orb., 1847. *A. striata*, Sow., 1823, Min., Conch., t. 5, p. 31, pl. 425 (non Brocchi, 1814). Angleterre, Londres, Barton.

## MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

**TEREBRATULA**, Lwyd, 1699. Voy. t. 1, p. 43.

- \***1151. bisinuata**, Lamk., Anim. s. vert., t. 6, p. 252, n° 32. Desh., 1824, 1, p. 389, pl. 65, f. 1, 2 (adulte). *T. succinea*, Deshayes, 1824, 1, p. 390, pl. 65, f. 3 (jeune). Grignon, Parnes, Chaumont, Courtagnon, Mouchy, Valognes.
- 1152. subellata**, Sow., 1819. Min. Conch., pl. 253. Angl., Londres, Hordwell, Barton, Lyundhurst.
- 1153. laevis**, Nyst., 1843, Belgiq., p. 334, *T. trilobata*, Galeotti (non Munster). Bruxelles, Laeken ? St-Gilles, Uccle, Forêt, Jette, Vleurgat, Assche, Loo, Gand, St-Josse-ten-Noode.
- 1154. Kickxii**, Galeotti, Nyst., 1843, Belgiq., p. 335, pl. 29, f. 4: Bruxelles, Assche, Gand.

**TREBRATULINA**, d'Orb., 1847.

- 1155.** *Lacryma*, d'Orb., 1847. *Terebratula lacryma*, Morton  
Syn. cret. group, p. 72, pl. 16, fig. 6. États-Unis (Alabama)  
borne.

**MOLLUSQUES BRYOZOAIRÉS.****VINCULARIA**, DeFrance, 1828.

- 1156.** *fragilis*, DeFrance, 1828, Dict., t. 48. Michelin, 1841  
zoophyt., p. 175, pl. 46, f. 21. *Glauconome tetragona*, Munster,  
p. 100, pl. 36, fig. 7. Grignon, Parnes; Westphalie, Osnabrück  
**1157.** *DeFrancii*, d'Orb., 1828. *Vaginipora fragilis*, De  
Michelin, 1845, Iconog. zoophyt., p. 176, pl. 46, f. 22. France,  
Grignon, Parnes.  
**1158.** *marginata*, d'Orb., 1847. *Glauconome marginata*,  
Goldf., 1831, Petref., 1, p. 100, pl. 36, fig. 5. France? Parnes,  
M. Graves. Westphalie, Astrupp.  
**1159.** *rhombifera*, d'Orb., 1847. *Glauconome rhombifera*,  
Goldf., 1831, Petref., 1, p. 100, pl. 36, fig. 6. France, le Vivr  
nonville (M. Graves). Westphalie, Astrupp.  
**1160.** *hexagona*, d'Orb., 1847. *Glauconome hexagona*,  
Goldf., 1831, Petref., 1, p. 100, pl. 36, fig. 8. Westphalie, Ast  
**ESCHARINA**, Edwards, 1836.  
**1162.** *excavata*, d'Orb., 1847. *Eschara*, id., Michelin, 1845,  
zoophyt., p. 174, pl. 46, fig. 17. Fontenay-St-Péri, près de l  
Ully.

**HORNERA**, Lamouroux, 1821.

- 1163.** *Hippolyta*, DeFrance, 1821, Dict. des Sc. nat., 21,  
pl. 46, fig. 3. Michelin, pl. 46. Grignon, Chaumont, Ambl  
Neuvillebosc (Oise).  
**1164.** *crispa*, DeFrance, 1821, Dict., 21, p. 432. Orglande.  
**1165.** *elegans*, DeFrance, 1821, Dict., 21, p. 432. Hautevill  
**1166.** *Opuntia*, DeFrance, 1821, Dict., 21, p. 432. Hautev  
**PYRIPORA**, d'Orb., 1847.  
**1167.** *tuberculum*, d'Orb., 1847. *Hyppothoa tuberculum*,  
dale, 1845, Quarterly journal 1, p. 527. États-Unis, Rock's-l  
**1168.** *contexta*, d'Orb., 1847. *Flustra contexta*, Goldf., 183  
tref. Germ., p. 31, pl. 10, t. 2. Nyst., 1843, Belgiq., p. 617, pl. 4  
Bruxelles, Jette, Forêt, St-Gilles, Saveuthen, Dieghem, Mels  
Nivelles, Terbank près de Louvain.

**ESCHARA**, Lamarck.

- 1169.** *Duvaliana*, d'Orb., 1847. *Flustra* id., Michelin, 184  
nog. zoophyt., p. 172, pl. 46, f. 10. Gentilly, Vaugirard, p  
Paris.  
**1170.** *mamillata*, Edwards, Ann., 6, p. 336, n. 12, pl. 11,  
France, Ponchon, Heilles (Oise).  
**1171.** *Brongnartii*, Edw., Ann. Sc. nat., 6, p. 335, n. 10. |  
f. 9. France, Parnes (Oise).  
**1172.** *milleporacea*, Edwards, 1838, Ann. des Sc. nat., 2°  
t. 6, pl. 12, f. 13. Michelin, Icon., p. 173, pl. 46, f. 11. F  
Chaumont, Gypseuil, Hénonville.

- 1173. *Damocomis***, Michelin, 1845, Iconog. zoophyt., p. 173, pl. 46, f. 25. France, Chamont, Hénonville, Paris, Fontaine, Parnes.
- 1174. *celleporacea***, Münst., Goldfuss, 1830, pl. 36, f. 10. Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgiq., p. 618. Belgique, Lacken, Forêt; Allemagne, Astrupp, près d'Osnabruck, en Westphalie.
- \***1175. *tubulata***, Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 528. Etats-Unis, Wilmington.
- 1176. *incumbens***, Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 529. Etats-Unis, Rock's-Bridge.
- 1177. *linea***, Lonsdale, 1845, Quarterly journal 1, p. 530. Etats-Unis, Eutaw.
- 1178. *viminea***, Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 530. Etats-Unis, Eutaw.
- LUNULITES**, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 194.
- \***1179. *radiata***, Lamarck, 1816, Anim. s. vert., 2, p. 195. Lamour., Polyp., pl. 73, f. 5-8. Michelin, p. 174, pl. 46, f. 5. Grignon, Courtagnon, Chaumont, Parnes, Valécourt, Gypseuil, Ponchon.
- \***1180. *urceolata***, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 195. Lamouroux, Polyp., pl. 73, f. 9-12. Mich., Icon. zooph., p. 175, pl. 46, f. 6. France, Parnes, Chaumont, le Vivray.
- 1181. *subperforata***, d'Orb., 1847. *L. perforatus*, Nyst., 1843, Belgiq., p. 626 (non Goldf., 1831). Bruxelles, Jette, St-Gilles, Steenockerzeel, dans le Brabant.
- 1182. *distans***, Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 531. Etats-Unis, Wilmington, Wantoot.
- \***1183. *contigua***, Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 533. Etats-Unis, Wilmington.
- CUPULITES**, Lamouroux, 1821.
- 1184. *macropora***, d'Orb., 1847. *Orbitulites macropora*. Lam., Goldfuss, 1830, Petref., 1, p. 41, pl. 12, f. 8. France, Grignon.
- RETÉPORA**, Lamarck.
- 1185. *Ferussaci***, Mich., Icon. zooph., pl. 46, f. 20. France, Parnes (Oise).
- CRIBRINA**, d'Orb.
- 1186. *coronopus***, d'Orb., 1847. *Idmonea coronopus*, DeFrance, 1822, Dict. des Sc. nat., 22, p. 555. Michelin, pl. 46, f. 16. Grignon, Hénonville, Gypsenil, Gomerfontaine.
- 1187. *maxillaris***, d'Orb., 1847. *Idmonea maxillaris*, Lonsdale, 1845, Quarterly journal, 1, p. 523. Etats-Unis, Wantoot, South-Carolina.
- 1188. *commiscens***, d'Orb., 1847, *Idmonea commiscens*, Lonsdale, 1845, Quarterly journal, 1, p. 524. Etats-Unis, Rock's-Bridge.
- 1189. *triquetra***, d'Orb., 1847. *Idmonea triquetra*, Galeotti, Nyst., 1843, Belgiq., p. 619, pl. 48, f. 3. — Galeot., 1837, Mém. géogn. Brabant, p. 187, pl. 4, f. 13. Bruxelles, Uccle, Forêt, Aasche.
- CLYPEINA**, Michelin.
- 1190. *marginiporella***, Mich., Icon. zooph., p. 177, pl. 46, f. 27. France, Mouy (Oise).
- ENTALOPHORA**, Lamouroux, 1821.
- 1191. *proboscidea***, d'Orb., 1847. *Tubulipora proboscidea*, Lons-

dale, 1845, Quarterly journal, 1, p. 522. États-Unis, Rock's-Bridge.  
**DEFRANCIA**, Rœmer, 1842.

\***1192. Grignonensis**, d'Orb., 1847. *Tubulipora id.*, Edwards, Michelin, Icon. zooph., p. 169, pl. 46, f. 7. Grignon, Parnes, Chaumont.

**1193. stelliformis**, d'Orb., 1847. *Tubulipora id.*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 169, pl. 46, f. 8. Parnes, Vaugirard, Lattainville, Neuville-Bosc (Oise).

**1194. disciformis**, d'Orb., 1846. *Ceripora disciformis*, Münster, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 104, pl. 37, f. 4. Wesph., Astrupp.

**FELAGIA**, Lamouroux, 1821.

\***1195. Defranciana**, d'Orb., 1847. *Lichenopora id.*, Michelin, 1845, Iconog. zooph., p. 167, pl. 46, fig. 9. France, Parnes (Oise).

**LICHENOPORA**, Defrance.

\***1196. turbinata**, Defrance, 1821, Dict. des Sc. nat., 26, p. 257, pl. 4, f. 4. France, Hauteville.

**1196'. crista**, Defrance, 1821, Dict. des Sc. nat., 26, p. 257. Fr., Hauteville.

**ZONOPORA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 87.

**1197. variabilis**, d'Orb., 1847. *Ceripora variabilis*, Münster, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 105, pl. 37, f. 6. Westph., Astrupp, Osna-brück; Belgique, Bruxelles.

## ÉCHINODERMES.

**SCHIZASTER**, Agassiz.

\***1198. latus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 127. France, Blaye (Gironde).

**HEMIASTER**, Agassiz.

\***1199. subglobosus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 124. *Spatangus subglobosus*, Lamk. *Spatangus subglobosus*, Lamour., Calc. gr. de Paris. Amblainville, Hénonville.

\***1200. inflatus**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 124. Environs de Paris.

**EUPATAGUS**, Agassiz.

**1201. nummulinus**, Agass., 1847, Cat., p. 115. Paris, Parnes.

**1202. minor**, Agass., 1847, Cat., p. 116. France, Vernon.

**1203. Duvalii**, Desor, Agass., 1847, Cat., p. 116. France, Mouchy-le-Châtel.

**MACROPNEUSTES**, Agass.

**1204. Deshayesii**, Agass., 1847, Cat., p. 114. *Microaster Deshayesii*, Cat. syst., p. 2. France, Paris, le Vivray, le Menillet (Oise).

**SPATANGUS**, Klein.

**1205. Archiaci**, Agass., 1847, Cat., p. 114. France, Mouchy-le-Château.

**1206. Grignonensis**, Agass., 1847, Cat., p. 114. Grignon, Parnes, Chaumont, Tracy-le-Mont, Hazemont près Crépy (Oise).

**ÉCHINOLAMPAS**, Gray.

**1207. Blainvillei**, Agass., 1847, Cat., p. 106. *Echinolampas ovi-formis*. Foss. de la Dordogne; Sardaigne, Nice.

\*1208. *stelliferus*, Desml., Agass., 1847, Cat., p. 106. *Clypeaster stelliferus*, Lamk. *Clypeaster fornicatus*, Goldf. Blaye (Gironde); Allem., Münster.

?1209. *ovalis*, Desml., Tabl. syn., p. 342. Agass., 1847, Cat., p. 106. France, Bordeaux.

\*1210. *similis*, Agass., 1847, Cat., p. 107. Env. de Paris, Hénonville (Oise), Blaye (Gironde).

\*1211. *affinis*, Desml., Tabl. syn., p. 344. *Clypeaster affinis*, Goldf., Petref., p. 134, pl. 42, f. 6. Agass., 1847, Cat., p. 107. Grignon, Mauriaumont, Ste-Croix, Laon, Courtagnon, Château-Thierry, Blaye.

1212. *columbaris*, Agass., Cat., p. 508. Amblainville, Chaumont, Parnes (Oise).

#### **FIGORHYNCHUS**, Agassiz.

1213. *subcylindricus*, Agass., 1847, Cat. syst., p. 103. Paris.

1214. *Cuvieri*, Agass., 1847, Cat., p. 102. *Clypeaster Cuvieri*, Goldf., Petref., p. 133, pl. 42, f. 2. France, la Glacière, Chaumont, Hénonville, Russenberg.

\*1214. *Grignonensis*, Agass., 1847, Cat., p. 102. *Nucleolites grignonensis*, Defr. Grignon, Chaumont, Parnes, Ully, Hauteville (Manche).

\*1215. *Desmoulinssii*, Delbos, Agass., 1847, Cat. syst., p. 103. France, Blaye (Gironde).

#### **LENITA**, Desor.

\*1216. *patellaris*, Agass., 1847, Cat., p. 84. *Nucleolites patellaris*, Goldf., Petref., p. 130, pl. 43, f. 5. Grignon, Parnes, Chaumont, St-Félix.

#### **ECHINOCCYANUS**, Van-Phels.

1217. *subcaudatus*, Agass., 1847, Cat., p. 84. *Fibularia subcaudata*, Desml., Tabl. syn., p. 224. Gypseuil, Parnes, les Groux (Oise).

1218. *Francii*, Agass. *Scutella inflata*, Defr., Dict., 48, p. 230. Parnes, Chaumont, Marquemont, Ponchon, les Groux, Chambors, (Oise).

\*1219. *pyriformis*, Agass., 1847, Cat., p. 83, et Monogr. des Scutell., p. 134, pl. 27, f. 19-24. Rive droite de la Garonne et de la Dordogne, Cannel, Montmirail, Parnes, Cotentin, Orglande, Bordeaux.

1220. *inflatus*, Agass., 1847, Cat., p. 83, et Monogr. des Scutelles, p. 137. Grignon (Seine-et-Oise).

?1221. *occitanus*, Agass., 1847, Cat., p. 82, et Monogr. des Scutelles, p. 136, pl. 27, f. 48-58. Pouillac et St-Estèphe (Gironde); Espagne.

\*1222. *crustuloides*, Agass., 1847, Cat., p. 141. *Scutella crustuloides*, Mort., Synops., p. 77, pl. 15, f. 10. Caroline du Sud.

#### **SCUTELLINA**, Agassiz.

1223. *Hayesianna*, Agass., 1847, Cat., p. 82, et Monogr. des Scutelles, p. 103, pl. 21, f. 15-19-22. Grignon (Seine-et-Oise), Hénonville (Oise).

\*1224. *complanata*, Agass., 1847, Cat., p. 82. *Cassidulus compla-*

*natus*, Lamk., p. 35, n. 4. Grignon (Seine-et-Oise), Chaumont, Parnes, Neuvillebosc.

\***1225. nummularia**, Agass., 1847, Cat., p. 81, et Monogr. des Scutell., p. 99, pl. 21, f. 8-14. Grignon (Seine-et-Oise), Blaye (Gironde), Antibes (Var)? Parnes, Vibrayes, Mouchy (Oise), Ile de Noirmoutiers.

\***1226. placentula**, Agass., 1847, Cat., p. 81, et Monogr. des Scutell., p. 102, pl. 21, f. 1-7. Chaumont, Parnes, Montmirail, Nogent, Courtagnon.

\***1227. elliptica**, Agass., 1847, Cat., p. 82, et Monogr. des Scutell., p. 103, pl. 21, f. 21-28. Grignon (Seine-et-Oise), Parnes.

**ECHINARACHNIUS**, Van-Phels.

\***1228. incisus**, Agass., Monog. des Scutelles, p. 93, pl. 21, f. 29-31. Ag., 1847, Cat., p. 76. Hauteville (Manche).

**LAGANUM**, Klein.

\***1229. tenuissimum**, Agass., Monogr. des Scutelles, p. 113, pl. 26, f. 4-6. Ag., Cat., p. 75. Plossac près Blaye (Gironde).

\***1230. marginale**, Agass., Monogr. des Scutelles, p. 113, pl. 26, f. 1-3. Ag., Cat. syst., p. 75. Blaye (Gironde), Noirmont.

**OCELOPLEURUS**, Agassiz.

**1231. radiatus**, Agass., 1847, Cat., p. 53. Chaumont, Amblainville (Oise).

**1232. spinosissimus**, Agass., 1847, Cat., syst., p. 53. Paris.

\***1233. infulatus**, Agass., 1847, Cat., p. 141. *Echinites infulatus*. Mort., Synops., p. 75, pl. 10, fig. 7. Caroline du Sud.

**ECHINOPSIS**, Agassiz.

\***1234. Gacheti**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 51. *Echinus Gacheti*, Desml., Tabl. syn., p. 300. Blaye (Gironde).

**DIADEMA**, Gray.

?**1234'. pusillum**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 43. *Echinus pusillus*, Münst. in Goldf., Petref., p. 125, pl. 40, fig. 14. Astrupp, près Osna-brück.

**OIDARIS**, Lamarck.

\***1235. Vapincanus**, d'Orb., 1847. Espèce à baguettes grosses, claviformes ou ovales, striées en long et pourvues de quelques côtes rayonnantes au sommet. France, Faudon (Hautes-Alpes).

**ORENASTER**, Lwyd, 1669. Voy. t. 1, p. 240.

\***1236. poritoides**, d'Orb., 1847. *Asterias poritoides*, Desmoulins, 1832, Bordx., Actes de la Soc. Linn. de Bordx., 4<sup>e</sup> liv., 2, p. 14, pl. 2, fig. 3. France, Parnes, Mouchy-le-Châtel, Hénonville, Ponchon, Hazemont, près Crépy (Oise).

?\***1237. lævis**, d'Orb., 1847. *Asterias lævis*, Desmoulins, 1832, Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux, 5, 4<sup>e</sup> liv., 2, p. 15, pl. 2, fig. 4. France, la Roque-de-Tau, Cambes (Gironde):

**PENTACRINUS**, Miller, 1821.

**1238. Sowerbyi**, Wether, Tr. Soc. géol. Lond., 5, p. 136, pl. 8, fig. 4. France (Oise); Angleterre, Hampstead.

\***1239. Alpinus**, d'Orb., 1847. Espèce confondue à tort avec le *P. basaltiformis*, par M. Deshayes (la Doucette, Statistique des



Hautes-Alpes, p. 565), mais ayant les articles lisses et égaux. France, Faudon (Hautes-Alpes).

### ZOOPHYTES.

**TURBINOLIA**, Lamarck, Edwards et Haime, 1848, p. 235.

\*1240. *sulcata*, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 231, n° 6. Lamouroux, Polypiers, pl. 74, f. 18-21. Michelin, Icon. zooph., pl. 43, f. 4. Edw. et Haime., p. 236. Grignon, Courtagnon, Montmirail, Betz, Ermenonville, Ver (Oise), Faudon (Hautes-Alpes).

1241. *Dixonii*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, pl. 4, f. 2. Angleterre, Blacklesham-Bay.

\*1242. *pharetra*, Lea, 1833, Cont. to Geol., p. 146, pl. 6, f. 210. Edwards et Haime, 1848, p. 238. États-Unis, Alabama.

1243. *minor*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 239. Angleterre, Barton.

1244. *costata*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 239, pl. 7, f. 1. France, Grignon.

\*1245. *dispar*, DeFrance, 1824, Michelin, 1844, Icon. zoophyt., p. 152, pl. 43, f. 5. Edwards et Haime, *id.*, p. 240. Grignon, Parnes, Lattainville, Hauteville (Manche).

**PLATYTROCHUS**, Edwards et Haime, 1848.

\*1245. *Stokesii*, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 247, pl. 7, f. 7. *Turbinolia*, *id.*, Lea, 1833, Contrib., p. 194, pl. 6, f. 207. *Endopachys*, Lonsdale, 1845. États-Unis, Alabama.

\*1245". *Goldfussii*, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 248, pl. 7, f. 9. *Turbinolia*, *id.*, Lea, 1833, p. 195, f. 6, pl. 208. Alabama.

**SPHENOTROCHUS**, Edwards et Haime, 1848.

\*1246. *crispus*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 241. *Turbinolia crispata*, Lamarck, 1816, Anim. sans vert., 2, p. 231. Lamouroux, pl. 74, f. 14-17. Goldf., pl. 15, f. 7. Michelin, Icon. zooph., pl. 43, f. 1. *Turbinolia trochiformis*, Michelotti, Sp. zooph., p. 33, pl. 4, f. 7. France, Grignon; Belgique, Louvain, Gand.

1247. *mixtus*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 243. *Turbinolia mixta*, DeFrance, 1824, Michelin, 1844, Iconog. zoophyt., p. 151, pl. 43, f. 3. France, Grignon, Parnes, Thury.

1248. *pulchellus*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 243, pl. 7, f. 3. Grignon.

\*1249. *granulosus*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., p. 246, pl. 7, f. 2. *Turbinolia granulosa*, DeFrance, 1828, Dict. des Sc. nat., vol. 56, p. 94. Hauteville (Manche).

1250. *nanus*, Edw. et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 9, p. 246. *Turbinolia nana*, Lea, 1833, Contrib. to Geol., p. 195, pl. 6, f. 209. États-Unis, Alabama.

**ENDOPACHYS**, Lonsdale, 1845.

\*1252. *Macluri*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 32, pl. 1, f. 1. *Turbinolia Macluri*, Lea, 1833, Cont., p. 193, pl. 6, f. 206. *Endop. Alatum*, Lonsdale, 1845, Quaterly Journal, p. 514, fig. a (exclus. fig. b, c). États-Unis, Alabama; Stoudenmire Creek?

**DISCOTROCHUS**, Edwards et Haime, 1848.

- \*1252'. *Orbignyanus*, Edwards et Haime, Ann. des Sc. 1848, p. 253, pl. 7, f. 6. États-Unis, Alabama.
- FLABELLUM**, Lesson., 1831.
- \*1253. *cuneiforme*, Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, États-Unis, Eutaw, Wilmington; Cavehall.
- PARACRYATHUS**, Edwards et Haime, 1848.
1254. *Desnoyersi*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. 9, p. 320. Grignon.
- \*1255. *procumbens*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. 9, p. 320, pl. 10, fig. 6. France, Hauteville (Manche).
1256. *caryophyllus*, Edwards et Haime, 1848, Ann. nat., 9, p. 322. *Turbinolia caryophyllus*, Lam., 1816, Aniz vert., 2, p. 332. Angleterre, Ile Sheppey.
1257. *brevis*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. 1 p. 323. Angleterre, Ile Sheppey.
- DASINIA**, Edwards et Haime.
1258. *Sowerbyi*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. p. 329. *Desmophyllum*, Sow., 1834, Trans. Geol. Soc., 5, p. 12 fig. 1. Angleterre, Highgate, Clarendon-Hill.
- EUPSAEMONIA**, Edwards et Haime, 1848.
- \*1259. *trochiformis*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. t. 10, p. 78, pl. 1, fig. 3. *Madrepora trochiformis*, Pallas, 1766, *Turbinolia clavus*, Lamarck, 1816, An. sans vert., 2, p. 232. *atica*, Brongniart, 1822, Michelin, Icon. zoophyt., p. 152, pl. 43 Chaumont, St-Germain.
- 1259'. *Bayliana*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 320. Grignon.
- \*1259''. *Haleana*, d'Orb., 1848, Edwards et Haime, loc. cit. p. 80. Alabama.
- 1259'''. *Brongniartiana*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit. p. 81, pl. 1, fig. 7. Environs de Paris.
- BALANOPHYLLIA**, Searles Wood, 1844.
- \*1260. *Gravesii*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 88. *Turbinolia id.*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 153, pl. 43, fig. 1. Nonville (Oise).
- 1260'. *desmophyllum*, Edwards et Haime, 1848, loc. cit. Angleterre, Blackbsleam-Bay.
- \*1260''. *tenuistriata*, Edwards et Haime, 1848, *id.*, p. 103. St-André-de-Meouille (B.-Alpes).
- STEPHANOPHYLLIA**, Michelin, 1841.
- 1260'''. *discoides*, Edwards et Haime, 1848, *id.*, t. 10, Angleterre, Haverstock-Hill.
- CIRCOPHYLLIA**, Edwards et Haime, 1848.
1261. *truncata*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat. p. 238. *Anthophyllum id.*, Goldf., pl. 13, fig. 9. *Turbinolia id.*, Michelin, 1845, pl. 43, fig. 9. Parnes, Chaumont.
- DENDROPHYLLIA**, Blainville, 1830.
- 1261'. *dendrophylloides*, Edwards et Haime, 1848, Ann. Sc. nat., 10, p. 102. *Oculina id.*, Lonsdale, M. S.
- TROCHOCRYATHUS**, Edwards et Haime, 1848.

- \***1262. Bouyanus**, d'Orb., 1849. Espèce trochoïde à calice presque circulaire. Faudon (H.-Alpes).
- \***1263. Alpinus**, d'Orb., 1849. Espèce comprimée, formant un cône presque régulier. France, St-André-de-Meouille.
- \***1264. grandis**, d'Orb., 1849. Grande espèce en corne arquée, peu comprimée. France, Faudon (H.-Alpes).
- \***1265. brevis**† d'Orb., 1847. *Turbinolia brevis* et *irregularis*, Desh., 1834, Stat. des Hautes-Alpes, de M. Ladoucette, p. 565, pl. 13, fig. 1-3. Faudon (H.-Alpes).
- \***1266. tenuistria**† d'Orb., 1847. *Turbinolia tenuistria*, Deshayes, 1834. Ladoucette, Stat. des H.-Alpes, p. 565, pl. 13, fig. 4-6. Faudon (H.-Alpes).
- FUNGINELLA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 91.
- \***1267. Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce plane nummusmale, à grosses cloisons inégales. Faudon (H.-Alpes).
- PHYZANGIA**, Edwards et Haime, 1849.
- \***1268. brevissimum**, Edwards et Haime, 1849, Ann. des Sc. nat., 12, p. 179. *Astrea id.*, Deshayes, 1834, in Ladoucette, p. 564, pl. 13, fig. 13-14. Michelin, pl. 63, fig. 8. Faudon (Hautes-Alpes), Chailleul-le-Vieil (non Dax, Michelin).
- CYLIPOSMILLA**, Edwards et Haime, 1848.
- 1268'. Altavillensis**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 233. *Caryophyllia id.*, Defrance, 1817, Michelin, Icon., p. 308, pl. 74, fig. 2. Hauterive (Manche).
- PHYLOCENIA**, Edwards et Haime, 1848.
- \***1269. irregularis**, Edwards et Haime, 1849. *Lithodendron irregulare*, Michelin, 1845, Icon. zooph., p. 154, pl. 43, fig. 14. Hondainville, Chaumont, Senlis, Auvert.
- LOBOPHANIA**, Edwards et Haime, 1848.
- \***1269'. cariosa**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., 10, p. 106. *Dendrophyllia cariosa*, Michelin, Icon. zoophyt., pl. 43, fig. 10. *Lithodendron cariosum*, Goldf., pl. 13, fig. 7. Auvert (Seine-et-Oise), Nanteuil, Bouconviillers, Aumont.
- 1269". Parisiensis**, Edwards et Haime, 1848, loc. cit., p. 106. *Lobophyllia Parisiensis*, Michelin, 1844, Icon., p. 155, pl. 43, fig. 11. Env. de Paris.
- DIPHELIA**, Edwards et Haime, 1849.
- \***1270. Solanderi**, d'Orb., 1848. *Oculina Solanderi*, Defrance, 1825, Michelin, Icon. zoophyt., p. 162, pl. 43, fig. 15. *Lithodendron Virginia*, Goldf., 1, p. 44, pl. 13, fig. 1 (non Schweiger). France, Chaumont, le Vivray, Ponchon, Gilocourt (Oise).
- \***1270'. raristella**, Edwards et Haime. *Oculina raristella*, Defr., Michelin, pl. 43, fig. 16. Le Vivray.
- \***1271. multistella**, d'Orb., 1848. *Caryophyllia multistellata*, Galeotti, Nyst., 1843, Coq. tert. de Belgiq., p. 628, pl. 48, fig. 10. — *Lithodendron multistellata*, Galeot., 1837, Mém. prov. de Brab., p. 158, supp., fig. 14. Belgique, Lacken, Jette.
- APLOSASTREA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 92.
- 1273. stylophora**, d'Orb., 1849. *Astrea id.*, Goldf., 1831, Petref., 1, p. 71, pl. 24, fig. 4. France, Grignon.

**ARRACIA**, Edwards et Haime, 1849.

\*1274. *sphaeroidalis*, d'Orb., 1847. *Astrea sphaeroidalis*, N 1845, Iconog. zoophyt., p. 159, pl. 44, fig. 9. Parnes, Trou-S Chaumont, Mouchy, Acy, Faudon (Hautes-Alpes).

**ASTROCCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*1274'. *Alpina*, d'Orb., 1847. Espèce à très-grands calic columelle bien marquée. France, Faudon (H.-Alpes).

**CONIOCCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Astroccenia* à ca polygones réguliers.

\*1275. *numisma*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, DeFrance, 18 des Sc. nat., 42, p. 390. Michelin, pl. 63, fig. 4. *A. geometrica*, 1834, M. Ladoucette, p. 564, pl. 13, fig. 10-12. *Astroccenia* n Edw. et Haime, 1848. Faudon et Ancelle (H.-Alpes).

**TRIPHYLLOCCENIA**, d'Orb., 1849. C'est un *Astroccen* columelle saillante, à calices très-profonds, pourvus de trois i  
1275'. *excavata*, d'Orb., 1847. Espèce remarquable, proba dendroïde. France, Ancelle (H.-Alpes).

**SIDERASTREA**, Edwards et Haime, 1849.

1276. *Parisiensis*, Edwards et Haime, 1849, Ann. des S 12, p. 143. *Astrea crenulata*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., pl. 44, fig. 1 (non Goldfuss, 1831). Grignon, Vaugirard.

**PRIONASTREA**, Edwards et Haime, 1849.

\*1277. *Amelliana*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, DeFrance, Michelin, pl. 44, fig. 3. *Astrea muricata*, Goldf., 1831, pl. 24 France, Grignon, Montmirail, Parnes. P. S. Acy, Ermenonville Hauteville (Manche), Faudon (H.-Alpes).

\*1278. *bellula*, d'Orb., 1847. *Astrea id.*, Michelin, 1845, I zoophyt., p. 158, pl. 44, fig. 2. France, Parnes, Valmondois, I (H.-Alpes).

**SEPTASTREA**, d'Orb., 1849.

1279. *hirtolamellata* ? Edwards et Haime, 1849, Ann. nat., 12, p. 165. *Astrea id.*, Michelin, 1845, Iconog. zoophyt., pl. 44, fig. 5. Parnes, Grignon, Acy.

**CLAUSASTREA**, d'Orb., 1849.

1280. *tessellata* ? Edw. et Haime, 1849, Ann. des Sc. na p. 159. *Astrea id.*, Michelin, 1845, Iconog. zoophyt., p. 161, fig. 2. Mouy, Aumont (Oise).

**STYLOCCENIA**, Edwards et Haime, 1848.

\*1281. *emarciana*, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc 10, p. 193, pl. 7, fig. 2. *Cellastrea id.*, Blainv. *Astrea id.*, Def 1826, Michelin, Icon. zoophyt., p. 158, pl. 44, fig. 6. *A. de* Michelin, pl. 44, fig. 8. Grignon, Parnes, Chaumont, Hauteville

\*1282. *monticularia*, Edwards, 1848, *id.*, p. 294. *Stylc monticularia*, Schweig. *Astrea Hystrix*, DeFrance, 1826, Mic Iconog. zoophyt., p. 160, pl. 45, fig. 1. Grignon, Parnes, Chau Lattainville, Fercourt.

**LATONCRANDRA**, d'Orb., 1847. Voy. p. 40.

\*1283. *Alpina*, d'Orb., 1847. Espèce voisine de l'espèce de l' corallien, mais à ramules plus étroits, plus déprimés. Faudon Alpes).

**GONIAARGAEA**, d'Orb., 1849. Voy. p. 322.

\*1283'. **Alpina**, d'Orb., 1849. Espèce à larges calices, en contact les uns avec les autres. Faudon (H.-Alpes).

**MADREPORA**, Lamarck.

\*1284. **ornata**? DeFrance, 1826, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 164, pl. 43, fig. 17. Grignon, Chaumont, Parnes.

1285. **tubulata**? Lonsdale, 1845, Quarterly Journal, 1, p. 520. États-Unis, Jacksonbord.

**LITHARGEA**, Edwards et Haime, 1849.

\*1285'. **Bouyana**, d'Orb., 1849. Espèce à cloisons très-fines. Faudon (H.-Alpes).

**DISTICHOPORA**, Blainville, 1834.

\*1286. **antiqua**, DeFr., Mich., Icon. zoophyt., 168, pl. 45, fig. 11. France, Chaumont, le Vivray (Oise).

**HOLARGEA**, Edwards et Haime, 1849.

\*1287. **Parisiensis**, d'Orb., 1847. *Porites parisiensis*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 166, pl. 45, fig. 10. France, Grignon, Parnes (Oise), Faudon (H.-Alpes).

1288. **micropora**, d'Orb., 1847. Charmante espèce à cellules très-petites, souvent un peu saillantes. France, Hauteville (Manche), Faudon (Hautes-Alpes).

1289. **Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce dont les cellules sont bien plus grandes et plus rares que chez la précédente. Faudon.

**DACTYLACIS**, d'Orb., 1849. Voy. p. 83.

\*1289'. **Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce à rameaux grêles, à cellules très-petites. Faudon (H.-Alpes).

#### FORAMINIFÈRES (D'ORB.).

**OVULITES**, Lamarck, 1816, Anim. s. vert., 2, p. 194.

\*1290. **margaritula**, Lam., 1816, Anim. s. vert., 2, p. 194, n. 1. Lam., Polyp., p. 43, pl. 71, fig. 9, 10. Grignon, Parnes, Chaumont, Uilly; Belgique, Forêt, Jette, Zoet-Water, près de Louvain, Gand.

\*1291. **elongata**, Lam., 1816, Anim. sans vert., 2, p. 194, n. 2. Lamouroux, Polyp., p. 43, pl. 71, fig. 11, 12. Grignon, Chaumont, Parnes.

1292. **Pavantina**, d'Orb., 1847. *Acicularia Pavantina*, d'Arch., 1843. Mém. Soc. géol. de Fr., p. 386, pl. 25, fig. 8. Pisseloup, près Pavant.

**DACTYLOPORA**, Lam., 1816, An. s. vert., 2, p. 189.

\*1293. **cylindracea**, Lam., 1816, An. s. vert., 2, p. 189. Goldf., pl. 12, fig. 4. Mich., pl. 46, fig. 3. Grignon, Parnes, Mouchy; Belgique, Bruxelles, Forêt, Laeken, Assche.

1294. **elongata**, d'Orb. *Polytripsa elongata*, DeFrance, Dict. des Sc. nat., t. 42, p. 453, pl. 48, fig. 1. Valognes, Grignon; Belgique, St-Gilles, Forêt.

**ORBITOLITES**, Lamarck, 1801.

\*1295. **complanata**, Lamk. *Orbulites, complanata*, Lam., An. s. vert., 2, p. 196, n. 2. Lamouroux, Polyp., pl. 73, fig. 12-16. France,

Grignon, Chaumont, Lattainville, Mouy, Lierville, Pauliac (Gironde); Belg., Forêt, Melsbroek, Assche.

**ORBITOIDES**, d'Orb., 1847. Voy. p. 322.

\***1296. Mantellii**, d'Orb., 1847. *Nummulites*, id., Morton, 1834, Syn. cret. group, p. 45, pl. 5, fig. 9. États-Unis (Alabama), Clairborne.

\***1297. Alpina**, d'Orb., 1847. Espèce très-voisine de la précédente, seulement plus irrégulière. France, Faudon (Hautes-Alpes).

**NODOSARIA**, Lamarck.

\***1298. pulchella**, d'Orb., 1826, Ann. des Sc. nat., p. 88, n. 25. Espèce pourvue de quinze côtes aiguës longitudinales. France, Montmirail.

**ORTHOCEKINA**, d'Orb., 1825.

\***1299. clavulus**, d'Orb., 1826, Ann. des Sc. nat., p. 90, n. 48. Grignon.

**CRISTELLARIA**, Lamarck.

**1300. rotella**, ?, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399. États-Unis, Tampa-Bay.

**1301. Floridanaf**, d'Orb., 1847. *Nummulites Floridanus*, Conrad, 1846, Amer. Journ., p. 399. Tampa-Bay.

**NUMMULITES**, Lamarck.

\***1302. laevigata**, Lam., An. s. vert., 7, p. 629, n. 1. Annal., 1, pl. 62, fig. 10. *N. elegans*, Sow., Min. Conch., pl. 538, fig. 1 (non d'Archiac, 1846). *Camerina laevigata*, Bruguière, 1791, p. 399. France, Pont-Ste-Maxence, Creil, Parnes, Mouchy, le Vivray, Coye (Oise); Angl., Stubbington, Emsworth.

\***1303. striata**, d'Orb., 1847. *Camerina striata*, Bruguière, 1791, Encycl., p. 400. *Num. contortus*, Desh., 1834, Ladoucette, Statist. des Hautes-Alpes, pl. 13, fig. 9. Faudon (Hautes-Alpes).

**NONIONINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.

\***1304. laevis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 128, n. 11, Modèles n. 46. Mouchy-le-Châtel.

\***1305. rugosa**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 128, n. 17. Espèce ovale à bordure très-épaisse sur les anciennes loges seulement. Blaye.

**PENEROPLIS**, Montfort, 1808, d'Orb., Foraminifères de Vienne.

\***1306. opercularis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 120, n. 6. *Renulites*, id., Lamarck, Encycl., pl. 465, fig. 8. Mouchy-le-Châtel, Montmirail.

\***1307. Gervillei**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *P. planatus*, mais lisse et renflée sur la spire. Env. de Valognes.

**SPIROLINA**, Lamarck, 1824.

\***1308. cylindracea**, Lamarck, 1822, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. naturelles, p. 120, n. 1, Modèles n. 24. Grignon, Chaumont, Parnes, Mouchy.

\***1309. striata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 121, n. 2. Espèce à côtes transverses, striées en long. Mouchy-le-Châtel.

\***1310. depressa**, Lamk., 1804, Defrance, Dict., pl. 2, fig. 2. D'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 121, n. 3. France, Mouchy-le-Châtel, Grignon, Chaumont.

- \***1311. *laevigata***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 121, n. 4.  
Espèce comprimée, lisse. Mouchy-le-Châtel.
- \***1312. *pedum***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 121, n. 5. Espèce très-grêle, striée en long, les tours non embrassants. Grignon, Mouchy-le-Châtel.
- ALVEOLINA**, Bosc, 1801. Voy. p. 185.
- \***1313. *Boscii***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 140, n. 5, Modèles n. 50. Grignon, Mouchy.
- \***1314. *elongata***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 141, n. 6. Espèce très-allongée, lisse. Env. de Valognes.
- ROTALIA**, Lamarck.
- \***1315. *complanata***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 108, n. 37. A loges bombées. Les Boves.
- \***1316. *turbo***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 108, n. 39, Modèles n. 73. Les Boves.
- \***1317. *semimarginata***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 110, n. 53. Espèce rugueuse, ovale, bordée intérieurement. France, Grignon.
- \***1318. *trochiformis***, Lamk., An. s. vert., 7, p. 106, n. 1. An. du Mus., 1, pl. 12, fig. 8. France, Montmirail, Liancourt, Valognes, Parnes, Mouchy.
- \***1319. *saxorum***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 106, n. 2. Espèce bordée en dessous. France, env. de Blaye.
- \***1320. *marginata***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 106, n. 9. Disque central très-grand. Montmirail.
- \***1321. *Dufrenoyi***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., pl. 107, n. 12. Espèce très-conique. Montmirail, Blaye.
- 1322. *papillosa***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 107, n. 16. Couverte de papilles au centre inférieur. Montmirail, les Boves, Parnes.
- \***1323. *Thouini***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 107, n. 16. Striée en travers sur les sutures inférieures. Boves, Parnes, Mouchy.
- \***1324. *Guerini***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 107, n. 18. Espèce à loges nombreuses droites. Boves, Parnes.
- \***1325. *Andouini***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 107, n. 19. Espèce bordée extérieurement et quelquefois épineuse. Boves, Essanville, Parnes.
- GLORIGERINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \***1326. *Parisiensis***, d'Orb., 1845, Ann. des Sc. nat., p. 111, n. 12. Espèce ovale fortement ombiliquée. Grignon.
- TRUNCATULINA**, d'Orb., 1825.
- \***1327. *elongata***, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 112, n. 2. Grande espèce bombée. Grignon, Parnes.
- ROSALINA**, d'Orb., 1825.
- \***1328. *orbicularis***, d'Orb., 1847. *Rosalia*, id., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 108, n. 35. Espèce très-déprimée. Mouchy-le-Châtel, les Boves.
- \***1329. *vesicularis***, d'Orb., 1847. *Rosalia*, id., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 108, n. 36. *Discorbites vesicularis*. Valognes.

- \***1330. Parisiensis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 16  
Modèles n. 38. Grignon, Montmirail, Parnes. P. S., Ermenon
- VALVULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.
- \***1331. triangularis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat.,  
n. 1, Modèles n. 25. Mouchy-le-Châtel, Valognes.
- \***1332. pupa**, d'Orbigny, 1825, Ann. des Sc. nat., p. 104  
Espèce plus allongée que la précédente. Mouchy-le-Châtel  
lognes.
- \***1333. columna-tortilis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc.  
p. 104, n. 3. Mouchy-le-Châtel, Valognes.
- \***1334. ignota**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 104, n. 5.  
carénée entièrement, peu élevée. Valognes.
- \***1335. globularis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 11  
Espèce globuleuses courte. Mouchy-le-Châtel. Valognes.
- \***1336. Gervillei**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 10  
Espèce plus courte encore. Valognes.
- \***1337. deformis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 104  
Espèce qui n'a qu'un tour de spire très-évasée. Valognes.
- CLAVULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.
- \***1338. Parisiensis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 16  
Modèles n. 66. Mouchy-le-Châtel.
- ASTERIGERINA**, d'Orb., 1846, Foraminifères de Vienne.
- \***1339. Ferussaci**, d'Orb., 1847. *Rosalina*, id., 1825, Ann. 4  
nat., p. 108, n. 38. Espèce trochoïde. France, les Boves.
- GUTTULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \***1340. caudata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 100  
Grignon (non Adriatique).
- \***1341. nitida**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 100, n. 17.  
ovale. Grignon, Parnes.
- GLOBULINA**, d'Orb., 1824, Foraminifères de Vienne.
- \***1342. translucida**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 1  
pèce irrégulière ovale. France, Grignon (non Rimini).
- \***1343. depressa**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., n. 101.  
comprimée. Env. de Beauvais, Mouchy.
- POLYMORPHINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \***1344. obtusa**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 99. Espè  
flée. Grignon.
- \***1345. aculeata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 99  
Grande espèce striée en long. Grignon.
- \***1346. Thouini**, d'Orb., 1825, Ann. des Sciences nat., p. 9  
Modèles n. 23. Grignon.
- BILOCULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.
- \***1347. bulloides**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. naturelles,  
n. 1, Modèles n. 90. Grignon (non Bordeaux, non Rimini), M.  
Parnes.
- \***1348. ringens**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 131  
Large ouverture, dent bifurquée. Grignon, Valognes, Blaye.
- \***1349. aculeata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 132,  
Modèles n. 31. Pierres de Blaye.



\***1350. elongata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 132, n. 5. Espèce très-allongée. Pierres de Blaye.

**SPIROLOCULINA**, d'Orb., 1825, Foraminifères de Vienne.

\***1351. perforata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 132, n. 2, Mod. n. 92. Montmirail.

\***1352. bicarinata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 132, n. 6. Mouchy-le-Châtel.

**FABULARIA**, Defr., 1824, d'Orb., Foraminifères de Vienne.

\***1353. discolithes**, Defr., 1820, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 141, pl. 17, fig. 14-17, Mod. n. 100, id., Foram. de Vienne, pl. 21, fig. 55, 56. Valognes, Mouchy, Parnes.

\***1354. compressa**, d'Orb., 1847. Espèce très-comprimée, très-grande. Parc-Fouru, près de Valognes (Manche).

**TRILOCULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foram. de Vienne.

\***1355. trigonula**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 133, n. 1, Mod. n. 93. Boves, Valognes, Parnes, Mouchy.

\***1356. angularis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 133, n. 6. Espèce très-anguleuse, triangulaire. Blaye.

\***1357. strigillata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 134, n. 13. Espèce courte, renflée. Valognes.

\***1358. deformis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 134, n. 18. Espèce très-allongée gibbeuse. Grignon, Chaumont.

\***1359. tricostata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 134, n. 21. Grignon.

**ARTICULINA**, d'Orb., 1825, Foram. de Vienne.

\***1360. nitida**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 134, n. 1, Modèles n. 22. Grignon.

**QUINQUELOCULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminif. de Vienne.

\***1361. saxorum**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 1, Mod. n. 33, pl. 16, fig. 10-14. Paris, Mouy, Blaincourt.

\***1362. birostris**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 2. *Miliolites*, id., Lam., Ann. du Mus., 5, p. 352, n. 7. Paris.

\***1363. striata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 4. Espèce fortement striée, comprimée. Grignon.

\***1364. Parisiensis**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 5. Espèce renflée et striée. Grignon.

\***1365. laevigata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 6. Espèce allongée. Grignon.

\***1366. glomerata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 7. Espèce très-irrégulière. Grignon, Chaumont, Neuville-Bosc.

\***1367. plana**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 8. Espèce subanguleuse. Grignon (non Méditerranée).

\***1368. semistriata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 13. Chaque loge est striée à ses extrémités. Grignon.

\***1369. crassa**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, n. 14. Espèce suborbiculaire renflée, striée. Grignon.

\***1370. Ferussaci**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 135, Modèles n. 32. Paris, Parnes, Mouchy.

\***1371. punctulata**, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 136. Ponctué en long. Paris.

- \*1372. *carinata*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 136.  
lisse, obtusément carénée. Paris.
- \*1373. *prisca*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 136, n.  
pèce renflée. Paris.
- \*1374. *lamellata*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 134  
Une lame carénée au pourtour. Paris.

## AMORPHOZOAIRES.

**OLIONA**, Grant, 1826. Voy. p. 289.

- \*1375. *Parisienata*, d'Orb., 1847. Jolie espèce dont les our-  
extérieures sont très-petites, nombreuses au centre, presque n-  
au pourtour. France, Grignon (Seine-et-Oise).



## VINGT-CINQUIÈME ÉTAGE : — PARIS

(B. — PARISIEN SUPÉRIEUR.)

## MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

**SEPIA**, Linné, d'Orb., Paléont. univ., 1, p. 147.

1376. *compressa*, d'Orb., Paléont. univ., 1, pl. 7, fig. 4-4  
tertiaires, pl. 1, fig. 1-3. Valmondois, Valognes.

## MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

**HELIX**, Linné, 1758.

1377. *pseudoglobosa*, d'Orb., 1847. *H. globosa*, Sow., 1817  
Conch., t. 4, p. 157, pl. 170 (non Montagu, 1802). Angl., Roach  
Benson (Oxfordshire).

**BULIMUS**, Bruguière, 1789.

1378. *ellipticus*, Sow., 1822, Min. Conch., 4, p. 46, pl.  
Wetherell, 1846, London, Geolog. Journ., p. 20, fig. 2. Angl.,  
combe, Ile de Wight.

1379. *costellatus*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 89, pl.  
Angl., Ile de Wight.

**LYMNEA**, Lamk., 1801.

1380. *ovum*, Brong., Ann. du Mus., t. 15, pl. 22, fig. 13. l  
1824, 2, p. 97, pl. 11, fig. 15, 16. Pierrelaye.

- \***1381. acuminata**, Brong., Ann. du Mus., t. 15, p. 373, pl. 22, fig. 11. Desh., 1824, 2, p. 92, pl. 10, fig. 20, 21. Pierrelaye, Beauchamp.
  - 1382. arenularia**, Brard, Ann. du Mus., t. 15, pl. 24, fig. 5, 6, 7. Desh., 1824, 2, p. 93, pl. 11, fig. 7, 8. Beauchamp, Valmondois, Crépy.
  - 1383. substriata**, Desh., 1824, 2, p. 94, pl. 11, fig. 5, 6. France, la Chapelle, près Senlis, la Chapelle-en-Serval.
  - \***1384. longiscata**, Brong., Ann. du Mus., t. 15, p. 372, pl. 22, fig. 9. Desh., 1824, 2, p. 92, pl. 11, fig. 3, 4. Sow., M. C., pl. 343. Belleville-St-Ouen, Pantin, Apremont, Fleuvines, Cran-de-Lude (Marne); Angl., Headon-Hill (Ile de Wight).
  - 1385. strigosa**, Brong., Ann. du Mus., t. 15, p. 373, pl. 22, fig. 10. Desh., 1824, 2, p. 92, pl. 11, fig. 1, 2. Pantin, Nanteuil, Ducy, Boulavre.
  - 1386. subpalustris**, d'Orb., 1847. *L. palustris*, Brong., Ann. du Mus., t. 15, p. 373, pl. 22, fig. 15. Desh., 1824, 2, p. 95, pl. 11, fig. 9, 10. Pierrelaye (non Gmelin, 1789).
  - \***1387. pyramidalis**, Brard, Ann. du Mus., t. 15, pl. 24, fig. 1, 2. Desh., 1824, 2, p. 95, pl. 10, fig. 14, 15. Sow., pl. 528, fig. 3. La Villette, Ermenonville, St-Christophe, Headon-Hill (Ile de Wight).
  - 1388. minima**, Sow., 1817, Min. Conch., t. 2, p. 155, pl. 169, fig. 1. Ile de Wight.
  - 1389. fusiformis**, Sow., 1817, Min. Conch., t. 2, p. 155, pl. 169, fig. 2, 3. Ile de Wight.
  - 1390. maxima**, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 53, pl. 528, fig. 1. Ile de Wight.
  - 1391. columellaris**, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 53, pl. 528, fig. 2. Hordwell.
- PLANORBIS**, Guettard, 1756.
- 1392. cylindricus**, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 89, pl. 140, fig. 2. Ile de Wight.
  - 1393. obtusus**, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 89, pl. 140, fig. 3. Ile de Wight.
  - 1394. hemistoma**, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 89, pl. 140, fig. 6. Londres, Plumsted.
  - \***1395. inflatus**, Desh., 1824, 2, p. 86, pl. 10, fig. 3, 4, 5. Septeuil, la Villette.
  - \***1396. subangulatus**, Desh., 1824, 2, p. 87, pl. 9, fig. 14, 15. Pantin, la Villette.
  - \***1397. lens**, Brong., Ann. du Mus., t. 15, p. 373, pl. 22, fig. 8. Desh., 1824, 2, p. 87, pl. 9, fig. 11, 12, 13. Sowerby, pl. 140, fig. 4. France, Buttes-Saint-Chaumont, Pantin, Ducy (Oise); Angl., Ile de Wight.
  - 1398. planulatus**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 88, pl. 10, fig. 8, 9, 10. Pantin, la Villette.
  - 1399. inversus**, Desh., 1824, 2, p. 89, pl. 9, fig. 16, 17, 18. La Villette.

**ANCYLUS**, Geoffroy, 1766.

**1400.** *elegans*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 63, pl. 533. Hordwell.

**PALUDESTRINA**, d'Orb., 1839, Voy. p. 300.

\***1401.** *varicosa*, d'Orb., 1847. *Paludina varicosa*, Ch. d'Ort Mag. de Zool., pl. 79, fig. 1-3. Paris.

\***1402.** *paludineformis*, d'Orb., 1847. *Paludina paludinis*, Ch. d'Orb., 1836, Mag. de Zool., pl. 79, fig. 4-5. Paris.

\***1403.** *elongata*, d'Orb., 1847. *Paludina elongata*, Ch. d'Ort Mag. de Zool., pl. 79, fig. 6, 7, pl. 33, fig. 15, 16. Barron, nonville, Tancrou, Valmondois, le Tomberay, Monnevil mont.

**1404.** *pyramidalis*, d'Orb., 1847. *Paludina pyramidalis*, 1824, 2, p. 134, pl. 17, fig. 5, 6. La Villette, St-Ouen.

\***1405.** *pusilla*, d'Orb., 1847. *Paludina pusilla*, Deshayes, p. 134, pl. 16, f. 5. Le Mesnil-Aubry, St-Ouen, Betz, Ermen Ducy, Lévignan (Oise).

\***1406.** *conulus*, d'Orb., 1847. *Bulimus conulus*, Lamk., A Mus., t. 4, p. 298, n. 7, et t. 8, pl. 59, fig. 7. Deshayes, 1824, 1 pl. 9, fig. 3, 4. Grignon, Ermenonville, Crépy (Oise).

\***1407.** *conica*, d'Orb., 1847. *Paludina conica*, C. Prévost sur un nouv. exemple, etc., Jour. de phys., juin 1821, p. 1 Deshayes, 1824, 2, p. 129, pl. 16, fig. 6, 7. Vaugirard, Septeuil.

\***1408.** *atomus*, d'Orb., 1847. *Paludina atomus*, Deshayes 2, p. 130, pl. 16, fig. 1, 2. Ménil-Aubry, St-Ouen, Ducy (Ois

**PALUDINA**, Lamarck, 1822.

**1410.** *orbicularis*, Morris, 1843. *Phasianella orbicularis*, 1817, Min. Conch., t. 2, p. 167, pl. 175, fig. 1. Angleterre, Sh dans l'île de Whigt.

**1411.** *angulosa*, Morris, 1843. *Phasianella angulosa*, Sow. Min. Conch., t. 2, p. 167, pl. 175, fig. 2. Angleterre, Shalcom l'île de Whigt.

**1412.** *minuta*, Morris, 1843. *Phasianella minuta*, Sow., Min. Conch., t. 2, p. 167, pl. 175, f. 3. Angleterre, île de Whi

**1413.** *suboperta*, Sowerb., 1813, Min. Conch., 1, p. 77, fig. 6. Angleterre, Holywell.

**MELANIA**, Lamarck, 1801.

**1414.** *costata*, Sow. 1819, Min. Conch., t. 3, p. 71, pl. 241, Angleterre, Hordwell-Cliff.

**1415.** *minima*, Sow., 1819, Min. Conch., t. 3, p. 71, p fig. 3. Angleterre, Brakenhurst.

**1416.** *truncata*, Sow., 1819, Min. Conch., t. 3, p. 71, p fig. 4. Angleterre, Brakenhurst.

**1417.** *fasciata*, Sow., 1819, Min. Conch., t. 3, p. 71, p fig. 1. Angleterre, île de Whigt.

**MELANOPSIS**, Férussac, 1807.

**1418.** *carinata*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 41, pl fig. 1, Angleterre, env. de Newport dans l'île de Whigt.

**1419.** *brevis*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 41, pl. 523, Angleterre, côte du Hampshire.

**1420. subulata**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 35, pl. 332, fig. 8. Angleterre, île de Wight.

**SCALARIA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 2.

**1421. costellata**, Deshayes, 1824, 2, p. 200, pl. 24, fig. 1, 2, 3. La Chapelle, près Senlis.

**TURRITELLA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 67.

**1422. scalarina**, Desh., 1824, 2, p. 281, pl. 40, fig. 33, 34, 35. Parnes, Acy-en-Mulcien.

\***1423. faniculosa**, Desh., Coq. foss., n. 6, p. 276, pl. 37, fig. 5, 6. Chavançon, Montépilloy, Ormoy-Villers (Oise), Grignon.

\***1424. incerta**, Deshayes, 1824, 2, p. 283, pl. 37, fig. 11, 12; Barron, Tancrou, Ermenonville, Valmondois.

\***1425. sulcifera**, Deshayes, 1824, 2, p. 278, pl. 35, fig. 5, 6; pl. 36, fig. 3, 4; pl. 37, fig. 19, 20. Valmondois, la Chapelle, près Senlis, Monneville, Villemétrie (Oise).

\***1426. granulosa**, Desh., 1824, 2, p. 275, pl. 37, fig. 1, 2. France, Monneville, Maule, Assy, Bouconvillers, Villemétrie, Thury-en-Valois.

\***1427. monilifera**, Desh., 1824, 2, p. 275, pl. 37, fig. 7, 8. La Chapelle, près Senlis, Valmondois, Assy, Monneville, Aumont (Oise).

**ORCHMNITZIA**, d'Orb., 1839. Voy. t. 1, p. 172.

\***1428. lactea**, d'Orb., 1847. *Melania lactea*, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 544, n. 2; Ann. du Mus., t. 4, p. 430, n. 2, et t. 8, pl. 60, fig. 5. Deshayes, 1824, 2, p. 106, pl. 13, fig. 1-5. Grignon, Courtaignon, Maule, Plaisir, Parnes, Houdan, Lallainville, Mouchy, Ermenonville, Lisy, la Chapelle, près Senlis, Valmondois.

\***1429. buccinalis**, d'Orb., 1847. *Melania buccinalis*, Deshayes, 1824, 2, p. 116, pl. 14, fig. 11, 12. Grignon, Valmondois, Monneville.

\***1430. tenuiplicata**, d'Orb., 1847. *Melania tenuiplicata*, Desh., 1824, 2, p. 111, pl. 13, fig. 20, 21. Pierrelaye.

\***1431. decussata**, d'Orb., 1847. *Melania decussata*, Deshayes, 1824, 2, p. 112, pl. 14, fig. 9, 10. Louvres, la Chapelle, près Senlis, Valmondois, Hauteville, près Valognes, Lierville.

**VOLVARIA**, Lamarck, 1801.

\***1432. acutiuscula**, Sow., 1825, Min. Conch., 5, pl. 487. Desh., n. 2, pl. 95, fig. 7-9. France, Acy-en-Mulcien, Monneville (Oise); Angleterre, Barton.

**NATICA**, Adanson, 1757.

\***1434. hybrida**, Deshayes, 1824, 2, p. 172, pl. 19, fig. 17, 18. Valmondois, Assy, Betz, Acy.

\***1435. conica**, d'Orb., 1847. *Ampullaria conica*, Lamk., Ann. du Mus., t. 5, p. 30, n. 3; Anim. s. vert., t. 7, p. 548, n. 3. Deshayes, 1824, 2, p. 140, pl. 17, fig. 7, 8. Betz.

\***1436. ponderosa**, d'Orb., 1847. *Ampullaria ponderosa*, Deshayes, 1824, 2, p. 140, pl. 17, fig. 13, 14. Monneville, le Tomberay, Acy (Oise).

\***1437. Noe**, d'Orb., 1847. *N. glaucinoides*, Deshayes, 1824. Env. de Paris, 2, p. 166, pl. 20, fig. 7, 8 (non Sowerby, 1812). La Chapelle, près Senlis, Valmondois, Tancrou, Assy, Ver, St-Sulpice.

- \***1438. lineolata**, Deshayes, 1824, 2, p. 167, pl. 20, fig. Beauchamp, Damerie, Lisy-s.-Ourcq.
- \***1438. athleta**, d'Orb., 1847. Espèce de la taille du *N. scamis*, mais plus courte, et sans canal ni rampe sur la suture.
- NERITA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 214.
- 1439. angistoma**, Deshayes, 1824, 2, p. 159, pl. 19, fig. Valmondois.
- \***1440. granulosa**, Deshayes, 1824, 2, p. 159, pl. 19, fig. Valmondois, Senlis, Faudon, St-Bonnet (Hautes-Alpes).
- PHORUS**, Montfort, 1810.
- \***1441. subconchyliophorus**, d'Orb. *Trochus conchyliis* Desh., 1824, 2, p. 242, pl. 31, fig. 1, 2 (non Born). Monneville Tancrou, Bouconvillers.
- TROCHUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 64.
- 1442. minutus**, Desh., 1824, 2, p. 239, pl. 29, fig. 15-1 mondois.
- \***1443. patellatus**, Desh., 1824, 2, p. 240, pl. 31, fig. 5 mondois, Acy, Mary, Tancrou.
- \***1444. monilifer**, Lamk., Desh. 1824, 2, p. 231, pl. 28, f Senlis, Valmondois, Mary, Tancrou, Ermenonville, Ver, C Faudon (Hautes-Alpes).
- \***1445. margaritaceus**, Desh., 1824, 2, p. 232, pl. 28, La Chapelle près Senlis, Valmondois, Tancrou.
- 1446. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *Monodonta Parisiensis*, 1824, 2, p. 248, pl. 33, fig. 8-9. Valmondois, Mary.
- \***1447. tricostratus**, d'Orb., 1847. *Turbo tricostratus*, Desh., p. 259, pl. 33, fig. 9-12. Monneville, Valmondois, Tancrou.
- SOLARIUM**, Lamarck, 1801. Voy. t. 1, p. 300.
- 1448. trochiforme**, Desh., 1824, 2, p. 217, pl. 26, fig. 8. Nyst., pl. 35, fig. 16. Tancrou, Ver; Belgique, Jette, Laeken Water, près de Louvain.
- \***1449. plicatulum**, Desh., 1824, 2, p. 220, pl. 24, fig. 9-11, Mary, Valmondois, Acy, Tancrou, Acy-en-Mulcien.
- PITONELLUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 64.
- \***1450. calliferus**, d'Orb., 1847. *Delphinula callifera*, Desh. 2, p. 210, pl. 35, fig. 16-18. Betz, Tancrou, Mouchy, Chapellenonville.
- TURBO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 5.
- \***1451. lima**, d'Orb., 1847. *Delphinula lima*, Lamk., Ann. dt t. 4, p. 110, n. 2. Deshayes, 1824, 2, p. 208, pl. 24, fig. 7-8. Valmondois, Tancrou, Mary, Assy, la Chapelle (Oise).
- \***1452. biangulatus**, d'Orb., 1847. *Delphinula biangulata* hayes, 1824, 2, p. 206, pl. 25, fig. 9, 10, 11. Senlis (Oise).
- SILIQUARIA**, Bruguière, 1791.
- \***1453. sulcata**, Defr.-Chenu, Illustr., p. 4, pl. 2, fig. 8. E court-le-Haut-Clocher, Monneville, Lierville (Oise).
- \***1454. dubia**, Defr.-Chenu, Ill., p. 3, pl. 2, fig. 4. Ermeno Ver (Oise).
- CYPRINA**, Linné, 1740.

- 1455. media**, Desh., 1824, 2, p. 723, pl. 95, fig. 37-38. Valmondois, le Tomberay.
- \***1456. Lamarckii**, Desh., 1824, 2, p. 727, pl. 97, fig. 9-10. Grignon, Valmondois, Tancrou.
- MARGINELLA**, Lamarck, 1801.
- \***1457. ampulla**, Desh., 1824, 2, p. 711, pl. 95, fig. 17-19. Valmondois.
- OLIVA**, Lamarck, 1801.
- \***1458. Branderi**, Sow., 1821, Min. Conch., pl. 288, fig. 1. Desh., n. 1, pl. 96, fig. 17-18. Monneville, Acy-en-Multien (Oise), Valmondois; Angleterre, Londres, Hampshire.
- \***1459. Lamontiana**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 23, n. 3; t. 16, p. 328, n. 5. Desh., 1824, 2, p. 742, pl. 96, fig. 12, 13. Beauchamp, Senlis, Valmondois.
- \***1460. Marmini**, Michelin, Représ. de quelq. coq. de sa collect., fig. 6 et 7. Desh., 1824, 2, p. 741, pl. 96, fig. 23, 24. Valmondois, Aumont, Cuvergnon, Acy (Oise).
- ANCYLLARIA**, Lamarck, 1801.
- \***1461. inflata**, Desh., 1824, 2, p. 732, pl. 97, fig. 15, 16. Ermenonville, la Chapelle, près Senlis, Valmondois, Mouchy, Monneville, Ver, Préciamont (Oise).
- VOLUTA**, Linné, 1758. Voy. p. 154.
- \***1462. mutata**, Desh., 1824, 2, p. 682, pl. 92, f. 1, 2. Mary, Tancrou, Betz, Valmondois, Aumont, le Tombray.
- 1463. Branderi**, Defr., Desh., 1824, 2, p. 701, pl. 90, fig. 15, 16. Monneville, Valmondois, les Clergis, Acy.
- \***1464. depauperata**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 4, p. 133, pl. 396, fig. 4. Deshayes, pl. 92, fig. 5, 6. Bouconvillers, Varinfroy, Cuvernon, Valmondois, Tancrou; Angl., Barton.
- \***1465. athleta**, Sow., 1823, t. 4, p. 133, pl. 396, fig. 1-3. Desh., pl. 93, fig. 12, 13. Monneville, Houdan; Angl., Barton.
- 1466. simplex**, Desh., 1824, Env. de Paris, 2, p. 704, pl. 94, fig. 12, 13. France, Betz, le Plessis-Cuvernon (Oise).
- \***1467. strombiformis**, Desh., 2, p. 687, pl. 92, fig. 13, 14. Valmondois, Mary, Bouconvillers, Acy.
- \***1468. scabricula**, d'Orb., 1847. *Buccinum scabriculum*, Brander, 1766, pl. 5, fig. 71. *Voluta digitalina*, Lamk., Ann. du Mus., t. 17, p. 77, n. 10. Deshayes, 1824, 2, p. 693, pl. 93, fig. 1, 2. *Voluta lima*, Valmondois, Betz. Sow., pl. 398, fig. 2. Monneville, Tancrou; Barton en Angleterre.
- \***1469. labrella**, Lamk., Ann. du Mus., t. 1, p. 478, n. 10, et t. 17, p. 78, n. 14. Desh., 1824, 2, p. 694, pl. 91, fig. 1-6. Valmondois, Lissy, Assy, Tancrou, Bouconvillers, le Tomberay, Ver, Aumont.
- \***1469. Auvertiana**, d'Orb., 1847. Espèce voisine du *V. mitrata*, mais bien plus courte et plus large, à 7 grosses côtes par tour, l'intervalle lisse, et pourvue seulement de quatre gros plis sur la columelle. Auvert.
- MITRA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 154.
- \***1470. Lajoyi**, Desh., 1824, 2, p. 678, pl. 89, fig. 5, 6. Valmondois, Acy-en-Multien (Oise).

**CONUS**, Linné, 1758.

\***1471. crenulatus**, Desh., 1824, 2, p. 750, pl. 98, fig. 7, 8. Valmondois, le Tomberay.

\***1472. scabriculus**, Brand., Foss. haut., pl. 1, fig. 21, Desh., 1824, 2, p. 751, pl. 98, fig. 17, 18. Monneville, Chavançon (Oise); Angl., Barton.

\***1473. sulciferus**, Desh., 1824, 2, p. 748, pl. 98, fig. 3, 4. Monneville, Aumont (Oise).

**ROSTELLARIA**, Lamarck, 1801. Voy. p. 71.

\***1474. labrosa**, Sow., *R. crassilabrum*, Desh., 1824, 2, p. 624, pl. 84, fig. 2-4. Betz, Monneville, la Chapelle-en-Serval, Brégy (Oise), Ver; Angleterre.

\***1474'. athleta**, d'Orb., 1848. Espèce longue de 24 centimètres, voisine du *R. macroptera*, mais s'en distinguant par l'aile peu développée, ne passant pas l'avant-dernier tour, et n'enveloppant d'aucune manière le reste de la spire. France, Auvert (Seine-et-Oise).

**PLEUROTOMA**, Lamarck, 1801.

\***1475. prisca**, Sow., Min. Conch., pl. 388, Desh., 1824, 2, p. 436, pl. 69, fig. 1, 2. Valmondois, Tancrou, Acy; Angleterre, Londres, Hordwell.

\***1476. propinqua**, Desh., 1824, 2, p. 465, pl. 63, fig. 14-16. Mary, Tancrou.

\***1477. costaria**, Deshayes, 1824, 2, p. 485, pl. 68, fig. 1-3. Valmondois, Lierville.

\***1478. lyra**, Desh., 1824, 2, p. 468, pl. 64, fig. 1, 2, 6, 14, 15, 16. Senlis, Tancrou, Ermenonville.

\***1479. ventricosa**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 469, pl. 65, fig. 1-7. Grignon, la Chapelle, près Senlis, Lierville.

\***1480. textiliosa**, Desh., 1824, 2, p. 454, pl. 62, fig. 5, 6. Monneville, Aumont, Acy-en-Multien.

**FUSUS**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 303.

\***1481. subcarinatus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 387, n. 24; Lamk., Desh., 1824, Paris, 2, p. 565, pl. 77, fig. 7-14. Valmondois, Senlis, Mortefontaine.

\***1482. plicatulus**, Deshayes, 1824, 2, p. 575, pl. 73, fig. 18-20. Monneville, Villemetrie, Acy-en-Multien (Oise).

\***1483. rarisulcatus**, Deshayes, 1824, 2, p. 556, pl. 76, fig. 32-34. Monneville (Oise).

\***1484. obtusus**, Desh., 1824, 2, p. 567, pl. 77, fig. 5, 6. La Chapelle, près Senlis.

\***1485. minax**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 135, n. 6; Deshayes, 1824, 2, p. 568, pl. 77, fig. 1-4; Sowerby, pl. 229, fig. 2. Valmondois, Senlis, Assy, Tancrou, Betz; Anglet., Barton, Highgate.

\***1486. sublamellosus**, Deshayes, 1824, 2, p. 549, pl. 76, fig. 22, 23, 24, 25, 26, 29. Monneville, le Vouast, Hadancourt, Mortefontaine.

\***1487. scalaris**, Lamk., Anim. s. vert., t. 7, p. 134, n. 5, enc., pl. 424, fig. 7; Nyst., pl. 39, fig. 49; Deshayes, 1824, 2, p. 525, pl. 72, fig. 13, 14. Valmondois, Assy, Mary, Tancrou, Senlis, Lévemont; Belgique, Mont-Panisel, près de Mons; Angl., Barton.

**1488. asperulus**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 319, n. 13; Des-



hayes, 1824, 2, p. 546, pl. 9i bis, fig. 15-17. Grignon, Assy-en-Multien.

**1489. sexdentatus**, Sow., 1823, Min. Conch., t. 5, p. 9, pl. 411, fig. 3. Angl., île de Wight.

**1490. labiatus**, d'Orb., 1847. *Buccinum labiatum*, Sow., 1823, Conch., t. 5, p. 10, pl. 412, fig. 1, 2. Angl., Hampshire, île de Wight.

**FASCIOLARIA**, Lamarck, 1801.

\***1491. Parisiensis**, d'Orb., 1847. *Turbinella Parisiensis*, Desh., 1824, 2, p. 496, pl. 79, fig. 13, 14. Valmondois, Mary, Tancrou, Assy-en-Multien, le Tomberay, Bouconvillers (Oise).

**MUREX**, Linné, 1758.

\***1492. tricuspidatus**, Desh., 1824, 2, p. 600, pl. 81, fig. 22, 23. Valmondois.

\***1493. denudatus**, Desh., 1824, 2, p. 601, pl. 81, fig. 4, 5, 6. Valmondois, Bouconvillers.

\***1494. crassicosatus**, Desh., 1824, 2, p. 601, pl. 82, fig. 13, 14. Valmondois.

\***1495. bicostatus**, Desh., 1824, 2, p. 602, pl. 81, fig. 28-30. Valmondois.

\***1496. distans**, Desh., 1824, 2, p. 592, pl. 81, fig. 24, 25. Valmondois.

**1497. subrudis**, d'Orb., 1847. *M. rudis*, Desh., 1824, 2, p. 593, pl. 81, fig. 1-3 (non Borson). Valmondois; Angl., Barton.

\***1498. spinulosus**, Desh., 1824, env. de Paris, 2, p. 590, pl. 81, fig. 13-15. France, Monneville, Senlis.

**1499. micropterus**, Desh., 1824, 2, p. 596, pl. 82, fig. 3, 4. Valmondois.

**CERITHIUM**, Adanson, 1757. Voy. t. 1, p. 196.

\***1500. microstoma**, Desh., 1824, 2, p. 412, pl. 59, fig. 32-34. Lévémont.

\***1501. moniliferum**, DeFr., Desh., 1824, 2, p. 413, pl. 60, fig. 6-8. France, Monneville, Chavançon, le Vouast (Oise).

\***1502. collaterale**, Desh., 1824, 2, p. 413, pl. 48, fig. 9, 10, 11. Tancrou, Bouconvillers, Levignen (Oise).

\***1503. turritellatum**, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 415, pl. 49, fig. 10, 11. Valmondois, Tancrou, Betz, Assy, Bouconvillers.

**1504. obscurum**, Desh., 1824, 2, p. 408, pl. 59, fig. 29-31. France, Lévémont, le Tomberay (Oise).

\***1505. scalaroides**, Desh., 1824, 2, p. 411, pl. 59, fig. 24-26. Monneville, Valmondois, Assy, Tancrou, le Vouast.

**1506. submarginatum**, d'Orb., 1847. *C. marginatum*, Desh., 1824, 2, p. 336, pl. 51, fig. 15, 16 (non Brug., 1794). France, Tancrou.

\***1507. multigranum**, Desh., 1824, 2, p. 393, pl. 60, fig. 4, 5. France, Blaincourt, Bouconvillers (Oise).

\***1508. Bonardi**, Desh., 1824, 2, p. 416, pl. 49, fig. 1-4. Valmondois, Tancrou, Betz, Assy, Préciamont (Oise).

\***1509. coronatum**, Desh., 1824, 2, p. 350, pl. 52, fig. 12, 13. Valmondois, Bouconvillers, Ermenonville.

- \*1510. *trechiforme*, Desh., 1824, 2, p. 336, pl. 52, fig. 1-  
mondois, Tancrou, Mary, Assy, Bouconvillers.
- \*1511. *seruposum*, Desh., 1824, 2, p. 374, pl. 57, fig.  
Bayues, Acy, Bouconvillers (Oise).
- \*1512. *Sowerbyi*, Desh., 1824, 2, p. 352, pl. 53, fig. 8, 9. Va  
dois, Bouconvillers, Ermenonville, Ver (Oise).
- \*1513. *subcanaliculatum*, Desh., 1824, 2, p. 253, pl. 53,  
10, 11, 12, 13. Senlis, Ermenonville, Hadancourt.
- \*1514. *subscabrum*, d'Orb., 1847, *C. scabrum*, Lamk., *At*  
Mus., t. 3, p. 346, n. 23; Desh., 1824, 2, p. 421, pl. 60, fig. 14-1  
Oliv). Grignon, Tancrou, Valmondois, Assy.
- \*1515. *constrictum*, Desh., 1824, 2, p. 373, pl. 57, fig.  
France, Damery, près Epernay.
- \*1516. *bicarinatum*, Lamk., Desh., 1824, 2, p. 356, pl. 53, 1  
15. Mortefontaine, Assy, Mareuil, près Betz, Blaincourt, Erm  
ville.
- \*1517. *globulosum*, Desh., 1824, 2, p. 379, pl. 57, fig.  
Mary, Tancrou, Hauteville, près Valognes.
- 1518. *propinquum*, Desh., 1824, 2, p. 321, pl. 51, fig. 1  
Assy, Betz, Ermenonville, Curvignon (Oise).
- \*1519. *pleurotomoides*, Lamk., *Ann. du Mus.*, t. 3, p. 342,  
Desh., 1824, 2, p. 345, pl. 46, fig. 11-15. La Chapelle, près  
Ermenonville.
- \*1520. *Cordieri*, Desh., 1824, 2, p. 338, pl. 52, fig. 8, 14,  
Chapelle, près Senlis, Crépy (Oise), Faudon (H.-Alpes).
- \*1521. *Brocchii*, Desh., 1824, 2, p. 310, pl. 47, fig. 13, 14;  
fig. 12, 13. Senlis, Valmondois, Tancrou, Assy, Monneville.
- \*1522. *tiarella*, Desh., 1824, Paris, 2, p. 314, pl. 44, fig. 1  
Senlis, Mareuil, Crépy, Auvergnon, Versigny (Oise).
- 1523. *nodiferum*, Desh., 1824, 2, p. 318, pl. 51, fig. 1  
Monneville, le Tomberay, Villemetrie, Assy (Oise).
- \*1524. *tenue*, Desh., 1824, 2, p. 402, pl. 59, fig. 9, 10, 1  
Grignon, Monneville, la Chapelle (Oise).
- \*1525. *subula*, Desh., 1824, 2, p. 339, pl. 52, fig. 16, 17. S  
Ermenonville, Crépy, Mortefontaine.
- 1526. *angustum*, Desh., 1824, 2, p. 340, pl. 59, fig. 1-3.  
mondois, Grignon.
- \*1527. *alligatum*, Desh., 1824, 2, p. 341, pl. 59, fig. 4, 5, 6. S  
Baron, Rosières.
- \*1528. *concavum*, Desh., 1824, 2, p. 341, pl. 46, fig. 1, 2. 1  
*mides concavus*, Sow., 1822, *Min. Conch.*, 4, pl. 339, fig. 1, 2. 1  
neville, Ermenonville, Charançon; Angl., île de Wight.
- \*1529. *rusticum*, Desh., 1824, 2, p. 342, pl. 46, fig. 3, 4. I  
mont, Monneville, Chavançon, Montagny.
- 1530. *lineolatum*, Desh., 1824, 2, p. 342, pl. 52, fig. 4, 5. 1  
Tancrou, Assy.
- \*1531. *Roissyi*, Desh., 1824, 2, p. 322, pl. 50, fig. 13-20. S  
Valmondois, Assy, Crépy, Ermenonville, Mortefontaine (Oise).
- \*1532. *mixtum*, Defr., Desh., 1824, 2, p. 324, pl. 45, fig. 6

Valmondois, Mary, Betz, Baron, Assy, la Chapelle, Ermenonville (Oise).

- \***1533. tricarinatum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 272, n. 4; Anim. s. v., t. 7, p. 77, n. 4; Desh., 1824, 2, p. 325, pl. 51, fig. 1-9. Senlis, Ermenonville, Beynes, Monneville.
- \***1534. tuberculosum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 348, n. 29; Desh., 1824, 2, p. 307, pl. 48, fig. 1-5. Valmondois, Lisv, Assy, Tancrou, Bouconvillers, Ermenonville, Ver.
- \***1535. Hericarti**, Desh., 1824, 2, p. 308, pl. 47, fig. 7-9. Valmondois, Assy, Betz, Tancrou, Villemetrie, Ermenonville, Baron.
- \***1536. Bouei**, Desh., 1824, 2, p. 349, pl. 52, fig. 9-11. Senlis, Ermenonville, Valmondois, Ver, la Chapelle.
- \***1537. triforis**, d'Orb., 1847. *Triforis plicatus*, Desh., 1824, 2, p. 431, pl. 71, fig. 13-17 (non *plicatus*, Sow., 1822). Valmondois.
- \***1538. mutabile**, Lamk., Ann. du Mus., p. 344, n. 15; Deshayes, 1824, 2, p. 305, pl. 47, fig. 16-23. Beauchamp, Valmondois, Assy, Tancrou, Betz, Assy, Ermenonville, Ver.
- 1539. striatum**, Desh., 1824, 2, p. 312, pl. 41, fig. 8, 9. Valmondois.
- \***1540. crenatulum**, Desh., 1824, 2, p. 317, pl. 51, fig. 5, 6. La Chapelle, près Senlis, Beauchamp, Pierrelaye.
- \***1541. clavosum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 3, p. 436, n. 45; Deshayes, 1824, 2, p. 385, pl. 41, fig. 1, 2; pl. 54, fig. 29. Valmondois, Betz, Mary, Tancrou, Bouconvillers, Assy.
- 1542. creniferum**, Desh., n. 55, pl. 53, fig. 3-5. Aumont, Villemetrie, le Tomberay, Ermenonville (Oise).
- \***1543. submargaritaceum**, d'Orb., 1847. *Potamides margaritaceus*, Sow., 1822. Min. Conch., t. 4, p. 50, pl. 339, fig. 4 (non Brocchi, 1814). Angl., Ile de Wight.
- 1544. pseudo-cinctum**, d'Orb., 1847. *Potamides cinctus*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 51, pl. 340, fig. 1. Angl., Headon-Hill (Ile de Wight).
- 1545. pseudo-plicatum**, d'Orb., 1847. *Potamides plicatum*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 51, pl. 340, fig. 2 (non Brug., 1791). Ile de Wight.
- 1546. duplex**, d'Orb., 1847. *Potamides duplex*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 51, pl. 340, fig. 3. Headon-Hill dans l'Ile de Wight.
- 1547. ventricosum**, d'Orb., 1847. *Potamides ventricosus*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 53, pl. 341, fig. 1. Ile de Wight.
- 1548. rigidum**, d'Orb., 1847. *Potamides rigidus*, Sow., 1817, Min. Conch., t. 4, p. 47, pl. 338. *Buccinum rigidum*, Brander, 1766, fig. 1-3. Londres, Barton.
- 1549. acutum**, Morris, 1843. *Potamides acutus*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 53, pl. 341, fig. 2. Ile de Wight.
- \***1550. Auvertianum**, d'Orb., 1847. Espèce presque aussi grande que le *C. giganteum*, mais à deux plis sur la columelle, et un troisième sur le retour de la spire; plus courte, son angle spiral étant de 35°. Chaque tour est orné de trois sillons longitudinaux et de quelques nodosités peu prononcées à la partie inférieure. Auvert. . .

- \***1551. conoideum**, Lamk., Desh., n. 32, pl. 45, fig. 14, 15. en-Multien, Mortefontaine, Rosières, Boullarre (Oise).
- \***1552. cornu-copie**, Sow., 1818, Min. Conch., t. 2, p. pl. 188, fig. 1. Londres, Stubbington; France, Cottentin.
- BUCCINUM**, Linné, 1758. Voy. p. 134.
- \***1553. fusiforme**, Desh., 1824, 2, p. 653, pl. 87, fig. 15-17. gnon, Senlis, Valmondois, Assy-en-Multien.
- \***1554. truncatum**, Desh., 1824, 2, p. 654, pl. 87, fig. 1. Valmondois, Aumont (Oise).
- \***1555. sub Andrei**, d'Orb., 1847. *Buccinum Andrei*, Desh., 2, p. 651, pl. 87, fig. 7-10 (non *Nassa Andrei*, Bast., Bass. et S. O. de la France, p. 50, n. 7, pl. 4, fig. 7). Senlis, Levemont, Assy, Valmondois.
- BUCCINIFORME**, d'Orb., 1839. Voy. p. 303.
- 1556. patulum**, d'Orb., 1847. *Buccinum patulum*, Desh., 1824, de Paris, 2, p. 646, pl. 88, fig. 5, 6. France, Valmondois.
- HARPA**, Lamarck, 1801.
- \***1557. elegans**, Desh., 1824, 2, p. 643, pl. 86, fig. 16-18. mondois.
- MORIO**, Montfort, 1810. *Cassidaria*, Lamarck, 1811.
- 1558. coronatus**, d'Orb., 1847. *Cassidaria coronata*, Desh., 2, p. 635, pl. 85, fig. 1, 2. Tancrou.
- CASSIS**, Bruguière, 1791.
- \***1559. calantica**, Desh., 1824, 2, p. 640, pl. 85, fig. 17-19. mondois.
- CAPULUS**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 31.
- \***1560. patelloides**, d'Orb., 1847. *Pileopsis patelloides*, Desh., pl. 3, fig. 23-25. Assy-en-Multien, Bouconvillers, Puits de Gignon (Oise).
- INFUNDIBULUM**, Montfort, 1810. Voy. p. 232.
- \***1561. levigatum**, d'Orb., 1847. *Calyptraea levigata*, Desh., 1, 2, p. 31, pl. 4, fig. 8, 9, 10. Valmondois, Betz, Villemetrie.
- HELICION**, Montfort, 1810. Voy. t. 1, p. 9.
- 1562. costaria**, d'Orb., 1847. *Patella costaria*, Desh., 1824, p. 9, pl. 1, fig. 10, 11. Valmondois, Bouconvillers, le Tomberay.
- 1563. striatula**, d'Orb., 1847. *Patella striatula*, Desh., 1824, p. 10, pl. 1, fig. 14-19. Valmondois.
- 1564. glabra**, d'Orb., 1847. *Patella glabra*, Desh., 1824, 2, p. pl. 1, fig. 9-11. Valmondois.
- \***1565. laevis**, d'Orb., 1847. *Parmaphorus laevis*, Blainv., Bull. 1817, p. 28; Desh., pl. 1, fig. 15-18. Monneville, Ver, la Chapelle-Serval (Oise).
- DENTALIUM**, Linné, 1757. Voy. t. 1, p. 73.
- \***1566. grande**, Desh., Monogr., n. 28, pl. 3, fig. 1-3. Assy-Multien, Le Tomberay, la Chapelle-en-Serval (Oise).

## MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

**CLAVAGELLA**, Lamarck, 1807.

\***1567. Brongniartii**, Desh., 1822, Mém. géolog. sur les foss.

Valm., p. 250, pl. 15, fig. 1; Paris, pl. 1, fig. 1-5. Valmondois.

- \***1568. coronata**, Desh., 1824, 1, p. 8, pl. 8, fig. 15, 16; Sow., Min. Conch., 5, p. 128, pl. 480. Lisy, près Meaux, Pauliac, près de Bordeaux, Ver; Angleterre, Londres.

**PHOLAS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.

- 1569. aperta**, Desh., 1822, 1824, 1, p. 21, pl. 2, fig. 10, 11, 12, 13. France, Valmondois, Assy-en-Multien.

- 1570. conoidea**, Desh., 1822, 1824, 1, p. 22, pl. 2, fig. 1-5 et 14-17. Valmondois, Assy.

- \***1571. scutata**, Desh., 1822, 1824, 1, p. 22, pl. 2, fig. 6, 7, 8, 9. Valmondois.

**TEREDO**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 251.

- \***1572. Causoniana**, d'Orb., 1847. Belle espèce dont les valves sont très-étroites et pourvues d'un sillon. Argenteuil, au-dessous du gypse.

**GASTROCHENA**, Spengler, 1783. Voy. t. 1, p. 275.

- \***1573. angusta**, d'Orb., 1847. *Fistulana angusta*, Desh., 1824, 1, p. 16, pl. 1, fig. 11-15. Valmondois, Monneville.

- \***1574. contorta**, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 49, pl. 526, fig. 2. *Fistulana contorta*, Desh., 1824, 1, p. 16, pl. 1, fig. 24, 25-27. Valmondois; Anglet., Londres, Barton.

- 1575. Provignyi**, d'Orb., 1847. *Fistulana Provigny*, Desh., 1824, t. 1, p. 17, pl. 1, fig. 16-19-22. Valmondois.

**SAXICAVA**, Fleuriau, 1802.

- 1576. modiolina**, Desh., 1824, 1, p. 65, pl. 9, fig. 27, 28, 29. Valmondois.

- \***1577. margaritacea**, Desh., 1824, 1, p. 65, pl. 9, fig. 22, 23, 24. Valmondois.

- 1578. vaginoides**, Desh., 1824, 1, p. 66, pl. 7, fig. 25, 26. Assy-en-Multien.

**SOLEOURTUS**, Blainville, 1824. Voy. p. 75.

- \***1579. tellinella**, d'Orb., 1847. *Solen tellinella*, Desh., 1824, 1, p. 28, pl. 4, fig. 1, 2. Tancrou, près Meaux, Assy, la Chapelle.

**MACTRA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 216.

- \***1580. subdepressa**, d'Orb., 1847. *M. depressa*, Desh., 1824, 1, p. 32, pl. 4, fig. 11, 12, 13, 14 (non Lam., 1818). La Chapelle, près Luzarches, Mortefontaine.

**ARCOFAGIA**, Brown, 1827. Voy. p. 75.

- \***1581. subrotunda**, d'Orb., 1847. *Tellina subrotunda*, Deshayes, 1824, 1, p. 81, pl. 12, fig. 16, 17. Assy-en-Multien, Houdan, Valmondois, la Chapelle.

- 1582. lucinalis**, d'Orb., 1847. *Tellina lucinalis*, Desh., 1824, 1, p. 85, pl. 13, fig. 7, 8. Valmondois, la Chapelle.

- \***1583. lunulata**, d'Orb., 1847. *Tellina lunulata*, Desh., 1824, 1, p. 79, pl. 11, fig. 3, 4. Houdan, Valmondois, Assy, Varinfroy (Oise).

**TELLINA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 275.

- \***1584. Lamarckii**, d'Orb., 1847. *Sanguinolaria Lamarckii*, Desh., 1824, 1, p. 73, pl. 10, fig. 15-19. Assy-en-Multien (Oise).

- \***1585. rudis**, d'Orb., 1847. *Psammolia rudis*, Desh., 1824, 1, p. 74, pl. 10, fig. 11, 12. Grignon, Valmondois. Assy, Varinfroy.

\*1586. *solida*, d'Orb., 1847. *Psammobia solida*, Sow., 1822 Conch., t. 4, p. 55, pl. 342. Angl. Headdon-Hill, Ile de Wight.

**DONAX**, Lamarck.

\*1587. *Masterotina*, Desh., 1824, 1, p. 110, pl. 17, fig. 21 Maulette, près Houdan, Damery, Ormoy-Villers, Ducy, Senlis.

\*1588. *incompleta*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 230, n. t. 12, pl. 41, fig. 3; Desh., 1824, 1, p. 111, pl. 18, fig. 1, 2. B Valmondois, Pierrelaye, Beauchamp, Bouconwillers.

\*1589. *retusa*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 230, n. 1, et pl. 41, fig. 1; Desh., 1824, 1, p. 109, pl. 17, fig. 19, 20. Valmoi

\*1590. *obtusalis*, Desh., 1824, 1, p. 109, pl. 18, fig. 7, 8. F laye, Beauchamp, Chaumont.

**PETRICOLA**, Lamarck, 1801.

\*1591. *depressa*, d'Orb., 1847. *Saxicava depressa*, Desh., 18 p. 66, pl. 9, fig. 20, 21. Valmondois.

**VENUS**, Linné, 1758. Voy. p. 15.

1592. *subglobosea*, d'Orb., 1847. *Venerupis globosa*, Desh., 1, p. 69, pl. 10, fig. 3, 4, 5 (non Gmelin, 1789). Valmondois, Ha court, Ver.

\*1593. *striatula*, d'Orb., 1847. *Venerupis striatula*, Desh., 1, p. 70, pl. 10, fig. 6, 7. Assy-en-Multien, la Chapelle, près Ser

\*1594. *rustica*, d'Orb., 1847. *Cytherea rustica*, Desh., 182 p. 130, pl. 33, fig. 10, 11. Pierrelaye, Marines, Lévemont, Mar mont, Assy, Ermenonville.

\*1595. *tenuis*, Desh., 1824, 1, p. 143, pl. 23, fig. 8, 9. Fra Vaugirard, près Paris.

\*1596. *trigonula*, d'Orb., 1847. *Cytherea trigonula*, Desh., 1 1, p. 139, pl. 21, fig. 12, 13. Assy-en-Multien, Valmondois, Er nonville.

\*1597. *cuneata*, d'Orb., 1847. *Cytherea cuneata*, Desh., 182 p. 131, pl. 22, fig. 6, 7. La Chapelle, près Senlis, Villemetrie, Tomberay.

\*1598. *lucinoides*, Desh., 1824, envir. de Paris, 1, p. 146, pl. fig. 12, 13. France, la Chapelle, près Senlis.

\*1599. *distans*, d'Orb., 1847. *Cytherea distans*, Deshayes, 1824 p. 138, pl. 22, fig. 10, 11. France, la Chapelle, près Senlis, Er nonville.

**CYCLAS**, Bruguière, 1791. Voy. p. 60.

1600. *pulcher*, Sow., 1826, Min. Conch., 6, p. 51, pl. 527, fig Anglet., Ile de Wight.

\*1601. *deperdita*, d'Orb., 1847. *Cyrena deperdita*, Desh., 1824, p. 118, pl. 19, fig. 14, 15. Pontoise, Pierrelaye, Beauchamp, Tancre Valmondois, Nanteuil, Villemetrie, le Tomberay.

\*1602. *crassa*, d'Orb., 1847. *Cyrena crassa*, Desh., 1824, 1, p. 1 pl. 18, fig. 14, 15. Valmondois, Crepy, Ognés, Assy.

1603. *obovata*, Sow., 1817, Min. Conch., t. 2, p. 189, pl. 11 fig. 4, 5, 6. Angl., Londres et Barton.

**COEBULA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 275.

\*1604. *striarella*, Deshayes, 1824, 1, p. 54, pl. 8, fig. 12-1 Houdan.

- 1605. ampullacea**, Deshayes, 1824, 1, p. 54, pl. 8, fig. 8-11. Houdan.
- \***1606. angulata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 8, p. 467, n. 4; Desh., 1824, 1, p. 54, pl. 8, fig. 16-20. Crépy, Senlis, Louvres, Assy, Ermenonville.
- 1607. nitida**, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 85, pl. 362, fig. 1-3. Ile de Wight.
- 1608. cuspidata**, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 85, pl. 362, fig. 4-6. Ile de Wight.
- 1609. gregaria**, d'Orb., 1847. *Mya gregaria*, Sow., 1822, Min. Conch., t. 4, p. 87, pl. 363. *Potamomya gregaria*, Sow. Ile de Wight.
- 1610. angustata?**, d'Orb., 1847. *Mya angustata*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 57, pl. 531, fig. 1. Ile de Wight.
- CARDITA**, Bruguière, 1791. Voy. p. 77.
- \***1611. aspera**, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 340, n. 1, et t. 9, pl. 19, fig. 5; Desh., 1824, 1, p. 182, pl. 30, fig. 15, 16. Grignon, Valmondois, Bouconvillers, Assy, Senlis, Varinfroy.
- \***1612. complanata**, d'Orb., 1847. *Venericardia complanata*, Deshayes, 1824, 1, p. 154, pl. 26, fig. 5, 6. France, Assy, Vary.
- \***1613. cor-avium**, d'Orb., 1847. *Venericardia cor-avium*, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 58, n. 7. *Venericardia oblonga*, Sow., Min. Conch., pl. 489, Desh., 1824, 1, p. 156, pl. 24, fig. 6, 7, 8. Essainville, Marquemont, Levemont; Barton, en Angleterre; Bouconvillers, Hadancourt, Chavançon.
- 1614. sulcata**, d'Orb., 1847. *Venericardia globosa*, Sow., 1821, Min. Conch., t. 3, p. 161, pl. 289, fig. 1. *Chama sulcata*, Brander, 1766, fig. 100. Londres, Barton, Hordwell.
- \***1615. spissa**, d'Orb., 1847. *Venericardia spissa*, Desf., Dictionn., t. 57, p. 234. France, Jaulzy, Ermenonville, Neumoulin (Oise).
- CRASSATELLA**, Lamarck.
- \***1615'. Parisiensis**, d'Orb., 1847. Espèce voisine de forme du *C. gibbosa*, mais plus grande, moins bombée, sans côtes concentriques régulières, celles-ci étant remplacées, sur la région palléale, par des côtes ondulées non parallèles aux lignes d'accroissement. Auvert.
- ERYCINA**, Lamarck, 1805.
- \***1616. elliptica**, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 414, n. 6, et t. 9, pl. 31, fig. 6; Desh., 1824, 1, p. 41, pl. 6, fig. 16, 17, 18. Essainville, près Ecoen, Pierrelaye, Valmondois, la Chapelle, près Senlis, Ver.
- LUCINA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 76.
- \***1617. sulcata**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, p. 240, n. 9, et t. 12, pl. 42, fig. 9; Desh., 1824, 1, p. 97, pl. 14, fig. 12, 13. Bouconvillers, Villemetrie.
- \***1618. Saxorum**, Lamk., Ann. du Mus., t. 7, n. 4 et t. 12, pl. 42, fig. 5; Desh., 1824, 1, p. 100, pl. 15, fig. 5, 6. Courtagnon, Damery, près Épernay, Grignon, Parnes, Maule, Vaugirard, Plaisir, Mouchy, St-Sulpice, Mortefontaine.
- \***1620. Ermenonvillensis**, d'Orb., 1847. *Lucina divaricata*, (pars). L. testâ orbiculari compressâ, concentricè subplicatâ, bifariant obli-

quæ striata, striis interruptis, latere anali brevi subangulato; buccali rotundato absque sulcato; intus labro longitudinaliter cato, externè lævigato, internè denticulato. Ermenonville.

**CARDIUM**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 33.

\*1621. *rachitis*, Desh., 1824, 1, p. 175, pl. 29, fig. 1, 2. Valdois, Bouconvillers, St-Félix.

\*1622. *emarginatum*, Desh., 1824, 1, p. 178, pl. 29, fig. 3, 4. mondois.

\*1623. *granulosum*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 341, n. t. 9, pl. 19, fig. 8; Desh., 1824, 1, p. 171, pl. 30, fig. 5, 6, 9, 10. gnon, Courtagnon, Senlis, Ermenonville, Valmondois, le Ver, la Chapelle.

\*1624. *semi-granulatum*, Sow., 1816, Min. Conch., 2, p. 144; Nyat., 1843. Coq. tert. de Belg., p. 189, pl. 14, fig. 5. 1 que, Lacken, Jette; Anglet.. Barton; France, Valmondois.

**CARDILIA**, Deshayes, 1835.

1625. *Michelini*, Desh., Anim. s. vert., 6, p. 450. France, la pelle-en-Serval (Oise).

**UNIO**, Retzius, Voy. p. 79.

1626. *solanderi*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 29, pl. Anglet., Hordwell.

**PECTUNCULUS**, Lamarck, 1801. Voy. p. 80.

\*1627. *depressus*, Desh., 1824, 1, p. 222, pl. 35, fig. 12, 11 Assy-en-Multien, Valmondois, Ermenonville, Cuvergnon.

**ARCA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 13.

\*1628. *hyantula*, Desh., 1824, 1, p. 199, pl. 34, fig. 7, 8. Valdois, Assy-en-Multien, Ermenonville.

\*1629. *Magellanoides*, Desh., 1824, 1, p. 213, pl. 32, fig. Valmondois, Bouconvillers, Aumont.

\*1630. *subrudis*, d'Orb., 1847. *A. rudis*, Desh., 1824, 1, p. pl. 33, fig. 7, 8 (non Sow., 1823). Valmondois, Valognes, la relle, Assy.

**PINNA**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 135.

\*1631. *margaritacea*, Lamk., Ann. du Mus., t. 6, p. 218, et t. 9, pl. 17, fig. 8; Desh., 1824, 1, p. 280, pl. 41, fig. 15; 1 pl. 20, fig. 9 (figure copiée de Deshayes et non originale). Grig Courtagnon, Parnes, Mouchy, Sèvres, Chaillot, Paris. P. S. St Valmondois, Valognes; Belgique, env. de Mons, Renaix, Oudenberg, Gand, Rouge-Clotire, St-Gilles de Deersel, Louvain, Jette.

**MYTILUS**, Linné, 1758. Voy. t. 1, p. 82.

\*1632. *acutangulus*, Desh., 1824, 1, p. 274, pl. 40, fig. 1, 2. mondois, Senlis.

1633. *affinis*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 59, pl. 532, file de Wight.

\*1634. *semi-nudus*, d'Orb., 1847. *Modiola semi-nuda*, Desh., 1824, p. 264, pl. 39, fig. 20, 21, 22. La Chapelle, près Senlis, Ver.

**LITHODOMUS**, Cuvier, 1817.

\*1635. *argenteus*, d'Orb., 1847. *Modiola argentea*, Desh., 1824, p. 269, pl. 42, fig. 1, 2, 3. Valmondois.



- \***1636. papyraceus**, d'Orb., 1847. *Modiola papyracea*, Desh., 1824, 1, p. 270, pl. 41, fig. 9, 10, 11. Valmondois.
- DREISSENA**, Van-Beneden, 1835.
- 1637. Sowerbyi**, d'Orb., 1847. *Mytilus Brardii*, Sow., 1826, Min. Conch., t. 6, p. 59, pl. 532, fig. 2. *Drissena Brardii*, Morris (non Faujas). Anglet., Hordwell.
- LIMA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 175.
- \***1638. flabelloides**, Desh., 1824, 1, p. 296, pl. 43, fig. 6, 7, 8. Valmondois.
- \***1639. subplicata**, d'Orb., 1847. *L. plicata*, Desh., 1824, 1, p. 297, pl. 43, fig. 4, 5 (non Lam.). Valmondois.
- AVICULA**, Klein, 1753. Voy. t. 1, p. 13.
- \***1640. fragilis**, Defr., Desh., 1824, 1, p. 289, pl. 42, fig. 10, 11 et pl. 45, fig. 14, 15; Defr., Dict. des Sc. nat., t. 3, suppl., p. 141; Nyst., pl. 25, fig. 5. Grignon, Senlis, Mortefontaine, Neuville (Oise); Belgique, Lacken.
- PERNA**, Bruguière, 1791. Voy. t. 1, p. 176.
- 1641. Lamarekii**, Desh., 1824, 1, p. 284, pl. 40, fig. 7, 8. Senlis, Valmondois, La Chapelle.
- SPONDYLUS**, Linné, 1758. Voy. p. 83.
- \***1642. multistriatus**, Deshayes, 1824, 1, p. 322, pl. 45, fig. 19, 20, 21. Chaumont. P. S. Mary, Assy-en-Multien, Tancrou.
- CHAMA**, Linné, 1758. Voy. p. 170.
- \***1643. substriata**, Desh., 1824, 1, p. 250, pl. 38, fig. 1, 2, 3. Senlis, le Tomberay, Villemétrie, Ver.
- 1644. papyracea**, Desh., 1824, 1, p. 251, pl. 37, fig. 3, 4. Valmondois, la Chapelle.
- \***1645. ponderosa**, Desh., 1824, 1, p. 248, pl. 37, fig. 9, 10. Auvvers, Valmondois, Bouconvillers, Assy, la Chapelle.
- \***1646. rusticula**, Desh., 1824, 1, p. 249, pl. 37, fig. 7, 8 et pl. 38, fig. 4. Monneville, Chavançon, Bouconvillers.
- OSTREA**, Linné, 1752. Voy. t. 1, p. 166.
- \***1647. arenaria**, Desh., 1824, 1, p. 354, pl. 64, fig. 9, 10, 11. Beauchamp, Pierrelaye, Pontoise, Creil, Bouconvillers.
- 1648. subplana**, d'Orb., 1847. *O. plana*, Desh., 1824, 1, p. 338, pl. 56, fig. 5, 6 (non Gmel., 1789). Valmondois, le Tomberay.
- \***1649. ambigua**, Desh., 1824, 1, p. 343, pl. 51, fig. 3, 4. Beauchamp, Valmondois, G. M. S. Fosse-Martin.
- 1650. radiosa**, Desh., 1824, 1, p. 359, pl. 60, fig. 6, 7. Poissy.
- 1651. Defranci**, d'Orb., 1847. *Gryphæa Defranci*, Desh., 1824, 1, p. 328, pl. 47, fig. 1-3. Boury, Hénonville (Oise).
- 1652. cymbiola**, d'Orb., 1847. *Gryphæa cymbiola*, Desh., 1824, 1, p. 329, pl. 47, fig. 4, 5, 6. Valmondois, Assy, Tancrou, Bouconvillers.
- \***1653. multistriata**, Desh., 1824, 1, p. 356, pl. 59, fig. 5, 6, 7, 8. *O. dorsata*, Desh., 1824, 1, p. 355, pl. 55, fig. 9-11; pl. 64, fig. 1-4; pl. 54, fig. 9, 10. France, Monneville, Valmondois, Senlis, la Chapelle, Bouconvillers.
- \***1654. gryphina**, Desh., 1824, 1, p. 360, pl. 62, fig. 1, 2. *O. inflata*, Desh., 1824, 1, p. 359, pl. 58, fig. 4, 5; pl. 59, fig. 1, 2 (non Gmelin, 1789). Valmondois, le Tomberay, Bregny, la Chapelle, Cuviergnon.

- \***1655. cubitus**, Desh., 1824, 1, p. 365, pl. 47, fig. 12, 13, 14, 15. Sentis, Valmondois, Varinfroy.
- \***1656. cucullaris**, Lamk., Anim. s. vert., t. 6, p. 219, n. 27; Desh., 1824, 1, p. 34, pl. 56, fig. 3, 4. *O. lingulata*, Desh., 1824, 1, p. 347, pl. 19, fig. 13, 14. *O. hybrida*, Desh., 1824, 1, p. 347, pl. 59, fig. 3, 4. *O. crepidula*, DeFr., Desh., 1824, 1, p. 339, pl. 57, fig. 1, 2; pl. 58, fig. 6, 7. *O. elongata*, Desh., 1824, 1, p. 348, pl. 49, fig. 3, 4. *O. simplex*, Desh., 1824, 1, p. 340, pl. 57, fig. 7; pl. 59, fig. 11, 12; pl. 60, fig. 3, 4. Valmondois, Assy, Tancrou, Betz, Ponchy, Bregny, Mary.

## ÉCHINODERMES.

**OIDARIS**, Lamarck.

- \***1657. Belone**, Agass., 1847, Cat. syst., p. 31. Valmondois, le Tomberay, Assy.

## ZOOPHYTES.

**TROCHOSERIS**, Edwards et Haime, 1849.

- \***1658. distorta**, d'Orb., 1847. *Antophyllum distortum*, Michelin, 1845, Icon. zooph., p. 149, pl. 43, fig. 8. Auvert, Valmondois, Assy.
- DENDROSMILIA**, Edwards et Haime, 1848.

- \***1659. Duvaliana**, Edwards et Haime, 1848, Ann. des Sc. nat., x, p. 274, pl. 5, fig. 7. Auvert (Seine-et-Oise).

**ASTREOPORA**, Blainville, 1830.

- \***1661. Auvertiana**, d'Orb., 1847. *Astræa Auvertiana*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 159, pl. 44, fig. 10. Auvert, Valmondois, le Tomberay, Assy.

- \***1662. panicea**, d'Orb., 1847. *Astræa panicea*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 160, pl. 44, fig. 11. Auvert, Valmondois, Monneville, le Tomberay.

- \***1663. asperrima**, d'Orb., 1847. *Gemmipora asperrima*, Michelin, 1845, Icon. zooph., p. 163, pl. 45, fig. 5. Auvert, Valmondois, Assy.

**ASTROCCENIA**, Edwards et Haime, 1849.

- 1664. microstella**, d'Orb., 1847, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 161, pl. 45, fig. 3. Valmondois, Aumont, Nanteuil.

**OULOPHYLLIA**, Edwards et Haime, 1848.

- 1665. Valmondoisiaca**, d'Orb., 1847. *Meandrina id.* Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 155, pl. 43, fig. 13. Auvert, Valmondois, Assy, Bouconwillers.

**CYATHOSERIS**, Edwards et Haime, 1849.

- \***1666. infundibuliformis**, Edw. et Haime, 1849. *Agaricia infundibuliformis*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 156, pl. 43, fig. 12. Auvert, Valmondois, Betz, Assy.

**DENDRACIS**, Edwards et Haime, 1849.

- \***1669. Gervillei**, Edwards et Haime, 1849. *Madrepora Gervillei*, DeFr., 1826, Michelin, Iconogr. zoophyt., p. 165, pl. 45, fig. 7, 8. Auvert, Valmondois, Assy-en-Multien. Le *M. Solanderii*, du même auteur, pl. 43, fig. 7, paraît être la même espèce roulée.

**MILLEPORA**, Lamarck, Linné.

- 1670. deformis**, d'Orb., 1847. *Heliopora id.*, Michelin, 1845, Icon. zoophyt., p. 164, pl. 45, fig. 6. Auvert, Valmondois.

- \*1671. *Solanderii*, d'Orb., 1847. *Pocillopora id.*, DeFrance, *Pal-mipora id.*, Michelin, p. 166, pl. 45, fig. 9. Auvert, Étairgny, Nanteuil.  
**LITHARCEA**, Edwards et Haime, 1849.  
 \*1671'. *Deshaysiana*, Edwards et Haime, 1849. *Porites Deshay-siana*, Michelin, Icon. zooph., pl. 45, fig. 5. Auvert.  
**POLYTREMA**, Risso, 1825.  
 \*1672. *subpyriformis*, d'Orb., 1847. *Geodia pyriformis*, Miche-lin, Icon. zooph., p. 178, pl. 46, fig. 2 (non Lamouroux, 1821). Mon-neville (Oise).

## FORAMINIFÈRES D'ORB.

**NUMMULITES**, Lamarck.

- \*1673. *variolaria*, d'Orb., 1847. *Lenticulina variolaria*, Lam., Anim. s. vert., 7, p. 619, n. 2; Sow., pl. 538, fig. 3. Auvert, Ormoy-Villers, Villemetrie, Cuvergnon, les Clergis (Oise); Anglet., Londres, Stubbington.

**ASSILINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.

- \*1674. *radiolata*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 130, n. 5. Auvert.

**ROTALIA**, Lamarck. Voy. Foraminifères de Vienne.

- \*1675. *subcarinata*, d'Orb., 1847. *Gyroïdina id.*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 112, n. 8. Montmirail, Ermenonville.

**TRUNCATULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.

- \*1676. *contecta*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 113, n. 4. Es-pèce presque lisse, tranchante. Ermenonville.

**SPIROLOCULINA**, d'Orb., 1825. Voy. Foraminifères de Vienne.

- \*1677. *pulchella*, d'Orb., 1825, Ann. des Sc. nat., p. 133, n. 13. Auvert.

## ERRATA.

Étage 1 B. N° 146, au lieu de *Leptana pecten*, lisez *L. Subpecten*, [le nom de *Pecten* se trouvant déjà. Étage 3, n° 712.

Étage 10. N° 548, au lieu de *Clausastrea tessellata*, lisez *C. Subtessellata*, ce nom étant déjà donné à une autre espèce. Étage 25, n° 1280.

Étage 13. N° 418, au lieu de *Gervilia lata*, lisez *G. Sublata*, ce nom faisant double emploi.

Étage 14. N° 534. au lieu de *Pseudocania ramosa*, lisez *P. Subramosa*, pour faire disparaître un double emploi.

Étage 17. N° 523, au lieu de *Prionastrea infundibulum*, lisez *P. Subinfundibu-lum*, ce nom ayant déjà été appliqué.

Étage 20. N° 466, au lieu de *Gervilia Aviculoides*, lisez *G. Subaviculoides*, ce nom appartenant à une autre espèce.

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME

---

## TERRAINS JURASSIQUES.

Quatorzième étage : <i>Corallien</i> .....	
Quinzième étage : <i>Kimmeridgien</i> .....	
Seizième étage : <i>Portlandien</i> .....	

## TERRAINS CRÉTACÉS.

Dix-septième étage : <i>Néocomien</i> .....	
A. <i>Néocomien</i> inférieur ou <i>Néocomien</i> .....	
B. <i>Néocomien</i> supérieur ou <i>Urgonien</i> .....	
Dix-huitième étage : <i>Aptien</i> .....	
Dix-neuvième étage : <i>Albien</i> .....	
Vingtième étage : <i>Cénomanién</i> .....	
Vingt-unième étage : <i>Turonien</i> .....	
Vingt-deuxième étage : <i>Sénonien</i> .....	
Vingt-troisième étage : <i>Danien</i> .....	

## TERRAINS TERTIAIRES.


Vingt-quatrième étage : <i>Suessonien</i> ou <i>Nummulitique</i> .....	
Vingt-cinquième étage : <i>Parisien</i> .....	
A. Partie supérieure.....	
B. Partie inférieure.....	

FIN DE LA TABLE.





562  
064





Stanford University Libraries



3 6105 004 563 123

546672

Rare  
Book

